





12693

UNITED

NATIONAL M



Digitized by the Internet Archive
in 2026

INTER

THE NATIONAL

5v

13

ANNALES

DU

BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE

DE FRANCE.

MÉMOIRES.

LIBRARY
SIGNAL OFFICE.
No. 12893
Shelf
Case



MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE.

ANNALES

DU

FRANCE. BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE

DE FRANCE,

PUBLIÉES

PAR E. MASCART,

DIRECTEUR DU BUREAU CENTRAL MÉTÉOROLOGIQUE.

ANNÉE 1887.

I.

MÉMOIRES.


QC
989
.F8
A56
année
1887
pt. 1

PARIS,


GAUTHIER-VILLARS ET FILS, IMPRIMEURS-LIBRAIRES,

Quai des Grands-Augustins, 55.

1889



12893



INTRODUCTION.

Les *Annales du Bureau central météorologique* pour l'année 1887 sont, comme pour l'année précédente, composées de trois Volumes : le tome I, sous le titre *Mémoires*, contient les Mémoires originaux sur la Météorologie publiés par le personnel du Bureau central ou des observatoires, l'étude des orages, les observations magnétiques, etc. ; dans le tome II, sous le titre *Observations*, on trouve les observations météorologiques proprement dites, recueillies pendant l'année en France, en Algérie, et dans les consulats et postes météorologiques français établis à l'étranger ; enfin le tome III, sous le titre *Pluies en France*, est consacré spécialement à l'étude détaillée du régime des pluies dans notre pays.

Le tome I renferme d'abord, comme d'habitude, un travail de M. Fron sur le caractère des orages observés en France l'année précédente, c'est-à-dire en 1886, et des Cartes journalières formant une sorte de statistique générale.

M. Moureaux a publié le détail des observations recueillies en 1887 sur le magnétisme terrestre au Parc Saint-Maur, avec une revue des caractères présentés par les perturbations ; huit Planches reproduisent exactement les courbes fournies par les appareils enregistreurs pour les perturbations les plus intéressantes.

A la suite de ces observations, nous donnons celles qui ont été recueillies en 1887 à l'observatoire de Perpignan, par M. Cœurdevache, sous la direction de M. le D^r Fines.

Dans un second Mémoire, M. Moureaux a étudié la périodicité des perturbations de l'aiguille aimantée horizontale, d'après les cinq premières années d'observations recueillies au Parc Saint-Maur.

Nous avons publié ensuite *in extenso* les observations magnétiques effectuées, pendant l'année 1887, par M. Moureaux en cinquante-deux stations dans le bassin occidental de la Méditerranée, avec un Appendice contenant d'autres observations inédites faites par M. Lephay dans le Levant. Trois Cartes, qui résument cet important travail, donnent la répartition des éléments magnétiques dans l'ouest de la Méditerranée pour le 1^{er} janvier 1888.

M. Renou, continuant ses intéressantes recherches sur le climat de Paris, a résumé et discuté les observations de températures relevées de 1664 à 1886.

M. Angot a publié une série de formules et de Tables destinées à faciliter le calcul de la variation annuelle des éléments météorologiques et la représentation de cette variation par une formule périodique.

Dans le travail suivant, M. Angot a étudié la variation diurne du baromètre dans soixante-dix stations, dans le but d'arriver à une explication de ce phénomène; c'est le travail le plus complet qui ait encore été publié sur cette intéressante question.

Enfin, M. L. Teisserenc de Bort a essayé de reconstituer *a priori* la répartition des pressions à la surface du globe pour les mois de janvier et de juillet.

Le tome II (*Observations*) contient généralement les observations des mêmes stations que celui de l'année précédente; toutefois on a ajouté, pour le Pic-du-Midi, les observations de la nuit, obtenues au moyen des enregistreurs, qui fonctionnent maintenant d'une manière régulière dans cet observatoire.

Aucune modification notable n'a été apportée dans la composition du tome III (*Pluies en France*).

Le Directeur du Bureau central météorologique,

E. MASCART.

RAPPORT

LU, LE 4 AVRIL 1888,

A LA SÉANCE GÉNÉRALE DU CONSEIL DU BUREAU CENTRAL

PAR LE VICE-PRÉSIDENT, M. L'AMIRAL CLOUÉ,

CONFORMÉMENT A L'ARTICLE 13 DU DÉCRET DU 14 MAI 1878.

MESSIEURS,

C'est la seconde fois, depuis la création du Bureau central météorologique, que j'ai l'honneur de suppléer, à cette grande réunion annuelle, notre éminent et cher Président, M. Hervé Mangon. Il y a deux ans, ses devoirs de Ministre de l'Agriculture l'avaient empêché de se rendre à cette assemblée; aujourd'hui, j'ai le regret de le dire, c'est par suite d'un empêchement d'un ordre plus grave que vous ne le voyez pas au milieu de nous; c'est malheureusement sa santé, profondément altérée, qui l'empêche de prendre part à nos travaux.

Dès l'origine, il a été élu notre Président, c'est lui qui a organisé ce grand Service météorologique devenu si utile et, j'ose dire, si indispensable qu'on ne saurait plus s'en passer désormais.

Vous savez, messieurs, avec quelle haute compétence, quel vif intérêt M. Mangon a constamment dirigé et suivi nos travaux; c'est vous dire quel profond chagrin il éprouve de ne pouvoir venir ici vous exposer, avec la clarté qui lui est propre, les résultats auxquels nous sommes parvenus, grâce aux progrès introduits sur ses indications dans toutes les parties du Service.

M. Mangon a voulu présider la première réunion de notre Conseil, qui a eu lieu dans le nouveau local situé rue de l'Université. Il a tenu à être présent à cette inauguration; ce fut son dernier effort, il n'a plus quitté son appartement depuis. J'espère, messieurs, que la belle saison dans laquelle nous allons entrer lui permettra de reprendre, avec la santé, ses habitudes laborieuses, en même temps que la direction de nos travaux dans le Conseil du Bureau central.

Vous avez dû le remarquer, messieurs, le personnel du Conseil et du Service

météorologique est cruellement éprouvé; chaque année, la mort fauche quelque'un de ses membres ou de ses plus utiles collaborateurs. Cette année, c'est à la fois un des plus jeunes et des plus brillants, j'ajouterai un des plus sympathiques, qu'elle nous a ravi, alors que tout nous faisait espérer que ce regretté et savant Collègue, le général Perrier, nous apporterait pendant bien des années encore son concours si intelligent et si éclairé.

Vous savez, messieurs, quels beaux travaux géodésiques ont été dirigés par le regretté général. C'est lui qui, avec les géodésiens espagnols, a exécuté cette magnifique opération dont le résultat a été de relier l'Espagne à l'Algérie à l'aide de triangles de plus de 200^{km} de côtés, qui franchissaient la Méditerranée.

C'est le général Perrier et son personnel qui ont étendu cette chaîne de triangles sur le continent africain, et l'ont poussée jusqu'aux confins du désert.

D'un autre côté, il avait fait relier la triangulation de Tunisie avec celle de la péninsule italienne, fermant ainsi le cercle de cet immense réseau qui, par deux côtés, atteint l'Afrique à travers la Méditerranée.

Ces grands travaux de Géodésie rendent impérissable le nom de Perrier. Membre du Conseil du Bureau central depuis sa création, le regretté général, très assidu à nos séances, nous y a constamment apporté un concours bien précieux. C'est certainement à lui que nous devons la création de l'observatoire météorologique de l'Aigoual, si intéressant pour le midi de la France, et qui peut être considéré comme son œuvre propre, tant il a déployé de persistance et de zèle pour conquérir les ressources nécessaires à son établissement.

C'était un collaborateur aussi précieux par ses connaissances scientifiques que de relations agréables et faciles, grâce à son caractère sympathique. Il était adoré de ses inférieurs, car il était aussi juste et bon que chef capable; son œuvre scientifique lui survivra, son observatoire de l'Aigoual sera prochainement inauguré.

J'arrive au compte rendu des travaux du Service.

Avertissements. — Le service des avertissements aux ports et à l'Agriculture a été très régulier pendant l'année 1887. Le nombre des dépêches reçues chaque jour est de 154, comme l'année précédente; on en expédie 42, soit une de plus qu'en 1886.

Les prévisions du *Bulletin international* ont été exactes 90 fois sur 100; ce chiffre avait été atteint déjà en 1884, mais n'a pas encore été dépassé. C'est à peu près la limite de ce qu'on peut espérer, dans l'état actuel de la Science.

Quant aux avis spéciaux de tempêtes, on en a expédié 182 aux quatre districts maritimes; sur ce nombre, il y en a eu 108 bons, 29 assez bons et 45 mauvais, soit 75 pour 100 d'avis bons ou assez bons; proportion un peu plus faible que l'année précédente (82 pour 100), mais égale à celle des années 1883, 1884

et 1885. Ce qui est important à noter, c'est qu'aucune tempête n'a été imprévue. Les avis considérés comme mauvais se rapportent à des annonces de tempêtes que l'on n'a pas ressenties.

Trois journaux nouveaux ont demandé la communication des documents météorologiques : le *Petit Parisien*, les *Débats* et la *France nouvelle*. Par contre, le journal *le Français* a cessé de paraître. La situation atmosphérique est donc communiquée actuellement à 24 journaux, au lieu de 22 en 1886.

Climatologie. — Le nombre des stations dont les observations sont reçues régulièrement chaque mois est de 143, savoir : 13 observatoires, 86 écoles normales, 21 phares, 2 sémaphores et 21 stations diverses où l'on fait au moins trois observations par jour. A ce nombre, il convient d'ajouter plusieurs centaines de stations où l'on ne fait qu'une observation par jour, et dont les données sont centralisées par les Commissions météorologiques qui nous les transmettent ensuite.

Le nombre des stations pluviométriques était de 1785 au 1^{er} janvier 1887, en diminution de 15 sur le total de l'année précédente.

Les observations simultanées transmises tous les mois aux États-Unis d'Amérique ont été faites dans 43 stations comme l'année précédente.

Le surcroît de travail dû au déplacement des bureaux n'a pas permis de faire d'inspection en 1887.

Il a été comparé, au Bureau météorologique, 47 baromètres à mercure, 9 métalliques et 421 thermomètres. Le Bureau a prêté 13 baromètres, 79 thermomètres, 11 psychromètres, 41 pluviomètres et 11 instruments divers.

Météorologie générale. — Le service a reçu les observations de 11 consulats, 8 stations de colonies et 11 stations étrangères. Soit 2 consulats de plus et 2 stations étrangères de moins qu'en 1886.

Les observations météorologiques de Madagascar font toujours défaut, mais les instruments indispensables vont être fournis et expédiés incessamment par le Bureau; 2 stations pourront être provisoirement installées à Tamatave et à Tananarive.

Il nous a été adressé, cette année, 452 journaux de bord, au lieu de 502 en 1886; mais la diminution est plutôt apparente que réelle, car les registres envoyés par le port de Marseille sont plus volumineux et contiennent plus d'observations que l'année dernière; de sorte que, bien que le nombre des journaux ait diminué, celui des journées d'observation sur la Méditerranée a au moins quintuplé.

Les Bureaux maritimes du Havre, de Saint-Nazaire et de Marseille ont con-

tinué à fonctionner régulièrement; on s'occupe d'organiser ceux de Dunkerque et de Bordeaux.

On a prêté aux navires de commerce et aux consulats 10 baromètres à mercure, 4 thermomètres et 1 pluviomètre.

16 médailles ont été données aux auteurs des meilleurs livres de bord.

Observatoires. — Aucune modification importante ne s'est produite en 1887 dans les observatoires du Parc Saint-Maur, de Nantes, de Perpignan et du Pic-du-Midi.

Au Puy-de-Dôme, le terrain appartenant à l'observatoire a été limité par une clôture; la tour qui domine la montagne a dû subir de nombreuses réparations destinées à empêcher l'infiltration de l'eau dans les salles des instruments. Malheureusement, le crédit alloué n'a pas permis d'achever tous les travaux: on a dû se borner à ceux qui étaient absolument indispensables.

L'observatoire du Mont-Ventoux, en faveur duquel vous aviez l'habitude d'entendre dans nos réunions annuelles des défenseurs ardents et éloquents, est près de sortir de la situation difficile qui vous était signalée l'an dernier. Un crédit qui doit lui être affecté figure pour la première fois sur notre budget.

L'observatoire de l'Aigoual est en voie d'achèvement.

Les observatoires particuliers de M. Carlier, à Saint-Martin-de-Hinx (Landes), et de M. l'abbé Raclot, à Marac (Haute-Marne), continuent à fonctionner régulièrement et dans d'excellentes conditions.

Le service météorologique de l'Algérie se développe peu à peu, grâce à l'activité de son directeur, M. Thévenet.

Publications, bibliothèque. — Depuis notre dernière réunion, le Bureau a fait paraître le tome II (dernière Partie) de 1884, les tomes I et III de 1886. La première Partie du tome II de 1885 sera terminée dans quelques jours; la seconde Partie ne pourra malheureusement pas être achevée avant un an, car on est forcé d'attendre pour la rédiger que toutes les observations de l'étranger nous soient parvenues.

L'expérience de huit années nous a montré que, pour donner plus d'homogénéité à la composition des *Annales du Bureau central*, il y avait intérêt à les ramener à trois volumes par an au lieu de quatre. Le tome IV comprenait, en réalité, deux Parties absolument distinctes: des Mémoires originaux et des données d'observation. Ces deux ordres de matières ont été réunis respectivement aux tomes I et II.

A partir de l'année 1886, les *Annales* se composeront donc seulement de trois volumes: dans le tome I, sous le titre *Mémoires*, seront tous les Mémoires originaux; dans le tome II, sous le titre *Observations*, on trouvera toutes les obser-

vations recueillies pendant l'année en France, en Algérie, dans les colonies et dans les stations météorologiques françaises établies à l'étranger. Enfin, le tome III, sous le titre *Pluies en France*, sera consacré spécialement, comme par le passé, à l'étude détaillée du régime des pluies dans notre pays.

Pendant l'année 1887, le Bureau a reçu à titre d'échanges ou acquis à ses frais 247 volumes ou brochures, sans compter 85 publications périodiques françaises ou étrangères.

Commissions départementales. — L'organisation des Commissions météorologiques a continué de faire quelques progrès en 1887. Les Commissions restent constituées dans 76 départements et manquent encore dans 10 autres. 13 Commissions publient un Rapport mensuel, 15 un Rapport annuel. En outre, comme l'année dernière, le Nord publie un Rapport annuel sur les pluies, et l'Oise un Rapport autographié. Enfin, les observations de Limoges sont insérées dans le journal *le Gay-Lussac*, et celles de Versailles dans le *Bulletin de la Société d'Agriculture de Seine-et-Oise*.

Dépêches d'Amérique. Exposition du Havre. — Les dépêches quotidiennes d'Amérique ont été reçues régulièrement en 1887 et rendues plus complètes; elles donnent maintenant non seulement, comme l'année dernière, le maximum et le minimum barométriques, et en moyenne trois observations de navires, les tempêtes, *icebergs* et épaves qui peuvent être rencontrés, mais encore deux stations du Canada, la distribution des pressions sur le continent des États-Unis et des observations plus détaillées sur les tempêtes en mer.

Le code télégraphique employé permet, en outre, de recevoir les observations de glaces flottantes ou d'épaves. Tous ces documents sont portés chaque jour sur des Cartes, et, pour pouvoir les compléter et rectifier les erreurs de transmission télégraphique, le *Signal Office* de Washington nous envoie toutes les semaines, par paquebot, l'original des dépêches transmises la semaine précédente. De notre côté, nous communiquons immédiatement ces originaux au *Meteorological Office* de Londres.

Comme on vous l'annonçait l'an dernier, le Bureau a pu prendre part à l'Exposition du Havre, grâce à la générosité d'un anonyme. Notre exposition a paru intéresser beaucoup les visiteurs, et il en a été rendu compte dans les journaux du Havre. Enfin, quatre prix ont pu être décernés par nous : l'un à un capitaine du port du Havre qui a présenté le meilleur journal de bord, les trois autres aux exposants des meilleurs instruments de Marine et de Météorologie.

Magnétisme. — Les observations magnétiques sont poursuivies régulièrement suivant la méthode adoptée pour ces recherches si intéressantes sur la physique

du globe. Nous avons pour la première fois publié, dans le tome I de nos *Annales*, les observations de Perpignan à côté de celles du Parc Saint-Maur.

M. Moureaux a étendu cette année à l'Algérie et à la Tunisie la détermination des éléments magnétiques, qu'il avait terminée pour la France. Nous publierons prochainement les résultats de ses observations.

Notre budget n'a subi aucune diminution et, au contraire, il a été possible de conserver une partie des sommes consacrées au loyer de l'ancien local, afin de satisfaire aux besoins d'entretien du nouvel établissement, qui est plus vaste, et pour une dotation à l'observatoire du mont Ventoux.

Nous n'avons donc qu'à nous louer des dispositions favorables du Ministre et des pouvoirs publics à notre égard.

La prise de possession du nouveau local affecté au service du Bureau central météorologique a eu lieu le 15 octobre 1887. Cette installation est on ne peut plus confortable et ne laisse rien à désirer. Les bureaux sont vastes et commodés, la bibliothèque est très bien organisée; le laboratoire, muni de tous les instruments les plus perfectionnés et exécutés par les meilleurs artistes, sera à la hauteur des progrès de la Science.

Aussi, messieurs, je suis heureux de vous dire qu'aussitôt les derniers travaux d'aménagement terminés, nous aurons là un établissement digne d'être montré aux étrangers, et où le service trouvera tous les moyens de développement qu'exige une grande institution scientifique.

Troisième période, du 18 au 23. — Le baromètre remonte, le vent est faible et variable, les pluies deviennent rares. Des orages disséminés, mais encore assez nombreux, éclatent le 18 et le 19; puis leur nombre diminue rapidement.

Quatrième période, du 24 au 31. — Pendant cette période, le vent des régions Est domine, la température est peu élevée. Des pluies torrentielles et des inondations ont lieu dans le sud-est de la France. La situation générale de l'Europe est la suivante : de fortes pressions sont stationnaires dans le nord de la Russie, où elles surpassent 780^{mm}. Les dépressions principales, concentrées dans le golfe de Gascogne, envoient des dépressions secondaires vers l'Angleterre et vers les côtes de Provence et d'Algérie. Ce sont ces dernières qui causent les pluies torrentielles signalées surtout sur les montagnes qui limitent les bassins de la Garonne et du Rhône. Dans un grand nombre de stations, on recueille plus de 100^{mm} d'eau en un jour. Ces pluies désastreuses sont accompagnées d'orages qui sévissent surtout, le 24, dans l'Ouest; le 25, dans tout le Sud; les 26, 27 et 28, dans le Sud-Est.

En résumé, pendant ce mois, on signale 29 jours d'orages, ayant sévi sur 337 départements.

Novembre 1886.

Novembre est un peu chaud, un peu pluvieux à Paris, avec pression barométrique légèrement au-dessus de la normale. Mais il est remarquable encore par les pluies torrentielles et les inondations, qui ont repris dans le sud-est de la France.

Première période, du 1^{er} au 5. — Le vent des régions Sud domine, le temps est pluvieux; quelques orages, rares et sans importance, sont signalés.

Deuxième période, du 7 au 13. Pluies torrentielles et inondations nouvelles dans le sud-est de la France. — Les pressions élevées séjournent encore dans l'est et le sud-est de l'Europe. Sur l'ouest, le baromètre est bas, principalement dans le golfe de Gascogne et vers la Péninsule Ibérique. Plusieurs dépressions, formées sous l'influence d'une bourrasque du Nord, ou bien venant directement de la Gascogne et de Gibraltar, traversent la France et se dirigent vers le golfe du Lion, la Corse et le golfe de Gênes; elles amènent des orages ou de très mauvais temps, surtout dans le bassin du Rhône et de Marseille à Nice. Les orages sont signalés le 6 dans le Nord; le 7, ils commencent en Gascogne et s'étendent vers le Rhône; du 9 au 11, ils sont violents dans le Sud-Est, puis diminuent à partir du 12.

Troisième période, du 14 au 30. — Du 14 au 18, le temps reste pluvieux par vents d'Ouest, les orages deviennent rares; on signale 2 départements atteints le 18. A partir du 19 jusqu'au 28, le temps devient beau et froid par vents d'Est; un seul orage est signalé le 19 et un le 22. Enfin, du 29 au 30, le vent revient à l'Ouest, les pluies reprennent. On signale un orage le 29 et deux le 30.

En résumé, il y a eu en novembre 18 jours d'orages et 62 départements ont été atteints.

Décembre 1886.

Le mois de décembre est chaud, très pluvieux, avec une pression de beaucoup au-dessous de la moyenne. Les orages sont assez nombreux; ils coïncident tous avec le passage de fortes dépressions.

Première période, du 1^{er} au 5. — Vent des régions Nord, sauf le 4. Température basse. Les orages éclatent, le 2, sur 5 départements; ils se rapportent à deux minima, qui se montrent l'un en Norvège, l'autre vers Gênes. Le 3 et le 4, les orages sévissent encore en Corse.

Deuxième période, du 6 au 16. — Elle correspond à un régime de mauvais temps d'Ouest, avec fortes dépressions et température relativement élevée. Les orages commencent, le 7, dans tout le nord et dans le sud-ouest de la France; ils précèdent la violente tempête du 8 décembre, dont le centre est ce jour, à 6^h du soir, au nord de Liverpool, près de Barrow in Furness (696^{mm}). Tandis que les vents soufflent avec violence, des manifestations électriques ont lieu, le 8, sur 15 départements. L'ouragan continue le 9, et 13 départements sont encore atteints; le 10, son centre est en Norvège, les orages n'atteignent plus que 6 départements. Mais une nouvelle dépression arrive de l'Ouest; elle est, le 12, sur la mer du Nord, et les orages sévissent encore sur tout le nord de la France, atteignant 25 départements. Enfin, un nouveau minimum se dirige vers l'Irlande le 14, 5 départements sont frappés; il est le 15 vers Londres, et les manifestations électriques se font sentir surtout dans l'est de la France, atteignant encore 20 départements; le lendemain 16, 11 départements seulement signalent des orages.

Troisième période, du 16 au 25. — A partir du 16, nous entrons dans un régime d'hiver, le temps froid domine, les neiges sont abondantes. Quelques orages rares sont signalés le 17, le 20 et le 23.

Quatrième période, du 26 au 31. — Les vents du Nord dominant encore; mais, le 27, une violente tempête passe sur la Manche, et les derniers orages sévisent, les 28 et 29, sur 4 départements.

En résumé, pendant ce mois de décembre, il y a eu 19 jours d'orages et 137 départements ont encore été atteints.

TEXTE DES CARTES DES PRINCIPAUX ORAGES DE 1886.

Orages du 10 août 1886.

L'après-midi du 10 août 1886, un groupe d'orage remarquable par son intensité plus encore que par son étendue embrasse toute la partie Nord-Est du territoire français.

Il fait son apparition vers midi, suivant une ligne se confondant sensiblement avec le méridien de Paris; ses premiers effets sont signalés à Arras, Amiens, Beauvais, Versailles, Rambouillet; la direction générale est de l'Ouest-Nord-Ouest à l'Est-Sud-Est. Toutefois, vers les frontières Nord-Est et Est de la France, le groupe orageux s'infléchit vers le Sud-Est; à 11^h du soir, il se trouve sur la crête du Jura et quitte le territoire français pour entrer en Suisse, après avoir couvert une partie de la Flandre, de l'Artois, de la Picardie, toute l'Ile-de-France, la Champagne, la Lorraine, la haute Bourgogne et la Franche-Comté.

Pendant toute la durée de cet orage, le vent a été violent, la pluie abondante, les chutes de foudre assez fréquentes; mais les plus grands ravages ont été occasionnés par la grêle. Nous allons passer en revue les dégâts causés par ces divers phénomènes.

Dans le département de Meurthe-et-Moselle, le village de Liverdun a été assailli par une véritable tourmente d'une durée de quatorze minutes, nombre d'arbres ont été arrachés et brisés; de même à Champigneules et Villey-le-Sec.

Dans les Vosges, à la violence du vent qui, notamment à Liffol, a brisé des arbres et renversé des hommes, sont venues s'ajouter des pluies torrentielles. A Trampot, 10^{mm}, 7 sont tombés en dix minutes, et à Neufchâteau, 11^{mm}, 5 en

vingt minutes. Dans l'Yonne, à Joigny, une pluie de 22^{mm} en vingt minutes occasionne de grands dégâts.

On a signalé des chutes de foudre dans l'Yonne, à la Celle-Saint-Cyr, où un bâtiment a été incendié; dans les Vosges, à Saint-Dié, sur l'usine Chrétien; dans Meurthe-et-Moselle, à Longuyon, où un chêne a été brisé.

Les chutes de grêle ont sévi avec violence dans presque tous les départements. Dans Seine-et-Marne, elles ont causé, à Trilport, de nombreux dégâts; dans le Loiret, à Rebrechien, le pays a été ravagé au nord-est et à l'est de cette commune; dans l'Aube, à Breurey, des grêlons de la grosseur d'une noix, mêlés à la pluie, ont endommagé gravement les récoltes et raviné les terres; à Moncel-les-Lunéville, dans Meurthe-et-Moselle, des oiseaux ont été tués; par contre, dans les Vosges, on n'a signalé que peu de dégâts.

Mais le département où cet orage a fait sentir ses effets les plus désastreux est, sans contredit, celui des Ardennes. Le *Bulletin* de la Commission météorologique des Ardennes en rend ainsi compte :

« Cet ouragan a présenté une intensité exceptionnelle et causé de véritables désastres, après avoir déjà ravagé le département de l'Aisne et les régions situées sur sa trajectoire. Il a duré de 2^h à 5^h du soir, s'est étendu sur presque tout le département. Quoique peu violent, il se présentait avec un aspect menaçant : temps très sombre, nuages de couleur cuivrée, pluie assez faible; tonnerre peu intense, mais continu et bas, quelques éclairs semblant raser le sol; dans la zone grêlée, les phénomènes orageux avaient plus d'intensité.

» L'ouragan de grêle est arrivé avec une rapidité foudroyante; sa durée n'a pas dépassé douze à quinze minutes. Il est entré dans le département près de Villers, devant le Thour, à 2^h30^m, l'a traversé suivant une bande presque rectiligne de 10^{km} à 11^{km} de largeur, orientée de l'Ouest-Sud-Ouest à l'Est-Nord-Est, puis est passé en Belgique du côté d'Escombres vers 3^h45^m.

» Sur tout son parcours, les récoltes ont été détruites, les arbres cassés ou abattus, les vitres et ardoises brisées, les petits animaux tués dans les champs ou les basses-cours, les hommes contusionnés. Les pertes éprouvées dans le département ont été évaluées à environ 6 millions de francs.

» Les grêlons avaient généralement un diamètre de 0^m,015 à 0^m,020; ils atteignaient en beaucoup d'endroits la grosseur d'un œuf de poule; on en a signalé de formes variées dont deux dimensions avaient 0^m,06.

» La vitesse du vent était énorme; sur les routes, un grand nombre d'arbres ont été coupés à 2^m ou 3^m du sol; dans les massifs forestiers, des chênes et des hêtres de 1^m,20 à 2^m de circonférence étaient renversés ou cassés en deux au quart ou au tiers de leur hauteur à partir du sol et les parties supérieures transportées à 30^m du tronc. Dans la forêt domaniale d'Élan, 600 arbres ont été ainsi

déracinés ou brisés; un hêtre de 1^m,40 de tour a été foudroyé et réduit en esquilles. Les bois communaux de Rémilly, Villers-devant-Mouzon, Autrecourt ont été plus éprouvés encore que les jeunes coupes situées à l'Ouest. Sur ce point, un quart au moins des réserves a été abattu ou brisé. Le sol était heureusement sec; s'il avait été détrempé par les pluies, il est probable que toutes les réserves auraient été arrachées.

» La direction des arbres abattus est assez constante sur le même point, mais diffère assez notablement d'un point à l'autre. La direction d'ensemble est d'ailleurs à peu de chose près celle de la marche du météore lui-même. Dans les bois qui bordent la frontière belge aux environs d'Escombres, les dégâts ont, au contraire, été insignifiants.

» Un autre ouragan de grêle venu du département de la Marne est entré dans les Ardennes par le Sud, du côté de Saint-Étienne; la grêle a causé des dégâts dans cette localité et à Semide, puis l'intensité du météore a diminué : il semble être allé se confondre avec le premier. Les dégâts paraissent avoir eu le plus d'importance à leur point de réunion, c'est-à-dire entre Vendresse, Omicourt, Connage et Bazeilles.

» La zone grêlée par l'ouragan principal a environ 80^{km} de longueur sur 10^{km} de largeur, soit un total de 800^{kmq}, qui ont été recouverts d'une couche de glace au moins équivalente à une épaisseur moyenne de 0^m,01. Le volume correspondant est de 8 millions de mètres cubes, pesant près de 8 millions de tonnes.

» Telle est l'énorme quantité d'eau congelée qui est tombée en moins d'un quart d'heure sur le département des Ardennes. »

Cartes fournies par les Commissions départementales pour les orages du 10 août 1886.

Aube.....	MM. SAILLARD, Président de la Commission.
Seine-Inférieure.....	VIVENOT, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Vosges.....	R. DENYS, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Orages du 23 août 1886.

L'après-midi du 23 août présente deux groupes d'orages intéressants; ces deux orages, quoique indépendants l'un de l'autre, commencent en même temps.

Le premier groupe se compose lui-même de deux orages venant l'un du Nord-Ouest vers la Bretagne, l'autre du Sud vers le Poitou, et commençant tous deux vers 1^h de l'après-midi.

L'orage de Bretagne, dont la direction est du Nord-Ouest au Sud-Est, ne tarde pas à rencontrer celui du Poitou, marchant du Sud au Nord; ils opèrent leur jonction aux environs de Niort et forment alors un groupe unique dont la direction est du Sud-Ouest au Nord-Est. A ce moment, l'orage présente dans

sa marche une particularité intéressante : la partie centrale est animée d'une vitesse de propagation très faible, et même, vers 5^h de l'après-midi, se concentre en une sorte d'ellipse dont le grand axe va de Niort à Tours. Aux extrémités du petit axe, les deux ailes s'étendent beaucoup plus rapidement : l'orage de Bretagne se transporte jusque vers Alençon, où il se termine à 5^h du soir, au moment où celui du Poitou disparaît aux environs de Bourges. En somme, on peut dire d'une manière plus exacte que ces deux orages conservent leur allure particulière et ne font que se toucher par leurs bords, ce qui donne naissance au mouvement giratoire qui se produit entre Niort et Tours; et que l'orage du Poitou a très peu dévié dans sa trajectoire, qui du Nord se trouve portée au Nord-Est, tandis qu'au contraire l'orage de la Bretagne, dont la direction primitive était du Nord-Ouest au Sud-Est, a, par suite de sa rencontre avec le second orage, vu dévier sa marche, qui s'est modifiée dans le sens du Nord-Est.

Les dégâts causés ont été très peu nombreux.

Dans la Sarthe, les chutes de foudre sont fréquentes, mais ne paraissent pas avoir eu de suites fâcheuses : on en signale à Conlie, Amné, Souigné, Loué, La Chapelle-d'Aligné, La Flèche, Le Lude, Château-du-Loir, Dissais et Couraillon. Dans le département de l'Orne, seul, les récoltes ont souffert de la grêle, notamment à Ventes-de-Bourses.

Le second groupe d'orages commence aussi vers 1^h. Il est signalé seulement du côté de Versailles et dans le Morvan; mais à 2^h il est dans toute sa force et s'étend sur une ligne passant par Beauvais, Paris, Montargis, Auxerre, Semur, Chalon-sur-Saône et Lons-le-Saulnier. Sa direction générale est du Sud-Ouest au Nord-Est; et ce groupe d'orages présente les mêmes caractères que le précédent.

Un orage éclate à l'ouest de Versailles vers 1^h et se dirige de l'Ouest à l'Est. Un autre apparaît dans le Morvan au même moment et se dirige d'abord du Sud-Ouest au Nord-Est; puis, lorsqu'il est dans tout son développement, vers 3^h, il atteint la frontière suisse, se trouve arrêté par la chaîne du Jura et les ballons des Vosges, se développe parallèlement à leur crête et se recourbe vers le Nord et le Nord-Ouest. Il rencontre ainsi le premier orage vers 5^h : à ce moment, sa direction est sensiblement de l'Est à l'Ouest, tandis que celle du premier s'est maintenue de l'Ouest à l'Est.

D'une manière plus exacte, ce groupe se compose de deux orages : chacun a pour base le côté d'un angle droit et se propage suivant un arc de cercle ayant pour rayon cette base et pour centre le sommet de l'angle, de sorte qu'ils se rencontrent suivant une ligne qui ne serait autre que la bissectrice de l'angle. C'est justement sous cet aspect que se présente la courbe formée par la jonction des points où l'orage se trouvait à 5^h.

Le premier orage, venu de l'Ouest, a sévi sur les départements de Seine-et-Oise, Seine, Seine-et-Marne, Aisne, Oise et Nord; le second, venu du Sud, a cou-

vert presque toute la Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine et la Champagne. Des chutes de foudre ont été signalées dans le Nord, à Ors, où elles ont causé des incendies et tué des bestiaux; dans la Côte-d'Or, aux environs de Mailly, où deux maisons ont été brûlées; dans l'Yonne, à Cussy, Sauvigny, Maligny, Mailly-la-Ville, Bois-d'Arcy, Domecy-sur-Cure où un bâtiment a été incendié. Dans ce dernier département, de très fortes pluies endommageant les récoltes se sont produites à Massangis (28^{mm} en 35 minutes) et à Annoux (35^{mm} en 40 minutes).

Dans les Vosges, les chutes de foudre ont été fréquentes : à Cornimont, la foudre est tombée cinq fois en quinze minutes; à Saint-Pierremont, un peuplier a été brisé. A ces dégâts sont venus s'ajouter ceux causés par la grêle, qui ont été très grands, notamment à Crain, où les avoines ont subi un cinquième de perte et où tous les arbres ont été endommagés. Dans cette localité, la grêle est tombée pendant vingt minutes en deux fois, mêlée d'une pluie torrentielle (40^{mm} en 1 heure); les grêlons pesaient jusqu'à 2^{gr} et 3^{gr}.

Indépendamment de ces deux principaux groupes, d'autres orages n'offrant entre eux aucun rapport de continuité, et présentant plutôt un caractère local, ont exercé leur action à la frontière des Pyrénées, vers Bayonne (de midi à 1^h); dans la haute vallée de la Garonne (de 7^h à 7^h30^m soir); dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude (de 2^h à 5^h soir). Le seul groupe offrant quelque intérêt commence à 2^h au bord de la Durance, entre Aix et Avignon, se dirige du Sud-Sud-Ouest au Nord-Nord-Est, sévit à 6^h à Chambéry et se termine vers 8^h aux environs d'Annecy. En outre, quelques chutes de foudre et de grêle se sont produites, mais n'ont causé aucun dégât.

Cartes fournies par les Commissions départementales pour les orages du 23 août.

Allier.....	MM. DOUMET-ADANSON, Président de la Commission.
Aube.....	SAILLARD, Président de la Commission.
Marne (Haute-).....	L'Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Seine-Inférieure.....	VIVENOT, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.
Vosges.....	R. DENYS, Ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

RÉSUMÉ DES ORAGES EN FRANCE

ET

DE L'ÉTAT DE L'ATMOSPHÈRE PENDANT L'ANNÉE 1886;

PAR M. FRON.

Introduction.

L'étude des orages en France est fondée principalement sur l'analyse des documents fournis par les Commissions départementales. On a utilisé aussi les observations faites dans les écoles normales et dans les stations pluviométriques. A cet ensemble de données est venue se joindre l'importante collection des observations recueillies par l'administration des Forêts, ce qui a permis de compléter les renseignements dans un grand nombre de régions.

Les Planches A₁ à A₂₂ comprennent toutes les journées orageuses de l'année. Les points marqués limitent les zones où l'orage a éclaté; les lignes horaires permettent de suivre la propagation du météore. Des hachures simples désignent les régions où ont été signalées des grêles sans dégâts; s'il y a eu dégâts, les hachures sont croisées. De plus, on a indiqué à l'aide de flèches munies de pennes, dont le nombre varie de 0 à 6, la direction et la force du vent dominant à 7^h le matin ou à 6^h le soir sur les quatre grandes régions de la Manche, de la Bretagne, de l'Océan et de la Méditerranée.

Dans la description générale, nous avons réuni en groupes naturels les journées qui correspondent à des situations atmosphériques analogues.

Janvier 1886.

Le mois de janvier, pris dans son ensemble, est un peu chaud, pluvieux, et offre une pression de beaucoup inférieure à la normale. On signale, au commencement, au milieu et à la fin, trois périodes chaudes séparées entre elles par des séries de jours froids, dont les minima à Paris sont de -8° environ. A ces périodes chaudes correspondent quelques orages; mais la phase orageuse la plus remarquable dure pendant toute la seconde quinzaine, du 16 au 31 janvier. Le 19, une zone de basses pressions s'établit sur la France, plusieurs minima secondaires s'y rattachent et se dirigent vers l'Est. Ils sont accompagnés d'orages qui sévissent surtout dans le sud-ouest de la France et atteignent 6 départements le 20, 7 départements le 21 et 6 le 25. Les autres jours, le nombre des départements atteints est très faible.

En somme, dans ce mois, il y a eu 22 jours d'orage et le nombre des départements atteints a été de 51.

Février 1886.

Février, dans son ensemble, est très froid, sec, avec pression élevée. Aussi les orages sont-ils beaucoup moins nombreux que dans le mois précédent. Toutefois, pendant la première semaine, continue le régime de janvier avec orages disséminés éclatant chaque jour. Le 1^{er} est la journée la plus remarquable, 4 départements sont atteints. Ces orages dépendent d'une vaste dépression dont le centre est situé sur la mer du Nord (Oxö, 726^{mm}). Le 17 et le 26 février sont également à signaler.

En résumé, pendant ce mois, il y a eu 11 journées orageuses seulement et 23 départements ont été atteints.

Mars 1886.

Le mois de mars est un peu froid, pluvieux, avec une pression supérieure à la normale. Il se partage en deux phases bien distinctes : la première quinzaine offre tous les caractères de l'hiver, les orages y sont isolés comme dans les mois précédents; la seconde quinzaine, chaude, ensoleillée, est un vrai type de printemps. Pendant cette seconde quinzaine, 2 journées orageuses sont remarquables, le 19 et le 31. Le 19 correspond à la cessation des vents d'Est froids sur la France; le baromètre est haut en Livonie, bas de l'Irlande à la Corogne, et les orages éclatent, principalement dans les départements du Sud. Le 31, au contraire, ils sévissent dans les départements du Nord et de l'Est

sous l'influence d'une violente tempête qui règne sur les côtes de la Manche et de la Bretagne.

On a compté, dans ce mois, 20 journées d'orages et 55 départements ont été atteints.

Avril 1886.

En avril commence le véritable régime orageux. Ce mois est chaud, pluvieux, avec une pression barométrique normale.

Première période, du 1^{er} au 10. — Les vents d'entre Sud et Ouest dominent; le baromètre est d'abord élevé, puis bas à la fin de la période, pendant laquelle les orages sont le plus fréquents. Ils sont surtout remarquables dans la journée du 9 et se produisent sous l'influence d'une vaste dépression qui couvre tout le nord-ouest de l'Europe. En France, ces orages atteignent presque toutes les régions, sauf l'Est; ils sévissent sur 24 départements.

Seconde période, du 11 au 30. — Les vents soufflent des régions Nord en tournant lentement vers l'Est; de basses pressions dominant, sur la France d'abord, puis sur la Méditerranée. Le 11, les orages sont nombreux sur tout le territoire, où ils atteignent 22 départements; une vaste dépression à gradient faible règne sur la France. Il en est de même le 19 et le 20, jours où les orages atteignent 27 et 35 départements. A partir du 20, le baromètre monte, les manifestations électriques diminuent, puis le baromètre descend de nouveau rapidement; les orages atteignent 22 départements le 27, 44 le 28, 40 le 29, enfin 20 seulement le 30, jour où un refroidissement notable se produit.

En somme, avril a présenté 27 jours d'orages et 374 départements ont été atteints.

Mai 1886.

Le mois de mai, pris dans son ensemble, est chaud, humide; les orages, rares au commencement, deviennent nombreux vers le milieu du mois et pendant toute la dernière quinzaine.

Première période, du 1^{er} au 8. — Elle est caractérisée par un temps beau, froid avec régime de vent d'Est. Les orages sont rares. Ils éclatent le 1^{er} dans 7 départements, puis les jours suivants n'ont que peu d'importance.

Deuxième période, du 9 au 15. — C'est la période la plus remarquable du mois; elle présente un contraste frappant avec la précédente. Plusieurs bourrasques orageuses traversent le sud de l'Angleterre, la Manche, la France, enfin l'Espagne et la Méditerranée. Les journées les plus notables sont les 12, 13 et 14.

Le 12, une dépression a son centre au sud de l'Irlande, où le baromètre a baissé de 10^{mm}; cette dépression passe le 13 sur la Manche, le 14 sur la mer du Nord. Les orages atteignent, le premier jour, 43 départements situés principalement dans le nord de la France; le deuxième jour, ils sévissent sur 44 départements, l'est et le sud-est sont frappés surtout; enfin, le troisième jour, on les signale dans 57 départements disséminés sur tout le territoire. Des grêles désastreuses les accompagnent. Le 15, la dépression a passé au sud de la Scandinavie et les orages n'atteignent plus que 7 départements.

Troisième période, du 16 au 31. — Les vents tournent au Sud-Ouest du 16 au 17 et 1 seul département est atteint ces deux jours; puis a lieu une rotation vers le Sud, en même temps qu'une hausse de température et une reprise des mouvements orageux, qui durera jusqu'à la fin du mois. 22 départements sont frappés le 18; 29 le 22, jour du maximum de température à Paris; enfin 49 départements le 23. Les autres jours, les orages, encore nombreux, atteignent un nombre moindre de départements.

En résumé, ce mois a présenté 28 jours d'orages et 619 départements ont été atteints.

Juin 1886.

Ce mois est froid, très humide, avec pression barométrique moyenne inférieure à la normale.

Première période, du 1^{er} au 10. — Une zone orageuse, apparue le 30 mai à l'ouest de Porto, s'étend du 1^{er} au 2 vers la Manche, puis traverse la France du 2 au 3 juin. Sous cette influence, le vent est faible d'entre Est et Sud, et les orages éclatent le 1^{er} juin sur 52 départements et le 2 juin sur 60 départements. Cette dernière journée est la plus orageuse du mois, elle correspond encore à une dépression venue de la Gascogne. Du 3 au 5, une aire apparaît sur les Iles Britanniques, les orages diminuent; ils reprennent le 6 sous l'influence de basses pressions venues de l'Est, qui se développent le 6 en Autriche, le 8 en Pologne et le 9 en Illyrie. Sous cette action, les vents sont d'abord modérés du Nord, puis faibles; les orages sont violents, ils atteignent 25 départements le 6, 34 le 7 et 42 le 8, et se développent principalement dans l'Est, le Sud-Est et le Sud. Le 10, ces basses pressions disparaissent dans l'Est et 39 départements sont encore frappés.

Deuxième période, du 11 au 18. — A partir du 11, la pression devient un peu forte en Espagne, des vents froids d'Ouest dominant, les orages sont peu nombreux, sauf le 12, et l'Est surtout est atteint.

Troisième période, du 19 au 22. — Les vents du Nord reprennent sous l'action d'une dépression qui, située le 19 dans les Pays-Bas, se trouve le 20 sur la France et, le 21, disparaît en Autriche. Les orages sont donc nombreux le 19, augmentent le 20, puis diminuent à partir du 21. Ils sévissent, le 19 dans le Nord principalement, le 20 sur toutes nos régions.

Quatrième période, du 25 au 30. — Les vents tournent vers l'Est. Des pressions assez fortes, situées à l'ouest de nos côtes, remontent lentement vers les Iles Britanniques, les basses pressions sont confinées dans l'Est. Des mouvements orageux locaux se montrent surtout le 26, et atteignent 59 départements disséminés sur tout le territoire. Les autres jours, les orages éclatent surtout dans l'Est et le Midi.

En résumé, pendant ce mois, il y a eu 30 jours d'orages et 727 départements ont été atteints.

Juillet 1886.

Le mois de juillet est généralement chaud, peu pluvieux, avec pression barométrique inférieure à la normale.

Première période, du 1^{er} au 6. — Les fortes pressions se transportent de la mer du Nord vers l'Ouest, à travers les Iles Britanniques. Les dépressions passent loin de nous, les orages sont peu nombreux, ils éclatent surtout dans le Midi. La journée la plus orageuse est le 2 juillet, où les orages sévissent sur 25 départements.

Deuxième période, du 7 au 11. — Le 7, au matin, une dépression apparaît en Gascogne, elle gagne le soir Orléans, puis se dirige le 8 vers Bruxelles et la Laponie, où elle arrive le 10. En France, des orages nombreux éclatent le 7 au matin dans le Midi, le soir sur toutes les régions, 57 départements sont atteints ce jour; le lendemain, les orages sévissent surtout dans le Centre et l'Est, 41 départements sont encore atteints, puis du 9 au 11 les manifestations électriques diminuent.

Troisième période, du 12 au 17. — L'aire des fortes pressions, refoulée d'abord vers le Portugal, revient lentement sur la France. Les vents soufflent de l'Ouest. Les orages sont rares et sévissent seulement sur 1 ou 2 départements.

Quatrième période, du 18 au 22. — Les basses pressions apparaissent à l'ouest de l'Irlande, elles s'étendent bientôt sur la Gascogne et la France. Les orages

reprennent, ils sévissent le 18 sur 12 départements situés dans le Sud et le Nord; le 19, ils s'étendent sur tout le territoire, sauf dans l'Est, puis diminuent du 20 au 22.

Cinquième période, du 23 au 31. — Les vents d'Ouest dominant jusqu'au 26, puis le temps est variable. Les orages, rares les 23 et 24, augmentent le 25 sous l'influence d'une dépression voisine de l'Irlande qui passe le 26 sur la mer du Nord et se dirige sur la Baltique; ils sont nombreux le 26 juillet, éclatent le matin dans le Centre et l'Est, le soir dans tout le Nord et le Sud-Est, et atteignent 58 départements dans cette journée, qui est la plus orageuse du mois. Le lendemain, les orages diminuent, ils sont faibles les 28, 29, puis reprennent les 30, 31 sous l'action d'une dépression nouvelle qui suit une marche analogue à la précédente et se transporte de l'Irlande vers la mer du Nord.

En résumé, ce mois a présenté 31 jours d'orages et 570 départements ont été atteints.

Août 1886.

Première période, du 1^{er} au 6. — La température est basse les six premiers jours, les courants d'Ouest dominant d'abord et le temps est pluvieux. Les orages commencent le 2, le 3 ils s'étendent dans le Sud, et le 4 ils sévissent sur 23 départements en gagnant le Centre, le Nord et l'Est. Ce jour, les vents sont faibles et soufflent généralement des régions Nord. Le 5, les orages ont diminué et se sont transportés dans l'Est.

Deuxième période, du 7 au 10. — Les vents restent faibles, d'entre le Nord et l'Ouest, la température s'élève au-dessus de la normale, et les maxima atteignent 30° le 10 à Paris. Les orages sont d'abord rares, ils se développent seulement le 10 et atteignent le matin le nord et le soir tout le nord-est de la France. 36 départements sont frappés. Un minimum barométrique principal existe ce jour au nord-ouest des Iles Britanniques, et deux minima secondaires se montrent vers le Mans et vers le Pas-de-Calais.

Troisième période, du 11 au 20. — Les courants d'Ouest dominant comme au commencement du mois, et la température est constamment basse. Les orages, nombreux le 11, jour où ils atteignent 21 départements, diminuent ensuite; le temps est pluvieux sous l'influence de dépressions qui traversent le sud des Iles Britanniques. A la fin de cette période, le 20, les orages reprennent par vents d'entre le Nord et l'Est, ils atteignent 19 départements.

Quatrième période, du 21 au 31. — Cette période est la plus notable de toute l'année. Le 21, une dépression existe près de Gibraltar, les vents du Nord dominant et les orages éclatent dans le Midi et le Centre, où ils sévissent sur 34 départements. Le 22, une zone inférieure à 760^{mm}, contenant trois faibles mouvements tourbillonnaires, s'étend de l'Algérie à l'est de la France; les orages s'étendent sur tout le territoire, ils atteignent 59 départements. Enfin, le 23, un fort mouvement orageux aborde nos côtes Ouest et, ce jour, 73 départements sont frappés. C'est la journée la plus remarquable de l'année. Le 24 août, ce mouvement orageux s'est avancé vers l'intérieur; les orages, moins nombreux, atteignent encore 54 départements situés sur toutes les régions. Le 25, le tout s'est transporté vers l'Allemagne et les phénomènes électriques sont signalés surtout dans l'Est de la France. Une diminution a lieu les trois jours suivants, puis les orages reprennent le 29 dans le Sud et le Sud-Est, les 30 et 31 dans l'Est, le Sud et le Sud-Est.

En résumé, pendant le mois d'août, il y a eu 30 jours d'orages ayant sévi sur 552 départements.

Septembre 1886.

Le mois de septembre est exceptionnellement chaud, la pression moyenne est très élevée, les orages sont encore nombreux jusqu'au 22.

Première période, du 1^{er} au 4. — Le vent d'entre le Nord et l'Est domine, le temps est très chaud. De fortes pressions règnent sur tout le continent, tandis que les bourrasques passent sur le nord des Iles Britanniques et sur la Norvège. Elles sont accompagnées d'orages qui sévissent, le 1^{er} sur 32, et le 2 sur 64 départements. Le 3 septembre, les dépressions orageuses abordent nos côtes Ouest; les orages augmentent : ils sévissent, le 3, sur 69 départements situés dans toutes les régions de la France; le 4, ils sont moins nombreux, mais sévissent encore sur toutes les régions.

Deuxième période, du 5 au 14. — Le vent rallie le Sud et le Sud-Ouest, sous l'action des bourrasques qui passent plus près de nous, sur les Iles Britanniques. La température reste élevée, sauf le 9. Ce jour, 16 départements seulement sont atteints, tandis que les autres jours une quarantaine sont frappés. Tous ces orages ont une direction générale du Sud-Ouest au Nord-Est.

Troisième période, du 15 au 18. — Les vents d'Est dominant, le temps est moins chaud; toutefois, les orages sont encore plus nombreux que dans la période précédente : ils sont signalés, le 16 et le 17, sur 38 départements.

Quatrième période, du 19 au 24. — Les vents sont encore faibles d'entre le Nord et l'Est, avec tour momentané vers le Sud. Les basses pressions qui existaient à l'Ouest se sont rapprochées de nous. Un minimum apparaît le 20 à l'ouest de la Bretagne, il atteint Brest le 22, descend ensuite vers la Gascogne le 23, puis gagne rapidement l'Italie. Les orages éclatent dans la région antérieure de la dépression; ils sont le plus nombreux quand le centre est encore un peu loin de nous, le 21, et atteignent 58 départements. Le 22, le centre étant plus près, ils sévissent encore sur 56 départements; puis le 23 atteignent seulement le midi de la France, où quelques restes d'orages subsistent encore le 24.

Cinquième période, du 25 au 30. — A partir du 26, les vents tournent de nouveau vers le Sud et le Sud-Ouest, les fortes pressions venues par l'Espagne s'étendent sur le centre et le sud de l'Europe. Le temps est beau; les orages n'ont plus aucune importance.

En résumé, il y a eu, pendant septembre, 27 jours d'orages ayant sévi sur 842 départements.

Octobre 1886.

Le mois d'octobre est chaud, très pluvieux, avec une pression moyenne inférieure à la normale.

Première période, du 1^{er} au 9. — Le vent souffle d'entre Est et Sud, avec temps relativement chaud. La zone des basses pressions reste constamment stationnaire à l'ouest du continent. Dans cette zone apparaissent plusieurs minima qui passent au nord-ouest des Iles Britanniques et amènent quelques orages, éclatant surtout dans le Sud les 4 et 5. Le 7, un minimum atteint le soir la Bretagne, et 26 départements signalent des orages. Le 8, le minimum est vers Paris, les orages éclatent dans l'Est, puis cessent le 9.

Deuxième période, du 9 au 17. — Les vents d'Ouest dominant; la température est voisine de la normale. Le baromètre descend et se maintient très bas au nord-ouest des Iles Britanniques. Quatre centres de tempête traversent ces régions en étendant leur action vers l'Europe centrale, où des orages les accompagnent. L'un d'eux a son centre, le 13, sur la mer du Nord. Les orages commencent dans la matinée; ils sont nombreux dans l'après-midi et sévissent principalement sur le nord-est et l'est de la France: 37 départements sont frappés. Le lendemain, les orages éclatent encore sur 20 départements, puis leur nombre diminue rapidement.

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES

FAITES A L'OBSERVATOIRE DU PARC SAINT-MAUR

PENDANT L'ANNÉE 1887,

PAR M. TH. MOUREAUX.

Les méthodes d'observation et de réduction des mesures magnétiques effectuées à l'observatoire du Parc Saint-Maur ont été développées dans les Volumes précédents des *Annales*, notamment dans celui de 1884; nous donnerons seulement ici, avec la revue magnétique de l'année, les résultats des mesures absolues et les Tableaux déduits du dépouillement des courbes relevées au magnétographe pendant l'année 1887.

Les mesures absolues ont été effectuées avec les mêmes instruments et dans les mêmes conditions que l'année précédente.

Dans le magnétographe, aucune modification n'a été apportée au déclinomètre et à la balance. Le 1^{er} janvier 1887, la sensibilité du bifilaire a été légèrement augmentée, de manière que, dans les graduations, l'aimant auxiliaire porté par la règle de comparaison donne exactement le même écart pour chacune des boussoles de variations.

La valeur du millimètre sur les ordonnées des courbes, en 1887, est de :

Pour le déclinomètre	1',39	
Pour le bifilaire.....	0,000406H	= 0,000079 C.G.S.
Pour la balance magnétique.....	0,000190Z	= 0,000080 "

Ces valeurs ont été vérifiées par des graduations faites régulièrement deux fois par mois.

Depuis le 1^{er} avril 1885, l'heure est inscrite directement trois fois par jour sur les courbes magnétiques. Un circuit, renfermant un élément Leclanché, a été établi entre la cave du magnétographe et la salle du rez-de-chaussée du pavillon. Lorsque ce circuit est fermé, le courant passe dans trois bobines enroulées sur un tube de verre et disposées à côté de chacun des appareils de variations; pour inscrire l'heure, on fait passer le courant, en appuyant sur un bouton, au moment précis de l'heure locale pleine.

Au commencement d'octobre 1887, la Station magnétique a été pourvue d'un

régulateur destiné à l'enregistrement automatique de l'heure sur les magnéto-grammes. Un rouage à contacts triples, produits par le frottement d'une lame de platine sur trois ressorts, est dégagé toutes les trois heures par le mouvement de l'aiguille des heures. La durée des contacts est de quatre secondes. La détente étant commandée par l'aiguille des heures, le moment des contacts ne correspond pas rigoureusement, pour les différentes heures, à l'instant précis où l'aiguille des secondes passe au zéro du cadran. Ainsi, la pendule étant réglée, par exemple, pour que le contact de midi se produise exactement à l'heure, les contacts de 3^h, 6^h et 9^h se produisent respectivement 23^s, 35^s et 7^s trop tôt. Ces corrections étant constantes pour un même contact, à quelques secondes près, il suffit de noter, aussi souvent qu'on le peut, le moment des différents contacts. La pendule étant installée dans le bureau même, cette obligation ne présente pas d'inconvénient.

Le régulateur est d'ailleurs comparé chaque matin à un chronomètre dont l'état est vérifié fréquemment par des mesures de hauteurs du Soleil ou, à défaut, à l'un des centres horaires de la ville de Paris.

L'enregistrement automatique de l'heure a commencé dans ces nouvelles conditions le 1^{er} novembre 1887, et se continue régulièrement.

Coordonnées géographiques de l'observatoire.

Longitude	0° 9' 23" E.
Latitude	48° 48' 34" N.

Mesures absolues de la Déclinaison en 1887.

Dates.	Heures.		Déclinaison.	Dates.	Heures.		Déclinaison.
	^h ₀	^m ₀			^h ₀	^m ₀	
Janv. 10....	14. 5	à 14.40	15.59,1	Août 20....	6.50	à 7.25	15.49,5
» 21....	13.15	13.50	16. 1,6	» 31....	13.10	13.45	15.58,2
» 28....	12.50	13.25	16. 1,3	Sept. 6....	8. 0	8.35	15.51,6
Févr. 4....	13. 5	13.40	15.59,2	» 8....	16.45	17.20	15.54,6
» 17....	13. 0	13.35	16. 0,8	» 20....	13. 0	13.35	16. 0,0
» 26....	13. 0	13.35	16. 1,4	» 25....	12.45	13.20	15.56,4
» 28....	16.15	16.50	15.56,4	» 29....	13.40	14.15	15.56,3
Mars 1....	13. 0	13.35	16. 1,9	Oct. 4....	8.20	8.55	15.51,3
» 15....	13. 5	13.45	16. 0,1	» 14....	13.30	14.20	15.56,6
» 22....	15.50	16.25	15.58,2	» 27....	13.15	13.50	15.57,1
» 25....	17.20	17.55	15.55,7	» 31....	12.50	13.25	15.57,1
» 28....	13.20	13.55	16. 0,4	Nov. 8....	8.10	8.45	15.51,2
Avril 4....	12.30	13. 5	16. 2,8	» 18....	13. 0	13.35	15.54,5
» 8....	8.45	9. 5	15.52,5	» 25....	13.40	14.15	15.53,8
Juin 27....	17. 0	17.35	15.56,7	» 30....	13.30	14. 5	15.55,5
» 30....	13. 0	13.35	16. 0,5	Déc. 9....	13.50	14.35	15.54,5
Juill. 2....	7.15	7.50	15.50,0	» 12....	13.30	14. 5	15.54,0
» 4....	13. 0	13.35	16. 3,1	» 23....	13. 0	13.35	15.54,3
» 11....	13. 0	13.35	15.59,2	» 25....	13.30	14. 5	15.54,3
» 18....	7. 5	7.40	15.49,6	» 26....	13. 0	13.35	15.56,2
» 25....	13.10	13.45	16. 0,8	» 29....	15. 5	15.40	15.52,6
Août 1....	13.10	13.45	16. 4,5	» 30....	14.55	15.30	15.53,4
» 8....	13.25	14. 0	15.58,6				

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES.

B.3

Mesures absolues de la Composante horizontale en 1887.

Dates.	Heures.	Composante horizontale.	Dates.	Heures.	Composante horizontale.
	^h ^m à ^h ^m			^h ^m à ^h ^m	
Janv. 10....	15. 0 à 16.10	0,19465	Juill. 11....	9. 0 à 10.10	0,19456
» 28....	13.35 14.50	0,19440	» 19....	7.50 9. 5	0,19470
» 31....	13.50 15.15	0,19441	» 25....	9. 0 10.10	0,19478
Févr. 26....	13.55 15.15	0,19430	Août 1....	8.10 9.30	0,19476
» 27....	14.20 16.10	0,19439	» 8....	8.25 9.35	0,19449
Mars 1....	13.50 15.15	0,19458	» 20....	7.40 8.45	0,19454
» 24....	14. 0 14.45	0,19433	» 31....	14.10 15.20	0,19477
» 27....	14.30 15.55	0,19461	Sept. 12....	8.50 10.10	0,19456
» 28....	14.20 15.40	0,19466	» 20....	14. 0 15. 5	0,19485
Avril 4....	9.30 10.55	0,19467	» 25....	13.35 14.40	0,19494
» 12....	8.20 9.40	0,19461	Oct. 5....	13.15 14.20	0,19475
» 19....	14.25 16.45	0,19473	» 18....	13.15 14.20	0,19477
» 30....	16. 5 16.55	0,19456	» 31....	9.25 10.35	0,19471
Mai 7....	14.30 16.10	0,19464	Nov. 8....	9. 0 10.15	0,19477
» 16....	12.40 15.25	0,19464	» 18....	14. 0 15. 5	0,19481
» 20....	15. 0 17.45	0,19468	» 25....	14.30 15.30	0,19477
» 27....	13.45 15.35	0,19471	» 30....	9.30 10.35	0,19487
» 31....	14.50 16.45	0,19474	Déc. 12....	14.15 15.15	0,19488
Juin 16....	14. 0 16. 0	0,19495	» 23....	9.15 10.30	0,19475
» 24....	15. 0 17.35	0,19488	» 28....	14.15 15.20	0,19459
» 27....	14. 0 15.10	0,19470	» 30....	13.35 14.40	0,19477
Juill. 4....	13.50 15. 5	0,19503			

Mesures absolues de l'Inclinaison en 1887.

Dates.	Heures.	Inclinaison.	Dates.	Heures.	Inclinaison.
	^h ^m à ^h ^m	[°] [']		^h ^m à ^h ^m	[°] [']
Janv. 26....	14.10 à 15.35	65.15,0	Août 20....	9.10 à 10.20	65.15,3
» 28....	15.15 16. 0	65.14,7	» 31....	16.15 16.50	65.15,3
Févr. 17....	14.15 14.50	65.14,4	Sept. 20....	15.15 16.20	65.13,6
» 28....	14.50 15.20	65.15,2	» 29....	14.30 15.35	65.15,5
Mars 1....	15.35 16.50	65.15,6	Oct. 5....	14.40 15.45	65.15,2
» 31....	16. 5 17.35	65.14,6	» 18....	14.40 15.45	65.14,6
Avril 4....	15.30 16.10	65.15,0	» 31....	13.45 14.35	65.14,1
» 11....	9. 0 10.30	65.15,5	Nov. 8....	13.30 14.35	65.14,9
Juin 27....	15.30 16.30	65.14,8	» 19....	9.45 10.50	65.15,0
Juill. 4....	15.15 16.55	65.14,5	» 30....	14.25 15.30	65.15,2
» 23....	13. 0 14.10	65.14,3	Déc. 12....	9. 0 10. 5	65.14,6
Août 1....	9.45 11.35	65.14,4	» 25....	9.30 10.30	65.14,9
» 8....	9.55 11.40	65.16,4	» 30....	9.30 10.35	65.15,2

Les mesures absolues des différents éléments ont servi à établir et à vérifier les repères des courbes relevées au magnétographe.

REVUE MAGNÉTIQUE DE L'ANNÉE 1887.

Dans la discussion générale des courbes magnétiques de 1887, nous désignerons, comme d'usage, la déclinaison par *D*, la composante horizontale par *H*, et la composante verticale par *Z*. Nous dirons que *D* diminue quand le pôle Nord du barreau du déclinomètre se rapproche du méridien magnétique, c'est-à-dire qu'il se dirige vers l'Est.

En comparant entre elles les courbes des deux composantes, on remarque, pendant les perturbations, que *Z* et *H* varient le plus souvent en sens inverse l'une de l'autre : on se dispensera donc de répéter chaque fois cette particularité. En comparant, au contraire, la déclinaison à l'une des composantes, à *H* par exemple, on constate que *D* et *H*, pendant les troubles magnétiques, varient tantôt dans le même sens, tantôt en sens opposés.

Les courbes des principales perturbations enregistrées en 1887 sont reproduites en grandeur naturelle sur les *Pl.* B.I à B.VIII. On a indiqué sur chaque planche, vers l'origine des courbes, la distance millimétrique qui correspond à 10' pour la déclinaison, à 0,00100 (unités C. G. S.) pour la composante horizontale, et à 0,00050 (unités C. G. S.) pour la composante verticale.

Les heures sont comptées de 0 à 24, à partir de minuit (').

Janvier. — La variation des éléments magnétiques est régulière pendant les deux premiers jours du mois. Le 3, légère agitation entre 16^h et 18^h. Le 4, à 2^h45^m, *D* augmente brusquement de 4', *H* augmente également, mais les deux mouvements ne sont pas simultanés, la hausse, au bifilaire, s'est produite seulement à 2^h55^m; ce même jour, on remarque encore une faible agitation vers 18^h et 23^h. Les aimants sont presque calmes jusqu'au 13. Le 14 au matin, les barreaux sont animés d'un mouvement vibratoire, et, à partir de 14^h, une perturbation se déclare; c'est dans la période du début que les oscillations atteignent la plus grande amplitude : *D* varie de 18', *H* de 0,0009; *Z* est moins affectée (voir *Pl.* B.I, *fig.* I). Les courbes restent très agitées dans la soirée du 15, et, après quelques heures de calme relatif, de nouveaux troubles se produisent le 16, après midi (voir *Pl.* B.I, *fig.* II). Le 17, vers 17^h, début d'une nouvelle phase d'agitation, qui se prolonge, en s'affaiblissant, toute la nuit du 17 au 18 (voir *Pl.* B.I, *fig.* III). Les courbes des 19 et 20 janvier témoignent encore de quelques troubles, puis les aimants sont revenus à leur position normale le 21.

(¹) L'étude de la distribution horaire et mensuelle des perturbations de 1887 se trouve dans un Mémoire qui fait suite au présent Résumé, et auquel le lecteur pourra se reporter.

La période du 23 au 27 correspond à une nouvelle série de perturbations, dont la plus importante se manifeste dans la nuit du 23 au 24; entre 21^h20^m et 0^h35^m, D augmente de 19', H augmente de 0,0008, tandis que Z diminue de 0,0003 (voir *Pl. B.II, fig. I*). Le 24, de 19^h à 19^h55^m, D diminue de 14' et H augmente de 0,0005.

Les mouvements sont ici de sens inverses, et la perturbation se produit un peu plus tôt pour la déclinaison que pour la composante horizontale. Le 25, entre 19^h et 20^h, la déclinaison diminue encore de 12'; les composantes de la force sont moins affectées. On remarque un peu de perturbation le 26, entre 18^h et 21^h, et le 28, de 21^h à 24^h. Les aimants sont faiblement agités dans la journée du 29, et plus calmes les deux derniers jours du mois.

La variation diurne, pendant ce mois, a été de 5',6 pour D, 0,00018 pour H, et 0,00008 pour Z.

En désignant comme perturbations les observations qui s'écartent de la moyenne horaire correspondante de 3' pour la déclinaison, et de 0,0002 pour la composante horizontale, on constate que le nombre des observations horaires ainsi troublées est de 20 pour D et de 33 pour H. On en trouve davantage dans presque tous les autres mois de 1887.

Aux États-Unis, des aurores boréales ont été signalées à Saint-Vincent (Minnesota) du 18 au 19 et du 24 au 25.

Février. — Un premier trouble est signalé dans la nuit du 31 janvier au 1^{er} février; entre 22^h et 5^h, la déclinaison augmente de 18'. Dans la soirée du 1^{er}, perturbation qui dure de 16^h à 22^h; D varie de 14'; H, de 0,0008 (voir *Pl. B.II, fig. II*). Le 3, les aimants sont en vibration de 18^h à 20^h, puis les oscillations augmentent peu à peu d'amplitude, et la perturbation dure jusque vers la fin de la nuit (voir *Pl. B.II, fig. III*). Faible agitation dans la soirée du 4, de 17^h à 21^h. Le 5, entre 17^h et 18^h, forte oscillation correspondant à une diminution de D et à une augmentation de H. La situation est sensiblement calme ensuite jusqu'au 8. Le 9 et le 10, agitation faible, mais incessante.

Le 12, début d'une série de perturbations qui se continuent jusqu'au 17; à 19^h10^m, la déclinaison, après s'être abaissée de 17' depuis 18^h, passe par un minimum anormal très accentué, correspondant à un maximum de H; l'agitation est moins marquée dans la matinée du 13; mais, le soir, les oscillations augmentent d'amplitude, et la déclinaison varie encore de 16' entre 19^h10^m et 20^h.

Le 14, de 14^h à 19^h55^m, D diminue de 24'; les écarts de H, et surtout de Z, sont moins accusés. Dans la journée du 15, mouvements vibratoires; dans la nuit, les oscillations augmentent d'amplitude. L'agitation s'affaiblit ensuite peu à peu, sans pourtant disparaître complètement. Les phases principales de cette série de perturbations sont reproduites *Pl. B.II, fig. IV et V*, et *Pl. B.III, fig. I*.

A partir de 17^h le 19, le trouble s'accroît de nouveau et les aimants sont très agités jusqu'au 24. La phase principale de ces perturbations est reproduite *Pl. III, fig. II*. La plus grande oscillation s'est produite le 23, entre 16^h et 17^h; elle est de même sens pour D et H. Mouvements vibratoires le 24, de 17^h à 18^h 30^m. Agitation très faible dans les derniers jours du mois.

Le tremblement de terre survenu le 23 février dans la région de Nice s'est manifesté par une brusque agitation des barreaux des appareils de variations, à 5^h 45^m du matin (temps moyen de Paris). Le déclinomètre, le bifilaire et la balance ont été affectés au même degré. L'oscillation paraît avoir duré plusieurs minutes; son amplitude totale au début a été d'environ 7'. Cette perturbation particulière diffère totalement des troubles magnétiques ordinaires, avec lesquels il n'est pas possible de la confondre; elle présente l'aspect de l'agitation obtenue par l'action des courants momentanés utilisés pour l'inscription de l'heure sur les courbes, avec cette seule différence que les oscillations paraissent avoir persisté pendant plusieurs minutes.

Variation diurne régulière en février : $D = 6',1$; $H = 0,00019$; $Z = 0,00016$.

On a relevé pendant ce mois, pour la déclinaison, 48 observations différant d'au moins 3' de la moyenne horaire correspondante, et 57 observations de la composante horizontale différant de 0,0002 de cette même moyenne.

Des aurores boréales ont été observées les 11, 12, 13 et 14 février dans tout le Canada et sur une grande partie des États-Unis; le 19 et le 21 dans la région nord-est des États-Unis.

Mars. — L'équilibre magnétique est presque parfait pendant les premiers jours du mois, notamment le 3 et le 4. Le 5, à partir de 18^h, baisse simultanée de D et de H; les courbes restent assez agitées pendant toute la nuit. Le 6, à la même heure, nouvelle agitation de même sens qui persiste jusqu'à 24^h. Le 7, entre 11^h et 14^h, faible agitation correspondant à une augmentation de D et à une diminution de H.

Le 10, entre 19^h et 20^h, crochet correspondant à une diminution de D et de H; ces deux mouvements ne sont pas simultanés : H précède D de 7 à 8 minutes. Le 11, à 23^h, crochet dans le sens d'une augmentation de ces deux éléments; le mouvement de variation de la composante horizontale précède également celui de la variation de déclinaison.

Le 12, calme magnétique. Faible agitation dans la nuit du 13 au 14. Le 15 au matin, oscillations faibles mais fréquentes; dans la nuit, l'agitation augmente; les courbes de D et de H ne présentent ni l'analogie ni l'opposition d'aspect qui se rencontrent fréquemment (voir *Pl. III, fig. III*). Les aimants, encore faiblement agités dans la nuit du 16 au 17, se calment peu à peu, et la variation est normale le 18. Dans la nuit du 19 au 20, le barreau du bifilaire subit une série

non interrompue de faibles oscillations; au contraire, le barreau du déclinomètre passe par une oscillation de $10'$ entre 20^h55^m et 22^h .

Le 21, entre 18^h et 20^h , forte oscillation; les variations de D et de H sont de sens opposés; D varie de $13'$, H de $0,0004$; dans la nuit, entre 1^h et 2^h , augmentation simultanée de D et de H. Le 22, agitation de 18^h à 24^h . Forte agitation le 24, depuis 0^h jusqu'à 20^h . De très faibles écarts se montrent encore sur les courbes jusqu'au 28, puis la variation des divers éléments est normale jusqu'à la fin du mois.

Variation diurne régulière pendant le mois de mars: $D = 8',7$; $H = 0,00023$; $Z = 0,00018$.

On a compté, pendant ce mois, 26 observations horaires troublées pour la déclinaison et 36 pour la composante horizontale.

Des lueurs aurorales ont été signalées aux États-Unis par les observateurs du *Signal Service*, principalement dans les nuits du 19 au 20, du 20 au 21 et du 23 au 24; cette dernière a été observée également à l'observatoire de Toronto.

Avril. — Le 1^{er}, calme magnétique jusque vers 23^h , faible agitation pendant le reste de la nuit. Le 4, mouvements vibratoires de 11^h à 18^h , puis oscillations plus fortes, principalement vers 19^h et 23^h . Le 5 au matin, début d'une série de perturbations qui se prolongent jusqu'au 9. L'aimant du bifilaire est affecté d'abord; entre 12^h35^m et 13^h55^m , H diminue de $0,0006$, D et Z sont moins troublées; la phase la plus importante se produit de 19^h10^m à 24^h ; de 20^h15^m à 22^h45^m , D augmente de $16'$ (voir *Pl. B.III, fig. IV*).

Les aimants restent très agités le 6 et le 7 (voir *Pl. B.IV, fig. I*); des oscillations de plus grande amplitude se produisent dans la soirée du 6 et dans la nuit du 6 au 7; D varie de $18'$, H de $0,0009$, Z de $0,0003$. Au contraire, le 7, de 10^h à 15^h , les mouvements des aimants sont rapides, mais de faible amplitude. Le 8, entre 20^h20^m et 20^h40^m , D diminue brusquement de $14'$. On remarque encore quelque agitation le 9, de 14^h à 17^h , et le 10 à 17^h ; le 11, troubles de faible amplitude, mais continus jusqu'à 19^h .

La variation est régulière dans la journée du 13, mais le 14 les aimants s'agitent de nouveau et une perturbation se produit dans la nuit du 14 au 15 (voir *Pl. B.IV, fig. II*). Le 15, de 10^h30^m à 16^h , mouvements vibratoires. Le 17, de 15^h5^m à 16^h15^m , diminution marquée de H. Quelques faibles oscillations se montrent ensuite sur les courbes jusqu'au 21. Le 22, mouvements vibratoires de 10^h à 21^h ; entre 22^h et 23^h , hausse très marquée de H ($0,0008$); diminution simultanée de D et de Z.

Le 23, à 20^h50^m , à 22^h35^m , de 23^h5^m à 23^h20^m , perturbations spéciales se traduisant par un épaississement momentané des tracés photographiques, notamment de la courbe du bifilaire. Le 26 et le 27, l'aimant du bifilaire subit de

faibles oscillations, qui persistent presque sans interruption pendant ces deux jours.

Cette agitation reprend le 28 vers 6^h en s'étendant aux trois aimants; elle augmente bientôt et une perturbation se manifeste vers 11^h. Les variations extrêmes des éléments pendant cette journée sont : $D = 21'$; $H = 0,0006$; $Z = 0,0006$; la perturbation de la composante horizontale est plus remarquable par le nombre que par l'amplitude des oscillations (voir *Pl. B.IV, fig. III*). Les variations sont sensiblement régulières le 29 et le 30; signalons seulement un épaissement de la courbe du bifilaire le 30, de 21^h45^m à 21^h50^m.

La variation diurne régulière a été pendant ce mois de 10',9 pour la déclinaison, 0,00034 pour la composante horizontale et 0,00026 pour la composante verticale, et le nombre des observations horaires troublées est respectivement de 54 et de 76 pour ces deux éléments.

Des lueurs aurorales ont été observées aux États-Unis aux dates suivantes : 1-2, 10-11, 11-12, 14-15, 15-16, 18, 19-20, 23-24, 25, 28, celles du 14 au 16 étant les plus importantes.

Mai. — Le 1^{er}, entre 18^h et 19^h, oscillation pendant laquelle les variations de D et de H sont de sens opposés. Le 2 au matin, la déclinaison subit un écart vers l'ouest de 11' et revient ensuite à l'est de 8'; cette oscillation est très lente et met trois heures à se produire, de 6^h à 9^h; de 9^h à 19^h, le mouvement de la déclinaison est plus régulier, mais le bifilaire reste assez agité dans l'après-midi. Le soir, de nouveaux troubles se manifestent, principalement de 20^h à 21^h (voir *Pl. B.V, fig. I*). Le 3 et le 4, agitation faible mais continue, spécialement au barreau du bifilaire. Quelques irrégularités peu importantes se montrent encore sur les courbes du 5 au 7, et la période du 8 au 10 correspond à une situation magnétique normale. Le 12, de 3^h à 4^h, épaissement des tracés photographiques; de 5^h à 6^h, mouvements précipités, mais distincts; l'agitation est faible ensuite, mais, de 14^h à 24^h, l'aimant du bifilaire est très instable; la perturbation est moins accusée sur la courbe du déclinomètre (voir *Pl. B.V, fig. II*). Du 13 au 15, le trouble continue en faiblissant.

La variation est presque régulière le 17; le 18, une agitation passagère se montre de 2^h30^m à 7^h; D et H ont un mouvement de hausse, tandis que Z est en baisse. Du 19 au 22, calme magnétique. Le 23, à 14^h, début d'une perturbation qui affecte plus spécialement le bifilaire, et qui persiste toute la nuit; les oscillations sont précipitées, mais de faible amplitude. Le 24, nouvelle agitation, pendant laquelle, au contraire, les oscillations sont lentes. Le 26, de 17^h à 24^h, l'aimant du bifilaire est très instable; à 20^h55^m, H augmente brusquement de 0,0004; le barreau du déclinomètre n'est affecté que de 22^h à 24^h.

Des irrégularités peu importantes, aussi bien en amplitude qu'en durée, se

montrent encore sur les courbes du 27 au 31; l'agitation est plus soutenue dans la nuit du 31 mai au 1^{er} juin.

C'est en mai que la variation diurne de la déclinaison a atteint sa plus grande valeur mensuelle en 1887; l'écart est de 11',4. La variation diurne est de 0,00031 pour la composante horizontale et 0,00030 pour la composante verticale.

Le nombre des observations horaires troublées est de 33 pour la déclinaison et de 51 pour la composante horizontale.

Des lueurs aurorales ont été observées à Toronto, le 18, et aux États-Unis dans les nuits du 23 au 24 et du 24 au 25.

Juin. — Le 1^{er}, faible agitation dans l'après-midi. Le 2, entre 15^h et 16^h, oscillation du bifilaire indiquant une diminution de H; les autres aimants ne participent pas d'une manière appréciable à ce mouvement. La variation diurne est régulière dans les journées du 3 et du 4.

Le 5, à 6^h 50^m, épaississement des tracés photographiques; de 8^h à 19^h, le barreau du bifilaire témoigne d'une assez forte agitation; le déclinomètre ne manifeste des troubles de quelque importance que vers la fin de cette période (voir Pl. B.V, fig. III). La variation diurne de la composante verticale s'est élevée, ce jour-là, à 0,00084.

Du 6 au 9, calme magnétique. Le 9, à 20^h 25^m et à 21^h 15^m, épaississement marqué des tracés photographiques. Le 10, toute la journée, faible et incessante agitation; la composante horizontale passe par un minimum irrégulier à 9^h. Le 11, de 4^h 45^m à 5^h 15^m, mouvements vibratoires. Quelques oscillations isolées et de faible amplitude se montrent encore sur les courbes du 12 et du 13, puis les aimants reviennent au repos. Du 14 au 17, la variation diurne des divers éléments est très régulière.

Le 17, vers 14^h, oscillation de H dans le sens d'une augmentation de cet élément; D est peu affectée. Le 19, dans l'après-midi, nouveaux troubles de la composante horizontale, qui augmente de 0,0008 entre 15^h et 16^h 30^m. Le 21, entre 22^h et 24^h, agitation momentanée affectant principalement la déclinaison; de 22^h 55^m à 23^h 20^m, cet élément augmente de 15', tandis que H augmente seulement de 0,0003; la variation de Z est peu sensible. Le 22, mouvements vibratoires du déclinomètre, de 5^h à 9^h; le bifilaire est agité toute la journée, mais les variations sont de faible amplitude. Le 23, de 16^h à 19^h 30^m, l'aimant du bifilaire est animé de mouvements vibratoires qui sont le plus accusés entre 16^h et 17^h. Le 25, de 20^h à 21^h 10^m, épaississement très prononcé de la courbe du bifilaire; celle du déclinomètre est fortement troublée, de la même manière, de 9^h à 9^h 15^m: un violent orage a éclaté au Parc Saint-Maur de 20^h à 21^h.

La situation magnétique est presque calme pendant les derniers jours du mois.

La variation diurne régulière, pendant ce mois, a été de $10', 3$ pour D, $0,00031$ pour H et $0,00026$ pour Z. On compte seulement 24 observations horaires de la déclinaison s'écartant de $3'$ de la moyenne horaire correspondante, et 31 de la composante horizontale s'écartant de $0,0002$ de cette même moyenne. Le solstice d'été correspond d'ailleurs habituellement à un minimum de perturbation de ces deux éléments.

Une lueur aurorale a été observée à Toronto, le 8 au soir. Des phénomènes analogues, mais de faible intensité, sont signalés aux États-Unis les 3, 9, 18 et 26.

Juillet. — La variation des éléments magnétiques est sensiblement régulière pendant les premiers jours du mois. Le 4, vers 15^h , agitation qui se prolonge toute la nuit et affecte surtout le bifilaire. La composante horizontale est normale, le 5, de 5^h à 10^h , puis l'aimant s'agite de nouveau, et la perturbation s'étend aux autres éléments, en augmentant graduellement d'intensité jusqu'au 7; de fortes oscillations se montrent sur la courbe du bifilaire dans l'après-midi de ce jour (voir *Pl. B.V, fig. IV*). Les plus grands écarts, pendant cette perturbation, ont été : $D = 17'$, $H = 0,0014$, $Z = 0,0007$. Les barreaux sont encore en état d'agitation le 8, notamment dans l'après-midi, et le 9, la variation diurne est redevenue à peu près régulière. Les aimants se troublent de nouveau le 10 dans l'après-midi; entre $15^h 30^m$ et $15^h 55^m$, H diminue de $0,0004$. On signale encore une faible agitation le 11, puis la journée du 12 est absolument calme. De légers troubles se montrent sur les courbes du 13, et la variation diurne reprend sa valeur moyenne le 14.

Le 15, dans l'après-midi, agitation incessante du bifilaire; les oscillations sont faibles. Le déclinomètre est à peine affecté; une oscillation dans le sens d'une augmentation se manifeste le 16 à $3^h 45^m$. Le 16 et le 17, situation presque calme: le bifilaire seul est légèrement agité par instants; le 17, à $23^h 25^m$, épaissement des tracés photographiques.

Une nouvelle période d'agitation se produit du 18 au 20. Le 18, à partir de 15^h jusqu'à 21^h , les oscillations sont assez marquées; entre $18^h 35^m$ et 20^h , H diminue de $0,0007$, et, de $18^h 45^m$ à $19^h 15^m$, D diminue de $9'$. Les mouvements des aimants sont ensuite faibles, puis la perturbation reprend quelque activité le 19 et le 20, dans l'après-midi. Le 21, faible agitation du bifilaire, de $15^h 30^m$ à $16^h 30^m$.

La variation est ensuite régulière jusqu'au 26. Ce jour-là, à $20^h 40^m$, à $21^h 25^m$, à $23^h 3^m$, épaissements marqués des tracés, spécialement de celui du bifilaire. Le 27, troubles momentanés de 14^h à 16^h , puis calme magnétique jusqu'à la fin du mois.

La variation diurne a été, pendant ce mois, de $11', 2$ pour D, $0,00033$ pour H,

0,00023 pour Z. On a constaté 27 perturbations horaires de la déclinaison, et 67 de la composante horizontale.

Quelques lueurs aurorales ont été observées : le 5 à Toronto, et dans les nuits du 18 au 19 et du 19 au 20 aux États-Unis, sur la région des Lacs et la côte nord Atlantique.

Août. — La période de calme magnétique survenue à la fin de juillet se continue jusque vers 11^h, le 1^{er} août; les aimants sont ensuite en mouvement vibratoire, et c'est seulement après 16^h que les oscillations prennent une plus grande amplitude. La phase de 16^h à 18^h, très accentuée sur la courbe du bifilaire, l'est beaucoup moins sur celle du déclinomètre (voir *Pl. B.V, fig. V*). H diminue de 0,0009, de 16^h30^m à 17^h55^m, et augmente de la même quantité dans la nuit, de 1^h45^m à 2^h35^m. Le 2, de 0^h27^m à 2^h30^m, D augmente de 16'; la variation de Z, pendant cette perturbation, est de 0,0006. Ce même jour, entre 18^h et 21^h, forte oscillation de D, qui diminue de 15' en une heure environ; en même temps, H augmente, mais l'oscillation est de moindre amplitude, et le point extrême se produit un peu plus tard que pour la déclinaison (voir *Pl. B.VI, fig. I*).

La période de trouble se continue avec une intensité variable, et en s'affaiblissant, jusqu'au 8; les aimants sont calmés ensuite jusqu'au 13. Le 14, à 10^h50^m, début subit d'une perturbation accusée plus spécialement au bifilaire; l'oscillation principale est signalée entre 21^h30^m et 23^h. Le 15, de 10^h à 18^h, mouvements vibratoires de l'aimant du bifilaire. On remarque encore quelques troubles momentanés sur les courbes du 16 et du 17, puis le calme magnétique se rétablit et persiste jusqu'au 24.

Le 25, à 1^h25^m, H et D augmentent brusquement, Z diminue, une faible agitation se manifeste et une oscillation assez marquée se produit entre 13^h et 14^h. Le bifilaire reste un peu troublé dans les journées du 26 et du 27. Le 28, entre 1^h et 3^h30^m, traces nombreuses d'épaississement des courbes. Le 28, commence une série de perturbations qui se prolongent jusqu'en septembre; la phase de 20^h à 5^h, dans la nuit du 28 au 29, correspond à un abaissement anormal de la déclinaison; cet abaissement a été de 17' entre 19^h et 20^h50^m. Le 29, le bifilaire est très agité dans l'après-midi, la déclinaison est au contraire plus troublée pendant la nuit; entre 15^h15^m et 16^h5^m, H diminue de 0,0008, tandis que de 22^h à 1^h20^m D augmente de 16' (voir *Pl. B.VI, fig. II*). L'agitation est encore très prononcée le 30, vers 18^h, et le 31, vers 20^h.

La variation diurne, en août, est de 11',1 pour la déclinaison, 0,00036 pour la composante horizontale, 0,00022 pour la composante verticale. On a compté comme perturbations 66 observations horaires de la déclinaison et 62 de la composante horizontale.

Une lueur aurorale a été observée à Toronto le 1^{er} août; des phénomènes de même nature sont signalés également aux États-Unis, le 14, le 15 et le 31.

Septembre. — La période de trouble survenue vers la fin du mois d'août se continue pendant les premiers jours de septembre. Le 1^{er}, les aimants sont en agitation continuelle, particulièrement dans l'après-midi. Le 2, de 12^h30^m à 17^h, mouvements vibratoires, suivis, entre 17^h et 18^h, d'une assez forte oscillation de D et de H. L'agitation s'affaiblit le 3, et la période du 4 au 8 correspond à un calme magnétique presque parfait.

Un léger trouble se produit dans l'après-midi du 9. Le 10, depuis 4^h jusqu'à 17^h, mouvements vibratoires incessants; entre 18^h et 20^h, les tracés photographiques sont épaissis à diverses reprises. Nouvelle période de mouvements vibratoires dans la journée du 11, surtout entre 14^h et 16^h. Le 12, à 19^h45^m, épaississement des tracés photographiques.

La variation est assez régulière le 13; quelques troubles se manifestent le 14 et surtout le 15, et les aimants redeviennent calmes; la variation diurne est régulière du 17 au 21. Le 22 au matin, la courbe du bifilaire est très mouvementée; entre 6^h50^m et 8^h45^m, H diminue de 0,0007, D est moins affectée. Très faible agitation dans la soirée, entre 14^h et 18^h. Le 23, entre 17^h et 24^h, la courbe du bifilaire montre une série non interrompue de petites oscillations; les mouvements du déclinomètre sont plus lents et plus accentués; D diminue de 12' entre 17^h30^m et 23^h50^m.

La période du 25 au 28 correspond à une grande perturbation magnétique, la plus forte qui se soit produite en 1887. Le 25 au matin, les aimants étaient presque calmes; la perturbation débute seulement à 16^h; tandis que les écarts du déclinomètre sont peu sensibles au début, le bifilaire passe au contraire par une forte oscillation, pendant laquelle H diminue de 0,0010. C'est seulement après 18^h30^m que les oscillations du déclinomètre prennent une grande amplitude; entre 18^h15^m et 19^h15^m, D diminue de 25'. A 19^h15^m, D et H passent simultanément par un minimum très accentué, suivi, pour D, d'une seconde oscillation de même sens (voir *Pl. B. VI, fig. III*). La déclinaison remonte ensuite rapidement, ainsi que H, tandis que Z diminue. Les écarts extrêmes, pendant cette première série de perturbations, sont : D = 39', H = 0,0016, Z = 0,0012. L'agitation est affaiblie le 26, mais le 27 la perturbation reprend plus d'énergie, principalement pendant la soirée et dans la nuit; entre 19^h25^m et 19^h45^m, la déclinaison diminue de 16' (voir *Pl. B. VII, fig. I*). Pendant cette seconde phase, les écarts extrêmes sont : D = 23', H = 0,0010, Z = 0,0005.

Les troubles se prolongent, en s'affaiblissant, jusqu'à la fin du mois.

La variation diurne en septembre a été : D = 9', 7, H = 0,00029, Z = 0,00020.

C'est dans ce mois que le nombre d'observations horaires troublées a été maximum; on en compte 67 pour la déclinaison et 82 pour la composante horizontale. L'équinoxe d'automne est d'ailleurs habituellement la saison pendant laquelle les perturbations sont le plus fréquentes.

La grande perturbation des 25-27 septembre a été accompagnée d'aurores boréales observées dans les diverses régions du Canada et dans les territoires du nord des États-Unis, depuis les montagnes Rocheuses jusqu'à l'Atlantique.

Octobre. — Le trouble magnétique cesse le 1^{er} octobre et, du 2 au 6, la variation des éléments est régulière; le 7, quelques faibles oscillations; dans la nuit du 7 au 8, D varie de $9'$ entre $22^h 50^m$ et $1^h 30^m$, mais cette oscillation lente est isolée et, jusqu'au 11, les courbes sont sensiblement normales. Le 12 au matin, entre 7^h et 9^h , H diminue de 0,0006, tandis que D et Z sont presque calmes; le soir, entre $20^h 30^m$ et $22^h 30^m$, troubles momentanés. Faible agitation dans la nuit du 13 au 14. Le 15, entre 21^h et 22^h , oscillation isolée correspondant à une hausse de H , à une baisse de D et de Z . La courbe du bifilaire est encore un peu agitée le 17, puis les aimants sont ensuite calmes jusqu'au 21.

Le 22, vers 12^h , début d'une nouvelle perturbation d'un caractère spécial (voir *Pl. B.VII, fig. II*). Les aimants sont en vibration continuelle; les oscillations sont de faible amplitude, mais extrêmement précipitées; à $23^h 40^m$, H augmente brusquement de 0,0010. Les vibrations des barreaux continuent jusqu'au 23 à 17^h , puis ensuite les oscillations sont beaucoup plus lentes et de plus grande amplitude; dans la nuit du 23 au 24, entre 21^h et $1^h 15^m$, D augmente de $19'$.

Les courbes sont à peu près régulières le 24 et le 25, mais une perturbation éclate encore le 26 (voir *Pl. B.VIII, fig. I*); D passe par un maximum anormal à 14^h et H par un minimum à $14^h 15^m$. Les écarts extrêmes pendant cette perturbation sont : $D = 21'$, $H = 0,0016$, $Z = 0,0004$. L'équilibre se rétablit rapidement, et les variations sont régulières le 28 et le 29.

Agitation dans la nuit du 30 au 31; le 30, entre $17^h 30^m$ et $18^h 5^m$, D diminue de $19'$, H est moins affectée. Enfin, la journée du 31 correspond au calme magnétique.

L'amplitude de la variation diurne, pendant ce mois, a été : $D = 6',9$, $H = 0,00024$, $Z = 0,00014$. Le nombre des perturbations est seulement de 33 pour la déclinaison et de 42 pour la composante horizontale.

Une lueur aurorale a été observée à Toronto le 13. Le 22, Toronto signale une aurore que divers observateurs du *Signal Service* ont vue également dans le nord des États-Unis.

Novembre. — Dans la nuit du 1^{er} au 2, abaissement marqué de D ; minimum

à 22^h 5^m. Le 3, dans la soirée, assez grande agitation du bifilaire, notamment de 14^h à 16^h. On remarque une très faible agitation dans la nuit du 4 au 5, puis les aimants sont calmes jusqu'au 7. Le 8, une assez forte oscillation se produit vers 17^h; elle est de même sens pour D et H, toutefois le minimum se produit un peu plus tôt pour H que pour D. Entre 22^h et 24^h, seconde et plus forte oscillation; cette fois, H augmente de 0,0006, tandis que D diminue de 11'. Le 10, entre 13^h 15^m et 14^h 5^m, D diminue de 9'; H diminue de 0,0004; les points extrêmes de cette oscillation se produisent plus tôt pour H que pour D.

La situation magnétique est sensiblement normale depuis le 11 jusqu'au 16; la variation diurne est même tout à fait régulière le 16. Faible agitation dans la nuit du 17 au 18, et dans les premières heures de la journée du 20. Le soir, deux oscillations d'assez grande amplitude sont signalées; toutes deux sont dans le sens d'une diminution pour D et H, et la perturbation affecte surtout le premier de ces deux éléments; D diminue de 8' pendant la première de ces deux oscillations, vers 16^h, et de 18' pendant la seconde, entre 18^h et 19^h.

Le 21, forte perturbation qui affecte les trois éléments, mais plus spécialement D et H, dont les mouvements sont de sens inverses (voir *Pl. B. VIII, fig. II*). Les écarts extrêmes pendant cette perturbation sont : D = 26', H = 0,0015, Z = 0,0003; l'agitation faiblit à partir de 2^h le 22, mais c'est seulement le 24 que les aimants redeviennent calmes. La situation reste sensiblement normale jusqu'au 28. Le 29, toute la journée, agitation qui n'est un peu importante que vers 4^h du soir; enfin, le 30, on observe deux assez fortes oscillations en diminution de D, entre 18^h et 19^h et entre 21^h et 22^h.

En novembre 1887, la variation diurne est : D = 5', 0, H = 0,00015, Z = 0,00011. Le nombre horaire des perturbations est de 31 pour la déclinaison et de 61 pour la composante horizontale.

Décembre. — Faible agitation dans la nuit du 1^{er} au 2; situation presque calme ensuite jusqu'au 5. Le 6, à partir de 15^h, H diminue peu à peu jusqu'à atteindre un minimum vers 19^h; cet élément revient lentement à sa valeur normale; l'anomalie affecte moins le déclinomètre. Le 7, au contraire, alors que le bifilaire présente de faibles variations accidentelles, la déclinaison passe le soir par deux oscillations d'amplitude assez marquée, vers 15^h et 18^h. Le 8, entre 23^h et 24^h, oscillation au bifilaire. Du 9 au 12, la variation diurne des éléments est régulière. Le 13 au matin, début d'une agitation qui se prolonge jusque vers 3^h le 14. Le calme se rétablit ensuite et persiste jusqu'au 15 au soir.

La période du 16 au 22 correspond à une suite de troubles magnétiques dont nous rappellerons les phases les plus importantes. Le 16, H et D passent simultanément, vers 21^h, par un minimum anormal; la diminution de D, entre 16^h 15^m

et 21^h est de 19'. Le 17, les oscillations sont encore très accentuées, et les écarts extrêmes pendant cette journée sont : $D = 17'$, $H = 0,0008$.

La perturbation du 18 (voir *Pl. B.VIII, fig. III*) comprend deux phases bien distinctes, séparées par une période de calme qui dure de 18^h à 20^h 30^m. L'agitation faiblit le 19 et le 20, mais le 21 la perturbation reprend de l'énergie et les mouvements des aimants ont une certaine amplitude pendant la nuit du 21 au 22 (voir *Pl. B.VIII, fig. IV*). Les courbes du 23 et du 24 sont à peu près régulières, puis survient une nouvelle période d'agitation, qui commence à se manifester dans la nuit du 25, s'accroît le 26 et passe par un maximum d'intensité dans la nuit du 27 au 28. Le trouble s'affaiblit ensuite, et la marche des éléments est presque régulière le 31.

La variation diurne moyenne, en décembre, est de 3',5 pour D , 0,00017 pour H , 0,00011 pour Z . On a relevé, comme perturbations, 36 observations horaires de la déclinaison et 61 de la composante horizontale.

L'observatoire de Toronto signale une aurore boréale le 21; ce phénomène a été observé également en diverses stations du nord et de l'est des États-Unis.

La variation diurne des divers éléments magnétiques diminue peu à peu depuis 1884; l'amplitude moyenne annuelle en 1887 est indiquée ci-dessous :

Variation diurne des éléments magnétiques en 1887.

Déclinaison.....	8',4
Inclinaison.....	1',5
Composante horizontale.....	0,00026
Composante verticale.....	0,00019
Force totale.....	0,00024

On verra, dans la Notice ci-après, que le nombre horaire des perturbations est également en diminution, au moins pour les deux éléments considérés.

Les valeurs absolues moyennes des éléments magnétiques en 1887, déduites de l'ensemble des valeurs horaires relevées pendant toute l'année, sont les suivantes :

Valeurs absolues des éléments magnétiques en 1887.

Déclinaison.....	15° 54',8
Inclinaison.....	65° 14',7
Composante horizontale.....	0,19470
Composante verticale.....	0,42224
Force totale.....	0,46496

En comparant ces valeurs avec celles de 1886, calculées de la même manière, on en déduit la variation séculaire des divers éléments :

Variation séculaire des éléments magnétiques, 1886-1887.

Déclinaison	-6', 1
Inclinaison.....	-1', 1
Composante horizontale.....	+0,00031
Composante verticale	+0,00032
Force totale.....	+0,00042

Sur les registres originaux, la déclinaison, la composante horizontale et la composante verticale sont calculées pour chaque heure; dans les Tableaux suivants, nous ne publions, pour chacun de ces éléments, que quatre observations par jour, à six heures d'intervalle, à partir de 0^h, et la moyenne diurne, déduite des vingt-quatre observations horaires. Les heures sont comptées en temps civil, de 0^h à 24^h.

Les Tableaux relatifs à la déclinaison contiennent, en outre, les minima et maxima diurnes considérés comme réguliers, avec l'indication de l'heure à laquelle ils se sont produits; cette heure est notée en fraction décimale.

Les remarques consignées dans la dernière colonne des Tableaux mensuels rappellent l'aspect général des courbes magnétiques pour chaque jour.

Des Tableaux résumés donnent ensuite, pour la déclinaison, les deux composantes et l'inclinaison, les écarts moyens horaires avec la moyenne mensuelle correspondante. Les écarts des deux composantes sont exprimés en unités du cinquième ordre (C.G.S.) L'inclinaison a été calculée au moyen de la relation connue.

Janvier 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15° +).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000 +).					REMARQUES (1).	
	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	6h.	12h.	18h.	24h.		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	57.0	58.8	57.0	56.8	57.2	56.3	9.0	59.8	12.4	445	449	448	448	446	195	194	197	198	196	Calme.
2....	55.9	58.4	57.0	55.8	56.8	55.3	8.8	59.8	13.7	452	440	447	447	446	195	189	196	197	195	Id.
3....	57.0	58.6	55.6	54.4	56.6	55.6	9.0	60.7	13.4	452	447	429	439	441	193	196	202	196	197	Peu agitée.
4....	57.3	61.1	57.0	52.9	56.9	55.4	8.1	60.8	13.3	450	426	434	433	436	195	195	195	191	194	Id.
5....	56.6	59.4	56.5	56.4	56.8	55.8	8.2	59.4	12.0	451	444	444	451	446	188	191	191	191	190	Presque calme.
6....	57.0	59.0	57.6	57.5	57.6	56.1	8.7	60.4	13.0	460	440	446	449	449	189	185	190	189	189	Id.
7....	57.4	58.9	58.0	56.9	57.6	56.4	7.7	61.0	13.7	469	448	449	445	452	182	184	193	193	189	Peu agitée.
8....	57.3	59.8	57.9	57.3	57.5	55.8	8.6	60.2	12.5	451	449	451	451	449	195	187	195	195	194	Presque calme.
9....	57.1	58.5	57.7	57.1	57.4	55.8	8.7	60.7	13.8	455	441	451	444	449	188	192	192	187	190	Calme.
10....	56.9	59.0	56.9	55.4	57.2	55.2	8.7	60.6	13.2	456	449	453	456	453	186	187	188	184	187	Id.
11....	56.7	59.4	58.4	56.7	57.5	55.3	8.4	60.9	13.6	456	449	445	447	450	184	180	191	186	186	Presque calme.
12....	55.6	59.4	57.3	57.3	57.2	55.4	9.0	60.9	12.8	446	435	442	451	446	186	178	192	186	186	Id.
13....	57.7	59.3	57.8	56.7	57.7	"	"	60.5	13.1	457	447	455	455	454	186	179	188	185	185	Id.
14....	57.7	59.8	60.9	53.4	57.0	56.2	8.5	"	"	462	429	421	425	441	184	182	194	188	188	Perturbation.
15....	59.6	63.1	54.7	54.0	56.8	"	"	"	"	427	410	435	443	434	179	185	198	180	186	Agitée.
16....	57.4	58.7	58.3	53.7	57.3	"	"	"	"	443	426	442	450	436	186	188	196	184	190	Id.
17....	55.7	58.5	55.7	54.3	56.6	55.6	8.5	60.7	13.0	441	410	446	436	438	184	192	197	193	190	Id.
18....	55.6	59.2	58.3	55.5	56.6	"	"	62.2	13.4	443	422	442	443	436	185	190	195	192	191	Id.
19....	56.8	61.8	56.8	55.3	57.4	55.3	8.8	62.0	12.4	441	429	446	454	440	187	186	193	190	191	Peu agitée.
20....	57.8	58.8	56.3	55.5	57.1	56.2	8.1	61.0	13.1	442	431	427	439	437	190	186	193	196	192	Id.
21....	56.6	59.4	57.7	56.6	57.3	55.4	9.0	62.2	13.4	448	424	447	445	442	192	190	194	195	194	Presque calme.
22....	55.7	60.0	57.2	56.5	56.9	54.5	8.5	61.9	13.0	450	425	451	445	448	192	186	191	191	193	Agitée.
23....	60.7	58.5	56.4	55.0	57.2	"	"	62.8	13.0	476	423	449	459	443	174	198	196	190	192	Très agitée.
24....	57.0	59.1	56.3	56.3	56.1	54.9	9.0	61.7	14.0	449	436	447	450	443	189	186	201	191	190	Agitée.
25....	57.6	59.7	57.6	54.1	56.7	56.2	9.0	62.7	13.8	453	430	448	445	442	185	186	191	185	189	Id.
26....	58.2	59.6	57.2	54.7	57.2	57.2	8.5	61.9	14.1	445	434	439	443	443	178	181	188	190	186	Id.
27....	58.0	58.8	56.1	56.0	56.9	56.0	9.0	61.6	13.3	444	433	444	447	443	186	185	197	191	189	Peu agitée.
28....	57.3	58.7	57.3	53.1	56.8	54.6	8.9	61.2	13.3	462	440	448	431	446	191	180	193	188	190	Id.
29....	57.2	60.0	57.9	55.5	57.2	55.8	8.5	62.9	12.9	451	430	442	444	441	185	172	191	188	186	Id.
30....	57.2	58.7	57.2	56.1	57.2	55.7	9.0	60.2	12.8	455	437	449	454	448	187	190	193	190	190	Id.
31....	55.9	58.6	57.2	55.1	56.9	54.3	8.7	62.7	13.9	464	437	453	441	450	190	185	187	192	190	Id.
Moy.	57.1	59.4	57.2	55.5	57.1	55.6	8.7	61.2	13.2	452	435	441	445	444	187	187	193	190	190	

(¹) Les remarques sont relatives à l'allure des courbes relevées au magnétographe.

Février 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15° +).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000 +).					REMARQUES.	
	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	6h.	12h.	18h.	24h.		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	57.1	58.7	57.7	56.6	57.0	"	h	61.0	14.4	461	442	444	443	442	179	181	199	191	188	Agitée.
2....	57.3	58.3	57.3	56.0	57.5	55.8	8.9	60.6	13.4	458	436	445	450	448	184	179	191	190	187	Peu agitée.
3....	58.0	58.6	57.7	45.5	56.8	57.1	8.5	60.8	13.0	463	448	464	454	454	188	192	193	190	192	Agitée le soir.
4....	58.7	57.9	60.2	57.2	57.8	"	"	"	"	455	455	432	452	455	188	185	199	192	189	Agitée.
5....	57.3	59.8	53.8	55.9	57.4	55.8	9.0	61.6	14.3	460	441	455	444	447	186	184	198	197	192	Agitée le soir.
6....	57.3	59.1	58.1	55.9	57.6	55.0	8.8	62.5	14.2	462	445	460	451	453	186	179	186	195	187	Peu agitée.
7....	57.3	62.7	58.8	55.9	58.4	56.4	8.5	64.5	13.6	465	463	450	451	457	187	172	193	190	186	Id.
8....	57.3	58.8	58.0	57.2	57.6	55.7	8.6	61.2	13.4	459	452	456	465	458	185	172	186	186	184	Presque calme.
9....	57.4	60.1	56.6	55.9	56.9	54.4	8.6	"	"	466	444	437	449	448	184	174	187	177	183	Peu agitée.
10....	55.9	58.3	58.6	51.7	56.9	54.5	9.0	62.3	13.6	456	451	455	469	454	180	167	191	179	180	Agitée.
11....	57.2	59.0	58.7	53.1	57.4	"	"	62.8	14.1	458	442	445	456	452	184	177	192	179	183	Id.
12....	56.2	62.7	60.4	48.1	56.4	"	"	"	"	439	417	434	445	439	182	178	198	190	187	Très agitée le soir.
13....	55.8	60.8	54.7	54.2	56.7	"	"	"	"	450	433	414	447	433	180	188	208	176	191	Très agitée.
14....	55.9	61.6	59.0	47.0	55.9	"	"	"	"	458	444	439	444	442	183	193	196	180	191	Id.
15....	57.4	60.1	59.2	55.9	57.2	"	"	61.6	14.4	444	432	430	467	440	186	182	196	188	189	Agitée.
16....	56.0	60.2	57.3	53.1	57.1	"	"	61.5	14.0	448	435	449	461	446	187	182	192	183	187	Peu agitée.
17....	57.3	59.9	57.2	55.9	57.2	56.4	8.8	61.0	13.8	440	435	452	442	448	176	171	180	183	177	Id.
18....	55.8	58.6	57.3	56.0	56.8	54.8	9.0	59.9	14.0	451	452	453	447	454	182	180	189	191	185	Presque calme.
19....	56.7	58.7	60.1	51.2	57.1	56.3	6.6	60.4	14.4	455	455	440	460	455	188	179	199	191	191	Agitée le soir.
20....	58.0	64.1	55.9	54.5	57.5	"	"	"	"	460	424	437	467	446	187	183	199	183	191	Très agitée.
21....	61.6	60.4	58.3	51.5	57.5	"	"	"	"	467	406	444	436	443	179	189	197	194	191	Id.
22....	57.3	60.4	57.0	55.9	57.5	"	"	"	"	446	428	438	450	448	187	182	198	193	190	Agitée.
23....	56.7	60.1	57.3	55.9	56.9	"	"	"	"	454	426	441	450	444	188	182	200	189	191	Id.
24....	57.3	59.5	58.0	55.8	57.0	"	"	60.1	14.2	446	441	453	456	451	189	187	207	196	193	Peu agitée.
25....	55.9	60.1	57.3	55.8	57.0	54.0	8.5	61.4	13.1	453	444	461	455	454	194	182	194	187	191	Id.
26....	57.2	60.4	57.9	53.7	56.9	54.4	8.9	61.3	12.8	459	443	456	462	454	182	177	189	181	185	Id.
27....	57.3	60.2	58.0	56.6	57.6	"	"	63.3	13.2	474	452	433	460	453	181	182	204	189	190	Id.
28....	56.3	59.4	57.7	56.0	57.1	55.0	8.5	60.6	13.2	465	439	448	459	454	185	179	202	198	190	Id.
Moy.	57.1	59.9	57.6	54.3	57.2	55.4	8.6	61.5	13.7	456	439	444	453	449	185	181	195	188	188	

Mars 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000+).					REMARQUES.		
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.			
						Valeur.	Heure.													Valeur.	Heure.
1....	55.1	59.5	54.9	55.0	56.8	54.4	8.8	62.1	13.4	465	447	455	463	459	198	198	213	204	203	Presque calme.	
2....	55.0	60.3	55.6	55.0	56.4	53.7	8.3	61.8	13.0	464	445	461	476	461	200	194	206	200	201	Calme.	
3....	55.0	59.6	56.4	55.6	56.5	53.6	8.4	61.6	13.4	468	460	467	468	465	197	189	195	196	194	Id.	
4....	54.9	60.6	56.8	55.8	56.5	54.4	7.8	61.5	12.8	470	453	468	470	465	195	185	202	200	197	Id.	
5....	55.0	59.3	57.2	53.5	56.0	53.5	8.5	"	"	474	461	464	441	460	200	188	200	212	202	Agitée le soir.	
6....	56.3	62.9	57.0	53.9	55.3	"	"	"	"	469	447	431	446	450	202	196	215	211	203	Agitée.	
7....	54.3	60.4	56.4	55.0	56.0	53.6	7.2	60.5	12.9	454	457	461	462	455	209	201	201	208	205	Peu agitée.	
8....	55.7	57.2	57.0	53.6	56.9	54.7	7.7	62.0	14.3	464	453	456	437	454	200	199	203	202	202	Agitée.	
9....	57.5	62.0	52.2	55.0	56.8	54.9	7.7	63.3	13.9	451	426	461	458	447	199	199	217	203	205	Id.	
10....	56.3	59.3	55.7	54.3	56.0	53.6	9.0	62.8	13.4	461	467	464	471	461	205	189	203	200	202	Peu agitée.	
11....	55.0	59.3	52.1	54.3	55.6	54.0	8.3	60.5	12.6	460	442	442	455	456	201	192	213	205	203	Id.	
12....	55.0	59.0	56.4	53.6	55.9	53.0	8.5	60.0	14.1	462	442	461	468	456	206	194	204	196	203	Presque calme	
13....	55.0	58.5	56.1	52.8	55.4	52.0	8.9	61.5	14.4	464	432	468	475	459	195	182	201	194	195	Peu agitée.	
14....	55.0	60.3	56.5	55.0	56.4	52.4	8.5	63.0	14.1	475	443	460	470	461	195	184	207	202	198	Presque calme.	
15....	54.9	59.2	57.1	48.2	55.8	53.6	7.3	61.0	13.2	478	436	467	452	464	201	186	200	201	199	Très agitée le soir.	
16....	56.4	58.8	55.0	55.0	56.0	"	"	60.8	13.3	461	447	451	452	451	200	186	197	197	197	Agitée.	
17....	54.3	59.2	55.1	54.5	55.8	53.3	7.6	61.2	12.4	461	456	464	465	460	193	183	199	197	194	Presque calme.	
18....	54.2	58.5	56.1	55.0	55.4	53.3	8.0	60.0	13.5	466	453	467	472	462	199	187	201	202	198	Calme.	
19....	55.0	58.2	58.6	55.0	55.4	52.2	9.0	60.5	14.1	467	460	448	482	467	204	189	210	203	202	Agitée le soir.	
20....	54.3	59.3	55.0	55.1	55.9	54.0	8.2	62.0	12.9	483	452	461	457	465	199	190	219	207	203	Agitée.	
21....	56.1	62.7	55.0	55.0	55.6	53.5	7.6	63.0	12.2	464	429	446	457	454	206	205	218	213	209	Id.	
22....	54.5	61.8	55.1	53.3	55.5	52.1	8.0	63.1	13.4	464	433	460	451	455	215	198	221	211	211	Id.	
23....	54.9	61.8	56.1	55.1	55.9	51.5	7.4	63.2	13.0	466	447	462	482	459	217	197	217	200	213	Peu agitée.	
24....	53.6	60.6	56.3	55.0	56.2	"	"	"	"	455	434	444	458	451	207	194	220	209	207	Id.	
25....	55.0	60.4	55.6	55.1	56.0	51.8	8.0	60.7	13.8	463	449	461	462	457	208	194	212	211	208	Id.	
26....	53.8	61.4	52.8	55.0	55.9	51.2	7.4	62.0	13.6	474	455	453	462	460	216	197	225	215	213	Id.	
27....	54.2	61.8	55.4	55.7	56.2	52.0	8.3	63.0	12.1	466	455	470	471	460	216	192	218	216	213	Id.	
28....	53.5	62.0	55.7	55.0	56.1	52.7	8.1	62.0	12.0	462	454	462	470	458	219	200	210	211	212	Id.	
29....	56.1	60.2	56.4	55.0	55.9	52.0	8.3	60.8	12.4	470	462	471	471	466	212	191	213	212	208	Calme.	
30....	55.0	61.3	55.7	55.3	55.9	51.0	8.5	62.0	12.5	474	460	471	475	468	213	188	204	207	206	Id.	
31....	55.3	59.7	55.7	55.0	56.0	51.4	9.0	61.1	13.3	486	458	471	477	473	211	188	205	205	206	Id.	
Moy.	55.0	60.2	55.7	54.5	56.9	53.0	8.2	61.7	13.2	466	449	460	464	459	204	192	209	205	204		

Avril 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000+).					REMARQUES.		
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.			
						Valeur.	Heure.													Valeur.	Heure.
1....	54.9	60.3	56.4	53.8	56.0	51.3	8.3	61.5	13.4	480	459	475	499	477	212	191	207	207	206	Calme.	
2....	54.3	61.5	55.0	53.8	54.3	"	"	62.0	13.0	462	445	474	478	463	206	201	213	208	209	Peu agitée.	
3....	52.4	64.2	54.3	54.9	56.3	"	"	67.4	13.0	479	429	453	460	456	207	197	228	220	214	Id.	
4....	53.8	61.8	56.4	51.3	55.2	51.8	8.0	62.5	12.7	465	465	457	453	461	220	201	218	207	214	Agitée.	
5....	52.5	60.9	55.0	54.7	55.4	"	"	65.0	13.7	473	444	463	457	450	214	206	227	204	216	Très agitée.	
6....	57.2	62.1	57.3	53.2	56.8	"	"	"	"	439	437	559	473	449	209	195	231	202	211	Id.	
7....	51.9	60.8	54.5	57.4	56.2	"	"	62.2	13.7	427	416	463	461	446	190	196	215	199	201	Id.	
8....	54.5	59.9	51.3	53.8	54.9	51.2	8.6	60.5	12.8	444	435	464	454	450	196	188	230	198	202	Agitée le soir.	
9....	56.1	59.5	56.8	54.8	56.1	52.2	8.8	61.0	13.8	458	434	464	457	450	204	193	218	202	205	Peu agitée.	
10....	54.0	60.7	56.8	55.3	56.0	51.2	8.3	62.0	13.7	456	435	458	469	456	203	188	219	202	205	Id.	
11....	53.0	65.0	54.4	53.8	56.4	50.1	8.0	67.0	12.9	468	429	467	462	454	210	191	220	211	208	Agitée.	
12....	54.2	59.4	56.3	54.4	55.5	51.4	8.0	61.6	14.0	473	442	462	463	463	204	190	219	210	206	Peu agitée.	
13....	55.3	60.4	55.7	53.5	56.0	52.5	8.3	61.8	13.6	469	451	468	471	464	209	187	212	200	205	Presque calme.	
14....	56.9	61.4	56.5	55.7	56.4	52.0	8.8	64.2	13.3	486	436	476	487	470	203	187	203	205	201	Peu agitée.	
15....	59.7	59.9	56.6	55.1	56.4	"	"	62.5	13.4	470	442	454	466	453	207	194	206	208	204	Agitée le matin.	
16....	56.0	61.2	54.8	54.8	55.6	50.3	8.0	62.9	13.1	460	451	461	467	462	214	189	207	208	204	Peu agitée.	
17....	54.9	63.9	56.1	55.4	56.9	51.8	8.2	64.8	12.7	465	430	461	472	457	213	177	213	213	204	Id.	
18....	56.0	59.0	56.4	55.3	56.1	52.9	9.0	60.3	12.7	460	444	465	468	461	218	179	196	210	203	Id.	
19....	54.0	59.6	56.1	55.3	55.9	51.7	8.4	61.6	13.3	471	444	467	473	463	210	195	214	207	208	Presque calme.	
20....	56.1	59.2	56.5	56.0	56.0	51.0	8.6	61.5	13.3	485	452	471	472	467	207	191	228	221	212	Peu agitée.	
21....	54.4	61.7	56.7	52.6	56.5	52.1	8.0	63.0	12.8	472	449	468	485	465	216	201	222	215	215	Id.	
22....	53.3	61.0	56.7	53.3	55.4	50.4	7.9	"	"	479	455	479	466	470	218	202	226	211	215	Agitée.	
23....	54.1	60.1	56.6	55.5	55.9	51.9	8.5	60.4	13.0	474	450	477	498	469	221	209	227	216	220	Peu agitée.	
24....	57.5	59.0	56.2	56.9	56.5	"	"	60.5	12.8	472	452	469	494	471	207	202	237	213	216	Id.	
25....	54.8	61.8	55.5	55.5	57.0	51.9	7.9	66.0	12.3	475	431	466	470	463	217	203	233	220	218	Id.	
26....	53.7	60.6	56.3	56.2	56.3	51.3	8.3	61.4	12.5	466	455	479	471	469	219	192	216	212	210	Presque calme.	
27....	53.3	60.5	56.3	55.5	56.2	51.9	8.0	61.7	12.8	474	472	482	489	476	216	192	216	211	211	Calme.	
28....	51.4	61.3	54.8	52.1	55.2	50.5	7.2	"	"	484	483	441	459	470	212	182	252	221	213	Très agitée.	
29....	54.2	60.5	56.4	57.4	56.3	"	"	61.5	12.3	453	456	469	472	453	211	195	215	204	208	Peu agitée.	
30....	52.3	59.1	56.3	54.9	55.6	52.1	6.8	59.1	13.0	468	460	469	465	462	204	188	209	209	203	Id.	
Moy.	54.6	61.0	55.8	54.7	55.9	51.5	8.2	62.4	13.1	467	446	466	471	461	210	193	219	209	209		

Mai 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15°+).							COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000+).					REMARQUES.			
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.		
						Valeur.	Heure.													Valeur.	Heure.
1....	54.1	59.6	56.3	54.9	55.8	52.6	h	8.0	60.0	13.7	469	467	464	467	464	209	188	226	218	211	Peu agitée.
2....	53.4	60.9	57.6	53.3	56.2	"	"	"	63.0	12.8	469	464	472	459	469	220	196	220	216	214	Agitée.
3....	55.9	61.5	57.0	54.8	55.9	"	"	"	"	"	459	433	471	470	459	198	212	235	215	214	Peu agitée.
4....	51.4	61.7	56.4	53.9	55.5	51.0	7.3	62.5	13.9	460	436	477	470	460	211	195	232	220	213	Id.	
5....	52.0	62.0	57.7	56.3	55.3	50.1	8.0	62.0	12.0	456	460	471	484	465	217	206	229	213	216	Id.	
6....	52.0	60.5	55.3	55.2	55.8	51.0	7.1	61.7	13.0	456	470	468	482	466	209	194	221	211	209	Id.	
7....	52.3	61.3	54.9	54.8	55.8	51.3	7.6	63.1	13.0	465	446	477	476	465	214	198	222	217	214	Id.	
8....	51.4	61.5	55.5	53.5	55.7	50.5	7.4	63.2	12.6	459	457	475	485	466	216	182	215	215	207	Presque calme.	
9....	53.5	62.4	56.2	54.6	56.3	52.4	7.1	63.3	12.8	469	472	483	482	473	218	188	224	214	210	Id.	
10....	52.3	61.0	57.6	53.7	56.0	50.6	8.1	63.3	13.6	480	476	482	486	475	218	184	217	209	208	Id.	
11....	52.8	61.5	57.6	55.1	56.3	51.1	7.6	63.2	12.6	473	459	491	483	474	209	194	211	205	204	Id.	
12....	52.0	61.2	58.4	52.7	55.9	50.0	7.8	"	"	"	476	480	492	499	486	204	180	207	186	196	Agitée.
13....	53.7	60.2	56.7	52.3	55.4	"	"	62.0	13.2	465	465	484	481	472	188	171	203	197	190	Id.	
14....	54.9	59.6	55.8	56.2	56.3	53.0	8.5	62.5	12.8	470	453	490	473	471	212	182	211	204	201	Id.	
15....	53.7	60.1	56.4	56.2	56.1	51.0	7.7	60.5	12.8	468	459	480	489	470	211	186	215	208	206	Peu agitée.	
16....	52.1	60.3	55.3	55.1	55.6	50.8	6.9	61.7	13.1	466	454	482	479	471	217	196	217	209	210	Id.	
17....	51.7	61.9	56.0	54.4	56.0	50.5	7.6	62.2	13.3	469	450	474	481	470	217	193	216	216	209	Id.	
18....	54.1	60.2	55.5	54.9	55.8	"	"	61.9	13.0	465	472	476	484	472	219	188	219	215	211	Id.	
19....	54.9	61.9	54.9	54.4	55.7	"	"	62.0	12.5	469	464	478	458	475	204	196	225	217	210	Id.	
20....	50.7	61.6	54.2	56.0	55.5	49.8	7.6	63.0	12.5	456	463	474	481	464	218	186	214	215	209	Calme.	
21....	51.6	61.7	54.1	55.5	55.4	50.9	7.0	61.8	12.6	470	474	479	480	475	222	193	211	215	212	Presque calme.	
22....	50.9	62.7	54.8	55.2	55.8	50.5	7.2	63.0	12.2	473	477	469	476	472	214	190	222	214	210	Id.	
23....	51.3	60.2	57.0	52.0	56.0	50.9	7.0	61.0	12.9	464	476	481	464	478	216	172	205	218	203	Agitée le soir.	
24....	49.4	63.4	58.3	57.6	56.0	"	"	64.7	12.8	458	455	462	483	459	220	188	247	209	218	Agitée.	
25....	51.9	62.4	54.9	52.0	56.5	"	"	63.4	12.8	453	448	459	464	455	216	197	244	230	220	Peu agitée.	
26....	52.1	60.5	56.3	50.6	55.7	49.4	7.7	62.2	14.3	464	452	488	478	469	235	194	235	217	223	Agitée le soir.	
27....	50.9	60.9	56.3	52.6	54.6	49.6	7.6	62.5	13.2	467	458	478	474	467	225	200	235	223	222	Peu agitée.	
28....	51.8	60.9	57.7	54.9	56.3	"	"	63.0	13.4	457	467	465	471	466	222	219	235	223	224	Id.	
29....	52.8	59.1	56.3	54.8	55.6	52.0	7.9	60.7	13.1	459	469	486	479	471	222	194	225	222	216	Presque calme.	
30....	50.9	59.5	53.8	55.5	55.3	50.9	6.0	60.6	13.1	473	467	487	480	475	222	208	233	221	221	Peu agitée le soir.	
31....	53.4	57.7	55.1	52.0	54.6	50.3	6.3	61.5	13.4	484	473	483	481	477	212	205	222	219	217	Id.	
Moy.	52.6	61.0	56.1	54.4	55.8	50.9	7.4	62.3	13.0	466	462	477	477	469	215	193	222	214	211		

Juin 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000+).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	49.7	59.7	56.4	55.7	55.3	48.7	6.5	61.0	14.2	471	471	489	489	477	219	211	233	228	223	Peu agitée.
2....	52.0	58.4	55.6	55.2	55.2	51.6	7.5	60.8	13.2	463	482	483	478	475	236	216	242	231	231	Id.
3....	50.3	58.7	55.0	55.0	54.6	49.8	7.2	58.7	12.7	469	473	477	482	474	234	195	223	219	217	Presque calme.
4....	51.0	61.4	55.0	55.0	55.4	49.8	7.5	61.4	12.3	475	479	493	483	482	243	200	224	226	219	Id.
5....	50.7	65.2	57.2	55.4	56.2	48.2	6.7	65.5	12.2	478	449	442	473	463	226	205	278	241	236	Agitée.
6....	51.8	58.8	55.6	55.0	55.2	50.6	7.9	59.2	13.0	480	469	484	477	476	244	220	236	233	236	Peu agitée.
7....	52.3	60.1	55.1	54.7	55.7	51.6	7.6	62.5	13.4	466	471	483	487	477	237	207	240	233	230	Presque calme.
8....	49.6	58.3	56.5	55.1	55.4	49.2	7.7	62.0	14.3	481	473	497	497	485	235	196	240	233	238	Peu agitée.
9....	54.4	56.4	55.5	51.5	54.6	49.7	7.8	58.8	14.1	480	479	494	490	484	238	211	242	239	234	Id.
10....	51.5	60.4	57.8	55.0	56.1	"	"	"	"	477	460	495	500	479	232	232	254	230	238	Très agitée ✓
11....	52.3	61.7	54.4	55.1	55.6	50.3	8.0	"	"	481	477	504	488	485	237	218	246	236	233	Peu agitée.
12....	51.9	59.3	55.4	54.3	55.3	49.6	7.0	62.0	13.9	480	474	496	504	483	236	222	238	234	234	Id.
13....	52.1	59.4	55.2	55.2	55.2	50.9	8.0	60.8	14.0	485	465	482	477	477	230	216	246	237	230	Id.
14....	51.2	59.4	55.2	55.6	55.5	50.9	8.2	60.6	12.6	475	470	484	482	476	246	218	241	235	237	Calme.
15....	52.4	58.0	54.7	55.2	54.9	51.5	7.6	58.1	13.0	479	488	486	483	481	239	213	229	233	231	Id.
16....	52.3	60.4	53.6	55.2	55.4	52.3	6.0	61.0	12.5	483	488	480	480	483	241	216	238	232	233	Id.
17....	51.0	56.6	53.4	55.4	54.3	51.0	6.0	57.9	13.0	478	496	488	495	487	233	211	238	230	233	Presque calme.
18....	49.7	58.0	56.9	54.9	55.5	49.7	6.0	52.9	14.0	488	495	490	508	494	230	212	233	230	227	Peu agitée.
19....	53.9	59.5	59.4	53.2	55.8	50.3	8.0	62.1	13.0	495	472	497	485	488	235	223	243	234	231	Agitée.
20....	50.6	59.4	56.6	51.1	54.7	49.8	7.0	61.0	13.8	481	468	499	474	483	235	217	234	224	230	Peu agitée.
21....	51.1	59.9	56.4	51.6	55.0	50.2	7.5	61.1	14.1	478	473	488	490	481	229	209	247	225	225	Agitée le soir.
22....	50.3	60.0	57.5	53.9	54.2	48.8	7.7	63.8	13.9	472	461	494	485	476	230	218	245	231	231	Agitée.
23....	51.6	59.1	55.5	53.9	54.8	50.2	7.9	61.9	13.1	470	458	498	497	483	240	231	251	232	239	Peu agitée.
24....	51.1	60.0	55.3	54.1	55.3	51.0	6.8	63.2	14.3	484	459	492	487	479	241	215	241	231	232	Presque calme.
25....	52.1	59.0	55.4	51.0	55.2	49.8	7.7	61.2	13.1	488	454	484	487	483	242	228	254	238	241	Id.
26....	51.2	56.8	55.8	51.1	54.7	50.1	7.0	59.1	14.5	486	473	497	488	484	228	212	234	223	224	Id.
27....	51.6	58.3	56.3	54.0	55.2	50.9	8.4	59.6	13.9	480	469	494	486	482	227	213	233	227	227	Id.
28....	51.2	56.8	56.8	54.4	54.6	49.9	9.0	59.8	14.1	484	467	491	494	485	236	217	240	228	230	Id.
29....	51.9	58.2	56.9	51.5	55.1	51.2	8.4	60.2	13.7	498	476	502	512	491	235	211	237	226	226	Peu agitée.
30....	51.1	59.8	56.1	54.1	55.0	"	"	61.2	13.6	490	463	489	490	488	229	208	238	244	229	Id.
Moy.	51.5	59.2	55.9	54.3	55.2	50.3	7.5	60.6	13.5	480	472	489	488	481	233	214	240	231	231	

Juillet 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15° +).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000 +).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	50.4	60.4	55.4	54.7	54.9	49.9	8.5	62.0	13.9	488	464	490	495	485	247	227	251	245	243	Presque calme.
2....	51.3	57.3	55.7	56.0	54.8	50.1	7.0	59.0	14.4	489	480	490	492	488	252	233	251	246	245	Id.
3....	51.3	60.5	54.1	54.8	55.1	50.1	7.0	62.5	12.7	473	486	487	496	485	247	224	241	243	241	Calme.
4....	50.8	60.7	55.5	55.5	55.5	49.8	7.2	63.7	14.0	489	486	519	515	498	244	222	243	235	237	Presque calme.
5....	50.0	59.3	55.5	53.7	54.8	48.6	8.0	61.6	14.0	492	497	520	511	505	238	217	239	229	231	Peu agitée.
6....	51.3	59.4	56.8	49.4	54.7	49.8	6.5	62.2	14.2	494	473	492	476	490	233	229	257	242	239	Id.
7....	48.4	61.6	50.1	48.6	54.6	"	"	"	"	472	444	471	469	471	238	217	287	232	243	Très agitée. v
8....	48.0	60.1	57.0	58.9	54.9	"	"	60.9	14.0	466	466	487	502	472	240	215	249	238	239	Agitée.
9....	50.7	57.3	55.4	54.1	54.2	50.0	7.0	59.2	13.2	469	464	490	489	477	244	236	247	242	241	Presque calme.
10....	51.2	58.7	56.9	53.9	55.0	49.5	7.5	61.1	14.1	490	472	522	490	489	239	228	247	239	240	Peu agitée.
11....	50.0	58.2	54.1	54.8	54.5	50.0	7.3	58.7	13.4	477	474	492	490	481	240	224	253	241	239	Agitée.
12....	52.7	59.8	54.3	54.8	55.3	51.5	6.3	59.8	12.0	482	459	474	477	474	237	222	245	239	236	Presque calme.
13....	52.5	56.6	55.4	53.4	54.5	51.5	7.5	59.0	13.0	483	468	494	506	480	242	235	258	239	244	Peu agitée.
14....	49.4	58.3	54.3	53.7	54.0	49.0	6.2	58.3	12.2	488	486	494	487	487	242	233	245	236	240	Presque calme.
15....	50.4	57.2	56.8	54.5	55.6	49.8	7.8	61.0	14.5	490	496	489	497	495	235	217	233	235	230	Peu agitée.
16....	52.7	58.9	55.0	52.7	54.4	48.4	8.1	58.9	12.0	514	491	492	482	493	231	230	250	246	238	Id.
17....	49.8	59.6	54.5	54.5	54.1	48.6	7.0	59.7	13.0	489	474	495	495	489	245	234	234	235	237	Presque calme.
18....	49.7	57.3	55.7	52.7	53.7	48.0	7.9	61.0	14.1	490	479	488	489	489	236	223	252	234	236	Agitée le soir.
19....	50.7	56.9	55.7	50.0	54.0	48.2	6.8	"	"	490	462	508	500	489	239	223	259	236	239	Agitée.
20....	50.8	60.4	54.3	53.2	54.3	"	"	62.0	12.9	486	474	519	495	489	240	230	259	240	243	Id.
21....	51.3	56.9	53.7	52.0	54.0	50.5	7.9	59.7	14.0	488	486	497	494	489	237	224	248	241	238	Peu agitée.
22....	51.1	59.7	53.6	53.9	54.2	49.9	7.4	59.8	13.0	485	492	501	494	491	241	220	241	237	238	Calme.
23....	50.0	59.7	55.5	51.3	54.3	50.0	7.0	61.0	13.6	491	501	496	503	496	240	232	247	239	239	Presque calme.
24....	50.8	57.6	55.7	53.6	54.4	49.8	6.5	62.3	14.0	493	482	497	498	490	244	222	246	242	239	Id.
25....	51.3	58.4	54.7	52.7	54.4	50.1	8.0	61.1	14.0	492	485	506	497	493	245	222	249	239	239	Id.
26....	50.7	56.8	54.1	53.3	54.0	48.5	7.5	61.2	14.5	496	478	501	509	495	247	227	251	247	243	Calme.
27....	51.3	59.7	54.5	52.7	54.8	51.3	6.9	62.5	14.6	502	485	503	507	499	247	227	251	249	246	Presque calme.
28....	48.7	57.5	54.1	51.1	53.8	48.5	6.8	59.0	14.3	495	467	502	506	494	252	237	254	246	246	Calme.
29....	50.0	58.2	53.3	53.6	53.9	48.6	8.0	59.6	14.0	498	482	515	516	500	253	232	250	249	246	Id.
30....	50.0	61.6	54.3	53.9	54.4	47.8	7.6	62.5	12.5	499	476	504	506	497	253	230	251	248	248	Id.
31....	48.8	59.8	54.8	54.0	54.4	47.7	7.1	62.1	13.0	494	500	497	510	502	251	238	257	249	249	Id.
Moy.	50.5	58.9	54.9	53.5	54.5	49.5	7.3	60.7	13.6	489	478	498	497	489	243	227	250	241	240	

Août 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15° +).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000 +).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
							^h		^h											
1....	50.0	63.5	54.6	46.4	54.2	48.2	7.5	63.8	13.5	496	516	466	451	498	255	239	271	250	254	Très agitée le soir.
2....	50.7	59.7	54.7	51.2	53.5	"	"	60.0	12.6	503	458	478	476	475	225	244	276	254	251	Très agitée.
3....	51.2	59.6	56.0	49.6	55.2	"	"	62.0	14.1	473	468	478	478	479	256	249	301	250	263	Id.
4....	50.6	59.6	55.0	51.8	54.4	"	"	61.4	13.5	477	455	495	493	476	261	234	269	260	256	Agitée.
5....	53.3	64.6	54.6	55.4	55.6	"	"	"	"	493	455	499	493	480	254	246	270	251	255	Id.
6....	51.1	54.0	53.9	54.7	53.3	48.5	7.0	58.2	14.0	470	456	493	491	476	263	243	271	256	258	Id.
7....	49.2	58.1	52.8	51.7	53.2	47.6	7.4	59.7	13.9	479	446	491	492	478	260	234	261	251	253	Peu agitée.
8....	52.5	56.7	54.6	51.1	53.7	49.8	7.9	57.8	13.2	468	473	498	503	481	255	233	263	248	250	Id.
9....	49.9	58.2	54.0	53.3	53.7	49.8	7.7	59.7	13.0	488	469	484	498	484	261	239	267	258	257	Presque calme.
10....	49.9	58.9	53.3	53.3	53.7	48.3	7.7	60.0	13.5	495	476	492	490	486	261	247	263	247	256	Calme.
11....	51.9	57.6	54.6	53.2	54.0	49.0	7.8	59.2	14.1	489	465	489	493	484	250	236	255	245	247	Id.
12....	50.3	56.7	54.2	53.9	53.7	49.0	7.6	58.3	13.5	488	468	494	498	487	251	227	251	246	240	Id.
13....	51.1	60.6	55.4	51.1	54.6	49.9	8.0	60.8	13.0	495	486	495	493	493	252	228	247	239	244	Presque calme.
14....	50.0	58.1	56.5	50.0	53.7	"	"	59.6	13.3	494	482	491	501	491	247	237	268	243	249	Agitée.
15....	47.2	60.7	51.9	54.7	53.4	"	"	"	"	493	462	482	495	484	251	245	257	250	251	Id.
16....	50.0	59.7	52.6	52.6	54.5	49.9	6.2	62.5	13.1	494	479	490	486	486	253	241	256	258	252	Peu agitée.
17....	50.0	59.7	54.7	53.1	54.5	49.8	6.3	60.8	13.5	475	486	493	486	484	260	233	253	250	250	Id.
18....	51.1	61.1	53.8	53.5	54.4	"	"	61.1	12.0	475	494	482	486	484	251	233	246	243	243	Presque calme.
19....	49.9	59.5	53.5	52.8	53.7	48.6	7.5	59.5	12.3	472	479	482	495	482	244	226	241	239	239	Calme.
20....	53.1	61.0	53.3	53.6	54.4	49.9	7.0	61.0	12.0	478	485	493	494	485	248	218	243	241	238	Id.
21....	50.4	59.7	52.6	53.5	53.8	49.0	7.3	60.6	13.2	483	475	493	490	486	248	221	240	243	239	Presque calme.
22....	49.9	58.6	53.1	53.5	53.9	49.7	7.8	60.8	13.4	481	449	487	485	476	251	232	249	241	243	Id.
23....	49.9	60.6	52.6	53.5	54.0	49.0	6.7	60.7	12.4	471	474	484	488	478	246	232	244	242	241	Calme.
24....	50.0	58.9	53.5	52.9	53.8	49.8	7.7	59.7	12.5	483	481	487	488	481	242	223	244	237	239	Id.
25....	49.9	56.8	54.0	53.3	53.8	49.9	6.0	"	"	481	477	491	489	486	241	224	242	235	237	Peu agitée.
26....	51.2	56.8	54.0	50.4	53.4	49.1	8.5	58.9	14.0	484	477	497	494	487	236	222	242	242	237	Id.
27....	50.4	57.6	53.3	52.5	53.3	48.5	8.0	59.5	13.0	480	477	486	500	483	245	229	239	238	239	Presque calme.
28....	50.0	56.9	56.1	52.9	52.0	49.7	7.0	60.0	14.5	483	481	467	467	478	239	230	250	244	242	Très agitée.
29....	56.1	60.7	53.5	51.5	53.8	"	"	63.6	13.9	488	445	476	469	468	243	240	261	253	248	Id.
30....	51.2	57.6	49.3	54.6	53.7	"	"	59.2	12.4	468	459	501	403	468	245	245	261	264	252	Agitée.
31....	52.1	59.5	51.5	53.1	53.5	"	"	"	"	455	474	479	485	476	253	248	248	248	253	Id.
Moy.	50.8	59.1	53.8	52.2	53.9	49.2	7.4	60.3	13.2	482	472	488	488	482	250	235	257	247	248	

Septembre 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15° +).									COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000 +).					REMARQUES.
	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	53.0	62.3	51.8	55.0	54.2	"	"	"	"	461	445	461	481	467	246	244	266	249	251	Agitée.
2....	50.8	59.7	51.9	51.5	54.0	49.4	7.0	61.2	12.3	470	445	473	483	466	254	241	270	241	253	Id.
3....	49.8	62.1	51.1	52.7	53.8	48.6	7.3	62.5	12.9	461	440	475	476	465	246	235	258	249	247	Peu agitée.
4....	52.5	59.8	52.2	52.7	53.7	50.3	7.7	60.8	12.4	460	460	483	481	470	250	240	250	247	247	Presque calme.
5....	50.4	58.4	52.5	52.0	53.8	50.0	7.0	59.6	12.7	469	471	484	480	475	246	236	251	246	249	Id.
6....	51.2	60.7	53.2	52.0	54.0	50.1	7.4	61.0	12.6	471	470	485	487	476	257	239	251	244	250	Calmes.
7....	50.1	59.8	53.3	52.7	53.5	48.6	7.4	59.8	12.0	478	484	483	492	480	247	232	239	236	239	Id.
8....	51.4	57.4	54.2	52.4	53.4	50.1	7.8	58.8	13.4	479	486	489	489	482	240	206	233	235	231	Presque calme.
9....	51.3	60.2	54.2	50.1	53.6	50.2	7.3	60.3	13.4	487	473	488	480	485	238	216	238	242	234	Peu agitée.
10....	49.4	58.7	54.2	50.2	53.6	"	"	"	"	496	469	470	471	480	235	226	242	239	237	Agitée.
11....	50.6	57.0	48.0	46.7	52.3	"	"	58.8	13.0	473	480	493	465	477	237	225	241	233	235	Id.
12....	49.2	58.4	54.2	53.5	53.0	"	"	58.5	12.2	469	466	475	478	471	240	225	233	237	233	Peu agitée.
13....	51.0	58.6	53.5	52.9	53.5	50.5	6.8	58.8	11.9	470	466	481	481	473	235	225	233	234	233	Presque calme.
14....	51.5	57.7	55.7	53.5	53.9	50.7	8.0	58.4	11.6	479	482	497	492	484	231	222	227	236	231	Peu agitée.
15....	51.7	60.2	52.9	53.8	53.7	51.4	6.4	61.3	13.1	485	471	451	481	475	234	220	251	241	238	Agitée.
16....	51.1	62.7	52.2	53.1	54.1	"	"	62.8	12.3	471	458	470	483	475	233	223	238	235	233	Peu agitée.
17....	52.5	59.2	52.9	52.9	53.4	50.1	7.3	59.6	12.1	474	465	478	484	475	231	229	238	238	235	Id.
18....	51.0	59.1	52.9	52.9	53.8	50.9	7.7	60.9	12.6	475	467	481	483	474	240	229	232	243	236	Calmes.
19....	51.7	57.8	53.4	52.1	53.8	50.3	8.0	60.0	13.2	486	483	481	486	481	237	222	235	233	232	Presque calme.
20....	52.5	60.1	54.4	53.2	54.3	51.0	8.0	60.5	12.6	481	473	488	490	481	233	213	229	231	228	Calmes.
21....	51.6	62.2	53.4	51.4	54.2	50.8	7.6	62.5	11.8	482	481	485	488	484	230	211	230	232	227	Presque calme.
22....	53.9	58.6	54.8	52.7	54.1	"	"	59.6	12.8	499	455	478	479	475	223	207	234	232	227	Agitée le matin.
23....	52.1	57.1	54.9	43.2	52.5	51.3	8.0	59.4	12.8	477	476	479	451	474	230	216	240	234	232	Agitée le soir.
24....	50.6	56.8	53.9	51.8	53.9	"	"	58.3	13.3	471	463	471	494	472	237	216	240	230	231	Peu agitée.
25....	51.4	55.2	52.8	31.8	50.0	"	"	57.0	14.1	503	479	438	423	466	228	226	250	214	232	Grande perturbation.
26....	60.2	61.1	52.7	46.7	54.5	"	"	"	"	434	417	446	454	443	202	239	263	242	229	
27....	53.5	59.6	54.5	44.3	53.4	"	"	61.8	12.6	466	447	462	465	455	231	234	245	232	238	Très agitée.
28....	52.7	59.1	54.2	55.4	54.3	"	"	"	"	445	438	460	478	455	234	239	243	236	238	
29....	52.5	58.2	49.9	55.4	53.5	"	"	"	"	459	454	465	474	462	236	226	244	235	236	Agitée.
30....	52.1	58.2	51.1	53.6	53.4	"	"	58.5	11.7	466	449	467	468	463	236	230	241	229	235	Peu agitée.
Moy.	51.8	59.2	53.0	51.1	53.6	50.3	7.5	60.0	12.6	473	464	475	477	472	237	226	243	237	237	

Octobre 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (18°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000 +).					REMARQUES.	
	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	6h.	12h.	18h.	24h.		Moy. des 4 obs.
						Valeur	Heure.	Valeur	Heure.											
1....	52.5	58.2	53.9	52.7	53.7	51.6	8.7	59.0	13.2	466	459	468	472	464	233	219	234	232	230	Peu agitée.
2....	53.4	54.2	53.9	52.4	53.7	52.3	7.8	56.7	13.6	465	451	464	472	463	231	222	233	232	230	Presque calme.
3....	52.7	56.0	52.7	52.8	53.6	51.7	8.2	56.4	14.1	468	465	466	473	469	233	224	233	232	230	Id.
4....	52.4	56.4	54.5	53.2	53.9	51.3	7.5	57.5	13.4	471	458	474	478	470	233	216	228	228	227	Id.
5....	51.8	58.2	54.2	52.7	54.1	51.1	7.8	58.8	12.6	485	473	482	482	478	229	213	233	233	228	Id.
6....	51.8	57.3	54.9	53.5	53.8	50.7	9.0	59.1	13.2	482	477	483	476	477	233	214	230	237	230	Id.
7....	51.4	58.2	55.3	50.2	53.2	"	"	59.2	12.7	474	468	476	475	477	230	214	231	230	228	Peu agitée.
8....	52.1	59.6	54.1	51.0	54.0	51.3	8.5	59.7	12.7	480	467	475	467	474	227	217	230	233	228	Id.
9....	52.5	55.4	56.1	52.7	53.7	51.3	9.0	58.3	13.7	480	462	477	480	475	234	226	233	233	232	Presque calme.
10....	52.7	55.4	56.1	52.1	53.9	50.4	8.8	59.6	13.4	485	473	477	480	480	231	217	234	231	228	Peu agitée.
11....	52.7	54.3	53.9	51.8	53.2	51.0	8.8	56.8	14.0	483	463	476	478	476	222	218	229	226	225	Presque calme.
12....	52.7	55.3	53.9	51.4	53.1	51.3	8.0	58.6	14.5	494	433	478	475	472	222	221	229	226	224	Peu agitée.
13....	52.7	57.0	53.1	52.7	53.2	50.3	8.8	58.6	14.0	483	450	462	478	466	222	218	242	233	230	Agitée.
14....	53.1	58.4	53.5	52.5	53.4	"	"	59.5	12.7	447	471	465	476	470	223	212	236	232	226	Peu agitée.
15....	52.7	56.8	53.8	53.6	53.8	51.7	8.3	58.2	13.3	479	473	480	480	476	231	221	231	231	229	Presque calme.
16....	52.5	58.9	54.2	52.8	53.9	51.6	8.0	59.0	12.1	485	477	470	486	478	229	213	232	234	228	Id.
17....	51.4	58.1	54.9	52.7	54.1	51.3	8.0	59.0	13.4	490	480	486	492	485	233	221	234	229	231	Peu agitée.
18....	52.7	56.3	54.1	52.8	53.4	51.0	9.0	57.4	13.0	480	473	480	481	477	229	220	232	229	228	Presque calme.
19....	53.8	58.5	54.2	52.7	53.9	51.3	9.0	60.2	12.3	486	465	480	484	480	232	223	232	229	229	Id.
20....	53.5	57.7	53.9	49.8	54.1	51.2	8.7	59.3	12.8	490	468	490	483	483	232	221	234	229	230	Calmes.
21....	53.4	56.7	54.9	52.5	53.8	51.9	8.5	56.9	13.2	488	477	499	492	487	228	216	227	227	226	Presque calme.
22....	54.2	60.0	55.9	47.0	53.9	"	"	"	"	492	494	471	486	471	225	223	234	216	231	Perturbation. ✓
23....	53.4	57.4	45.9	51.1	51.9	"	"	"	"	486	466	466	471	470	229	219	246	226	229	
24....	54.9	55.4	54.1	54.1	54.2	"	"	55.6	13.0	488	456	486	483	477	224	226	233	229	228	Agitée.
25....	54.2	58.9	55.4	54.1	54.1	52.7	8.6	59.9	13.1	485	468	480	489	480	225	214	230	219	225	Peu agitée.
26....	54.1	58.9	45.0	47.1	54.4	53.1	7.0	"	"	491	426	453	475	465	222	225	254	219	231	Très agitée.
27....	53.9	54.6	50.7	54.8	53.2	"	"	58.0	13.0	473	444	451	492	466	222	225	237	233	228	Agitée.
28....	53.8	56.6	52.8	52.7	53.5	51.7	8.3	57.2	12.7	484	466	479	479	475	222	230	237	231	233	Peu agitée.
29....	52.7	56.4	53.2	52.4	53.2	50.6	9.0	57.2	12.7	485	463	485	486	479	228	224	229	230	228	Presque calme.
30....	52.8	58.2	45.7	49.3	54.0	52.0	7.4	60.8	13.7	494	459	449	474	473	230	229	251	237	235	Agitée le soir.
31....	52.7	56.4	54.1	52.8	53.4	51.3	8.4	57.1	13.3	476	467	477	475	474	233	216	230	230	228	Presque calme.
Moy.	52.9	57.1	53.3	52.1	53.7	51.4	8.4	58.3	13.2	481	463	474	480	474	228	220	234	230	229	

Novembre 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,15000+).				COMPOSANTE VERTICALE (0,42000+).				REMARQUES.			
	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	6h.	12h.		18h.	24h.	Moy. des 4 obs.
						Valeur	Heure.	Valeur	Heure.											
							h		h											
1....	52.6	56.7	54.5	52.0	53.2	51.5	9.0	57.5	12.7	487	467	467	477	476	230	229	237	237	233	Presque calme.
2....	51.6	54.7	52.7	50.6	52.4	50.6	9.0	55.3	12.6	483	476	480	476	480	231	227	236	240	234	Peu agitée.
3....	52.0	56.1	53.9	52.7	53.4	51.4	9.0	59.0	13.6	495	476	484	486	479	238	227	245	240	240	Id.
4....	52.0	56.0	52.7	51.8	52.7	50.6	9.1	56.2	12.6	479	477	484	479	477	241	236	244	241	241	Id.
5....	52.0	56.0	52.8	51.1	52.7	50.4	8.9	56.4	13.0	486	467	480	479	479	244	233	245	238	241	Presque calme.
6....	52.1	55.9	53.2	51.4	52.7	50.6	9.0	56.6	12.4	484	472	487	480	480	239	233	241	243	240	Id.
7....	52.0	55.2	52.1	52.0	52.4	50.5	8.2	55.3	13.0	484	474	487	483	481	244	236	242	240	242	Id.
8....	52.0	56.3	54.1	41.4	52.6	51.0	8.5	56.4	12.2	484	483	475	477	481	240	235	249	242	243	Agitée le soir.
9....	52.9	56.1	53.5	52.1	52.9	52.0	8.0	57.4	13.0	484	468	490	500	480	243	235	247	242	243	Peu agitée.
10....	52.7	58.9	52.7	51.8	53.2	"	"	59.3	13.4	493	429	468	476	465	243	244	260	249	249	Agitée.
11....	52.0	54.7	52.0	52.0	52.2	50.8	8.8	54.7	12.2	488	473	457	457	468	242	237	243	243	242	Presque calme.
12....	52.0	54.9	52.1	51.0	52.4	51.8	7.0	55.7	12.5	457	478	487	479	472	242	244	247	241	243	Id.
13....	51.8	55.9	52.0	51.4	52.3	50.6	8.1	56.0	12.3	486	483	493	478	482	243	240	243	244	242	Id.
14....	50.9	54.6	52.0	52.0	52.0	50.2	8.2	55.5	12.3	486	485	496	489	486	240	238	246	243	240	Id.
15....	52.0	54.3	52.4	52.0	52.2	50.5	8.9	55.6	13.3	492	477	486	491	488	242	228	239	236	237	Calme.
16....	52.0	55.6	52.5	52.0	52.7	51.8	9.0	56.3	12.5	491	488	492	492	491	236	225	239	236	235	Id.
17....	52.0	54.9	53.2	50.6	52.5	51.9	8.2	56.6	12.6	492	495	494	471	487	239	237	243	248	241	Presque calme.
18....	51.4	54.7	53.5	51.8	52.3	"	"	55.0	13.2	489	474	478	483	480	250	250	247	246	249	Peu agitée.
19....	51.3	57.4	52.7	51.4	53.1	"	"	57.6	12.4	499	478	477	477	482	243	246	253	246	247	Id.
20....	54.7	54.6	54.1	49.2	51.4	"	"	"	"	500	468	456	477	471	239	246	260	249	250	Agitée le soir.
21....	52.7	59.1	51.4	48.4	51.2	"	"	"	"	485	441	435	466	452	249	245	272	250	255	Perturbation. ✓
22....	54.1	53.9	49.2	54.7	52.6	"	"	"	"	474	456	451	481	463	261	258	270	252	259	Agitée.
23....	53.4	54.5	51.0	53.5	52.5	"	"	55.5	12.4	472	475	469	470	470	254	250	262	260	255	Id.
24....	52.0	54.7	52.0	52.8	52.6	51.7	9.1	54.7	12.0	477	477	476	474	474	258	251	260	256	257	Peu agitée.
25....	52.0	54.7	51.8	52.0	52.5	52.0	8.0	54.8	12.7	481	468	482	476	477	254	256	256	256	256	Calme.
26....	51.4	54.7	52.0	51.8	52.4	51.0	7.8	54.8	12.3	482	475	485	483	480	255	252	255	255	255	Id.
27....	51.1	54.7	52.1	50.6	52.4	51.1	8.0	54.9	13.0	498	483	494	491	488	250	246	249	250	251	Presque calme.
28....	51.3	53.9	53.4	50.6	52.3	51.2	7.1	55.1	12.6	489	491	496	483	488	248	241	249	248	248	Peu agitée.
29....	51.0	54.1	51.1	51.3	51.7	"	"	"	"	499	479	458	480	478	248	248	265	249	253	Agitée.
30....	51.4	54.7	50.4	51.3	52.0	"	"	55.6	13.7	491	485	472	481	484	252	243	258	252	251	Id.
Moy.	52.1	55.4	52.4	51.2	52.5	51.1	8.4	56.1	12.7	486	474	478	480	478	245	241	250	246	246	

Décembre 1887.

PARC SAINT-MAUR.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON. (15°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,19000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,42000+).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
							h		h											
1....	51.9	53.9	52.5	51.9	52.2	51.5	7.2	54.4	12.8	486	477	492	482	484	250	245	252	252	249	Peu agitée.
2....	52.1	53.3	52.1	50.8	52.2	50.7	9.0	54.7	13.0	488	484	488	485	486	248	239	254	251	249	Presque calme.
3....	52.1	53.5	52.5	51.9	52.4	51.4	9.0	54.4	13.7	492	484	492	488	488	250	239	254	254	240	Id.
4....	52.5	54.0	52.1	51.4	52.4	52.1	8.0	54.4	12.9	493	499	492	487	492	255	240	255	252	252	Calme.
5....	52.3	53.4	53.4	51.8	52.4	52.0	9.0	54.2	12.9	492	483	487	492	489	252	248	255	252	252	Presque calme.
6....	52.2	54.5	51.2	49.4	52.6	52.0	8.9	56.6	13.7	499	483	453	468	480	246	245	257	251	251	Agitée le soir.
7....	53.4	55.2	43.3	51.9	52.5	"	"	56.4	13.3	485	462	480	481	478	250	248	257	252	252	Agitée.
8....	52.6	53.8	52.2	50.6	52.5	52.0	8.6	55.1	12.4	496	476	485	502	486	249	247	254	251	252	Peu agitée.
9....	53.5	54.9	52.3	52.3	52.8	52.3	8.3	55.4	12.6	488	479	486	484	485	259	247	254	253	254	Presque calme.
10....	51.6	53.7	52.4	51.2	52.4	50.9	9.0	54.3	13.1	490	482	491	491	487	250	247	247	245	248	Calme.
11....	52.3	54.5	53.0	52.1	52.6	50.9	9.0	55.1	13.4	496	494	487	485	493	241	235	242	245	241	Id.
12....	51.6	53.8	52.3	49.5	52.1	50.8	8.8	55.0	13.4	493	485	497	487	493	243	241	243	243	243	Id.
13....	53.8	55.8	54.3	51.0	52.7	"	"	"	"	495	475	499	472	475	240	239	257	250	247	Peu agitée.
14....	52.5	55.0	52.1	51.8	52.3	51.4	9.0	55.0	12.3	485	474	483	484	481	244	246	251	248	246	Id.
15....	52.5	54.6	52.9	51.3	52.7	51.0	9.0	54.7	13.1	499	482	491	483	489	245	248	250	248	248	Calme.
16....	52.5	56.4	56.5	48.8	53.0	52.3	8.8	"	"	507	475	442	479	479	249	241	273	259	256	Agitée le soir.
17....	56.6	52.2	47.6	49.8	52.0	"	"	"	"	493	415	450	480	466	262	253	275	251	262	Très agitée.
18....	54.0	53.2	52.5	45.5	52.0	"	"	"	"	492	476	488	487	481	253	254	259	247	256	Id.
19....	55.2	54.3	52.3	52.3	52.1	"	"	55.0	13.1	486	455	481	495	474	249	250	262	252	253	Agitée.
20....	52.5	54.4	49.7	50.5	52.4	52.0	8.3	55.6	12.8	492	481	472	488	479	250	245	258	251	252	Peu agitée.
21....	52.5	53.7	50.4	46.1	51.7	52.3	8.7	"	"	484	467	491	466	473	248	250	269	251	256	Très agitée.
22....	53.9	57.9	52.5	51.1	52.5	"	"	"	"	460	450	465	479	463	240	257	264	256	255	Agitée le matin.
23....	52.3	53.6	51.9	51.2	52.1	51.0	9.5	54.3	13.3	484	476	478	477	478	250	249	253	253	251	Presque calme.
24....	52.5	53.7	52.5	51.1	52.3	"	"	54.4	13.5	487	481	486	483	483	248	245	252	251	250	Id.
25....	52.3	54.3	52.6	44.4	52.3	"	"	55.1	13.0	501	486	486	493	488	248	248	253	250	251	Agitée le soir.
26....	51.9	53.9	51.1	53.0	52.1	"	"	"	"	476	481	459	477	473	249	235	246	244	243	Agitée.
27....	52.5	53.9	50.0	50.0	51.7	"	"	"	"	475	474	479	471	474	240	240	246	241	243	Id.
28....	52.5	53.9	50.4	51.8	51.5	"	"	55.3	13.8	478	491	484	487	482	242	240	251	244	244	Peu agitée.
29....	51.1	53.9	51.1	51.6	51.7	"	"	54.4	13.1	479	475	484	480	479	235	239	250	250	243	Id.
30....	52.3	53.9	51.8	51.3	52.2	51.0	8.8	56.2	13.4	484	477	473	476	479	249	247	260	252	251	Id.
31....	51.1	54.7	52.5	51.5	52.3	50.0	8.8	54.9	12.6	491	475	479	475	481	248	238	251	244	246	Presque calme.
Moy.	52.7	54.3	51.7	50.6	52.3	51.5	8.7	55.0	13.1	489	476	479	483	481	248	245	255	250	250	

Année 1887. — Résumé.

PARC SAINT-MAUR.

Déclinaison.

HEURES.	ÉCARTS AVEC LA MOYENNE MENSUELLE.													DÉCLINAISON.
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Octobre.	Nov.	Déc.	Moyenne.	
<i>Midnight</i>														
1.....	-1.3	-1.9	-1.3	-1.5	-1.4	-1.0	-1.5	-1.8	-1.2	-1.1	-1.1	-1.2	-1.4	15.53,4
2.....	-0.4	-1.2	-1.0	-1.3	-1.9	-0.9	-1.3	-0.9	-1.5	-0.9	-0.6	-0.8	-1.1	53,7
3.....	-0.3	-0.1	-0.9	-1.3	-1.5	-0.6	-1.5	-1.5	-1.6	-0.7	-0.3	-0.1	-0.9	53,9
4.....	-0.1	-0.1	-0.7	-1.5	-1.9	-1.7	-1.9	-1.9	-1.3	-0.9	-0.1	+0.3	-1.0	53,8
5.....	-0.1	+0.1	-0.7	-1.3	-2.6	-3.0	-3.0	-2.4	-2.0	-0.8	-0.3	+0.4	-1.3	53,5
6.....	0.0	-0.1	-1.0	-1.3	-3.2	-3.7	-4.0	-3.1	-1.8	-0.8	-0.4	+0.4	-1.6	53,2
7.....	-0.3	0.0	-1.2	-2.4	-3.5	-4.2	-4.5	-3.5	-2.1	-1.1	-0.5	+0.3	-1.9	52,9
8.....	-0.8	-0.3	-2.4	-3.4	-3.4	-4.1	-4.4	-3.4	-1.9	-1.8	-0.7	0.0	-2.2	52,6
9.....	-0.9	-0.7	-2.2	-3.1	-2.3	-3.0	-1.7	-0.5	-1.7	-0.7	-0.7	-0.5	-1.7	53,1
10.....	0.0	-0.2	-0.4	-0.5	+0.2	+0.8	-0.8	+0.9	+2.0	-0.4	+0.4	+0.1	0.0	54,8
11.....	+1.3	+1.4	+1.9	+2.4	+2.9	+1.8	+2.0	+3.4	+4.1	+1.7	+2.3	+1.1	+2.2	57,0
12.....	+2.3	+2.7	+4.2	+5.1	+5.2	+4.0	+4.4	+5.2	+5.6	+3.4	+2.9	+2.0	+3.9	58,7
13.....	+3.5	+3.9	+5.0	+6.0	+5.9	+5.1	+5.6	+5.9	+6.0	+4.3	+3.2	+2.7	+4.8	59,6
14.....	+3.2	+3.4	+4.4	+5.7	+5.1	+5.1	+6.0	+5.6	+4.2	+4.2	+2.3	+2.3	+4.3	59,1
15.....	+2.0	+2.9	+3.3	+4.1	+4.0	+4.0	+4.8	+3.9	+2.2	+2.4	+1.5	+1.7	+3.1	57,9
16.....	+0.6	+2.0	+1.6	+2.5	+2.7	+2.8	+3.1	+2.0	+0.5	+1.3	+0.4	+0.8	+1.7	56,5
17.....	+0.4	+0.6	+0.5	+1.1	+1.2	+1.5	+1.6	+0.8	-0.5	+0.9	-0.5	-0.2	+0.6	55,4
18.....	+0.1	+0.4	-0.3	-0.1	+0.3	+0.7	+0.4	-0.1	-0.6	-0.4	-0.1	-0.6	0.0	54,8
19.....	-1.2	-1.6	-1.2	-0.9	-0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.7	-0.3	-1.1	-0.2	-0.7	54,1
20.....	-1.5	-1.8	-1.3	-1.2	-0.7	-0.2	-0.3	-0.9	-1.0	-0.8	-0.9	-0.7	-0.9	53,9
21.....	-1.9	-1.9	-1.3	-1.2	-1.1	-0.3	-0.4	-1.3	-1.4	-1.8	-1.5	-1.8	-1.3	53,5
22.....	-2.0	-2.6	-1.8	-2.0	-1.9	-0.4	-0.4	-1.9	-1.8	-1.7	-2.3	-2.4	-1.8	53,0
23.....	-1.9	-2.8	-1.9	-1.8	-1.4	-0.9	-0.5	-1.6	-2.8	-1.8	-1.5	-2.0	-1.7	53,1
24.....	-1.6	-2.9	-1.5	-1.2	-1.4	-0.9	-1.0	-1.7	-2.5	-1.6	-1.3	-1.7	-1.6	53,2
Écart diurne (1).....	5.6	6.1	8.7	10.9	11.4	10.3	11.2	11.1	9.7	6.9	5.0	3.5	8.4	"
Déclinaison (15°+).	57.1	57.2	56.0	55.9	55.8	55.2	54.5	53.9	53.6	53.7	52.5	52.3	"	54,8

(1) Différence entre la moyenne des minima et la moyenne des maxima diurnes.

Année 1887. — Résumé.

PARC SAINT-MAUR.

Composante horizontale.

HEURES.	ÉCARTS AVEC LA MOYENNE MENSUELLE.													COMPOSANTE horizontale.
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Octobre.	Nov.	Déc.	Moyenne.	
1.....	+4	+2	+6	+9	+7	+6	+5	+6	+7	+4	+1	+2	+5	0,19475
2.....	+5	+1	+4	+8	+7	+4	+7	+6	+7	+6	0	0	+5	475
3.....	+5	+2	+5	+8	+4	+6	+6	+7	+6	+6	+2	+2	+5	475
4.....	+5	+5	+6	+6	+3	+6	+5	+5	+8	+8	+5	+6	+6	476
5.....	+7	+5	+5	+7	0	+5	+5	+5	+5	+9	+6	+7	+5	475
6.....	+8	+7	+7	+6	-3	-1	0	0	+1	+7	+8	+8	+4	474
7.....	+9	+9	+8	0	-10	-7	-8	-7	-5	+7	+8	+11	+1	471
8.....	+7	+8	+2	-5	-17	-15	-14	-18	-13	+1	+7	+10	-4	466
9.....	-1	+3	-6	-17	-19	-19	-20	-22	-16	-5	+1	+4	-10	460
10.....	-9	-2	-13	-23	-15	-18	-21	-23	-20	-12	-5	-3	-14	456
11.....	-9	-5	-15	-24	-13	-13	-18	-18	-16	-15	-7	-5	-13	457
12.....	-9	-10	-10	-15	-7	-9	-11	-10	-8	-11	-4	-5	-9	461
13.....	-7	-10	-7	-11	-4	-7	-5	-4	-2	-5	-3	-3	-6	464
14.....	-5	-6	-3	-5	-2	-1	-1	+1	0	-4	-5	-6	-3	467
15.....	-2	-5	-2	+1	+4	+3	+3	-1	-1	-4	-5	-5	-1	469
16.....	-2	-4	-2	0	+3	+4	+2	+1	+1	-3	-4	-5	-1	469
17.....	0	-3	-2	+2	+7	+6	+5	+3	+1	-2	-1	-6	+1	471
18.....	0	-5	+1	+5	+8	+8	+9	+6	+3	0	0	-2	+3	473
19.....	-4	-2	+2	+8	+11	+9	+12	+10	+7	-1	0	-2	+4	474
20.....	+1	+1	+3	+9	+10	+12	+11	+12	+8	0	0	-3	+5	475
21.....	-1	+1	+4	+10	+12	+9	+10	+12	+9	+6	-1	-4	+6	476
22.....	+1	+1	+7	+9	+8	+8	+11	+13	+8	+5	-1	-2	+6	476
23.....	+2	+2	+6	+10	+8	+7	+9	+8	+6	+9	-1	-1	+5	475
24.....	+1	+4	+5	+10	+8	+7	+8	+6	+5	+6	+2	+2	+5	475
Écart diurne.....	18	19	23	34	31	31	33	35	29	24	15	17	26	"
Composante horizontale (0,19000+).	444	449	459	461	469	481	489	482	472	474	478	481	"	470

m m
+ 0.61.3
1.8

Année 1887. — Résumé.

PARC SAINT-MAUR.

Composante verticale.

HEURES.	ÉCARTS AVEC LA MOYENNE MENSUELLE.													COMPOSANTE verticale.
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Octobre.	Nov.	Déc.	Moyenne.	
1.....	-2	-1	+1	-1	+2	+1	+1	-1	-1	+1	-1	-1	0	0,42223
2.....	-3	-2	0	-1	+1	0	+1	-1	-2	0	-1	-1	-1	223
3.....	-3	-3	0	-2	0	-1	0	-1	-2	0	-1	-2	-1	222
4.....	-3	-3	0	-1	+2	+2	+1	0	-3	-1	-1	-2	-1	223
5.....	-3	-4	0	-1	+4	+3	+3	+1	-2	-1	-1	-2	0	223
6.....	-3	-3	0	+1	+4	+2	+3	+2	0	-1	-1	-2	0	224
7.....	-3	-3	+1	+2	+3	+1	+3	+3	0	0	-2	-3	0	224
8.....	-2	-3	+1	0	0	-2	+1	0	-1	+1	-2	-3	-1	223
9.....	-2	-3	-3	-5	-6	-6	-3	-5	-4	-1	-3	-4	-4	220
10.....	-3	-6	-9	-11	-13	-12	-7	-9	-10	-6	-5	-6	-8	216
11.....	-3	-8	-12	-15	-19	-17	-12	-12	-12	-9	-7	-6	-11	213
12.....	-3	-7	-12	-16	-18	-17	-13	-13	-11	-9	-5	-5	-11	213
13.....	-3	-5	-9	-10	-13	-11	-11	-10	-6	-7	-2	-3	-8	216
14.....	+2	-2	-3	-3	-7	-4	-6	-5	+1	-3	+2	0	-2	221
15.....	+5	+3	+2	+3	0	+1	0	+3	+5	+1	+4	+3	+2	226
16.....	+5	+6	+6	+6	+6	+6	+4	+8	+8	+3	+4	+4	+5	229
17.....	+4	+6	+6	+10	+10	+8	+9	+9	+8	+4	+4	+5	+7	231
18.....	+3	+7	+5	+10	+11	+9	+10	+9	+6	+5	+4	+5	+7	231
19.....	+4	+8	+4	+9	+11	+9	+9	+8	+5	+5	+3	+4	+7	230
20.....	+5	+7	+4	+8	+10	+7	+7	+5	+5	+5	+2	+5	+6	229
21.....	+4	+6	+4	+5	+7	+5	+5	+3	+3	+3	+2	+5	+4	228
22.....	+3	+5	+3	+4	+5	+3	+2	+1	+2	+3	+1	+3	+3	227
23.....	+2	+2	+2	+2	+4	+2	+1	-1	+1	+1	+1	+2	+2	225
24.....	0	0	+1	0	+3	0	+1	-1	0	+1	0	0	0	224
Écart diurne.....	8	16	18	26	30	26	23	22	20	14	11	11	19	"
Composante verticale (0,42000 +).	190	188	204	209	211	231	240	248	237	229	246	250	"	224

Année 1887. — Résumé.

PARC SAINT-MAUR.

Inclinaison.

HEURES.	ÉCARTS AVEC LA MOYENNE MENSUELLE.													INCLINAISON.
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Octobre.	Nov.	Déc.	Moyenne.	
1.....	-0.3	-0.2	-0.3	-0.6	-0.4	-0.3	-0.3	-0.4	-0.5	-0.2	0.0	-0.2	-0.3	65.0
2.....	-0.4	-0.1	-0.2	-0.5	-0.4	-0.2	-0.4	-0.4	-0.6	-0.3	0.0	-0.1	-0.3	14.4
3.....	-0.4	-0.2	-0.3	-0.6	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.5	-0.3	-0.1	-0.2	-0.3	14.3
4.....	-0.4	-0.4	-0.4	-0.4	-0.1	-0.3	-0.3	-0.3	-0.7	-0.5	-0.3	-0.5	-0.4	14.3
5.....	-0.6	-0.5	-0.3	-0.5	+0.2	-0.2	-0.2	-0.3	-0.4	-0.5	-0.4	-0.6	-0.4	14.3
6.....	-0.6	-0.6	-0.4	-0.3	+0.4	+0.2	+0.1	+0.1	-0.1	-0.4	-0.5	-0.6	-0.2	14.4
7.....	-0.7	-0.7	-0.5	+0.1	+0.8	+0.6	+0.6	+0.6	+0.3	-0.4	-0.5	-0.9	-0.1	14.6
8.....	-0.5	-0.6	-0.1	+0.4	+1.2	+1.0	+1.0	+1.3	+0.8	+0.1	-0.5	-0.8	+0.3	14.9
9.....	0.0	-0.3	+0.3	+1.0	+1.1	+1.2	+1.3	+1.4	+0.9	+0.4	-0.1	-0.4	+0.6	15.2
10.....	+0.5	-0.1	+0.6	+1.3	+0.7	+0.9	+1.2	+1.3	+1.0	+0.7	+0.2	0.0	+0.7	15.4
11.....	+0.5	+0.1	+0.7	+1.2	+0.3	+0.4	+0.8	+0.9	+0.7	+0.8	+0.3	+0.1	+0.6	15.2
12.....	+0.5	+0.4	+0.3	+0.6	0.0	+0.2	+0.4	+0.3	+0.2	+0.6	+0.2	+0.1	+0.3	15.0
13.....	+0.4	+0.5	+0.2	+0.5	-0.1	+0.2	0.0	0.0	-0.1	+0.2	+0.2	+0.1	+0.2	14.8
14.....	+0.4	+0.3	+0.1	+0.3	0.0	0.0	-0.1	-0.2	0.0	+0.3	+0.4	+0.4	+0.2	14.8
15.....	+0.3	+0.4	+0.2	+0.1	-0.2	-0.1	-0.2	+0.2	+0.2	+0.4	+0.5	+0.4	+0.2	14.9
16.....	+0.3	+0.4	+0.3	+0.2	0.0	0.0	0.0	+0.2	+0.1	+0.4	+0.4	+0.4	+0.2	14.9
17.....	+0.1	+0.4	+0.3	+0.2	-0.1	-0.1	0.0	+0.1	+0.1	+0.3	+0.2	+0.5	+0.2	14.8
18.....	+0.1	+0.5	+0.1	0.0	-0.1	-0.2	-0.3	-0.1	-0.1	+0.2	+0.2	+0.3	0.0	14.7
19.....	+0.4	+0.4	0.0	-0.2	-0.3	-0.3	-0.5	-0.4	-0.3	+0.3	+0.1	+0.2	-0.1	14.6
20.....	+0.1	+0.2	-0.1	-0.3	-0.3	-0.5	-0.5	-0.6	-0.4	+0.2	+0.1	+0.3	-0.2	14.5
21.....	+0.2	+0.1	-0.1	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5	-0.7	-0.5	-0.2	+0.2	+0.4	-0.2	14.5
22.....	0.0	+0.1	-0.4	-0.4	-0.3	-0.4	-0.6	-0.8	-0.5	-0.2	+0.1	+0.2	-0.3	14.4
23.....	-0.1	-0.1	-0.3	-0.6	-0.3	-0.3	-0.5	-0.5	-0.4	-0.5	+0.1	+0.1	-0.3	14.4
24.....	-0.1	-0.3	-0.3	-0.6	-0.4	-0.4	-0.5	-0.4	-0.4	-0.3	0.1	-0.2	-0.3	14.3
Écart diurne.....	1.2	1.2	1.2	1.9	1.7	1.7	1.9	2.2	1.7	1.3	1.0	1.4	1.5	"
Inclinaison (65° +)	15.4	15.0	14.8	14.8	14.3	14.1	13.9	14.6	15.0	14.5	14.8	14.8	"	14.7

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES

FAITES A L'OBSERVATOIRE DE PERPIGNAN,

PENDANT L'ANNÉE 1887,

PAR M. P. COEURDEVACHE,

SOUS LA DIRECTION DE M. LE D^r FINES.

Nous avons dit, dans le Tome I des *Annales du Bureau central météorologique*, année 1886, que le pavillon magnétique de l'Observatoire de Perpignan était construit d'après les mêmes plans que celui du Parc Saint-Maur, et que nous avions adopté les mêmes instruments, les mêmes méthodes d'observation et de réduction des mesures magnétiques que dans cet établissement. Rien n'a été changé dans cette installation; nous ne donnerons donc ici que les résultats des mesures absolues et les Tableaux déduits du dépouillement des courbes photographiées à notre magnétographe pendant l'année 1887.

Coordonnées géographiques de l'observatoire de Perpignan.

Longitude.....	0° 32' 45" E
Latitude.....	42° 42' 8" N

Valeur du millimètre sur les ordonnées des courbes.

Déclinomètre.....	1' 36
Bifilaire.....	0,00041 H
Balance magnétique.....	0,00027 Z

Ces valeurs ont été vérifiées par des graduations faites régulièrement le 1^{er} et le 15 de chaque mois.

L'angle horaire a été pris aussi deux fois par mois et la marche des chronomètres a été soigneusement vérifiée chaque fois, afin de bien repérer l'heure sur les courbes. Celle-ci est toujours donnée en temps moyen local de Perpignan, la journée commençant à minuit.

Mesures absolues de la Déclinaison en 1887.

Dates.	Heures.		Déclinaison.	Dates.	Heures.		Déclinaison.
	^h _h ^m _m	^h _h ^m _m			^h _h ^m _m	^h _h ^m _m	
Janv. 4....	10.16	à 10.45	14.47,6	Juill. 12....	17.26	à 18. 0	14.40,8
» 10....	8.30	9.00	14.42,8	» 20....	16. 8	16.30	14.44,8
» 14....	9.45	10.12	14.44,9	» 26....	15.42	16.10	14.46,0
» 27....	8.32	9. 0	14.44,0	» 30....	17.15	17.40	14.42,3
» 29....	8.48	9.18	14.43,6	Août 5....	15.52	16.20	14.43,2
Févr. 3....	14. 2	14.27	14.47,5	» 9....	16.56	17.17	14.41,5
» 7....	13.27	13.58	14.49,3	» 13....	15.12	15.36	14.45,8
» 12....	16.50	17.14	14.45,7	» 18....	14.18	14.46	14.44,2
» 17....	8.10	8.42	14.44,5	» 23....	15.35	15.56	14.41,6
» 19....	8.35	8.56	14.43,2	Sept. 6....	8.50	9.12	14.40,5
» 26....	9.33	9.56	14.43,6	» 9....	17. 0	17.20	14.41,5
Mars 4....	16.52	17.10	14.45,3	» 16....	13.40	14. 0	14.44,9
» 7....	16.15	16.35	14.46,1	» 17....	8.25	8.48	14.43,8
» 11....	11.32	11.53	14.47,1	» 23....	16.30	16.53	14.41,5
» 15....	14.13	14.35	14.47,4	» 30....	15.40	16. 2	14.40,4
» 23....	7.48	8.10	14.41,3	Oct. 8....	15.43	16. 7	14.41,2
» 29....	16.55	17.18	14.43,8	» 11....	16.48	17. 9	14.42,2
Avril 5....	8. 8	8.30	14.42,4	» 15....	15.42	16. 4	14.40,3
» 8....	9. 0	9.18	14.40,9	» 21....	14.33	14.57	14.42,8
» 13....	11.24	11.48	14.47,5	» 25....	15.18	15.40	14.39,5
» 19....	9.48	10.10	14.40,8	Nov. 4....	11.18	11.43	14.41,5
» 26....	15.48	16. 6	14.44,0	» 7....	11.20	11.43	14.42,7
» 30....	16.50	17.15	14.44,0	» 11....	11.24	11.45	14.41,1
Mai 7....	16.30	16.52	14.44,5	» 15....	10.55	11.17	14.38,8
» 10....	15.30	15.54	14.48,8	» 22....	11.20	11.42	14.41,6
» 20....	14.58	15.21	14.46,5	» 26....	11.28	11.49	14.42,0
» 28....	14.32	15. 0	14.47,7	Déc. 6....	11.15	11.36	14.40,6
Juin 3....	17. 4	17.20	14.42,6	» 8....	15.22	15.39	14.39,5
» 14....	17. 6	17.26	14.44,0	» 12....	10.45	11. 8	14.39,5
» 25....	8. 7	8.33	14.37,2	» 21....	11.27	11.50	14.41,5
» 28....	17.13	17.36	14.44,0	» 28....	14.45	15. 7	14.40,6
Juill. 5....	10.15	10.37	14.42,3				

Mesures absolues de la Composante horizontale en 1887.

Dates.	Heures.		Composante horizontale.	Dates.	Heures.		Composante horizontale.
	^h _h ^m _m	^h _h ^m _m			^h _h ^m _m	^h _h ^m _m	
Janv. 4.....	11. 0	à 12.21	0,22103	Mars 4.....	15.58	à 16.34	0,22148
» 10.....	9.30	10.58	0,22115	» 7.....	14.49	16. 0	0,22134
» 14.....	10.34	11.58	0,22116	» 11.....	10. 0	11.22	0,22126
» 27.....	9.28	10.46	0,22105	» 15.....	15.13	16.30	0,22143
» 29.....	9.30	10.54	0,22093	» 18.....	10.17	11.32	0,22139
Févr. 3.....	14.42	16. 8	0,22125	» 22.....	9. 3	10.20	0,22123
» 7.....	14.23	15.40	0,22115	» 25.....	15.28	16.42	0,22123
» 12.....	15.18	16.40	0,22133	» 29.....	14.18	15.45	0,22154
» 17.....	9.30	10.48	0,22131	Avril 1.....	7.36	9. 0	0,22143
» 19.....	7.26	8.32	0,22143	» 5.....	9.40	10.54	0,22106
» 23.....	7.46	10.36	0,22128	» 8.....	9.30	10.55	0,22096
» 26.....	8. 3	9.18	0,22147	» 13.....	15.18	16.34	0,22108

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES.

B.27

Dates.	Heures.		Composante horizontale.	Dates.	Heures.		Composante horizontale.
	^h _m	^h _m			^h _m	^h _m	
Avril 15.....	6.25 à	7.42	0,22126	Août 12.....	16.32 à	17.46	0,22174
» 17.....	7.50	9.12	0,22098	» 24.....	16. 7	17.20	0,22152
» 19.....	9.35	10.48	0,22139	» 27.....	15.36	16.46	0,22158
» 22.....	14.17	15.40	0,22113	Sept. 5.....	15.33	16.52	0,22158
» 26.....	15.30	16.45	0,22157	» 9.....	15.33	16.45	0,22186
» 30.....	15.30	16.48	0,22137	» 15.....	15.36	16.55	0,22143
Mai 4.....	15. 4	16.18	0,22155	» 21.....	8.36	9.55	0,22135
» 7.....	16.16	16.35	0,22141	» 21.....	10.13	11.30	0,22146
» 10.....	16.16	17.35	0,22155	» 23.....	14.50	16.12	0,22164
» 15.....	5.55	7.18	0,22147	Oct. 5.....	14.37	15.48	0,22146
» 20.....	13.24	14.42	0,22145	» 8.....	14.13	15.26	0,22170
» 25.....	15.26	16.45	0,22145	» 11.....	15. 8	16.24	0,22154
» 31.....	16. 0	17.20	0,22150	» 14.....	15.13	16.24	0,22151
Juin 3.....	15.25	16.37	0,22137	» 18.....	14. 1	15.17	0,22160
» 7.....	15.55	17.10	0,22145	» 21.....	13. 8	14.24	0,22168
» 14.....	15.36	16.50	0,22157	» 25.....	13.50	15. 5	0,22143
» 17.....	15.32	16.50	0,22159	Nov. 4.....	9.58	11.16	0,22150
» 23.....	15.30	16.45	0,22162	» 8.....	9.32	10.49	0,22172
» 28.....	15.48	17. 3	0,22167	» 11.....	10. 6	11.20	0,22149
Juill. 1.....	15.45	17. 5	0,22168	» 15.....	9.38	10.52	0,22172
» 5.....	15.35	16.50	0,22177	» 18.....	9.49	11.17	0,22162
» 12.....	16.10	17.22	0,22156	» 24.....	9.59	11.30	0,22147
» 18.....	15.37	16.56	0,22151	» 26.....	10. 2	11.14	0,22147
» 22.....	15.27	16.40	0,22162	Déc. 6.....	9.48	11. 6	0,22140
» 26.....	14.15	15.25	0,22175	» 8.....	10.10	11.23	0,22135
» 28.....	15.54	17. 8	0,22173	» 13.....	9.39	11. 3	0,22152
» 30.....	15.33	16.48	0,22155	» 21.....	9.53	11. 7	0,22140
Août 5.....	14.14	15.36	0,22155	» 23.....	10.25	11.41	0,22144
» 9.....	15.14	16.34	0,22150	» 28.....	10.26	11.49	0,22155

Mesures absolues de l'Inclinaison en 1887.

Dates.	Heures.		Inclinaison.	Dates.	Heures.		Inclinaison.
	^h _m	^h _m	^o _'		^h _m	^h _m	^o _'
Janv. 4.....	8.48 à	9.45	60.24,6	Mars 22.....	9.10 à	9.53	60.22,6
» 10.....	11.22	12.10	60.23,4	» 23.....	8.20	9. 6	60.23,2
» 14.....	8.36	9.21	60.22,8	» 24.....	8.28	9.16	60.22,6
» 27.....	11. 4	11.56	60.23,2	» 25.....	8. 7	8.48	60.24,6
» 29.....	11. 8	11.53	60.24,2	» 26.....	6. 8	7. 0	60.22,5
Févr. 3.....	16.25	17. 5	60.22,7	» 29.....	14. 4	16.50	60.23,5
» 7.....	16. 3	16.52	60.23,2	Avril 6.....	8.40	9.24	60.23,1
» 12.....	14.10	15. 1	60.23,1	» 7.....	8.43	9.30	60.23,2
» 17.....	11.12	11.58	60.23,0	» 8.....	7.56	8.48	60.23,5
» 19.....	9.47	10.30	60.23,3	» 9.....	8.21	9. 8	60.23,0
» 23.....	10.55	11.40	60.24,6	» 13.....	7.58	8.45	60.23,1
» 26.....	10.14	11. 8	60.25,2	» 15.....	13.45	14.24	60.21,2
Mars 7.....	13.36	14.30	60.24,4	» 19.....	10.30	11.18	60.22,1
» 8.....	8.32	9.15	60.22,3	» 20.....	8.15	9. 8	60.24,2
» 11.....	8.52	9.42	60.23,5	» 21.....	7.50	8.40	60.22,5
» 15.....	16.45	17.25	60.22,8	» 22.....	8. 8	9. 4	60.21,8
» 18.....	13.56	14.40	60.22,8	» 26.....	16.36	17.25	60.22,0
» 20.....	7. 4	7.48	60.21,1	» 29.....	14. 8	14.56	60.23,5
» 21.....	8.20	9. 7	60.21,9	» 30.....	14. 8	14.52	60.12,5

Dates.			Heures.		Inclinaison.		Dates.			Heures.		Inclinaison.	
			^h _m	^h _m	^o _'				^h _m	^h _m	^o _'		
Mai	1.....	7.15	à	8. 0	60.22,0	Août	20.....	16.14	à	17. 6	60.21,1		
»	2.....	8.10		9. 2	60.21,6	»	23.....	14.22		15. 6	60.20,5		
»	4.....	14.16		15. 0	60.22,8	»	26.....	13.53		14.37	60.19,6		
»	5.....	8.30		9.15	60.21,0	Sept.	1.....	7.35		8.30	60.22,7		
»	6.....	14.20		15.26	60.21,1	»	5.....	14.18		15. 8	60.18,2		
»	7.....	13.50		14.36	60.21,5	»	9.....	14.06		15. 3	60.19,7		
»	10.....	14.12		14.54	60.23,2	»	15.....	14.35		15.22	60.19,2		
»	14.....	14.15		15. 0	60.21,3	»	21.....	14.57		15.45	60.21,0		
»	19.....	8.15		9. 0	60.22,2	»	21.....	15.50		16.36	60.20,1		
»	21.....	14.12		15. 0	60.21,5	»	23.....	13.42		15.27	60.19,1		
»	25.....	13.55		14.45	60.24,5	»	30.....	13.41		14.35	60.20,1		
»	28.....	15.36		16.22	60.24,3	Oct.	5.....	16. 7		16.57	60.20,4		
»	31.....	14.45		15.26	60.23,8	»	8.....	16.25		17. 8	60.21,8		
Juin	3.....	14. 6		14.55	60.21,6	»	11.....	13.58		14.50	60.21,7		
»	7.....	14.33		15.18	60.22,6	»	14.....	13.50		14.36	60.20,0		
»	14.....	14.18		15. 6	60.23,0	»	17.....	13.48		14.42	60.20,8		
»	17.....	14.14		15. 0	60.20,7	»	18.....	15.32		16.18	60.21,7		
»	18.....	16.40		17.25	60.21,1	»	21.....	15.14		15.57	60.22,2		
»	23.....	14.18		15. 8	60.22,5	»	25.....	15.48		16.32	60.21,1		
»	24.....	16.56		17.36	60.21,4	Nov.	4.....	14. 7		14.52	60.19,5		
»	28.....	14.27		15.18	60.23,1	»	5.....	8. 5		8.53	60.20,7		
Juill.	1.....	14.28		15.20	60.22,0	»	8.....	15.15		16. 0	60.21,5		
»	5.....	14.16		15. 8	60.20,8	»	12.....	8. 3		8.45	60.20,7		
»	6.....	14. 5		14.48	60.20,6	»	15.....	8.15		9. 4	60.19,2		
»	9.....	14. 5		14.45	60.20,9	»	18.....	8.30		9.12	60.20,2		
»	12.....	14.20		15. 5	60.22,2	»	24.....	8. 2		8.45	60.20,4		
»	17.....	6.12		7. 0	60.20,5	»	26.....	7.58		8.46	60.20,3		
»	20.....	14. 5		14.55	60.20,6	»	29.....	8.16		9. 8	60.19,9		
»	22.....	14. 8		14.55	60.19,7	Déc.	6.....	8. 0		8.45	60.19,3		
»	25.....	13.40		14.50	60.20,8	»	8.....	14.14		15. 5	60.22,2		
»	28.....	14.22		15.15	60.20,6	»	12.....	9. 5		9.53	60.19,0		
»	30.....	14.16		15. 0	60.20,6	»	14.....	9. 5		9.56	60.21,2		
Août	3.....	14. 7		14.55	60.25,0	»	16.....	8.58		9.46	60.21,1		
»	9.....	14. 2		14.50	60.21,9	»	21.....	13.58		14.38	60.23,0		
»	11.....	14.24		15.15	60.22,5	»	23.....	13.53		14.45	60.22,0		
»	13.....	14.20		15. 3	60.20,1	»	28.....	8.57		9.45	60.22,2		
»	18.....	15.15		16. 2	60.19,8	»	30.....	9.10		9.58	60.21,6		

Janvier 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (14° +).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (38800 +).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	44.8	47.5	45.2	44.9	45.6	44.1	9.0	48.3	12.4	107	103	113	108	108	136	134	132	136	134	Presque calme.
2....	44.5	46.7	45.1	44.3	45.2	43.7	8.8	47.8	13.7	109	95	102	103	102	135	126	134	132	132	Id.
3....	44.8	46.0	44.6	43.3	44.7	43.4	8.9	48.4	13.4	112	98	110	120	110	133	133	131	130	132	Peu agitée.
4....	45.3	48.3	45.7	43.7	45.7	43.9	8.2	48.5	13.2	132	107	91	98	107	126	133	135	133	132	Id.
5....	44.6	47.5	44.2	44.1	45.1	43.7	8.7	47.5	12.0	115	110	115	124	116	131	132	134	134	133	Presque calme.
6....	44.5	47.8	45.2	44.8	45.6	42.6	8.9	49.1	13.0	134	112	124	127	124	134	129	132	134	132	Id.
7....	44.6	46.7	44.8	43.9	45.0	43.8	8.9	47.8	13.7	149	132	133	128	135	126	129	134	133	131	Peu agitée.
8....	44.8	47.3	44.6	44.2	45.2	42.5	8.9	47.4	12.1	138	128	137	136	135	128	124	132	132	129	Presque calme.
9....	44.8	46.0	44.9	44.8	45.1	42.9	8.7	47.8	13.8	144	129	144	136	138	127	130	131	128	129	Id.
10....	45.2	47.1	44.2	43.4	45.0	42.5	8.7	48.2	13.1	146	138	154	149	147	125	131	131	125	128	Calme.
11....	44.6	46.9	46.2	44.3	45.5	43.7	8.6	48.2	13.8	150	145	143	140	145	125	129	132	125	128	Peu agitée.
12....	43.7	47.7	44.6	44.6	45.2	42.6	9.2	48.4	12.2	129	125	135	134	131	132	126	134	131	131	Id.
13....	44.8	47.5	45.5	44.8	45.6	44.2	8.0	48.1	13.1	140	136	134	131	135	130	132	131	126	130	Presque calme.
14....	45.3	47.1	48.1	42.0	45.6	44.2	8.8	49.8	14.5	137	114	100	109	115	130	119	130	130	127	Agitée.
15....	47.5	50.2	42.0	42.3	45.5	"	"	"	"	113	86	115	124	110	122	125	138	125	127	Très agitée.
16....	45.5	46.5	44.9	41.9	44.7	42.9	8.1	50.6	13.1	122	103	123	134	120	124	124	134	123	126	Agitée.
17....	43.9	46.7	43.4	42.6	44.3	42.6	8.7	48.5	12.7	121	90	130	107	112	125	126	129	124	126	Id.
18....	43.4	45.2	45.6	42.9	44.3	42.9	8.7	48.8	13.4	128	100	122	119	117	125	121	130	130	126	Id.
19....	44.5	48.8	44.1	42.0	44.8	42.7	8.8	49.1	12.5	114	107	126	141	122	130	126	128	125	127	Peu agitée.
20....	44.8	46.5	44.2	43.4	44.7	42.9	9.3	47.9	13.2	126	108	103	118	114	131	133	124	127	129	Id.
21....	44.5	46.5	44.8	43.8	44.9	44.5	8.6	48.8	13.4	127	104	125	119	119	133	130	133	132	132	Id.
22....	43.5	47.8	44.5	43.9	44.9	42.0	9.0	48.4	13.0	124	101	125	120	117	136	121	133	136	132	Id.
23....	47.0	46.5	43.5	42.0	44.8	"	"	49.8	12.9	156	94	121	137	127	129	126	134	135	131	Très agitée.
24....	44.8	47.1	44.1	42.5	44.6	42.3	9.0	"	"	119	98	120	120	114	130	120	133	129	128	Agitée.
25....	45.9	48.6	45.0	42.6	45.5	"	"	51.0	12.9	129	102	124	119	118	129	119	135	129	128	Id.
26....	45.8	46.9	44.7	42.8	45.0	43.9	9.0	49.4	14.1	119	99	112	113	111	133	126	135	131	131	Id.
27....	45.6	47.5	44.3	41.2	45.4	43.9	8.8	49.1	13.3	114	103	113	113	111	133	129	134	131	132	Peu agitée.
28....	44.7	46.6	44.7	42.2	44.6	44.4	8.9	49.1	13.2	122	110	116	98	112	132	128	136	136	133	Presque calme.
29....	45.2	47.8	45.0	43.3	45.3	44.7	8.7	50.1	12.9	118	105	115	112	112	132	122	136	133	131	Peu agitée.
30....	44.7	47.2	45.5	44.4	45.5	42.6	8.6	49.0	12.9	118	97	117	118	113	133	126	137	131	132	Id.
31....	44.7	46.1	45.2	43.6	44.9	44.6	8.8	49.6	14.0	125	105	111	107	112	134	131	132	133	132	Id.
Moy.	44.9	47.2	44.8	43.5	45.1	43.4	8.8	48.8	13.2	127	109	121	121	120	130	127	133	130	130	

Février 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (14° +).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800 +).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	44.6	45.7	41.1	43.5	43.7	"	h	47.5	12.9	142	124	107	119	123	125	130	134	131	130	Agitée.
2....	44.2	45.5	44.2	43.3	44.3	42.9	9.1	47.5	12.9	129	115	115	123	121	123	128	131	130	128	Peu agitée.
3....	44.6	45.2	44.3	36.8	42.7	43.1	8.5	48.1	12.9	134	119	139	130	130	129	125	130	133	129	Id.
4....	45.7	44.6	46.7	44.1	45.3	41.7	9.2	"	"	126	132	110	126	123	136	134	143	146	140	Agitée.
5....	44.1	46.0	42.6	43.0	43.9	42.7	9.1	47.8	14.2	134	110	128	119	123	135	133	143	144	139	Id.
6....	44.6	45.6	45.2	42.9	44.6	41.7	8.9	48.1	14.1	139	130	139	131	135	144	137	142	144	142	Peu agitée.
7....	44.6	49.1	45.6	43.7	45.8	43.4	8.9	50.4	13.6	142	144	128	125	135	141	132	145	144	140	Id.
8....	44.2	45.7	44.7	44.3	44.7	42.6	8.7	47.5	13.4	134	136	137	141	137	139	130	144	144	139	Presque calme.
9....	44.6	47.5	44.2	44.1	45.1	40.6	9.3	48.8	12.7	141	97	120	137	124	144	135	151	151	145	Peu agitée.
10....	44.1	45.7	45.3	40.6	43.9	42.9	8.9	48.8	13.6	140	136	134	142	138	142	137	151	143	143	Agitée.
11....	44.2	49.4	45.7	41.9	45.3	"	"	49.4	14.1	126	114	121	133	124	141	129	144	144	140	Id.
12....	43.8	49.2	47.1	38.5	44.6	43.3	9.2	51.2	13.2	132	94	116	106	112	149	137	145	148	145	Id.
13....	43.0	47.7	43.1	42.0	43.9	"	"	50.1	12.8	121	105	90	125	110	134	145	157	148	146	Très agitée.
14....	43.7	48.1	45.6	37.3	43.7	"	"	50.1	12.9	123	109	109	130	118	144	145	148	142	145	Id.
15....	44.6	46.6	45.7	43.0	45.0	42.4	8.7	47.8	14.4	120	105	103	136	116	145	143	151	149	147	Agitée.
16....	43.7	46.6	44.1	40.8	43.8	"	"	47.5	14.1	121	113	122	126	120	148	145	154	148	149	Peu agitée.
17....	44.3	46.0	43.9	43.3	44.3	43.3	8.8	47.4	13.9	116	117	134	121	122	151	141	154	154	150	Id.
18....	43.3	45.2	44.1	43.3	44.0	41.7	9.0	46.1	14.0	130	128	138	128	131	153	154	156	153	154	Id.
19....	43.3	45.2	46.7	40.0	43.8	42.9	9.0	46.3	14.5	135	141	120	145	135	149	141	149	146	146	Presque calme.
20....	44.6	49.1	43.4	42.0	44.8	"	"	50.1	13.7	144	114	128	147	133	148	135	148	141	143	Agitée.
21....	47.1	46.9	44.6	42.1	45.2	44.1	8.8	48.9	13.6	148	95	132	125	125	137	132	144	144	139	Id.
22....	44.1	47.7	44.2	43.0	44.8	"	"	"	"	136	118	117	131	125	136	123	129	133	130	Id.
23....	44.1	47.0	44.6	43.0	44.7	"	"	49.8	12.9	139	116	128	131	129	129	134	142	133	135	Id.
24....	44.3	46.4	45.3	43.0	44.8	"	"	"	"	124	130	132	134	130	132	127	135	134	132	Peu agitée.
25....	43.4	47.9	44.7	43.8	44.9	43.3	7.8	49.8	12.9	138	127	138	143	137	136	124	131	131	130	Id.
26....	44.1	47.7	44.9	41.9	44.6	41.7	8.9	48.3	12.7	142	127	147	146	140	132	125	134	131	130	Presque calme.
27....	43.0	47.5	44.3	43.8	44.6	43.0	8.1	49.8	13.2	158	131	116	141	137	132	124	142	133	133	Peu agitée.
28....	43.5	46.3	44.6	43.8	44.5	42.6	8.5	47.8	13.2	148	130	122	137	134	138	128	142	136	136	Id.
Moy.	44.2	46.8	44.7	42.2	44.5	42.6	8.8	48.6	13.5	134	120	124	131	127	139	134	144	141	140	

Mars 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (14°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800+).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
							h		h											
1....	43.7	47.4	43.0	43.3	44.4	42.3	8.4	49.4	13.5	144	110	126	127	127	135	132	134	140	135	Presque calme.
2....	43.5	47.7	43.7	43.0	44.5	42.6	8.1	48.5	13.1	133	115	134	141	131	137	133	134	140	136	Calme.
3....	43.7	47.9	44.7	44.0	45.1	42.2	8.6	49.1	13.1	142	139	145	141	143	138	132	133	141	136	Id.
4....	43.6	48.6	44.9	44.0	45.3	42.6	8.5	49.1	12.9	147	127	148	143	141	140	133	148	144	141	Presque calme
5....	43.8	47.5	45.3	42.4	44.7	42.0	8.9	48.7	13.4	148	139	139	123	137	142	136	146	157	145	Peu agitée.
6....	44.8	49.8	45.4	43.4	45.8	42.4	7.3	50.9	13.2	145	127	106	118	124	150	145	158	163	154	Agitée.
7....	43.9	48.0	45.0	43.6	45.1	42.4	7.3	50.7	12.8	128	133	135	134	132	154	151	150	152	152	Peu agitée.
8....	44.6	46.0	43.9	39.3	43.5	43.2	7.7	50.0	14.1	137	123	127	112	125	153	139	155	156	151	Agitée.
9....	44.6	50.3	42.5	44.2	45.4	42.1	8.2	50.8	13.7	125	103	134	130	123	155	154	164	156	156	Id.
10....	44.9	47.6	44.5	43.4	45.1	42.4	8.5	50.2	13.5	137	136	137	140	138	156	145	154	154	152	Peu agitée.
11....	43.7	47.0	41.2	43.1	43.7	42.6	8.3	48.2	12.4	126	126	121	129	125	156	147	158	157	155	Id.
12....	42.9	46.6	44.5	42.7	44.2	40.7	8.6	50.1	12.8	138	121	145	143	137	156	148	164	158	156	Presque calme.
13....	43.7	45.8	43.5	41.4	43.6	40.6	9.0	48.5	14.5	143	123	148	151	141	157	143	162	156	155	Peu agitée.
14....	43.0	47.6	44.7	43.1	44.6	40.2	9.0	49.9	14.3	154	127	138	148	142	153	131	155	156	149	Id.
15....	43.1	46.1	45.0	39.9	43.5	42.6	7.3	48.7	13.1	161	124	165	139	147	150	136	154	153	149	Agitée.
16....	43.0	45.8	43.0	42.9	43.7	41.5	8.5	47.8	13.3	150	141	145	146	145	140	143	151	143	144	Id.
17....	42.9	45.9	43.6	42.5	43.7	41.2	8.1	47.6	12.5	154	149	156	153	153	141	129	141	138	137	Peu agitée
18....	42.8	45.5	43.7	41.6	43.6	41.4	8.5	46.8	13.0	150	138	144	147	145	135	122	129	129	129	Presque calme.
19....	42.9	45.5	46.2	43.2	44.5	40.0	9.0	47.7	14.5	141	140	120	155	139	132	118	134	135	130	Id.
20....	43.3	47.9	43.5	43.8	44.6	41.1	8.3	49.1	12.8	154	138	130	130	138	144	120	146	137	137	Agitée.
21....	42.9	49.5	42.9	43.0	44.6	41.7	8.1	49.8	12.1	147	108	122	131	127	141	137	143	143	141	Id.
22....	43.4	49.2	43.9	42.5	44.8	40.1	7.7	50.2	12.3	138	112	137	127	128	147	130	150	142	142	Peu agitée.
23....	43.5	49.3	44.4	43.2	45.1	40.3	8.5	50.3	13.0	139	125	136	173	143	148	135	149	145	144	Id.
24....	42.2	47.9	44.0	43.2	44.3	"	"	50.3	13.8	136	118	124	136	129	151	137	152	145	146	Agitée.
25....	43.6	48.2	44.1	43.8	44.9	40.4	8.1	48.9	13.5	143	135	142	143	141	151	141	150	148	148	Peu agitée.
26....	42.8	49.2	42.4	43.7	44.5	40.1	7.5	50.2	13.7	146	143	136	143	142	150	135	152	148	146	Id.
27....	43.0	49.8	44.1	44.1	45.2	40.3	8.4	50.7	12.1	148	150	143	143	146	153	133	146	141	143	Id.
28....	42.4	50.4	44.5	44.1	45.4	42.2	8.3	50.5	12.6	139	132	140	147	140	142	128	140	138	137	Id.
29....	41.6	48.1	44.6	43.5	45.2	41.1	8.4	48.7	12.6	146	145	145	145	145	143	136	135	133	137	Presque calme.
30....	43.5	49.3	44.3	41.1	45.3	39.3	8.6	49.7	12.3	149	144	147	148	147	136	138	133	129	131	Calme.
31....	44.2	48.8	44.8	44.2	45.5	40.1	9.0	50.0	13.4	157	134	151	149	148	131	139	132	126	132	Id.
Moy.	43.5	47.9	44.1	43.1	44.6	41.4	8.3	49.4	13.2	143	130	138	140	138	146	136	147	145	144	

Avril 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (14°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800+).					REMARQUES.	
	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	6h.	12h.	18h.	24h.		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
							h		h											
1....	44.1	48.8	45.3	43.0	45.3	40.6	8.5	49.9	13.4	149	133	145	168	149	138	120	137	138	133	Calme.
2....	43.6	50.3	44.3	43.6	45.4	40.3	8.7	50.4	13.0	129	117	140	148	133	138	129	144	140	138	Agitée.
3....	42.3	51.8	43.3	43.5	45.2	41.2	8.4	54.0	12.9	146	102	120	129	124	140	125	152	148	141	Id.
4....	43.1	49.2	45.2	40.9	44.6	40.8	7.8	49.7	12.8	135	144	125	129	133	146	139	147	147	145	Id.
5....	41.5	48.4	43.5	43.2	44.2	41.1	8.6	51.5	13.7	148	124	139	135	136	150	142	154	146	148	Très agitée.
6....	45.1	49.3	45.1	42.0	45.4	40.7	7.8	52.8	14.1	118	119	133	150	130	150	135	158	143	147	Id.
7....	41.5	48.6	43.3	44.9	44.6	"	"	49.1	13.7	108	108	141	136	123	139	144	156	148	147	Id.
8....	43.2	48.4	41.2	42.3	43.8	39.8	8.6	48.8	12.8	120	111	136	129	124	140	133	152	145	142	Agitée.
9....	41.3	47.9	41.8	43.5	45.1	39.8	8.2	49.3	13.7	130	110	140	131	128	147	133	151	145	144	Peu agitée.
10....	43.0	48.5	44.5	43.6	44.9	40.0	8.3	49.1	13.6	126	114	126	138	126	147	133	156	148	146	Id.
11....	42.1	51.8	43.4	42.4	44.9	38.8	7.9	53.8	12.8	140	106	135	135	129	148	132	160	152	148	Id.
12....	42.9	47.5	44.3	42.9	44.4	39.8	7.8	49.4	14.0	141	114	127	128	128	154	138	159	154	151	Id.
13....	43.7	48.6	43.9	42.5	44.7	40.7	8.5	49.3	13.7	134	128	140	141	136	156	145	158	153	153	Presque calme.
14....	43.6	48.5	44.1	43.3	44.9	39.4	8.9	51.4	13.3	158	115	153	158	146	152	134	152	148	146	Peu agitée.
15....	46.2	47.7	44.0	42.9	45.2	41.1	7.8	50.0	13.5	147	142	145	153	147	153	134	151	144	145	Agitée.
16....	43.6	48.6	42.5	42.8	44.4	37.8	8.1	49.2	12.2	145	145	153	150	148	141	123	138	135	134	Peu agitée.
17....	42.6	49.4	43.6	42.9	44.6	38.4	8.2	51.5	12.4	146	132	151	157	147	140	116	144	136	134	Id.
18....	43.2	46.6	43.6	42.6	44.0	39.6	8.7	47.8	12.6	149	152	153	148	150	137	116	131	131	129	Id.
19....	41.5	46.4	43.1	42.3	43.3	38.6	8.4	47.5	13.3	153	136	152	154	149	135	106	132	132	126	Presque calme.
20....	42.6	46.2	43.1	42.4	43.6	37.5	8.4	47.8	13.2	164	148	141	141	148	137	119	136	130	131	Peu agitée.
21....	41.3	47.8	43.2	39.9	43.1	38.3	8.2	49.0	12.8	146	125	139	156	142	139	125	135	138	134	Id.
22....	40.5	47.1	43.0	40.9	42.9	37.7	7.9	49.4	12.1	154	137	156	142	147	143	132	144	140	140	Agitée.
23....	40.9	47.1	42.8	41.2	43.0	38.2	8.4	47.2	12.6	151	132	150	173	151	143	130	143	141	139	Peu agitée.
24....	42.9	46.1	43.2	43.3	43.9	39.1	8.3	47.3	12.8	148	122	134	159	141	142	134	152	147	144	Agitée.
25....	42.2	50.5	42.2	42.5	44.4	39.5	8.0	51.5	12.4	145	111	138	131	133	150	135	157	152	149	Peu agitée.
26....	41.2	47.0	42.9	42.7	43.4	38.4	8.4	47.4	12.6	145	146	163	149	151	155	135	154	145	147	Presque calme.
27....	40.6	47.0	42.7	42.2	43.1	38.8	8.0	48.4	12.8	156	156	161	162	159	150	125	142	141	140	Calme.
28....	39.2	47.7	42.0	39.7	42.1	37.4	7.7	"	"	164	167	112	132	144	145	119	161	152	144	Agitée.
29....	41.2	46.6	42.9	43.3	43.5	39.7	7.0	47.9	13.3	129	142	147	160	145	150	130	156	156	148	Peu agitée.
30....	39.6	45.9	41.7	42.5	39.0		7.6	45.9	12.0	151	142	153	148	148	156	136	159	154	151	Id.
Moy.	42.4	48.2	43.5	42.5	44.1	39.4	8.2	49.5	13.0	142	129	142	146	140	145	130	149	144	142	

Mai 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (14°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800+).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	41.3	46.6	43.1	42.1	43.3	39.2	8.0	47.4	13.7	152	156	141	145	148	158	147	166	166	159	Peu agitée. Agitée.
2....	40.9	47.5	43.9	40.9	43.3	"	"	49.6	12.8	148	144	145	136	143	164	150	164	164	160	
3....	42.5	47.3	43.5	41.8	43.8	40.1	6.6	47.6	11.8	144	117	137	144	136	158	148	173	163	160	Peu agitée. Id.
4....	39.6	48.0	43.6	41.5	43.2	38.8	7.3	48.8	13.8	139	126	145	146	139	168	142	170	165	161	
5....	39.8	48.6	44.1	42.5	43.7	38.1	8.1	48.5	12.0	135	141	149	160	146	160	145	163	161	157	Id. Id.
6....	39.1	47.5	43.1	42.8	43.1	38.5	7.1	48.3	12.4	147	159	150	156	153	166	152	167	166	163	
7....	40.9	48.7	42.2	42.5	43.6	39.8	6.8	49.4	13.0	149	135	159	155	150	167	145	169	161	160	Id. Id.
8....	39.4	49.0	43.4	42.0	43.5	38.6	6.8	49.5	12.7	146	150	158	161	154	161	137	163	159	155	
9....	41.8	49.3	43.4	42.7	44.3	40.2	7.2	50.1	13.0	153	172	167	159	163	165	146	158	153	155	Presque calme. Id.
10....	41.0	48.8	44.2	42.3	44.1	38.4	7.4	50.0	13.6	160	161	159	152	158	158	137	152	150	149	
11....	41.4	48.8	44.6	43.2	44.5	38.9	7.7	50.0	13.2	153	147	172	164	159	158	129	154	148	147	Id. Agitée.
12....	39.9	48.2	45.4	41.0	43.6	38.0	7.8	48.5	12.2	162	171	162	182	169	149	127	152	145	143	
13....	41.8	48.0	44.6	41.7	44.0	41.1	7.0	49.4	13.2	154	160	166	161	160	147	132	156	143	145	Id. Id.
14....	43.2	48.0	43.4	44.1	44.7	41.1	7.9	49.3	13.0	150	145	172	153	155	146	130	159	144	145	
15....	42.4	47.1	44.4	44.4	44.6	39.6	7.7	48.2	14.6	147	147	155	160	152	145	125	141	140	138	Peu agitée. Id.
16....	40.7	48.2	43.4	43.2	43.9	39.5	6.9	48.8	13.1	150	132	156	148	146	143	125	144	143	139	
17....	40.5	49.4	43.8	42.2	44.0	39.5	7.7	49.8	12.4	143	138	144	151	144	146	128	147	147	142	Id. Id.
18....	42.2	48.1	43.7	43.1	44.3	41.4	7.0	49.3	13.0	136	153	146	157	148	146	134	150	146	144	
19....	44.4	48.5	43.2	42.8	44.7	41.1	8.0	48.6	12.4	142	151	151	142	147	143	126	149	146	141	Id. Presque calme.
20....	40.1	49.4	43.1	44.2	44.2	38.8	7.0	49.7	12.5	138	156	148	153	149	150	122	147	144	141	
21....	40.8	49.8	42.7	43.8	44.3	39.9	6.7	49.8	12.0	146	170	162	156	159	149	129	149	140	142	Id. Id.
22....	40.6	49.3	42.9	43.3	44.0	40.0	6.4	49.7	11.3	155	171	146	154	156	139	119	157	138	138	
23....	39.7	47.9	44.7	41.0	43.3	39.5	6.3	48.7	13.2	149	167	166	142	156	142	109	135	134	130	Id. Agitée.
24....	39.0	49.0	44.9	44.5	44.3	37.3	7.3	49.5	12.3	132	146	135	167	145	138	122	157	141	140	
25....	42.0	48.9	43.1	40.8	43.7	41.3	6.7	50.4	14.6	133	130	130	132	131	137	120	147	143	137	Id. Peu agitée.
26....	40.6	48.4	43.5	39.8	43.1	38.4	7.7	48.8	13.5	132	128	169	147	144	142	114	143	140	135	
27....	39.1	47.4	43.4	40.9	42.7	37.3	7.6	49.6	13.2	144	137	143	139	141	142	119	145	140	137	Id. Id.
28....	42.3	47.4	44.5	41.9	44.0	40.3	7.5	49.2	13.5	123	135	136	140	134	141	144	147	144	141	
29....	40.4	46.4	43.7	42.5	43.2	39.3	7.6	47.8	13.4	132	154	154	148	147	144	124	148	147	141	Presque calme. Peu agitée.
30....	39.8	46.3	41.5	42.4	42.5	39.2	7.8	47.5	13.1	144	139	156	150	147	149	139	155	150	148	
31....	40.4	45.6	42.8	40.7	42.4	38.1	6.4	47.5	13.5	154	147	154	150	151	152	144	155	149	150	Id.
Moy.	40.9	48.1	43.6	42.3	43.7	39.4	7.3	49.0	13.0	145	148	153	152	149	151	133	154	149	147	

Juin 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (14°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800+).					REMARQUES.	
	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	6h.	12h.	18h.	24h.		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	38.5	46.9	42.6	42.3	42.6	"	"	47.8	14.2	148	149	148	154	150	150	143	156	152	151	Peu agitée.
2....	39.2	45.5	42.7	42.3	42.5	38.2	7.8	47.1	13.2	126	143	140	141	138	138	148	162	158	157	Id.
3....	38.6	45.3	42.3	42.1	42.1	37.8	6.2	46.1	13.4	135	155	147	146	146	146	139	161	154	155	Presque calme.
4....	39.3	48.2	42.0	42.4	43.0	37.9	7.2	48.3	12.8	138	153	153	139	146	146	144	159	150	154	Calme.
5....	38.8	51.5	43.5	42.5	44.1	36.7	6.8	51.2	12.2	144	113	89	134	120	120	134	170	160	155	Agitée.
6....	39.5	46.0	42.9	42.2	42.7	38.4	6.7	46.4	12.8	138	134	149	138	140	140	150	159	156	158	Peu agitée.
7....	39.8	46.5	42.7	42.4	42.8	39.2	7.5	49.0	13.4	124	144	145	146	140	140	132	151	145	147	Presque calme.
8....	37.5	46.5	43.5	42.6	42.5	37.0	7.7	47.9	13.1	148	151	155	157	153	153	121	148	145	141	Peu agitée.
9....	40.7	44.1	42.6	40.3	41.9	36.5	7.8	45.8	14.0	141	157	158	159	154	154	135	146	145	145	Id.
10....	39.1	46.4	44.0	42.2	42.9	"	"	49.3	13.2	151	135	163	158	152	152	146	154	145	149	Très agitée.
11....	39.8	48.3	42.1	42.8	43.2	38.4	8.1	48.6	13.9	159	147	171	157	159	159	140	149	148	149	Agitée.
12....	37.4	46.5	42.9	41.7	42.1	37.9	7.0	48.0	13.9	162	156	169	173	165	165	147	157	151	153	Peu agitée.
13....	41.0	46.7	42.9	43.0	43.4	38.7	8.0	47.1	13.8	157	148	152	148	151	151	137	139	139	143	Id.
14....	40.6	47.1	42.9	43.1	43.4	39.6	8.2	48.4	12.6	147	150	159	154	152	152	130	145	144	141	Calme.
15....	40.7	46.0	42.1	42.8	42.9	39.8	7.6	46.1	12.8	155	169	159	155	159	159	146	152	151	151	Id.
16....	40.3	48.4	41.2	42.5	43.1	40.2	6.9	48.7	12.4	155	167	157	158	159	159	151	164	156	158	Id.
17....	39.4	43.5	41.2	42.4	41.6	39.3	7.0	44.2	12.3	154	170	157	165	161	161	144	158	154	153	Presque calme.
18....	38.2	45.7	44.3	42.1	42.6	37.2	6.1	49.0	14.0	163	176	156	163	165	165	122	143	141	139	Peu agitée.
19....	41.0	46.0	44.1	40.6	42.9	37.8	8.0	48.7	13.1	155	137	155	157	151	151	133	148	148	144	Agitée.
20....	37.5	45.3	42.8	39.0	41.2	36.8	7.0	46.9	13.9	156	145	170	153	156	156	138	153	154	150	Peu agitée.
21....	37.8	44.9	41.6	38.8	40.8	36.1	7.3	46.2	13.1	161	161	172	171	166	166	144	157	154	153	Agitée.
22....	37.8	46.0	42.9	40.4	41.8	35.5	6.7	48.9	13.9	153	137	168	164	155	155	146	161	155	154	Id.
23....	38.8	44.4	40.8	40.3	41.1	36.8	7.9	47.0	13.5	155	142	173	176	161	161	144	160	155	153	Peu agitée.
24....	38.1	45.4	41.2	40.6	41.3	37.4	6.8	47.4	14.3	164	151	173	166	163	163	133	154	153	151	Presque calme.
25....	38.4	45.0	41.2	41.4	41.5	36.7	8.3	47.0	13.1	170	148	164	168	163	163	136	156	154	151	Id.
26....	38.0	43.1	41.7	40.6	40.8	37.2	6.9	45.1	14.6	173	177	185	176	178	178	139	157	155	152	Id.
27....	39.8	45.0	42.4	40.9	42.0	37.4	8.6	45.5	13.5	168	161	178	174	170	170	142	156	154	152	Id.
28....	38.7	44.7	43.9	41.8	42.3	37.8	7.2	46.2	13.3	173	166	171	174	171	171	138	149	146	147	Id.
29....	40.1	45.4	43.6	39.8	42.2	38.3	8.2	47.2	13.8	181	161	175	185	175	175	141	150	148	148	Peu agitée.
30....	38.6	46.2	43.1	41.5	42.4	37.9	8.1	47.3	14.3	181	152	169	164	167	167	131	139	135	138	Id.
Moy.	39.1	46.0	42.6	41.6	42.3	37.8	7.4	47.4	13.4	155	152	159	159	156	156	139	154	150	150	

Juillet 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (14°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800+).					REMARQUES.	
	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	6h.	12h.	18h.	24h.		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	38.9	43.1	42.8	42.2	41.8	37.7	8.3	48.5	13.3	162	148	160	164	159	126	103	125	123	119	Presque calme.
2....	39.2	44.6	42.7	42.1	42.2	38.4	8.1	45.6	14.5	163	164	168	167	165	134	118	145	132	132	Id.
3....	39.0	48.1	41.5	42.0	42.6	38.1	6.8	48.6	12.8	154	167	165	173	165	134	119	130	130	128	Calme.
4....	39.0	48.3	42.7	42.5	43.1	38.0	7.2	49.8	13.5	166	168	183	191	177	135	119	134	134	131	Presque calme.
5....	37.4	45.7	43.1	41.2	41.8	36.0	8.1	47.5	14.0	178	183	186	182	182	139	116	143	134	133	Peu agitée.
6....	38.3	47.1	44.8	35.4	41.4	37.1	6.6	48.9	13.3	169	146	167	150	158	136	131	159	139	141	Id.
7....	34.1	44.1	36.7	35.0	37.5	32.8	6.3	49.0	14.0	144	127	131	147	137	125	109	151	120	126	Agitée.
8....	34.2	44.3	41.8	43.9	41.0	"	"	46.1	13.4	148	148	159	167	156	122	96	127	127	118	Id.
9....	37.8	43.6	41.0	40.5	40.7	36.6	6.8	44.6	12.7	142	137	156	157	148	132	130	138	135	134	Presque calme.
10....	37.6	44.7	42.4	40.3	41.3	35.6	7.6	46.8	13.8	165	151	185	169	167	141	129	147	137	138	Peu agitée.
11....	36.7	43.3	40.3	41.1	40.3	36.3	7.4	45.4	13.4	165	147	160	161	158	144	138	143	133	140	Agitée.
12....	38.7	45.0	40.8	41.3	41.5	37.6	6.3	45.5	12.9	156	140	144	147	147	127	109	135	132	126	Peu agitée.
13....	39.1	42.6	41.5	39.6	40.7	38.1	8.0	45.1	14.5	152	139	154	171	154	141	131	150	149	143	Id.
14....	37.2	44.2	40.9	40.5	40.7	37.2	6.0	44.3	12.2	164	165	168	162	165	153	136	154	146	147	Id.
15....	37.9	44.3	42.0	41.0	41.3	37.2	7.0	47.2	14.5	168	170	170	173	170	148	129	142	142	140	Id.
16....	38.7	44.9	41.4	40.1	41.3	36.5	8.0	45.7	12.8	190	170	171	160	173	139	133	138	134	136	Id.
17....	37.8	45.6	41.7	41.4	41.6	36.6	6.5	45.7	12.1	156	145	165	166	158	137	124	134	131	131	Presque calme.
18....	37.8	44.8	43.0	40.4	41.5	36.2	7.8	47.7	14.4	160	163	161	166	163	131	116	135	136	130	Peu agitée.
19....	38.5	44.6	42.7	39.0	41.2	36.8	6.8	45.7	12.9	163	150	173	175	165	132	102	140	130	126	Agitée.
20....	39.3	47.1	41.3	41.0	42.2	37.8	8.5	48.5	12.8	154	145	180	161	160	132	117	151	132	133	Id.
21....	39.5	45.0	41.6	40.7	41.7	38.4	7.8	46.6	14.3	159	164	165	161	162	128	110	134	127	125	Peu agitée.
22....	39.7	46.7	40.9	41.5	42.2	38.6	7.5	47.1	13.5	154	171	171	164	165	126	99	133	119	119	Calme.
23....	38.6	47.0	42.9	39.9	42.1	38.1	7.3	48.1	13.6	162	168	164	168	165	127	122	127	119	124	Presque calme.
24....	38.6	45.0	43.0	41.6	42.0	37.7	6.6	49.1	13.8	168	156	169	166	165	129	107	140	129	126	Id.
25....	39.5	45.8	42.5	41.3	42.3	37.8	8.1	49.3	13.3	164	158	168	162	163	130	100	130	126	122	Id.
26....	38.9	44.2	41.8	41.1	41.5	36.9	7.5	47.7	14.3	166	162	173	175	169	134	120	141	130	131	Calme.
27....	39.8	45.8	41.3	41.0	42.0	39.6	7.4	48.5	14.6	173	161	178	174	172	127	115	137	122	125	Presque calme.
28....	37.6	45.0	41.4	41.4	41.4	36.8	6.7	46.1	14.3	167	146	173	174	165	128	94	129	124	119	Calme.
29....	38.2	45.0	41.0	40.9	41.3	35.9	8.6	46.6	13.1	172	157	182	176	172	135	114	124	120	123	Id.
30....	37.9	47.0	41.8	40.7	41.8	35.6	7.6	47.8	12.5	166	161	173	176	169	130	119	128	126	126	Presque calme.
31....	37.1	46.5	41.8	41.0	41.6	35.6	7.2	48.0	13.3	172	173	166	175	171	135	120	131	129	129	Calme.
Moy.	38.1	45.3	41.8	40.7	41.5	37.1	7.3	47.1	13.5	162	156	167	167	163	133	117	138	130	130	

Août 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (15° +).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800 +).					REMARQUES.	
	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	6h.	12h.	18h.	24h.		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	38.3	48.9	42.4	35.7	41.3	37.7	7.5	48.9	12.0	178	200	141	158	169	130	115	130	128	126	Agitée.
2....	38.1	45.7	41.0	38.5	40.8	38.2	8.5	45.9	13.7	180	142	153	158	158	130	134	148	137	137	Très agitée.
3....	38.0	45.9	42.0	38.1	41.0	38.0	6.0	48.3	14.1	156	155	146	169	156	131	128	162	130	138	Id.
4....	38.7	45.4	41.5	39.5	41.3	36.0	8.2	47.6	13.7	161	146	167	167	160	137	117	144	131	132	Agitée.
5....	40.1	49.9	41.5	42.5	43.5	36.5	7.9	50.3	12.3	169	133	171	165	160	135	113	135	134	129	Id.
6....	38.5	41.5	41.1	41.7	40.7	35.8	7.1	44.9	14.1	154	146	163	162	156	140	117	146	139	136	Id.
7....	37.5	44.8	40.3	39.8	40.6	35.0	7.3	46.3	13.8	161	141	173	176	163	154	122	154	140	142	Peu agitée.
8....	39.4	44.5	42.1	39.0	41.2	37.3	7.9	45.4	12.4	151	166	178	183	170	152	138	157	139	146	Id.
9....	38.3	45.2	41.0	40.1	41.2	37.8	6.8	47.2	13.1	169	157	175	176	169	147	132	148	135	140	Presque calme.
10....	38.3	46.1	41.4	41.4	41.8	37.2	7.3	47.2	13.6	177	163	173	167	170	144	124	142	124	133	Calme.
11....	40.8	44.9	42.3	41.3	42.3	38.2	7.8	46.8	14.0	161	149	171	173	163	135	119	131	120	126	Id.
12....	39.7	45.0	42.4	42.2	42.3	37.8	7.5	46.1	13.2	168	156	171	174	167	133	112	135	131	128	Id.
13....	40.5	48.7	43.7	40.6	43.4	38.8	8.1	48.9	12.1	175	173	179	172	175	139	121	149	137	134	Presque calme.
14....	39.7	45.1	45.0	39.7	42.4	39.0	8.1	46.7	13.3	173	167	168	182	173	139	121	151	134	136	Peu agitée.
15....	37.0	47.8	40.7	42.4	42.0	35.9	6.6	48.7	11.8	173	145	162	171	163	139	131	143	135	137	Agitée.
16....	38.1	46.3	40.5	40.5	41.4	38.1	6.0	47.7	13.1	161	161	169	160	163	137	123	143	138	135	Id.
17....	37.9	46.7	42.0	40.5	41.8	37.7	6.3	47.1	12.8	154	180	169	169	168	137	122	130	130	130	Peu agitée.
18....	38.7	48.1	41.0	40.5	42.1	38.3	6	47.2	11.2	159	184	170	171	171	136	128	137	135	132	Presque calme.
19....	37.7	46.3	40.3	40.6	41.2	36.1	6	47.4	11.8	162	163	175	175	169	124	102	119	106	113	Calme.
20....	38.7	47.2	41.0	41.0	42.0	37.9	6	47.9	13.0	160	164	173	172	167	113	89	125	104	108	Id.
21....	38.1	46.2	39.6	40.7	41.1	37.2	7	47.0	12.2	164	165	179	168	169	126	110	122	103	115	Presque calme.
22....	38.0	46.0	40.2	41.0	41.3	37.5	62	47.8	13.5	160	130	164	156	152	114	89	114	101	105	Id.
23....	37.5	47.0	40.2	40.7	41.4	36.7	69	47.7	12.0	150	150	155	158	153	111	92	110	111	106	Calme.
24....	38.1	45.2	40.5	40.5	41.1	37.2	74	47.7	12.5	159	164	165	162	163	122	120	131	131	126	Presque calme.
25....	38.3	44.0	40.9	40.5	40.9	37.5	83.1	47.8	13.6	158	166	171	165	165	125	116	130	131	126	Peu agitée.
26....	39.1	44.0	41.4	38.7	40.8	37.5	108.7	47.6	13.8	163	160	171	170	166	133	109	132	132	127	Id.
27....	38.3	41.5	41.0	40.0	40.9	37.2	147.9	47.6	13.2	160	162	166	182	167	131	122	132	135	130	Presque calme.
28....	38.5	44.0	42.9	33.4	39.7	37.4	16.8	46	14.8	165	168	140	153	157	137	123	155	139	139	Agitée.
29....	41.6	47.0	41.5	39.9	42.5	37.4	7.8	48	13.8	162	124	154	146	146	132	119	144	134	132	Très agitée.
30....	39.3	44.2	38.4	41.5	40.9	37.7	6.6	46	12.5	145	143	161	167	154	131	127	158	130	137	Agitée.
31....	40.2	45.9	40.3	40.3	41.5	39.1	7.0	46	11.8	141	148	152	166	152	132	128	130	135	131	Id.
Moy.	38.7	45.9	41.3	40.1	41.5	37.4	7.3	47	13.0	162	157	165	168	163	133	118	138	128	129	

Septembre 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (14° +).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800 +).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	40.0	49.3	40.2	42.2	42.9	38.5	7.8	49.4	11.3	140	129	140	157	142	127	123	149	132	133	Agitée.
2....	38.5	46.8	39.6	39.6	41.1	37.7	7.0	47.8	12.3	144	127	141	162	143	132	121	147	134	133	Très agitée.
3....	37.4	48.6	39.1	40.2	41.3	36.5	7.0	48.7	12.9	147	131	156	156	148	139	126	148	137	137	Agitée.
4....	39.5	46.5	39.9	40.5	41.6	37.4	7.5	47.2	12.4	150	147	166	163	156	138	123	141	137	135	Peu agitée.
5....	38.1	45.1	40.0	40.2	40.9	37.5	7.0	46.0	12.8	158	161	168	163	162	143	134	138	135	137	Id.
6....	38.5	47.8	39.9	39.9	41.5	37.2	7.4	48.0	12.1	155	153	165	169	161	139	138	140	136	138	Presque calme.
7....	38.5	46.6	40.9	40.2	41.5	36.4	7.5	46.3	12.2	160	163	166	158	162	139	127	137	137	135	Calme.
8....	38.9	45.3	41.3	40.3	41.5	37.2	8.3	45.5	12.6	171	188	179	177	179	154	139	156	152	150	Presque calme.
9....	39.1	47.2	42.0	39.0	41.8	37.8	7.6	47.4	12.8	173	169	173	159	168	138	116	139	131	131	Peu agitée.
10....	37.4	46.2	41.7	39.3	41.2	36.3	6.8	48.6	13.0	179	156	167	151	164	132	118	133	126	127	Agitée.
11....	38.7	44.8	40.1	36.6	40.0	37.9	7.1	46.1	13.0	154	161	169	147	158	143	111	125	117	124	Id.
12....	37.9	45.7	41.8	41.4	41.7	36.4	7.6	46.1	12.3	148	147	151	157	151	119	108	119	115	115	Peu agitée.
13....	39.1	45.6	41.3	40.5	41.6	38.3	7.7	45.7	11.8	146	146	151	156	150	117	106	115	117	114	Presque calme.
14....	39.5	44.8	43.1	40.8	42.0	38.6	8.0	45.5	11.6	157	161	173	168	165	122	110	120	128	120	Id.
15....	39.9	47.1	42.3	41.3	42.7	39.4	6.5	47.6	13.2	158	153	126	156	148	119	108	129	122	119	Peu agitée.
16....	39.4	49.1	40.8	40.8	42.5	38.8	6.9	49.3	11.8	145	137	148	156	146	114	114	120	118	117	Id.
17....	39.2	46.3	41.4	41.0	42.0	37.9	7.3	46.6	12.1	147	151	149	153	150	116	114	119	119	117	Id.
18....	39.2	46.5	40.5	40.3	41.6	37.7	7.8	47.5	12.7	146	146	157	156	151	124	119	127	124	124	Presque calme.
19....	39.4	45.2	40.6	40.2	41.4	38.0	8.0	47.5	12.8	157	156	156	161	158	125	131	134	133	131	Id.
20....	39.8	47.4	41.7	41.2	42.5	38.2	8.3	48.0	12.7	163	163	167	168	165	135	108	130	128	125	Calme.
21....	40.0	48.1	40.7	39.5	42.1	38.5	7.6	"	"	159	152	165	166	160	120	111	125	123	120	Presque calme.
22....	40.8	45.4	41.6	40.2	42.0	"	"	46.1	12.8	167	139	158	156	155	117	103	129	126	119	Peu agitée.
23....	39.4	44.4	41.6	32.8	39.5	38.9	8.2	47.7	13.0	151	157	169	134	153	121	110	134	125	123	Id.
24....	40.6	43.8	41.3	39.7	41.4	"	"	45.3	13.4	150	141	145	170	152	118	116	135	128	124	Id.
25....	39.6	42.4	41.1	26.4	37.4	39.0	6.4	44.2	14.0	169	149	95	125	134	115	110	129	133	122	Agitée.
26....	45.0	47.8	40.6	36.2	42.4	"	"	48.7	12.2	107	88	112	128	109	114	122	140	126	126	Perturbation.
27....	40.9	45.8	41.8	34.5	40.7	40.3	8.8	47.4	12.6	132	113	133	148	132	112	124	136	123	121	Agitée.
28....	39.9	46.0	41.8	42.2	42.5	"	"	47.3	12.6	124	113	133	151	130	115	115	122	115	117	Très agitée.
29....	39.9	45.4	38.7	41.4	41.4	39.1	7.6	46.5	12.7	130	131	136	141	134	118	104	122	115	115	Agitée.
30....	39.5	44.5	38.4	40.1	40.6	"	"	44.8	12.7	134	128	137	140	135	113	103	116	113	111	Peu agitée.
Moy.	39.4	46.2	40.9	39.3	41.4	38.0	7.5	47.0	12.6	151	145	152	155	151	126	117	131	127	125	

Octobre 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (14°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800 +).					REMARQUES.	
	6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6h.	12h.	18h.	24h.	Moy. des 4 obs.	6h.	12h.	18h.	24h.		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	38.4	44.7	34.2	39.3	39.1	37.0	8.2	44.8	12.3	150	149	153	153	151	115	101	115	113	111	Peu agitée.
2....	39.3	41.9	34.2	39.1	38.6	37.8	7.9	43.0	13.4	151	143	150	152	149	119	111	121	118	117	Presque calme.
3....	39.1	41.3	39.6	39.6	40.2	38.0	7.9	42.5	12.5	152	158	154	156	155	127	121	130	124	123	Id.
4....	38.4	42.5	40.5	39.8	40.3	38.0	6.7	43.8	14.3	155	153	161	159	157	125	108	121	122	119	Id.
5....	38.6	41.2	40.9	39.8	40.9	37.7	8.0	44.9	13.2	167	161	165	160	163	125	112	130	127	123	Calme.
6....	38.8	43.5	41.3	40.2	41.0	37.3	8.2	45.2	13.3	163	151	165	154	158	128	116	132	133	127	Presque calme.
7....	39.3	44.4	41.8	38.2	40.9	38.0	6.8	45.2	12.7	149	151	154	150	151	120	113	127	126	122	Peu agitée.
8....	39.2	46.3	40.9	38.4	41.2	38.1	8.6	46.7	12.2	158	141	156	148	151	125	116	130	131	125	Id.
9....	39.5	41.8	41.8	39.3	40.6	37.8	9.0	44.7	13.7	154	134	155	160	151	126	122	131	133	128	Presque calme.
10....	39.5	41.6	41.6	38.6	40.3	37.0	9.2	45.3	13.5	160	149	160	159	157	130	120	135	135	130	Peu agitée.
11....	39.3	41.5	40.5	39.1	40.1	37.0	8.8	43.8	13.8	165	149	162	163	160	131	121	133	135	130	Presque calme.
12....	40.2	42.2	40.3	39.1	40.5	38.0	8.0	44.7	14.5	177	120	139	151	152	127	115	131	126	125	Peu agitée.
13....	39.9	43.3	39.6	39.2	40.5	37.4	8.9	43.7	12.6	163	140	142	157	150	127	115	134	127	126	Id.
14....	40.2	44.4	40.5	39.5	41.1	38.4	9.1	45.1	12.7	162	163	148	160	158	129	124	136	134	131	Id.
15....	39.6	42.7	39.9	39.8	40.5	38.4	9.0	43.8	13.3	164	161	161	162	162	134	118	131	130	128	Presque calme.
16....	39.1	44.2	40.5	39.3	40.8	37.8	8.2	44.7	12.1	169	165	157	162	163	129	112	126	124	123	Id.
17....	38.1	44.5	41.3	39.3	40.8	37.7	8.0	44.8	13.4	174	165	172	171	170	119	108	123	119	117	Peu agitée.
18....	39.5	43.5	40.5	39.9	40.9	38.0	8.7	43.7	12.9	160	163	163	160	162	113	106	120	116	114	Presque calme.
19....	40.3	44.9	40.5	39.3	41.2	38.1	8.7	46.3	12.3	165	151	163	163	160	120	109	125	119	118	Id.
20....	39.8	44.4	40.3	37.3	40.4	37.7	8.7	45.9	12.8	166	140	168	159	158	116	106	123	119	116	Calme.
21....	40.0	42.9	40.5	38.6	40.5	38.1	9.2	43.4	13.1	161	151	173	165	163	116	111	120	118	116	Presque calme.
22....	40.5	46.1	41.1	34.7	40.6	39.1	7.5	49.3	14.1	160	114	138	159	143	125	113	123	124	121	Agitée.
23....	39.1	43.3	34.8	37.8	38.8	36.5	7.6	41.5	14.3	158	143	140	141	145	126	109	133	125	123	Très agitée.
24....	40.4	42.5	39.9	39.5	40.6	37.7	8.4	42.9	12.8	150	129	152	148	145	126	119	132	133	128	Agitée.
25....	39.5	44.7	40.2	39.8	41.0	37.7	8.5	45.5	12.3	155	137	149	159	150	130	124	127	123	126	Presque calme.
26....	40.3	43.5	33.7	35.0	38.1	39.2	7.1	49.4	14.1	164	102	125	144	134	122	119	137	114	121	Agitée.
27....	40.0	40.8	38.4	40.3	39.9	37.7	8.5	43.8	13.0	142	124	127	158	138	111	111	125	116	116	Id.
28....	40.0	43.3	39.6	39.5	40.6	37.8	8.3	44.1	12.7	147	124	147	148	142	113	107	116	114	112	Peu agitée.
29....	39.8	42.9	39.8	39.1	40.4	37.7	8.5	43.7	12.5	152	140	154	154	150	114	107	119	115	114	Presque calme.
30....	39.3	44.2	35.7	37.0	39.0	38.4	7.1	45.9	12.3	161	133	150	145	147	120	109	123	127	120	Agitée.
31....	39.5	42.6	40.3	39.5	40.5	38.0	8.2	43.5	13.2	143	137	145	143	142	119	116	123	137	124	Peu agitée.
Moy.	39.5	43.4	39.5	38.9	40.3	37.9	8.2	44.8	13.1	159	143	154	156	153	123	113	127	124	122	

Novembre 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON (13° +).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000 +).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800 +).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
							h		h											
1....	39.7	43.6	41.3	39.5	41.0	37.9	9.0	44.7	12.7	176	155	161	166	164	114	100	114	118	111	Presque calme.
2....	39.6	42.1	40.3	38.4	40.1	38.5	8.3	42.4	13.2	171	167	169	166	168	109	104	111	110	109	Peu agitée.
3....	39.1	43.5	41.0	39.7	40.8	38.4	8.8	45.5	13.4	191	169	172	173	176	116	101	120	121	114	Id.
4....	39.3	42.7	40.3	39.5	40.5	38.1	8.7	43.8	12.6	169	161	173	166	167	120	114	127	125	121	Id.
5....	40.0	43.7	40.1	39.1	40.7	37.9	8.6	44.4	13.1	174	155	177	171	169	122	110	121	117	117	Presque calme.
6....	39.6	43.4	40.2	38.8	40.5	38.5	8.4	44.6	12.3	169	161	177	160	169	116	104	108	106	109	Id.
7....	38.9	42.3	39.4	39.4	40.0	37.1	8.2	42.7	12.6	169	160	175	168	168	119	112	124	122	119	Id.
8....	39.5	43.2	40.4	31.4	38.6	38.3	8.5	43.6	12.2	170	167	165	159	165	118	109	124	121	118	Peu agitée.
9....	39.3	43.1	40.5	39.1	40.5	37.8	8.1	44.1	13.0	169	150	172	177	167	116	106	120	117	115	Id.
10....	40.2	45.1	39.6	39.2	41.0	40.0	8.6	45.6	13.4	167	121	148	157	148	117	110	128	122	119	Agitée.
11....	39.4	41.5	39.0	39.1	39.7	38.0	8.6	41.7	12.4	171	162	168	166	167	120	114	123	121	119	Presque calme.
12....	39.3	42.7	39.8	39.1	40.2	38.9	8.2	43.2	12.3	168	158	168	164	165	117	113	120	114	116	Id.
13....	39.2	43.6	40.5	39.4	40.7	37.5	8.1	43.7	12.4	170	163	174	160	167	112	104	109	111	109	Id.
14....	39.1	41.5	39.5	39.7	40.0	37.9	8.4	42.3	12.3	164	160	174	169	167	108	106	121	123	115	Peu agitée.
15....	40.0	41.0	39.7	39.3	40.0	38.3	8.8	43.5	13.2	174	166	167	167	169	124	112	121	117	118	Presque calme.
16....	39.4	42.3	39.7	39.3	40.2	39.1	9.0	43.1	12.3	172	167	171	170	170	110	98	109	107	106	Calme.
17....	39.3	42.4	40.0	38.3	40.0	38.6	8.2	43.5	12.6	174	171	171	149	166	111	102	114	118	112	Presque calme.
18....	39.0	41.8	40.4	39.1	40.1	38.3	8.5	42.1	13.0	167	153	159	160	160	122	122	125	123	125	Peu agitée.
19....	38.9	44.1	39.8	39.6	40.6	38.7	8.6	45.0	12.8	181	153	156	151	160	127	125	138	117	124	Id.
20....	41.2	41.4	40.6	37.1	40.1	39.8	7.2	42.1	13.7	180	158	134	160	158	116	117	127	120	120	Agitée.
21....	39.7	45.0	40.5	35.5	40.2	"	"	"	"	173	118	111	146	137	115	106	126	120	117	Perturbation.
22....	40.2	40.2	36.6	40.7	39.4	"	"	"	"	152	147	141	159	130	117	107	117	113	114	Agitée.
23....	40.1	41.8	38.4	40.1	40.1	39.8	8.3	42.8	12.3	178	155	146	149	149	107	100	119	117	111	Id.
24....	39.2	41.9	39.1	39.4	39.9	38.9	6.9	42.1	12.2	149	150	150	150	150	115	112	121	120	117	Peu agitée.
25....	39.0	42.2	38.8	39.3	39.8	38.8	6.6	42.3	11.9	152	140	160	152	151	122	119	125	121	122	Presque calme.
26....	38.8	41.9	38.6	38.9	39.6	38.5	8.7	42.0	12.4	162	156	164	157	160	120	116	121	115	118	Calme.
27....	38.1	41.7	39.6	38.5	39.5	37.8	6.3	42.6	12.8	178	165	176	171	173	115	109	117	115	114	Presque calme.
28....	39.4	41.4	40.1	38.1	39.7	38.9	6.8	42.8	12.4	169	168	170	158	166	107	106	110	104	107	Peu agitée.
29....	39.1	39.6	39.1	38.3	39.0	38.7	9.0	40.8	13.8	171	160	132	148	153	106	104	117	108	109	Agitée.
30....	37.7	41.2	39.3	38.2	39.1	"	"	42.3	13.7	164	157	148	152	155	116	113	122	121	118	Id.
Moy.	39.4	42.4	39.7	38.7	40.0	38.5	8.2	43.2	12.7	169	157	161	161	162	116	109	120	117	115	

Décembre 1887.

PERPIGNAN.

Observations magnétiques.

DATES.	DÉCLINAISON. (14°+).								COMPOSANTE HORIZONTALE (0,22000+).					COMPOSANTE VERTICALE (0,38800+).					REMARQUES.	
	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	Minimum.		Maximum.		6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .	Moy. des 4 obs.	6 ^h .	12 ^h .	18 ^h .	24 ^h .		Moy. des 4 obs.
						Valeur.	Heure.	Valeur.	Heure.											
1....	39.4	41.3	39.4	38.9	39.8	38.6	9.0	41.6	12.2	156	148	162	154	155	109	106	111	107	108	Peu agitée.
2....	39.2	39.6	39.2	38.5	39.1	38.2	9.1	41.3	13.5	164	166	164	160	164	108	100	106	106	105	Presque calme.
3....	39.8	41.0	39.5	38.9	39.8	38.6	9.2	42.0	13.7	161	159	159	157	159	105	97	106	109	104	Id.
4....	39.9	41.0	39.2	38.9	39.7	39.0	9.5	41.4	12.3	164	167	160	157	162	110	105	115	115	111	Id.
5....	39.7	40.9	40.1	39.1	40.0	38.8	8.8	41.4	13.0	162	153	155	156	156	116	109	119	117	115	Id.
6....	39.2	40.1	39.0	37.3	38.9	39.0	8.7	44.2	13.7	172	154	131	139	149	117	111	123	123	119	Peu agitée.
7....	40.2	43.0	39.0	39.3	38.9	39.0	9.0	43.3	13.3	155	138	157	151	150	124	114	126	120	121	Agitée.
8....	39.7	41.4	39.3	37.6	38.9	38.9	8.7	42.5	12.4	168	150	159	179	162	122	117	113	118	118	Peu agitée.
9....	39.1	41.9	39.0	39.1	39.8	37.9	9.0	42.4	12.6	158	152	157	155	156	118	116	121	122	119	Presque calme.
10....	39.0	40.9	39.6	38.5	39.5	38.0	8.4	41.3	14.0	160	148	162	159	157	124	121	127	127	125	Calme.
11....	39.0	41.5	39.7	38.8	39.7	38.2	8.5	41.9	13.6	164	163	156	154	159	129	126	132	132	130	Id.
12....	38.9	41.1	39.4	37.1	39.1	37.7	9.2	41.6	13.1	164	156	171	155	162	134	128	136	131	132	Id.
13....	39.7	40.4	40.9	38.8	40.0	38.8	9.2	41.9	12.7	165	141	122	149	142	135	134	146	147	140	Peu agitée.
14....	39.6	41.5	38.6	38.9	39.6	38.2	9.2	40.2	12.2	152	141	156	158	152	142	141	143	143	142	Id.
15....	38.9	41.3	39.3	38.7	39.6	37.8	9.0	40.0	12.3	162	147	160	150	155	137	138	140	135	138	Calme.
16....	39.4	42.6	41.8	36.8	40.1	38.7	8.5	"	"	171	143	110	138	140	135	129	152	140	141	Peu agitée.
17....	41.9	42.2	35.4	37.3	39.2	38.4	8.7	"	"	153	91	133	150	132	141	125	155	142	141	Agitée.
18....	40.8	40.7	39.3	35.2	39.0	39.2	8.8	43.2	14.1	157	144	158	162	155	140	153	147	131	143	Id.
19....	41.6	41.6	39.0	38.7	40.2	38.1	9.0	42.5	13.2	155	122	147	157	145	137	130	138	131	134	Id.
20....	38.9	41.5	37.0	37.6	38.7	38.5	8.3	42.8	12.7	159	148	149	155	153	128	126	134	124	128	Peu agitée.
21....	39.7	41.8	37.2	35.5	38.6	38.7	8.6	42.3	12.3	153	134	150	135	143	124	124	139	134	130	Agitée.
22....	40.8	44.0	39.3	38.8	40.7	"	"	41.7	13.0	126	125	134	145	132	126	139	157	129	133	Id.
23....	39.2	40.8	39.0	38.7	39.4	38.1	9.4	41.1	13.5	152	145	150	151	149	127	124	126	122	125	Presque calme.
24....	39.7	40.2	38.9	38.1	39.2	37.6	9.5	41.1	12.8	166	160	157	157	160	120	117	114	116	116	Id.
25....	38.9	41.3	39.6	37.7	38.4	38.8	9.2	41.7	13.0	175	156	156	166	163	115	112	120	120	117	Id.
26....	39.0	41.2	38.2	39.5	39.5	38.5	7.8	43.9	14.2	146	149	133	148	144	122	122	135	125	128	Agitée.
27....	39.7	41.2	37.4	37.7	39.0	37.4	9.7	43.0	13.2	147	147	155	145	148	130	129	130	121	128	Id.
28....	39.7	40.9	38.2	38.7	39.3	38.2	9.2	41.9	14.1	148	161	155	144	152	113	113	116	110	113	Peu agitée.
29....	38.9	41.3	38.4	38.7	39.3	38.0	8.7	42.1	13.2	150	144	153	146	148	106	100	107	103	105	Id.
30....	39.1	41.3	39.0	38.9	39.6	38.0	9.0	42.5	13.6	151	144	142	142	145	98	95	106	99	100	Id.
31....	38.2	41.6	39.5	38.7	39.5	37.4	9.0	42.3	12.1	157	150	151	144	151	98	90	104	97	97	Id.
Moy.	39.6	41.3	38.8	38.1	39.4	38.3	8.9	42.1	13.1	158	147	150	152	152	122	119	126	123	122	

✓ SUR LA PÉRIODICITÉ
DES
PERTURBATIONS DE L'AIGUILLE AIMANTÉE HORIZONTALE

A L'OBSERVATOIRE DU PARC SAINT-MAUR,

D'APRÈS CINQ ANNÉES D'OBSERVATIONS (1883-1887),

PAR M. TH. MOUREAUX.

En résumant, dans les volumes précédents des *Annales du Bureau central météorologique*, les observations magnétiques faites à l'observatoire du Parc Saint-Maur pendant les années 1883, 1884 et 1885, nous avons présenté quelques remarques relatives aux perturbations enregistrées pendant chacune de ces années au magnétographe de l'observatoire.

Nous donnons ici les résultats déduits de la discussion de cinq années consécutives, de 1883 à 1887 inclusivement. Cette période n'est sans doute pas suffisamment étendue pour qu'on puisse tirer de ces résultats des conclusions définitives; toutefois, les phénomènes ont présenté une telle analogie d'allure pendant chacune des années considérées qu'on est conduit à reconnaître une certaine *régularité* dans les variations, dites *irrégulières*, des éléments magnétiques.

Le dépouillement de nos courbes étant effectué pour chaque heure du jour pendant cinq années, nous possédons 43824 observations de chaque élément.

Perturbations de la déclinaison.

Les Tableaux mensuels de la déclinaison sont disposés de façon à donner les moyennes horaires mensuelles de cet élément. On a admis comme *perturbations* toutes les valeurs de la déclinaison différant de 3' de la moyenne horaire correspondante, et l'on a fait simplement, pour chaque heure et pour chaque mois, la somme des observations ainsi troublées, en distinguant celles qui ont eu pour effet de ramener vers l'Est le pôle Nord de l'aiguille aimantée, c'est-à-dire de diminuer l'angle de déclinaison, de celles qui tendent à le rejeter vers l'Ouest,

en augmentant la déclinaison. Ce travail a été répété pour chacune des cinq années, et l'on a totalisé les résultats.

Le nombre annuel des valeurs de la déclinaison s'écartant de 3' de la moyenne horaire correspondante est indiqué dans le Tableau suivant :

Perturbations de la déclinaison.

Années.	Vers l'Est.	Vers l'Ouest.	Totaux.
1883.....	349	257	606
1884.....	311	217	528
1885.....	309	255	564
1886.....	395	370	765
1887.....	269	196	465
Totaux.....	1633	1295	2928

D'après la limite d'écart admise comme perturbation, le rapport du nombre des observations troublées au nombre total d'observations est de $\frac{4}{15}$, ou de 7 pour 100 environ. L'année 1886 correspond à un excès de perturbations de la déclinaison, tandis que le total de 1887 est de beaucoup inférieur à la moyenne des cinq années. Les perturbations vers l'Est sont, chaque année, plus fréquentes que les perturbations vers l'Ouest; le rapport des premières aux secondes est de 1,3 à 1.

Dans le Tableau suivant, on a groupé les perturbations par mois, en tenant compte du sens dans lequel elles se sont produites; et, de plus, on a distingué, pour chaque groupe, les perturbations de jour (7^h m. à 6^h s.) des perturbations de nuit (7^h s. à 6^h m.).

Distribution mensuelle des perturbations de la déclinaison.

Cinq années, 1883 à 1887.

Mois.	Vers l'Est.			Vers l'Ouest.			Totaux.		
	Jour.	Nuit.	Total.	Jour.	Nuit.	Total.	Jour.	Nuit.	Total.
Janvier.....	16	84	100	29	22	51	45	106	151
Février.....	27	118	145	58	29	87	85	147	232
Mars.....	30	145	175	72	31	103	102	176	278
Avril....	29	111	140	90	39	129	119	150	269
Mai.....	39	98	137	72	38	110	111	136	247
Juin.....	39	83	122	71	24	95	110	107	217
Juillet.....	34	72	106	69	40	109	103	112	215
Août.....	45	90	135	102	75	177	147	165	312
Septembre..	65	131	196	98	62	160	163	193	356
Octobre....	29	102	131	60	38	98	89	140	229
Novembre...	29	98	127	85	27	112	114	125	239
Décembre...	31	88	119	48	16	64	79	104	183
Totaux:..	413	1220	1633	854	441	1295	1267	1661	2928

Pendant les différents mois, sauf en juillet et en août, les perturbations vers l'Est sont en excès marqué sur les perturbations vers l'Ouest.

Considérées dans leur ensemble, ou suivant leur signe, les perturbations présentent deux maxima correspondant aux équinoxes, et deux minima correspondant aux solstices. Le minimum principal a lieu au solstice d'hiver, et le maximum principal à l'équinoxe d'automne.

Le Tableau montre en outre une inversion complète du rapport des perturbations de jour et de nuit, selon le sens dans lequel elles se produisent : les perturbations vers l'Est sont, pour tous les mois, beaucoup plus fréquentes la nuit que le jour, tandis que les perturbations vers l'Ouest sont en excès pendant le jour.

Le rapport des perturbations vers l'Est et vers l'Ouest, pendant les différentes heures du jour, sera plus complètement mis en évidence dans le Tableau suivant, qui montre la variation diurne de chaque sorte de perturbations. Dans ce Tableau, l'année a été divisée en deux périodes de six mois, selon que le Soleil est en déclinaison boréale ou australe; la première comprend, sous le nom de *saison chaude*, les mois d'avril à septembre, et la seconde, correspondant à la *saison froide*, les mois d'octobre à mars.

Distribution horaire des perturbations de la déclinaison.
Cinq années, 1883 à 1887.

Heures.	Vers l'Est.			Vers l'Ouest.			Totaux.		
	Saison			Saison			Saison'		
	chaude.	froide.	Total.	chaude.	froide.	Total.	chaude.	froide.	Total.
1.....	64	75	139	24	7	31	88	82	170
2.....	68	53	121	29	12	41	97	65	162
3.....	49	41	90	26	16	42	75	57	132
4....	39	23	62	34	13	47	73	36	109
5.....	23	16	39	30	11	41	53	27	80
6.....	19	10	29	37	21	58	56	31	87
7.....	16	3	19	43	21	64	59	24	83
8.....	19	1	20	38	24	62	57	25	82
9.....	18	5	23	42	30	72	60	35	95
10.....	22	6	28	46	28	74	68	34	102
11.....	18	7	25	44	29	73	62	36	98
Midi...	22	8	30	53	24	77	75	32	107
1.....	25	12	37	47	36	83	72	48	120
2.....	23	12	35	49	36	85	72	48	120
3.....	22	11	33	41	40	81	63	51	114
4.....	13	21	34	36	29	65	49	50	99
5.....	23	36	59	33	33	66	56	69	125
6.....	30	40	70	30	22	52	60	62	122
7.....	32	54	86	16	16	32	48	70	118
8.....	55	61	116	21	6	27	76	67	143
9.....	54	70	124	11	12	23	65	82	147
10.....	64	79	143	11	19	30	75	98	173
11.....	55	77	132	20	19	39	75	96	171
Minuit.	63	76	139	19	11	30	82	87	169
Totaux...	836	797	1633	780	515	1295	1616	1312	2928

En envisageant l'ensemble des perturbations des cinq années, abstraction faite de leur signe, on voit qu'elles présentent une double oscillation diurne. Le maximum principal se produit vers le milieu de la nuit, de 10^h du soir à 1^h du matin, et le minimum principal de 5^h à 8^h du matin. L'oscillation secondaire se montre dans l'après-midi : maximum de 1^h à 2^h, minimum vers 4^h (voir *Pl. B.IX, fig. 1*).

Si l'on divise l'année en deux périodes égales, d'après le sens de la déclinaison du Soleil, on trouve que, pendant les six mois d'octobre à mars, les perturbations forment une seule oscillation diurne, dont le minimum a lieu vers 7^h ou 8^h du matin, et le maximum vers 10^h du soir. Au contraire, lorsque le Soleil est en déclinaison boréale, on remarque deux oscillations dont les maxima se produisent sensiblement à douze heures d'intervalle, vers 2^h du matin et de midi à 2^h du soir ; les minima ont lieu également à des intervalles égaux, vers 5^h du matin et de 4^h à 7^h du soir, c'est-à-dire environ trois heures après les maxima. Le minimum principal est celui du matin, et le maximum principal celui de la nuit.

Le maximum *secondaire* de perturbations coïncide donc sensiblement avec le maximum diurne régulier de la déclinaison, et le minimum *principal* de perturbations se produit, en toutes saisons, un peu avant le minimum diurne régulier de la déclinaison.

D'une manière générale, la variation diurne des perturbations, dans un sens ou dans l'autre, est beaucoup plus nette en hiver qu'en été.

En séparant les perturbations en deux groupes, vers l'Ouest et vers l'Est, on voit que celles-ci sont peu fréquentes pendant le jour (minimum de 7^h à 8^h du matin) et présentent un maximum très accentué pendant la nuit, de 10^h du soir à 2^h du matin ; au contraire, les perturbations vers l'Ouest sont relativement rares pendant la nuit et présentent un maximum très net de 1^h à 2^h du soir. Cette opposition si frappante entre les perturbations qui diminuent la déclinaison et celles qui l'augmentent se retrouve tous les mois, quel que soit le sens de la déclinaison du Soleil. On remarquera encore que le minimum des perturbations *vers l'Est* se montre sensiblement à la même heure que le *minimum* de l'oscillation diurne régulière, tandis que le maximum des perturbations *vers l'Ouest* coïncide avec le *maximum* diurne régulier de la déclinaison (voir *Pl. B.IX, fig. 1*).

Le nombre des perturbations vers l'Est et vers l'Ouest, le jour et la nuit, pendant les deux périodes semi-annuelles, est résumé dans le Tableau suivant :

Résumé des perturbations de la déclinaison.
Cinq années, 1883 à 1887.

Déclinaison du Soleil.	Vers l'Est.			Vers l'Ouest.			Totaux.		
	Jour.	Nuit.	Total.	Jour.	Nuit.	Total.	Jour.	Nuit.	Total.
Boréale.....	251	585	836	502	278	780	753	863	1616
Australe	162	635	797	352	163	515	514	798	1312
Totaux.....	413	1220	1633	854	441	1295	1267	1661	2928

Les perturbations sont plus fréquentes pendant la saison chaude que pendant la saison froide; l'excès est plus grand pour les perturbations vers l'Ouest que pour les perturbations vers l'Est. L'excès des perturbations de jour sur les perturbations de nuit est, au contraire, plus grand l'hiver que l'été.

Perturbations de la composante horizontale.

Les valeurs horaires de la composante horizontale sont exprimées, dans nos Tableaux mensuels, en unités du cinquième ordre (C. G. S.). On a considéré comme *perturbations* toutes les valeurs différant, en valeur absolue, de 0,00020 de la moyenne horaire correspondante et, comme pour la déclinaison, on a fait la somme de toutes les observations troublées, en distinguant celles qui ont pour effet de diminuer la composante horizontale de celles qui tendent à la relever.

Le nombre des observations troublées, établi pour chaque année comme il vient d'être dit, est indiqué dans le Tableau suivant :

Perturbations de la composante horizontale.

Années.	En augmentation.	En diminution.	Total.
1883 ⁽¹⁾	602	689	1291
1884.....	399	518	917
1885.....	455	603	1058
1886.....	391	639	1030
1887.....	228	431	659
Totaux.....	2075	2880	4955

L'année 1883 présente, sur la moyenne, un excès considérable, qui ne peut être attribué à l'interpolation des mois d'avril et mai, puisque le total des dix autres mois (1140) est supérieur aux sommes respectives des autres années.

⁽¹⁾ Les courbes du bifilaire, pour les mois d'avril et mai 1883, présentant quelque incertitude, il n'en a pas été tenu compte dans ce travail. Afin d'utiliser les dix autres mois de 1883, on a attribué aux mois d'avril et mai de cette année un nombre de perturbations égal à la moyenne des mois correspondants pour les quatre autres années.

L'année 1887 correspond, comme pour la déclinaison, à un nombre de perturbations nettement au-dessous de la moyenne des cinq années.

Pour toutes les années, les perturbations qui diminuent la composante horizontale sont plus fréquentes que celles qui l'augmentent; le rapport moyen est de 1,4 à 1.

Si l'on groupe les perturbations par mois, en tenant compte du sens dans lequel elles se sont produites et en séparant, pour chaque groupe, les observations de jour (7^h m. à 6^h s.) des observations de nuit (7^h s. à 6^h m.), on obtient le Tableau suivant :

*Distribution mensuelle des perturbations de la composante horizontale.
Cinq années, 1883 à 1887.*

Mois.	Perturbations						Totaux.		
	en augmentation.			en diminution.					
	Jour.	Nuit.	Total.	Jour.	Nuit.	Total.	Jour.	Nuit.	Total.
Janvier	56	70	126	101	90	191	157	160	317
Février	54	47	101	97	97	194	151	144	295
Mars	110	105	215	156	152	308	266	257	523
Avril	64	50	114	142	82	224	206	132	338
Mai	123	55	178	146	72	218	269	127	396
Juin	99	55	154	139	44	183	238	99	337
Juillet	115	89	204	133	70	203	248	159	407
Août	167	119	286	187	61	248	354	180	534
Septembre . .	180	87	267	205	127	332	385	214	599
Octobre	123	65	188	194	118	312	317	183	500
Novembre . .	112	64	176	179	93	272	291	157	448
Décembre . . .	34	32	66	120	75	195	154	107	261
Totaux . . .	1237	838	2075	1799	1081	2880	3036	1919	4955

Il ressort de ce Tableau que les perturbations de la composante horizontale, comme celles de la déclinaison, présentent deux maxima aux équinoxes et deux minima aux solstices. Comme pour la déclinaison encore, le maximum principal correspond à l'équinoxe d'automne, et le minimum principal au solstice d'hiver. Ces particularités persistent, soit que l'on considère l'ensemble des perturbations, soit qu'on les groupe suivant le sens dans lequel elles se produisent.

Les perturbations qui diminuent la composante horizontale sont en excès pendant toute l'année, sauf en août; l'excès est maximum pendant les mois d'hiver.

Si l'on groupe séparément les perturbations de jour et les perturbations de nuit, on voit que, quel que soit leur signe, les perturbations de jour sont sensiblement égales en fréquence aux perturbations de nuit, de janvier à mars; pendant tout le reste de l'année, les perturbations de jour sont en excès marqué, principalement celles qui diminuent la composante.

Les perturbations de la composante horizontale sont également soumises à une variation diurne, mise en évidence dans le Tableau suivant, préparé pour les deux périodes semi-annuelles et pour l'année :

Distribution horaire des perturbations de la composante horizontale.
Cinq années, 1883-1887.

Heures.	Perturbations						Totaux.		
	en augmentation.			en diminution.					
	Saison			Saison			Saison		
	chaude.	froide.	Total.	chaude.	froide.	Total.	chaude.	froide.	Total.
1.....	32	29	61	32	40	72	64	69	133
2.....	37	32	69	32	42	74	69	74	143
3.....	33	24	57	34	38	72	67	62	129
4.....	32	25	57	25	35	60	57	60	117
5.....	38	26	64	37	33	70	75	59	134
6.....	37	22	59	47	39	86	84	61	145
7.....	50	21	71	57	41	98	107	62	169
8.....	68	27	95	72	49	121	140	76	216
9.....	70	42	112	85	47	132	155	89	244
10.....	75	56	131	90	64	154	165	120	285
11.....	74	46	120	92	72	164	166	118	284
Midi....	72	47	119	86	74	160	158	121	279
1.....	76	39	115	99	69	168	175	108	283
2.....	61	46	107	99	76	175	160	122	282
3.....	56	37	93	85	93	178	141	130	271
4.....	57	42	99	72	88	160	129	130	259
5.....	50	43	93	57	86	143	107	129	236
6.....	39	43	82	58	88	146	97	131	228
7.....	44	36	80	52	86	138	96	122	218
8.....	43	42	85	42	75	117	85	117	202
9.....	35	40	75	38	76	114	73	116	189
10.....	35	32	67	41	61	102	76	93	169
11.....	46	41	87	39	53	92	85	94	179
Minuit..	43	34	77	37	47	84	80	81	161
Totaux.	1203	872	2075	1408	1472	2880	2611	2344	4955

La variation diurne des perturbations de la composante horizontale montre une seule oscillation, dont le maximum se produit vers le milieu du jour et le minimum vers 4^h du matin. En groupant séparément les perturbations d'après leur signe, on voit que l'heure du minimum (4^h m.) est commune aux deux séries; le maximum a lieu vers 10^h du matin pour les perturbations qui augmentent la composante et vers 3^h du soir pour celles qui la diminuent (voir *Pl. B. IX, fig. 2*).

Tandis que, pour la déclinaison, les courbes de variations des perturbations de signes contraires sont opposées, ici elles affectent sensiblement la même allure, sauf un retard du maximum des perturbations qui diminuent la composante. A

toutes les heures du jour, ces dernières perturbations sont les plus fréquentes; les écarts entre les nombres horaires qui représentent chaque sorte de perturbations atteignent leur plus grande valeur dans l'après-midi.

Si l'on considère l'année en deux périodes de six mois, selon que le Soleil est en déclinaison boréale ou en déclinaison australe, on remarque à peu près les particularités dont il vient d'être parlé; toutefois l'excès des perturbations qui diminuent la composante horizontale sur celles qui l'augmentent est plus prononcé en hiver qu'en été. La variation diurne des perturbations semble plus régulière en été qu'en hiver : c'est le contraire de la déclinaison.

Enfin, en comparant la courbe de variation des perturbations avec la courbe de la variation diurne régulière de la composante horizontale, on remarque une opposition bien nette des deux phénomènes, soit pendant l'année, soit pendant les périodes semi-annuelles (voir *Pl. B.IX, fig. 2*).

Le Tableau suivant résume, pour chaque période semi-annuelle et pour l'année, le nombre des perturbations en augmentation ou en diminution, de jour et de nuit :

*Résumé des perturbations de la composante horizontale.
Cinq années, 1883-1887.*

Déclinaison du Soleil.	Perturbations						Totaux.		
	en augmentation.			en diminution.					
	Jour.	Nuit.	Total.	Jour.	Nuit.	Total.	Jour.	Nuit.	Total.
Boréale	748	455	1203	952	456	1408	1700	911	2611
Australe....	489	383	872	847	625	1472	1336	1008	2344
Totaux....	1237	838	2075	1799	1081	2880	3036	1919	4955

Comme pour la déclinaison, les perturbations de la composante horizontale, considérées dans leur ensemble, sont plus fréquentes pendant la saison chaude que pendant la saison froide. Mais, en les séparant d'après leur signe, on trouve que les perturbations de nuit qui diminuent la composante sont, au contraire, plus fréquentes en hiver qu'en été. En toutes saisons, et quel que soit leur sens, les perturbations sont plus fréquentes le jour que la nuit.

En comparant nos résultats avec ceux qui ont été publiés déjà sur ce sujet par divers auteurs, et en particulier par le général Sabine, on est amené à reconnaître que la variation annuelle des perturbations de la déclinaison et de la composante horizontale paraît suivre une loi uniforme. On retrouve à peu près partout deux maxima aux équinoxes et deux minima aux solstices, le maximum principal correspondant à l'équinoxe d'automne, et le minimum principal au solstice d'hiver. Pourtant cette loi n'est pas absolue; car, en étudiant

la variation annuelle de la déclinaison à Hobarton, Sabine n'a trouvé qu'une seule oscillation annuelle, dont le maximum a lieu au solstice d'hiver et le minimum au solstice d'été.

Quant à la variation diurne des perturbations, elle semble soumise à des lois complexes. Bien que la période solaire se distingue nettement dans les différentes stations, l'allure générale des courbes de variations diffère notablement d'une station à l'autre. Les heures des maxima et des minima sont variables suivant les lieux; de plus, tandis que la période diurne se manifeste le plus généralement par une seule oscillation, certaines courbes montrent nettement deux oscillations diurnes, par exemple, la courbe des perturbations qui diminuent la déclinaison à Pékin, et celle des perturbations qui augmentent cet élément au Cap de Bonne-Espérance.

Nous citerons encore un exemple remarquable. La variation diurne des perturbations qui diminuent la composante horizontale, à Kew, présente deux oscillations très nettes, d'après la moyenne des résultats de 1858 à 1864, tandis que la courbe similaire au Parc Saint-Maur, tracée avec les données de 1883 à 1887, ne présente qu'une seule oscillation : les deux stations sont pourtant peu éloignées l'une de l'autre.

Ce qu'on est convenu d'appeler la *variation diurne d'un élément* serait ainsi la résultante de deux phénomènes au moins, se superposant, ayant chacun des lois distinctes, et se combinant dans des proportions différentes selon les régions du globe. L'un de ces phénomènes est la variation solaire proprement dite, dont les points extrêmes se manifestent à la même heure locale; l'autre est la variation due aux perturbations, dont la période est également d'un jour solaire, mais dont les heures des maxima et minima diffèrent selon les positions géographiques.

La variation diurne régulière prédomine dans les régions équatoriales; mais, dans les stations polaires, la variation diurne des perturbations est la plus importante et amène fréquemment le déplacement des heures tropiques du phénomène régulier, si l'on considère le nombre total des observations. A Paris même, pendant les mois de novembre, décembre, janvier et février, c'est-à-dire lorsque l'oscillation diurne régulière a son minimum d'amplitude, le minimum de nuit, pour la déclinaison, s'est constamment montré plus accentué que le minimum du matin dans chacune des années 1883 à 1887. Cette particularité peut être attribuée, au moins en grande partie, à l'influence des perturbations ayant pour effet de diminuer la déclinaison, et dont le maximum de fréquence se produit précisément vers le milieu de la nuit.

Il est difficile de tirer aucune conclusion de la variation annuelle du nombre des perturbations de la déclinaison; au contraire, le nombre annuel des perturbations de la composante horizontale a diminué régulièrement, sauf en 1884.

Mais la période envisagée ici n'est pas assez longue pour appuyer l'hypothèse, fort plausible d'ailleurs, que les perturbations magnétiques, en outre des caractères de périodicité que nous venons de résumer, suivent de plus la loi undécennale des taches solaires.

Pour rechercher les causes de ces divers phénomènes relatifs aux perturbations, il semble indispensable d'étudier, en un grand nombre de points, pendant une période uniforme et suffisamment étendue, les lois qui les régissent.

Pour être complète, cette étude devrait d'ailleurs porter également sur les autres éléments magnétiques, et en particulier sur la force totale ; il n'a malheureusement pas été possible, jusqu'ici, d'entreprendre la longue série de calculs que nécessite une semblable discussion.



✓ DÉTERMINATION
DES
ÉLÉMENTS MAGNÉTIQUES

DANS LE
BASSIN OCCIDENTAL DE LA MÉDITERRANÉE.

CARTES MAGNÉTIQUES
DRESSÉES POUR LE 1^{er} JANVIER 1888.

PAR M. TH. MOUREAUX,
Météorologiste-Adjoint au Bureau central,
Chargé du service magnétique à l'observatoire du Parc Saint-Maur.

INTRODUCTION.

Par un arrêté en date du 18 mars 1887, M. le Ministre de l'Instruction publique nous chargeait d'une mission en Corse, en Italie, en Tunisie, en Algérie, au Maroc et en Espagne, en vue de réunir les éléments nécessaires pour dresser des Cartes magnétiques du bassin occidental de la Méditerranée. M. Mascart, Directeur du Bureau central météorologique, qui avait bien voulu prendre l'initiative de cette mission, nous avait prié de visiter en même temps les stations météorologiques de Tunisie et d'Algérie situées sur notre itinéraire, et de procéder à la comparaison des instruments d'observation en usage.

Le voyage a été effectué sous les auspices du Bureau central météorologique, et avec le concours des Sociétés savantes. M. Hervé Mangon, Président du Conseil du Bureau central météorologique, s'était intéressé tout particulièrement au travail que nous allions entreprendre, et, sur sa haute recommandation, nous avons pu obtenir des diverses Compagnies de transport de grandes facilités.

La Compagnie générale transatlantique nous avait en outre recommandé aux capitaines de ses paquebots et à ses agents dans les ports d'escale; ces recommandations nous ont été particulièrement utiles pour l'embarquement et le

débarquement de nos appareils dans les ports, très nombreux, où les paquebots mouillent en rade.

Toutes les observations ont été faites pendant un seul voyage, accompli du 17 avril au 26 juin 1887. Nous sommes arrivé à Ajaccio le 19 avril, sans qu'il ait été possible, en raison du mauvais temps, de faire une première série à Marseille, avant de quitter la France.

Les communications sont lentes et difficiles en Corse, et nous n'avons pu, à notre grand regret, effectuer des mesures que dans quatre stations seulement. L'influence du sol y est parfois considérable, ainsi que nous l'avons constaté à Bastia, et, pour connaître la valeur exacte des éléments magnétiques dans l'île, il conviendrait d'en faire une étude spéciale, en multipliant le nombre des stations plus qu'il ne nous a été possible de le faire, étant obligé de réserver notre temps pour les opérations à effectuer sur le littoral du nord de l'Afrique, but principal de la mission.

De Bastia, nous nous sommes rendu par Livourne en Italie, afin de relier nos observations, par quelques stations communes, avec le réseau si complet entrepris pendant ces dernières années par M. Chistoni. A l'observatoire de Capodimonte, à Naples, M. Brioschi a bien voulu nous faciliter la comparaison de nos instruments de voyage avec ceux de cet établissement. Les quarantaines établies alors dans les ports de la Sicile ne nous ont pas permis de faire escale entre Naples et Malte. A Malte, nous avons pu opérer en deux points : près du port de La Valette, et à Città Vecchia, dans l'intérieur de l'île.

Le paquebot nous a transporté ensuite à Tripoli. Nous n'étions pas sans quelque appréhension sur le succès de nos opérations en ce point ; lors de notre arrivée à Tripoli, le 4 mai, la ville était en effet occupée par une forte armée turque, et l'état de siège y régnait de fait ; les Européens de passage y étaient l'objet d'une surveillance attentive qui rendait tout essai d'observation impossible vers le port ou dans le voisinage immédiat de la ville. M. Destrées, Consul général de France à Tripoli, après nous avoir informé de cette situation, nous conseilla de nous transporter au delà de l'oasis. Accompagné de deux fonctionnaires et d'un kawas du Consulat, nous nous rendîmes sous les oliviers que l'on rencontre au delà des derniers palmiers, et pûmes effectuer, à l'entrée du désert, une série complète de déterminations des trois éléments magnétiques. Le siroco soufflait avec une violence extrême, entraînant des tourbillons d'un sable fin qui pénétrait jusque dans les cages des appareils, fermées pourtant avec le plus grand soin ; à 2^h le thermomètre marquait 41°, 7. Nous remercions ici M. le Consul général de France pour le concours moral et matériel qu'il nous a prêté ; sans son appui, il nous eût été vraisemblablement impossible d'accomplir cette partie de notre mission.

De Tripoli, le paquebot se rendait à la Goulette, en faisant diverses escales

que nous avons mises à profit en différents points de la côte de Tunisie. Cette côte avait d'ailleurs été étudiée par la mission hydrographique française, de 1884 à 1886, mais seulement pour la déclinaison et l'inclinaison; il importait d'y déterminer également la valeur de l'intensité.

En Tunisie et en Algérie, nous avons pu opérer en toute liberté, et multiplier à volonté le nombre des points d'observation.

Nous n'avons eu aucun ennui à Tanger. A Melilla, nous étions descendu à terre avec nos appareils; mais c'était l'heure de la sieste, une sieste qui se prolonge à propos pendant toute la durée de l'escale, en sorte qu'il est impossible de se présenter aux autorités. En réalité, on ne nous a pas, comme à M. Duveyrier, opposé un refus d'observer : nous nous sommes simplement trouvé dans l'impossibilité d'en formuler la demande.

A l'observatoire de San Fernando, M. Pujazon nous a fait le meilleur accueil. Bien que ce point soit en dehors du bassin de la Méditerranée, il importait de relier nos observations avec celles de cet établissement, par la comparaison de nos instruments. M. Pujazon a bien voulu nous recommander en outre, d'une manière toute spéciale, aux autorités maritimes des ports espagnols de la Méditerranée; nous avons pu ainsi remplir sans difficulté cette dernière partie de notre mission.

On s'étonnera peut-être que Gibraltar ne figure pas dans notre travail; ce n'est point un oubli : ce port important, situé à la limite même de la région sur laquelle devaient s'étendre nos opérations, était une des stations prévues de notre itinéraire. Nous nous sommes donc rendu à Gibraltar; mais, malgré les lettres officielles qui établissaient le caractère purement scientifique des opérations à exécuter, malgré les démarches personnelles de M. Ledoux, Vice-Consul de France, nous ne pûmes, en l'absence du Gouverneur, obtenir l'autorisation nécessaire. Nous en fûmes d'autant plus contrarié que, à notre connaissance du moins, il n'a pas été fait récemment d'observations magnétiques à Gibraltar, sauf une mesure de la déclinaison, le 1^{er} décembre 1886, date qui correspond précisément à une perturbation magnétique. Les observations de la déclinaison faites par M. de Bernardières, les 19 et 21 décembre 1878, inspirent plus de confiance. Pour l'inclinaison et l'intensité, les observations les plus récentes sont dues aux officiers du *Challenger*, et datent de 1873; il n'eût peut-être pas été inutile de répéter ces mesures à quatorze ans d'intervalle. Nous avons, heureusement, pu faire une série complète de déterminations sur l'autre rive de la baie d'Algésiras, en territoire espagnol.

Nous sommes rentré en France par Port-Vendres. Il restait à comparer nos instruments au retour : l'observatoire météorologique et magnétique de Perpignan, que dirige avec tant de zèle M. le Dr Fines, se présentait tout naturellement pour cet objet.

On trouvera, au Chapitre I, avec la description des appareils et l'exposé des méthodes d'observation et de réduction, les résultats des diverses comparaisons exécutées en cours de route.

Le nombre total de nos mesures absolues est de 98 pour la déclinaison, 90 pour la composante horizontale et 59 pour l'inclinaison; la détermination du méridien géographique en chaque point comprend au total 514 observations du Soleil. Ces différentes déterminations, effectuées sans le secours d'aucun aide, se rapportent à 52 stations, dont 4 en Corse, 3 en Italie, 2 à Malte, 1 à Tripoli, 7 en Tunisie, 25 en Algérie, 1 au Maroc, 8 en Espagne, et 1 en France.

Le Chapitre II contient le détail des opérations effectuées en chaque point de la région que nous avons parcourue.

Dans la construction des Cartes magnétiques qui accompagnent ce Mémoire, nous avons utilisé toutes les observations récentes que nous avons pu réunir pour les régions comprises dans les limites de notre cadre; on en trouvera le Tableau au Chapitre III.

Enfin, dans un Appendice, nous donnons les résultats, encore inédits, des mesures absolues de la déclinaison et de la composante horizontale faites en 1885 et 1886, dans la Méditerranée orientale, par M. J. Lephay, lieutenant de vaisseau.

CHAPITRE PREMIER.

INSTRUMENTS ET MÉTHODES D'OBSERVATION.

I. — DESCRIPTION DES APPAREILS.

Les mesures magnétiques ont été effectuées à l'aide de deux appareils : 1° un théodolite-boussole disposé pour déterminer à volonté la déclinaison ou la composante horizontale ; 2° une boussole d'inclinaison.

Ces appareils, construits spécialement pour le voyage par MM. Brunner frères, sont ceux qui ont servi aux déterminations que nous avons faites en France de 1884 à 1886, et dont les résultats ont été utilisés pour dresser de nouvelles Cartes magnétiques de la France.


Théodolite-boussole.

Cet appareil est représenté à peu près en demi-grandeur naturelle (*fig. 1*). Les cercles ont 0^m,08 seulement de diamètre ; ils sont gradués en demi-degrés, et le vernier donne directement la minute ; on peut facilement apprécier à l'œil la demi-minute. Les lectures se font à l'aide d'une loupe à main, indépendante de l'appareil. Le cercle horizontal est muni d'un équipage, mobile autour d'un axe vertical qui supporte tous les autres organes. Une cage métallique, vitrée sur ses faces, renferme le cercle vertical et l'étrier dans lequel on place le barreau aimanté B ; elle s'ouvre en enlevant la partie C, placée, sur le dessin, à côté de l'appareil. Le cercle vertical entraîne dans son mouvement une lunette L et une tige intérieure fixée à l'un des diamètres du cercle, parallèlement à la lunette. Cette tige porte à son extrémité un index en argent I, sur la face extérieure duquel sont gravés trois traits verticaux équidistants ; sa face intérieure porte un seul trait, gravé exactement derrière le trait central de la face extérieure. La distance angulaire entre deux traits consécutifs de l'index est de 6'. La lunette et l'index sont fixés invariablement l'un à l'autre. La cage est surmontée d'un tube métallique terminé, à sa partie supérieure, par une monture munie d'un treuil T, auquel est attaché le fil de suspension du barreau. Ce

treuil peut tourner autour de son centre, de façon à permettre d'annuler et, au besoin, de mesurer la torsion du fil.

Le barreau B, de forme cylindrique, a une longueur de 0^m,065; sa position dans l'étrier est déterminée par une petite goupille fixée en son milieu; on peut tourner le barreau sur lui-même de façon à l'arrêter dans deux positions déterminées, pour lesquelles la goupille est alternativement à droite ou à gauche.

Fig. 1.



Théodolite-boussole de voyage (demi-grandeur naturelle).

Les extrémités du barreau, au lieu de présenter des surfaces planes, ont une forme concave et deviennent de véritables miroirs, grâce au poli de l'acier.

Pour faire un pointé, on amène l'équipage dans une position telle qu'à l'aide des microscopes M on voie l'image du trait postérieur, réfléchi sur la surface terminale du barreau, venir se placer sur le prolongement du trait central de

l'index. Un plan E, commandé par une vis V située sur le côté et à l'extérieur de la cage, peut être élevé ou abaissé jusqu'au contact de l'aimant, afin d'amortir les oscillations. Un niveau N sert à régler l'appareil en place, au moyen des vis calantes de l'appareil.


Une règle spéciale R, destinée spécialement à la mesure de la composante horizontale, porte deux étriers fixes, disposés pour recevoir un barreau déviant à deux distances différentes du centre de l'appareil. Cette règle peut se placer à volonté sur l'une ou l'autre face de la cage.

L'appareil complet, renfermé dans sa boîte de voyage, pèse seulement 4^{kg}.

Boussole d'inclinaison.

Cet appareil est représenté (*fig. 2*) à peu près en demi-grandeur naturelle. Les cercles, comme dans le théodolite, ont seulement 0^m,08 de diamètre ; ils

Fig. 2.



Boussole d'inclinaison de voyage (demi-grandeur naturelle).

sont gradués en demi-degrés, et le vernier donne directement la minute. Les lectures se font à l'aide d'une loupe à main, indépendante de l'appareil. Sur le cercle horizontal est un équipage mobile qui porte le cercle vertical. La cage

métallique, de forme circulaire, est vitrée sur ses faces ; elle s'ouvre en enlevant la partie C placée, sur le dessin, à côté de l'appareil. Les deux traverses horizontales qui terminent la partie fixe de la cage portent, près du centre, deux agates dont les bords supérieurs sont situés dans le même plan horizontal. L'aiguille I, en forme de losange allongé, a une longueur de 0^m,065 ; elle est traversée en son milieu par un axe d'acier qui pose sur les agates. Au moyen d'un levier L, on peut la soulever à volonté par deux étriers taillés en forme de V, et la maintenir en position convenable. L'une des deux traverses en croix auxquelles est fixé le cercle vertical porte un miroir concave M vers chacune de ses extrémités. Un disque moleté V, situé en arrière et à l'extérieur de la cage, et solidaire avec le cercle vertical, sert à mettre à peu près en position l'axe des miroirs. Les pointés de l'aiguille se font au moyen de deux loupes extérieures I, montées sur une tige qui tourne à frottement doux autour de l'axe horizontal, devant la face de la cage. Enfin un niveau N sert à régler l'appareil au moyen des vis calantes.

Pour faire un pointé, on tourne à la main le disque moleté jusqu'à ce que les miroirs viennent se placer à peu près derrière les pointes de l'aiguille. A l'aide de la vis de réglage, on amène les miroirs et, par suite, le cercle vertical dans une position telle qu'on voie dans les microscopes la pointe de l'aiguille coïncider avec son image réfléchie par le miroir concave. Le cercle vertical est d'ailleurs disposé de telle façon que, lorsque le zéro de sa graduation coïncide avec le zéro du vernier, la ligne qui joint le centre des miroirs est exactement verticale. On peut, du reste, vérifier facilement cette verticalité au moyen d'un fil à plomb, que l'on suspend à un crochet fixé au bouton B qui surmonte le couvercle de la cage.

Le poids de l'appareil complet, renfermé dans sa boîte de voyage, est inférieur à 2^{kg}.

II. — MÉTHODES D'OBSERVATION.

Les méthodes d'observation ont été développées dans un Mémoire précédent (¹) ; nous ne ferons que les résumer ici.

Choix de l'emplacement.

Dans le Chapitre II, nous donnerons, pour chaque station, des détails circonstanciés sur l'emplacement choisi. D'une manière générale, les expériences ont toujours été faites en dehors des villes, loin des agglomérations de maisons,

(¹) Voir *Détermination des éléments magnétiques en France*, par M. Th. Moureaux (*Annales du Bureau central météorologique de France*, année 1884, t. I, p. B.55 et suivantes).

des lignes de chemins de fer, des usines, des conduites d'eau ou de gaz, etc., de manière à éviter, autant que possible, toute influence perturbatrice accidentelle.

Avant de commencer les opérations, on faisait régulièrement un examen minutieux des lieux autour du point où devaient être établis les appareils. Il est peu de stations où cette précaution ait été inutile; dans le voisinage des villes, notamment, on a trouvé presque toujours, sur le sol, des débris métalliques de diverse nature.

Toutes les fois qu'on l'a pu, on s'est placé à l'ombre pour les expériences relatives à la composante horizontale; cette condition, dans bien des cas, n'a pu être réalisée qu'au prix de longues courses, en raison de la rareté des arbres à haute tige. En certains points même, nous n'avons pu opérer autrement qu'à découvert. Dans le détail des observations, au Chapitre II, on trouvera, pour chaque station, les indications relatives aux conditions dans lesquelles l'appareil était placé pendant les mesures de la composante.

Ordre des opérations.

Sauf en quelques villes importantes, telles que Tunis ou Alger, où les opérations ont été répétées en trois points différents, notre séjour dans les diverses stations était limité au temps nécessaire aux observations et subordonné aux moyens de transport.

La température étant déjà très élevée en mai et juin dans les pays que nous avons parcourus, nous n'avons opéré dans l'après-midi que lorsque cette disposition pouvait faire gagner du temps; la plupart des observations ont été faites dans la matinée. Généralement, nous étions sur le terrain avant 5^h, et vers 10^h le travail était terminé; la série complète des expériences était ainsi effectuée sans trop de fatigue, condition essentielle pour en assurer la précision.

L'ordre des opérations successives était réglé de façon à observer le méridien magnétique vers le moment du minimum de la déclinaison et à prendre les hauteurs du Soleil dans le voisinage du premier vertical.

Dans les voyages en paquebot, nous avons dû nécessairement nous conformer aux heures d'escale; mais, même dans ces cas particuliers, les conditions d'observation n'ont jamais été trop défavorables. De plus, bien que nous ayons opéré quelquefois par un ciel voilé ou nuageux, l'observation du Soleil n'a jamais fait absolument défaut, en sorte que les résultats des 52 stations sont complets et comprennent par conséquent, pour chacune d'elles, la déclinaison, l'inclinaison et la composante horizontale.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déterminé exclusivement par l'observation du Soleil. Le procédé qui nous a semblé le plus commode en voyage consiste à observer l'astre simultanément en hauteur et en azimut; cette méthode dispense de la connaissance rigoureuse de l'heure. Autant que les circonstances l'ont permis, on a observé le Soleil dans le voisinage du premier vertical. Le réticule de la lunette L (*fig. 1*) comprend, outre les deux fils qui se croisent au centre du champ, quatre autres fils disposés de manière à *encadrer* le disque du Soleil; on manœuvre les vis de rappel des deux cercles de manière à amener le bord du Soleil à être tangent aux côtés du carré formé par les fils extérieurs du réticule. La lunette du petit théodolite grossit seulement sept ou huit fois, et comme dans ces conditions l'épaisseur des fils est loin d'être négligeable, on les a disposés pour que le côté du carré formé par les fils extérieurs du réticule soit un peu moins grand que le diamètre apparent du Soleil, dont le disque déborde légèrement en dehors. Avec un peu d'habitude, l'observation du centre de l'astre se fait avec la plus grande facilité, et la correction du demi-diamètre se trouve ainsi évitée.

Après s'être assuré que l'axe optique de la lunette est parallèle au plan du cercle vertical, on commence par viser un repère éloigné, lunette à droite et lunette à gauche, puis on note le baromètre et le thermomètre, et l'on procède à l'observation du Soleil proprement dite. On fait un premier pointé sur l'astre, la lunette étant à droite de l'observateur, par exemple, et on lit les deux cercles; puis, retournant l'appareil de 180° , on répète l'observation, la lunette étant à gauche, et on lit de nouveau les deux cercles. On note en même temps l'heure approchée dont on aura besoin pour chercher, dans la *Connaissance des Temps*, la déclinaison du Soleil au moment de l'observation. Si on lit toujours le même vernier, la différence des deux lectures du cercle vertical donne le double de la distance zénithale moyenne de l'astre, qu'il faudra ensuite corriger de la réfraction et de la parallaxe; la moyenne des deux lectures du cercle horizontal donne la trace moyenne du vertical du Soleil au moment moyen de l'observation. Comme la *Connaissance des Temps* donne d'ailleurs la déclinaison du Soleil pour le temps moyen de Paris, il est avantageux, en voyage, de régler simplement sa montre sur l'heure de Paris et de noter cette heure à chaque observation. La variation de déclinaison du Soleil étant toujours inférieure à $1'$ par heure, l'approximation est suffisante pour le but proposé. La montre dont nous avons fait usage pour noter, en chaque point, le temps moyen de Paris correspondant aux différentes observations, appartient au Dépôt de la Marine (Leroy, n° 252), et avait été mise obligeamment à notre disposition par M. le Ministre de la Marine.

On ne se contentait pas, d'ailleurs, des deux pointés dont il vient d'être question; on répétait l'observation quatre ou cinq fois, lunette à droite et lunette à gauche, en ayant soin chaque fois de vérifier le niveau.

Chaque groupe de deux pointés consécutifs a été calculé séparément par la formule

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2} A = \sqrt{\frac{\sin(S - \lambda) \sin(S - z)}{\sin S \sin(S - \Delta)}},$$

dans laquelle

A est l'azimut du Soleil;

λ le complément de la latitude du lieu;

z la distance zénithale du Soleil, corrigée de la réfraction et de la parallaxe;

Δ le complément de la déclinaison ou la distance polaire du Soleil;

$$S = \frac{\lambda + z + \Delta}{2}.$$

La trace définitive du méridien géographique sur le cercle azimutal est déduite de la moyenne des résultats obtenus.

Nous donnons ci-dessous un extrait du carnet d'observation.

MECHERIA. — Latitude 33° 37' N. (1).

31 mai 1887, soir.

DÉTERMINATION DU MÉRIDIEŒ GÉOGRAPHIQUE.

Repère. — Sommet du poste B de Télégraphie optique, sur le Djebel Antar, à 2^{km} au Nord-Nord-Ouest.

Lunette à droite..... 98° 43' 0" } 98° 43' 30"
Lunette à gauche..... 98° 44' 0" }
Baromètre 664^{mm}; thermomètre 32°.

Observation du centre du Soleil.

LUNETTE A DROITE.				LUNETTE A GAUCHE.			
Numéro d'ordre des observations.	Heure de Paris.	Cercle		Numéro d'ordre des observations.	Heure de Paris.	Cercle	
		vertical.	azimutal.			vertical.	azimutal.
1.....	^h 5.35 ^m	169. 44'. 30"	46. 17'. 30"	2.....	^h 5.37 ^m	27. 32'. 0"	46. 31'. 0"
3.....	5.41	171. 15. 40	47. 12. 0	4.....	5.43	26. 4. 40	47. 23. 0
5.....	5.45	172. 26. 30	47. 55. 30	6.....	5.47	24. 51. 0	48. 8. 20
7.....	5.51	173. 11. 30	48. 23. 0	8.....	5.53	24. 10. 0	48. 33. 0
9.....	5.55	174. 4. 40	48. 55. 0	10.....	5.57	23. 17. 0	49. 6. 0

Vérification du repère.

Lunette à droite..... 98° 43' 0" } 98° 43' 30"
Lunette à gauche..... 98° 44' 0" }

(1) D'après la Carte de l'Algérie au $\frac{1}{800000}$, dressée au Dépôt de la Guerre en 1876.

<i>Calcul.</i>						
Observations.	λ .	z .	Δ .	Cercle azimutal.	A.	Méridien géographique.
1-2.	56.23 ⁰	71. 8.24 ⁰	68.3.16 ⁰	46.24.15 ⁰	75.41.30 ⁰	122.5.45 ⁰
3-4.	56.23	72.37.52	68.3.14	47.17.30	74.47.38	122.5. 8
5-6.	56.23	73.50.22	68.3.13	48. 1.55	73. 3.32	122.5.37
7-8.	56.23	74.33.33	68.3.11	48.28. 0	73.37.18	122.5.18
9-10.	56.23	75.26.51	68.3.10	49. 0.30	73. 4.33	122.5. 3
Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.						122.5.22

Déclinaison.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal étant obtenue comme il vient d'être dit, il reste à déterminer la trace du méridien magnétique, d'où l'on déduit la déclinaison. Cette opération nécessite plusieurs précautions, dont la première est de s'assurer que le fil de suspension du barreau est sans torsion. Le poids du barreau étant inférieur à 8^{gr}, on a pu le suspendre à un fil de soie extrêmement fin, qui a été mis en place au mois de juin 1884 et a servi pendant tout le cours des opérations. A chaque station, on a commencé par vérifier le *zéro de torsion*, qui correspond à la position du barreau dans l'axe de la cage. D'ailleurs, toutes les fois qu'on l'a pu, le théodolite restait monté pendant la nuit, le barreau de cuivre suspendu dans l'étrier. Le fil, enduit d'oléonaphte anhydre, est peu impressionné par les variations de l'humidité, et la pratique de plusieurs années montre que, sauf en des cas exceptionnels, le zéro de torsion n'a pas de variation sensible. Pour vérifier en chaque lieu la position du zéro de torsion, on suspend d'abord, dans l'étrier, un barreau de cuivre de même poids que le barreau aimanté, puis on tourne au besoin le cercle du treuil jusqu'à ce que le barreau de cuivre se tienne en équilibre dans l'axe des microscopes.

Cela fait, on enlève le barreau de cuivre et l'on prend une double visée, lunette à droite et lunette à gauche, sur la mire choisie pour la détermination du méridien géographique. On place alors l'aimant en position, la goupille à l'Est par exemple, et l'on tourne l'appareil jusqu'à ce que le barreau oscille à peu près dans l'axe de la cage. A l'aide du plan d'arrêt E (*fig. 1*), on diminue rapidement l'amplitude des oscillations, et, par une manœuvre convenable de la vis de rappel du cercle horizontal, on amène l'image du trait intérieur de l'index I à osciller entre les deux traits extrêmes de la face de l'index visible au microscope, symétriquement par rapport au trait central. On lit le vernier et l'on répète la même opération sur l'autre pôle de l'aimant. On tourne ensuite le barreau sur lui-même, goupille à l'Ouest, et, agissant comme il vient d'être dit, on fait deux nouveaux pointés.

L'appareil est ensuite tourné de 180°, l'aimant renversé bout pour bout dans l'étrier, et l'on répète exactement les quatre opérations effectuées dans la pre-

mière position de l'appareil. La moyenne des huit lectures donne la trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal. On s'assure enfin, par une double visée sur la mire, que l'instrument ne s'est pas dérangé.

L'exemple suivant est extrait de notre carnet d'observation.

MECHERIA.

31 mai 1887.

DÉCLINAISON. — MÉRIDIEEN MAGNÉTIQUE.

Barreau n° 1. — De 6^h 10^m à 6^h 25^m du soir (temps local).

Repère. — Sommet du poste B de Télégraphie optique, sur le Djebel Antar, à 2^{km} au Nord-Nord-Ouest.

Lunette à droite.....	98° 43' 0"	} 98° 43' 30"
Lunette à gauche.....	98° 44' 0"	

LUNETTE A L'EST.

1 ^{re} position : Goupille à l'Est.		} 107° 24' 40"
Pôle Nord...	107° 24' 0"	
Pôle Sud ...	107° 22' 30"	
2 ^e position : Goupille à l'Ouest.		
Pôle Nord ..	107° 25' 30"	} 107° 26' 5"
Pôle Sud ...	107° 26' 40"	

LUNETTE A L'OUEST.

1 ^{re} position : Goupille à l'Est.		} 107° 24' 42"
Pôle Nord..	107° 21' 0"	
Pôle Sud ...	107° 25' 0"	
2 ^e position : Goupille à l'Ouest.		
Pôle Nord ..	107° 23' 20"	} 107° 26' 25"
Pôle Sud ...	107° 29' 30"	

$$\text{Trace du méridien magnétique} = \frac{107^{\circ} 24' 40'' + 107^{\circ} 24' 42''}{2} = 107^{\circ} 24' 41''.$$

Vérification du repère.

Lunette à droite.....	98° 43' 0"	} 98° 43' 30"
Lunette à gauche.....	98° 44' 0"	

La mesure de la déclinaison a toujours été effectuée avec tous les retournements indiqués dans l'exemple précédent. L'ensemble des lectures du barreau ne demande pas plus de quinze minutes, ce qui facilite et rend plus précise la comparaison des résultats avec les courbes relevées aux appareils de variations. Nous avons d'ailleurs pris pour règle d'opérer aux heures où la déclinaison est sensiblement stationnaire, c'est-à-dire de 7^h à 8^h du matin, de 1^h à 2^h du soir, et quelquefois, comme dans l'exemple ci-dessus, vers 6^h du soir.

Dans la plupart des cas, la mesure absolue de la déclinaison, effectuée avec l'un des barreaux comme il vient d'être dit, a été répétée, à titre de contrôle, avec le deuxième barreau de la boussole.

Selon les circonstances, la détermination du méridien géographique a immédiatement précédé ou suivi les expériences magnétiques proprement dites, et le théodolite n'a jamais été déplacé dans l'intervalle de ces deux ordres d'opérations.

Composante horizontale.

Le théodolite-boussole de voyage est disposé également, avons-nous dit, pour la mesure de la composante horizontale. La valeur absolue de H en chaque point a toujours été conclue de deux expériences distinctes, l'une ayant pour but de déterminer le rapport $\frac{H}{M}$ par la méthode de Gauss; l'autre, dite *des oscillations*, en vue de déterminer le produit HM .

La méthode d'observation adoptée est exactement celle que nous avons employée dans nos observations en France. Nous nous bornerons à la résumer.

1° *Détermination du rapport $\frac{H}{M}$* . — Dans la méthode de Gauss, le barreau est placé successivement sur chacune des deux encoches formant des étriers fixes sur la règle R (*fig. 1*), et l'on observe dans chaque cas la déviation produite par cet aimant sur un second barreau de longueur moitié moindre, disposé dans l'étrier de la cage; ce second aimant est prolongé par des bouts en cuivre terminés par un miroir concave, afin que les pointés puissent se faire comme avec les barreaux ordinaires.

L'appareil étant réglé, on vérifie le centrage du fil, et l'on fait un pointé du barreau à bouts de cuivre; ce pointé sert uniquement de repère et n'intervient pas dans le calcul. On place alors le barreau déviant dans l'étrier de la règle le plus rapproché de la cage, à la distance R ; le barreau intérieur est dévié d'un certain angle. On tourne l'équipage jusqu'à ce que le barreau dévié se mette en équilibre dans la direction habituelle des pointés, et l'on note la lecture du cercle azimutal : les deux barreaux sont dans deux directions perpendiculaires.

On retourne ensuite le barreau déviant, bout pour bout, sur le même étrier; la déviation se produit en sens inverse, et l'on note encore la lecture du cercle azimutal. La différence des deux lectures est égale au double de la déviation δ_1 à la distance R . Pour éviter l'erreur possible de centrage du fil, on enlève la règle et on la place symétriquement de l'autre côté de la boussole; puis, répétant les mêmes opérations, on obtient une nouvelle valeur δ_2 de la déviation dans cette seconde position de la règle.

La déviation moyenne α à la distance $R = \frac{\delta_1 + \delta_2}{2}$.

En faisant abstraction des termes de correction, dont l'influence est négligeable, la condition d'équilibre est représentée par l'équation

$$(1) \quad \frac{H}{M} = \frac{2}{R^3 \sin \alpha} \left(1 + \frac{a}{R^2} \right).$$

Pour suivre complètement la méthode de Gauss, il conviendrait de répéter les mêmes expériences en plaçant le barreau déviant sur l'autre étrier de la règle;

on obtiendrait ainsi la déviation α' , satisfaisant à l'équation

$$(2) \quad \frac{H}{M} = \frac{2}{R'^3 \sin \alpha'} \left(1 + \frac{a}{R'^2} \right).$$

Le rapport des deux déviations conduirait à la détermination du terme de correction $\frac{a}{R^2}$.

En combinant les équations (1) et (2), on a en effet

$$\frac{a}{R^2} = \frac{\left(\frac{R}{R'} \right)^3 \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha'} - 1}{1 - \left(\frac{R}{R'} \right)^2 \left(\frac{R}{R'} \right)^3 \frac{\sin \alpha}{\sin \alpha'}}.$$

Les expériences de déviations à la distance R' ont donc uniquement pour objet la détermination de $\frac{a}{R^2}$. La valeur du terme a dépendant des dimensions du barreau, on peut l'établir une fois pour toutes et, en l'introduisant directement dans le calcul, supprimer les expériences de déviations à la distance R' : c'est ainsi que nous avons procédé.

La valeur du terme $\frac{a}{R^2}$ a été déterminée par une série d'expériences effectuées en 1884 pour le barreau n° 1 et en 1885 pour le barreau n° 2 (1), à l'aide d'un appareil spécial, de grande sensibilité, construit par MM. Brunner; elle a été vérifiée au retour de l'expédition, en juillet 1887.

2° *Détermination du produit HM.* — Pour déduire le produit HM des oscillations du barreau déviant, on introduit ce barreau dans l'étrier de la cage, et l'on règle l'équipage mobile de façon à obtenir l'état d'équilibre du barreau, comme il a été dit pour la déclinaison. En approchant momentanément de l'appareil un corps magnétique, un objet en fer, par exemple, on provoque des oscillations symétriques de part et d'autre du trait central de l'index I (*fig. 1*).

On note alors, à l'aide d'un compteur à pointage, l'instant précis où l'extrémité du barreau passe devant le fil central de l'index; on compte une à une les vingt premières oscillations, en notant également au pointeur le moment du passage de la vingtième. On continue de pointer les oscillations de vingt en vingt jusqu'à la centième au moins; on peut, d'ailleurs, se dispenser de les compter une à une, si l'on se rappelle la durée totale des vingt premières, durée que l'on ajoute par la pensée au temps indiqué par le premier pointé. Il suffit alors de se mettre en observation quelques instants avant le moment présumé du vingtième passage.

Les différences successives d'un pointé au pointé suivant doivent être des nombres sensiblement constants, si l'expérience a été faite dans de bonnes con-

(1) Le barreau n° 2 est un barreau nouveau, mis en service en octobre 1885.

ditions. Le compteur est d'ailleurs comparé à un chronomètre immédiatement avant et après les oscillations, et il est tenu compte de sa correction, s'il y a lieu. La durée moyenne t d'une oscillation peut ainsi être déterminée très exactement.

Nous avons fait usage du compteur à pointage Breguet n° 538, et du chronomètre Juntas n° 18, appartenant l'un et l'autre au Collège de France. D'après les différentes comparaisons qui ont été faites avant le départ et au retour, à bord des paquebots, dans les observatoires, le retard par jour du chronomètre était compris entre 30 et 40 secondes. Afin de tenir compte de cette correction, on a ajouté régulièrement 0^s, 1 au temps observé pour une série de 100 oscillations, dont la durée était de 5 minutes environ.

En désignant par

H la composante horizontale de l'action de la Terre;

M le moment magnétique du barreau;

K^2 son moment d'inertie;

n le nombre d'oscillations infiniment petites par seconde,

on a la relation

$$(3) \quad HM = \pi^2 K^2 n^2.$$

Le moment d'inertie K^2 des barreaux n'a pas été calculé directement, à cause de la forme concave de leurs extrémités; il a été déterminé par des expériences exécutées à l'observatoire du Parc Saint-Maur, en 1884 pour le barreau n° 1, en 1885 pour le barreau n° 2, et répétées au retour de l'expédition.

La valeur de t , durée moyenne d'une oscillation, d'où l'on déduit n , peut être altérée par différentes causes. Dans la réduction des observations, et en raison des conditions spéciales de l'expérience, on a considéré comme négligeable la correction due à la torsion du fil, et la correction due à l'amplitude des oscillations (*voir* le Mémoire précité).

Si la température restait constante pendant les oscillations et pendant les déviations, il ne serait pas utile d'introduire dans le calcul la correction relative aux modifications que subit le moment magnétique des barreaux sous l'influence des variations de la température. En réalité, cette condition n'est jamais rigoureusement remplie; mais, en prenant la précaution de déduire t d'une double série d'oscillations faites avant et après les expériences de déviations, on pourra éliminer cette correction. On admet alors que la température varie dans le même sens pendant le cours des opérations (ce qui est le cas le plus habituel) et que la moyenne correspondant aux deux séries d'oscillations est sensiblement égale à la température observée pendant les déviations. D'ailleurs, une observation complète ne dure pas plus de 30 à 40 minutes; si donc l'appareil peut être protégé contre l'action directe des rayons solaires, la variation

de la température pendant ce court espace de temps sera généralement faible. On s'en assure d'ailleurs par la lecture du thermomètre avant et après les expériences d'oscillations et de déviations. En fait, on verra au Chapitre II que la température observée pendant les déviations coïncide toujours, à quelques dixièmes de degré près, avec la température moyenne correspondant aux deux séries d'oscillations. Dans les conditions de l'expérience, l'erreur commise en négligeant d'appliquer la correction de température n'est certainement pas supérieure à celle qui pourrait résulter de la difficulté d'assurer que la température du barreau est bien égale à celle qu'indiquerait le thermomètre.

Enfin, les observations n'ont pas été corrigées de l'action inductrice de la Terre, qui représente d'ailleurs une fraction très faible de l'intensité d'aimantation des barreaux.

En définitive, pour déterminer H , on a admis que la méthode d'observation adoptée permettait d'éliminer les différentes corrections, comme restant comprises dans les limites possibles des erreurs d'observation.

La mesure de la composante horizontale, effectuée avec l'un des barreaux comme il vient d'être dit, a été répétée avec le deuxième barreau dans la plupart des stations.

Calcul de la composante horizontale. — En combinant les équations (1) et (3) et substituant à n sa valeur $\frac{1}{t}$, on a

$$(4) \quad H = \frac{\pi K}{R t} \sqrt{\frac{2 \left(1 + \frac{a}{R^2}\right)}{R \sin \alpha}}.$$

La distance R , mesurée par M. Brunner, est de 15^{cm}, 1807; les constantes relatives aux moments d'inertie et au terme de correction $\frac{a}{R^2}$ sont les suivantes :

	K^2 .	$\frac{a}{R^2}$.
Barreau n° 1.....	26,936	0,04127
Barreau n° 2.....	27,187	0,04361

En remplaçant, dans l'équation (4), toutes les quantités connues par leurs valeurs numériques, on obtiendra une constante unique pour chaque barreau :

$$\log C_1 = \overline{1},5996755,$$

$$\log C_2 = \overline{1},6021770.$$

Le calcul de la composante horizontale s'effectue alors par l'une des expressions suivantes, selon le barreau qui a servi aux expériences :

$$\text{Barreau n° 1.....} \quad \log H_1 = \frac{\overline{1},5996755}{\log t_1 + \frac{1}{2} \log \sin \alpha_1},$$

$$\text{Barreau n° 2.....} \quad \log H_2 = \frac{\overline{1},6021770}{\log t_2 + \frac{1}{2} \log \sin \alpha_2}.$$

Nous donnons ci-dessous un exemple d'observation et de calcul.

MECHERIA.

1^{er} juin 1887.

COMPOSANTE HORIZONTALE.

Barreau n° 1. — De 4^h 20^m à 4^h 50^m du matin (temps local).

$$\theta = 16^{\circ}, 4.$$

OSCILLATIONS. — Première série.

Oscillations.	Pointeur.		Comparaison du pointeur Breguet n° 538.	
	^m ^s	^m ^s		
0.....	8.59,0	1. 2,0		
20.....	10. 1,0	1. 2,0		
40.....	11. 3,0	1. 2,0		
60.....	12. 5,0	1. 2,0		
80.....	13. 7,0	1. 2,0		
100.....	14. 9,1	1. 2,1		
		5.10,1		
			Chronomètre Juntas n° 18.	Pointeur.
		Avant les oscillations....	13 ^m 0 ^s ,0	8 ^m 44 ^s ,9
		Après les oscillations....	19 ^m 0 ^s ,0	14 ^m 44 ^s ,5
		Différence.....	6 ^m 0 ^s ,0	5 ^m 59 ^s ,6

$$\theta = 16^{\circ}, 4.$$

Temps observé pour la durée de 100 oscillations.....	310 ^s ,1
Correction du pointeur	» » + 0 ^s ,4
» du chronomètre	» » + 0 ^s ,1
Durée de 100 oscillations.....	310 ^s ,6

$$\text{Durée de 1 oscillation } t_1 = 3^s, 106.$$

DÉVIATIONS.

Petite distance..... R = 15,1807.
Repère de l'aiguille..... 166° 2' 0".

Règle à l'Est.

Pôle Nord de l'aimant déviant vers l'appareil... 152° 7' 30" }
Pôle Sud » » » 179° 41' 0" } 27° 33' 30"

$$\delta_1 = \frac{27^{\circ} 33' 30''}{2} = 13^{\circ} 46' 45''.$$

Règle à l'Ouest.

Pôle Nord de l'aimant déviant vers l'appareil... 180° 5' 30" }
Pôle Sud » » » 152° 14' 30" } 27° 51' 0"

$$\delta_2 = \frac{27^{\circ} 51' 0''}{2} = 13^{\circ} 55' 30''.$$

$$\theta = 16^{\circ}, 4.$$

$$\alpha = \frac{13^{\circ} 46' 45'' + 13^{\circ} 55' 30''}{2} = 13^{\circ} 51' 8''.$$

OSCILLATIONS. — Deuxième série.

Oscillations.	Pointeur.		Comparaison du pointeur Breguet n° 538.	
	^{m s} 9.21,6	^{m s} 1. 2,0		
20.....	10.31,6	1. 2,0		
40.....	11.33,6	1. 2,0		
60.....	12.35,6	1. 2,0		
80.....	13.37,6	1. 2,0		
100.....	14.39,6	1. 2,0		
	5.10,0			
			Chronomètre Juntas n° 18.	Pointeur.
		Avant les oscillations....	38 ^m 30 ^s ,0	14 ^m 14 ^s ,3
		Après les oscillations....	44 ^m 30 ^s ,0	20 ^m 13 ^s ,8
		Différence.....	6 ^m 0 ^s ,0	5 ^m 59 ^s ,5

$$\theta = 16^{\circ},4.$$

Temps observé pour la durée de 100 oscillations.....	310 ^s ,0	
Correction du pointeur	»	+ 0 ^s ,5
» du chronomètre	»	+ 0 ^s ,1
Durée de 100 oscillations.....	310 ^s ,6	

$$\text{Durée de 1 oscillation } t_2 = 3^s,106.$$

$$t = \frac{3,106 + 3,106}{2} = 3^s,106.$$

Calcul.

$$\text{Barreau n° 1. — } \alpha = 13^{\circ}51'8'', \quad t = 3^s,106.$$

$$\log C_1 = 1,5996755$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{1}{2} \log \sin \alpha = 1,6895788 \\ \log t = 0,4922015 \end{array} \right\} 0,1817803$$

$$\log H_1 = 1,4178952$$

$$H_1 = 0,26175.$$

Inclinaison.

La boussole de voyage dont on a donné la description plus haut est actuellement munie de deux aiguilles. Afin de rendre plus rigoureusement comparables entre eux les résultats obtenus, on a employé presque exclusivement l'aiguille portant le n° 2, qui avait déjà servi aux déterminations analogues faites en France. Les aiguilles se distinguent par un point ou par deux points gravés sur une des faces de la monture du pivot et d'un seul côté de l'axe. La position de cette marque sert à déterminer celle de l'aiguille.

Les mesures de l'inclinaison ont toujours été effectuées par la méthode directe, c'est-à-dire dans le plan du méridien magnétique. L'appareil étant fixé sur son pied et réglé au moyen des vis calantes, on commence par chercher le plan perpendiculaire ; pour cela, le zéro de la graduation du cercle vertical est amené à coïncider avec le zéro du vernier ; nous avons vu que, dans cette position du cercle, la ligne passant par le centre des miroirs est verticale. On tourne alors la cage de la boussole jusqu'à ce que l'aiguille soit elle-même verticale, c'est-à-dire

que les images de ses pointes, réfléchies par les miroirs, soient vues au microscope dans le prolongement des pointes elles-mêmes. On lit alors le cercle horizontal.

On tourne l'équipage de 180° environ, et l'on répète la même opération ; la moyenne des deux lectures du vernier donne la trace du plan perpendiculaire au méridien magnétique sur le cercle horizontal. En tournant la cage de 90° , l'aiguille est amenée dans le plan du méridien magnétique.

Pour que l'inclinaison puisse être déterminée rigoureusement par une seule lecture, il faut :

- 1° Connaître la ligne d'horizon sur le cercle vertical ;
- 2° Que l'axe de l'aiguille passe par le centre du cercle ;
- 3° Que l'axe magnétique de l'aiguille soit parallèle à la ligne des pointes ;
- 4° Que le centre de gravité de l'aiguille soit situé sur l'axe qui la supporte ;
- 5° Que le plan des agates soit horizontal.

Quel que soit le soin apporté à la construction, ces conditions ne sont jamais réalisées d'une manière absolue ; mais toutes les causes d'erreurs peuvent être éliminées par l'observation, savoir : la deuxième, en observant chaque fois les deux pointes de l'aiguille, et prenant la moyenne ; la première et la cinquième, en tournant l'équipage de 180° ; la troisième, en retournant l'aiguille face pour face ; enfin, la quatrième, en renversant les pôles de l'aiguille.

La mesure de l'inclinaison a toujours été complète, c'est-à-dire qu'elle a comporté tous les retournements dont il vient d'être parlé.

Avant de placer l'aiguille dans la boussole, on l'essuie, ainsi que les pivots, d'abord avec une peau, puis avec un pinceau affecté exclusivement à cet usage. On examine les pivots à la loupe, pour s'assurer que toute trace de poussière a disparu, et l'on pose l'aiguille sur les agates, préalablement époussetées au pinceau ; on la soulève à plusieurs reprises en la laissant reposer doucement ; on note en même temps la position de la marque par rapport à la face de l'instrument, c'est-à-dire au côté qui correspond à la graduation du cercle vertical. Lorsque les oscillations sont très affaiblies, ce qui arrive rapidement, on amène le cercle vertical dans une position telle que le centre du miroir supérieur vienne coïncider avec la pointe supérieure de l'aiguille, et on lit le cercle vertical ; puis, sans toucher à l'aiguille, on fait un second pointé sur la pointe inférieure. On soulève alors l'aiguille, et l'on fait deux nouveaux pointés, haut et bas. Ces pointés sont toujours répétés au moins trois fois pour chaque position de l'aiguille, en soulevant l'aiguille avant chaque double lecture.

La marche des opérations est indiquée dans le Tableau suivant, extrait du carnet d'observation.

MECHERIA.

1^{er} juin 1887.INCLINAISON. — De 5^h50^m à 6^h20^m du matin (temps local). — Aiguille n° 2.*Recherche du méridien magnétique.*

Plan perpendiculaire : Face au Nord.	198° 1'
» Face au Sud.	18° 23'
	216° 24'
Méridien magnétique : Face à l'Est.	108° 12'
» Face à l'Ouest.	288° 12'

Première aimantation. — Marque en bas.

Marque en avant.				Marque en arrière.			
Face à Est : 108° 12'.		Face à Ouest : 288° 12'.		Face à Ouest : 288° 12'.		Face à Est : 108° 12'.	
Haut.	Bas.	Haut.	Bas.	Haut.	Bas.	Haut.	Bas.
38.58 ⁰ /	38.52 ⁰ /	321.15 ⁰ /	321.15 ⁰ /	321. 9 ⁰ /	321. 9 ⁰ /	38.42 ⁰ /	38.38 ⁰ /
58	52	15	15	10	10	42	38
58	52	16	16	8	8	42	38
38.58,0	38.52,0	321.15,3	321.15,3	321. 9,0	321. 9,0	38.42,0	38.38,0
38° 55',0		321° 15',3		321° 9',0		38° 40',0	

Deuxième aimantation. — Marque en haut.

Marque en avant.				Marque en arrière.			
Face à Est : 108° 12'.		Face à Ouest : 288° 12'.		Face à Ouest : 288° 12'.		Face à Est : 108° 12'.	
Haut.	Bas.	Haut.	Bas.	Haut.	Bas.	Haut.	Bas.
38.36 ⁰ /	38.32 ⁰ /	321. 7 ⁰ /	321. 7 ⁰ /	321.15 ⁰ /	321.15 ⁰ /	38.41 ⁰ /	38.38 ⁰ /
36	32	7	7	15	15	41	38
35	31	7	7	16	16	41	38
38.35,7	38.31,7	321. 7,0	321. 7,0	321.15,3	321.15,3	38.41,0	38.38,0
38° 33',7		321° 7',0		321° 15',3		38° 39',5	

RÉSUMÉ.

Première aimantation.

Face à Est.	Face à Ouest.
38° 55',0	321° 15',3
40',0	9',0
38° 47',5	321° 12',1
	38° 47',5
	282° 24',6
	— 180°
	2 I ₁ = 102° 24',6
	I ₁ = 51° 12',3
	I = $\frac{51° 12',3 + 51° 17',3}{2}$ = 51° 14',8.

Deuxième aimantation.

Face à Est.	Face à Ouest.
38° 33',7	321° 7',0
39',5	15',3
38° 36',6	321° 11',2
	38° 36',6
	282° 34',6
	— 180°
	2 I ₂ = 102° 34',6
	I ₂ = 51° 17',3

Comparaison des appareils de voyage, en cours de route.

Notre passage en différents établissements munis d'une installation magnétique a permis de comparer nos résultats avec les observations locales. Cette comparaison a pu être faite aux observatoires de Naples, de San Fernando et de Perpignan.

A Naples, M. Brioschi a eu l'obligeance de faire lire le déclinomètre pendant nos observations de la déclinaison. La composante horizontale a été observée seulement le 5 mai avec le magnétomètre de l'observatoire et l'inclinaison les 11 avril et 8 mai; les résultats de ces observations ont été ramenés au 29 avril.

L'observatoire de la Marine espagnole, à San Fernando, possède un magnétographe du système de Kew. Les nombres relatifs à cette station nous ont été fournis par M. Pujazon; ils ont été relevés sur les courbes de variations, d'après les repères adoptés.

A l'observatoire de Perpignan, M. Cœurdevache a opéré simultanément sur le pilier du pavillon, tandis que nous observions sur le pilier du jardin.

Nous donnons ci-dessous les résultats de ces comparaisons :

Stations.	Dates.	Heures locales.	Boussole		Différence.
			de l'observatoire.	de voyage.	
Déclinaison.					
Naples.....	29 avril 1887	de ^{h m} 3.35 à ^{h m} 4.20 s.	[°] 10.19,7	[°] 10.20,9	+1,2
San Fernando....	13 juin 1887	de 0.50 à 1.25 s.	17. 0,5	17. 1,0	+0,5
Perpignan.....	25 juin 1887	de 8.10 à 8.55 m.	14.37,2	14.37,7	+0,5
Composante horizontale.					
Naples.....	29 avril 1887	de 4.30 à 5.30 s.	0,23914	0,23944	+0,00030
San Fernando....	13 juin 1887	de 8.45 à 9.55 m.	0,24307	0,24293	—0,00014
Perpignan.....	25 juin 1887	de 6.20 à 7.40 m.	0,22165	0,22166	+0,00001
Inclinaison.					
Naples.....	29 avril 1887	de 5.50 à 6.30 s.	[°] 56.51,2	[°] 56.50,3	—0,9
San Fernando....	13 juin 1887	de 10.10 à 11. 5 m.	56.3	55.59,5	—3,5
Perpignan.....	24 juin 1887	de 5 à 6 s.	60.21,4	60.20,9	—0,5

III. — RÉDUCTION DES OBSERVATIONS AU 1^{er} JANVIER 1888.

Pour comparer les observations entre elles en les ramenant à une date unique, on s'est servi des courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, près Paris. Cet appareil, du modèle de M. Mascart, enregistre à la fois, sur une même feuille de papier au gélatinobromure d'argent, les variations

de la déclinaison et celles des deux composantes de la force terrestre. Les valeurs des repères des trois courbes sont contrôlées, au moins une fois par semaine, par des mesures absolues effectuées sur un pilier extérieur au pavillon magnétique; de plus, on vérifie régulièrement deux fois par mois, par des graduations, la sensibilité des appareils de variations. La marche du magnétographe a été très régulière et l'enregistrement des courbes n'a subi aucune lacune pendant la durée de nos opérations dans le bassin de la Méditerranée. L'aide attaché au service magnétique depuis plus de trois années, M. L. Logeat, s'est acquitté de ce soin avec le plus grand zèle.

Les observateurs qui viendront après nous en Algérie pourront sans doute comparer leurs observations à des courbes de variations obtenues dans la région même, car l'installation d'un magnétographe à l'observatoire d'Alger est activement poursuivie par M. Trépied; mais, dans l'état actuel, nous avons dû nous contenter de nos propres moyens. Chacune des mesures absolues faites en voyage, déclinaison, inclinaison, composante horizontale, a donc été comparée respectivement aux valeurs correspondantes de ces éléments au Parc Saint-Maur, déduites des courbes relevées au magnétographe. Ces comparaisons ont été faites au temps local. On a commencé par établir les valeurs absolues de la déclinaison au Parc Saint-Maur, pour tous les instants correspondant aux diverses mesures de cet élément en voyage, puis on a fait de même pour la composante horizontale et pour l'inclinaison. L'enregistreur magnétique ne donnant pas directement la variation de l'inclinaison I , on a calculé cet élément au moyen de la relation

$$\text{tang } I = \frac{Z}{H},$$

Z et H étant fournis par le dépouillement des courbes de la balance et du bifilaire. On a ainsi obtenu, pour chaque élément, les différences entre les valeurs relevées au Parc Saint-Maur et celles observées dans chacune des stations.

Nous ne nous dissimulons pas qu'on ne saurait en toute rigueur comparer à des observations faites dans le voisinage de Paris les résultats obtenus à des latitudes très différentes. Cette méthode, sous les réserves dont il est parlé plus loin, peut être suffisamment correcte lorsque la variation diurne est régulière; mais, en temps d'agitation magnétique, elle comporte moins de précision. Les phénomènes sont alors simultanés, et les comparaisons, au lieu d'être faites au temps local, doivent être ramenées à un même moment; d'autre part, il n'est pas certain que les anomalies soient identiques de forme et qu'elles présentent les mêmes détails à Tunis, par exemple, qu'à Paris. Nous devons dire toutefois que les courbes magnétiques de Perpignan se superposent bien à celles du Parc Saint-Maur, même celles qui correspondent aux grandes perturbations, l'amplitude des oscillations étant seulement affaiblie à Perpignan.

On a indiqué, au détail des observations, l'état magnétique correspondant aux diverses mesures absolues effectuées en campagne. Aucune grande perturbation ne s'est produite pendant la période considérée.

La comparaison d'observations faites sur divers parallèles montre que l'amplitude de la variation diurne de la déclinaison diminue avec la latitude, au moins pendant les mois de la saison chaude, les seuls dont nous ayons à nous occuper ici.

En vue de vérifier directement la variation de cette amplitude, dont la loi est encore mal connue, nous avons effectué des mesures absolues aux moments du minimum et du maximum diurnes, en trois stations, dont deux, Biskra et Mechéria, sont parmi les plus méridionales de notre réseau, et la troisième, Aïn Temouchent, la plus occidentale en Algérie. Malheureusement, la marche diurne de la déclinaison n'a pas été suffisamment régulière les jours de ces observations pour qu'il ait été possible d'utiliser les résultats à ce point de vue spécial; mais nous aurons des indications plus précises sur ce sujet, en comparant l'amplitude de la variation diurne au Parc Saint-Maur, pendant les mois de mai et juin 1887, avec les résultats analogues obtenus dans les observatoires de Greenwich, Perpignan, Naples et San Fernando.

MM. W.-H.-M. Christie, le Dr Fines, F. Brioschi et C. Pujazon nous ont obligeamment fourni les éléments de cette comparaison; nous attachons une importance spéciale aux données de l'observatoire de San Fernando, situé précisément à la latitude moyenne de la plupart de nos stations dans le nord de l'Afrique.

Mai et juin 1887.

Observatoires.	Variation de la déclinaison.	Différence.
<i>De 7^h m. à 1^h s.</i>		
Le Parc Saint-Maur.....	9,3 }	—0',3
Greenwich.....	9,6 }	
<i>Différence moyenne entre les minima et maxima réguliers.</i>		
Le Parc Saint-Maur.....	10,8 }	+1',2
Perpignan.....	9,6 }	
<i>De 7^h m. à 2^h s.</i>		
Le Parc Saint-Maur.....	9,0 }	+1',0
Naples.....	8,0 }	
<i>De 7^h m. à 1^h s.</i>		
Le Parc Saint-Maur.....	9,3 }	+2',1
San Fernando.....	7,2 }	

D'un autre côté, M. L. Teisserenc de Bort a installé à Biskra un petit déclinomètre à lecture directe; il résulte d'observations faites à diverses reprises que la variation diurne de la déclinaison, pendant les mois d'été, est de 3' moindre à Biskra qu'au Parc Saint-Maur.

La comparaison des courbes de la déclinaison au Parc Saint-Maur, à Perpignan, à Naples et à San Fernando, montre qu'il serait assez indifférent de prendre l'une ou l'autre de ces stations comme point de comparaison, si les mesures absolues en campagne avaient été faites vers 10^h du matin ou 6^h du soir, alors que la déclinaison passe par sa valeur moyenne; mais, comme nous l'avons dit, nous avons surtout opéré aux heures tropiques. Pour ramener en chaque station les valeurs du déclinographe du Parc Saint-Maur à ce qu'elles auraient été si cet appareil eût fonctionné à la station même, on leur a donc fait subir une correction relative à la latitude du lieu et à l'heure de l'observation. Bien que, en réalité, cette correction surpasse rarement 1', nous avons pensé qu'il était légitime de l'indiquer et d'en tenir compte.

Nous donnons d'ailleurs, au Chapitre II, pour chaque station, le résultat direct de l'observation, auquel il sera toujours loisible de se reporter.

La *correction de latitude* appliquée aux valeurs de la déclinaison relevées à l'observatoire du Parc Saint-Maur est indiquée dans la Table suivante, dressée d'après les observations comparatives des divers magnétographes dont il vient d'être parlé.

Correction de latitude.

Latitude.	6 ^h .	7 ^h .	8 ^h .	9 ^h .	10 ^h .	11 ^h .	Midi.	1 ^h .	2 ^h .	3 ^h .	4 ^h .	5 ^h .	6 ^h .
42°.....	+0,3	+0,4	+0,4	+0,3	0,0	-0,3	-0,4	-0,5	-0,5	-0,4	-0,3	-0,2	0,0
40°.....	+0,4	+0,5	+0,5	+0,4	0,0	-0,4	-0,6	-0,7	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	0,0
38°.....	+0,5	+0,6	+0,6	+0,4	0,0	-0,5	-0,8	-0,9	-0,9	-0,7	-0,5	-0,3	0,0
36°.....	+0,6	+0,8	+0,8	+0,5	0,0	-0,6	-0,9	-1,1	-1,1	-0,9	-0,6	-0,4	-0,1
34°.....	+0,7	+0,9	+0,9	+0,6	0,0	-0,8	-1,1	-1,2	-1,2	-1,0	-0,7	-0,4	-0,1

Pour la composante horizontale et l'inclinaison, on a admis que le rapport entre la variation diurne de ces deux éléments à Paris et dans les divers points d'observation est assez faible pour qu'il ait été possible de négliger une correction, d'ailleurs difficile à établir, et certainement comprise dans les limites possibles des erreurs d'observation. On a donc comparé directement les valeurs de H et de I obtenues en voyage aux valeurs correspondantes relevées à l'observatoire du Parc Saint-Maur.

Enfin, comme l'époque de réduction à une date unique diffère seulement de quelques mois de l'époque à laquelle ont été faites toutes les observations, on a pu admettre, sans erreur appréciable, l'uniformité de la variation séculaire des divers éléments à Paris et en Algérie pendant ce court espace de temps.

Les valeurs des éléments magnétiques au Parc Saint-Maur, au 1^{er} janvier 1888, ont été déduites de la demi-somme des valeurs moyennes horaires obtenues pendant les mois de décembre 1887 et janvier 1888 :

Valeurs absolues des éléments magnétiques à l'observatoire du Parc Saint-Maur, au 1^{er} janvier 1888.

	D.	H.	I.
Décembre 1887.....	15°.52',3	0,18481	65°.14',8
Janvier 1888.....	15.52,2	0,18479	65.15,0
1 ^{er} Janvier 1888.....	15.52,2	0,18480	65.14,9

En ajoutant à ces valeurs les différences établies par les observations comparatives des diverses stations et celles du Parc Saint-Maur, modifiées, pour la déclinaison, par la correction de latitude, on a obtenu les nombres dont on trouvera le Tableau résumé au Chapitre III, et qui ont servi à dresser les Cartes magnétiques jointes à cet Ouvrage.

CHAPITRE II.

DÉTAIL DES OBSERVATIONS.

Les observations ont été effectuées en une seule campagne, du 19 avril au 25 juin 1887, dans l'ordre suivant :

Corse : Ajaccio, Bonifacio, Corte, Bastia;

Italie : Livourne, Rome, Naples;

Malte : La Valette, Città Vecchia;

Tripolitaine : Tripoli;

Tunisie : Gabès, Sfax, Sousse, Tunis, Carthage, la Manouba, Souk-el-Arba;

Algérie : Souk-Ahras, Bône, Duzerville, le Kroubs, Biskra, Batna, Philippeville, Constantine, Sétif, Bordj-Bouira, Ménerville, Alger, Maison Carrée, Boudzaréah, Boufarik, Affreville, Orléansville, Arzew, Saïda, Mecheria, Mascara, Sidi-bel-Abbès, Magenta, Aïn-Temouchent, Oran;

Maroc : Tanger;

Espagne : Malaga, Algésiras, San Fernando, Almeria, Carthagène, Alicante, Valence, Barcelone;

France : Perpignan.

Dans les Tableaux qui suivent, les stations ont été classées d'après l'ordre alphabétique. Leurs coordonnées géographiques sont extraites des feuilles parues de la *Carte topographique de l'Algérie* au $\frac{1}{50000}$ et de la *Carte provisoire de la Tunisie* au $\frac{1}{200000}$, publiées par le Dépôt de la Guerre; de la *Connaissance des Temps*, et, pour quelques stations, de la *Carte de l'Algérie* au $\frac{1}{800000}$ dressée au Dépôt de la Guerre en 1876.

Les indications sommaires relatives à la nature des terrains en Algérie ont été empruntées à la *Carte géologique provisoire* de MM. Pomel, Pouyanne et Tissot.

I. — AFFREVILLE.

28 MAI 1887.

Station.

Le village d'Affreville est situé à 5^{km} au sud de Miliana, dans la vallée et sur la rive droite du Chelif, sur la limite Nord de la plaine de ce nom, au pied du massif montagneux que couronne le Djebel Zaccar.

Le point d'observation a été choisi au sud du village et de la route nationale n° 4, à 800^m au sud du chemin de fer, à 100^m au sud-est de l'école communale des garçons, sur le bord de l'Oued es Seba, qui descend des hauteurs de Miliana et se jette dans le Chelif, à 3^{km} au sud d'Affreville. Altitude, 301^m.

Terrain d'alluvion; dans les calcaires du Zaccar, à 9^{km} ou 10^{km} au Nord, se trouvent des amas considérables de fer hydroxydé.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 0° 6', 9 O.
Latitude..... 36° 15', 5 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été déduite de dix observations du Soleil, faites de 8^h 28^m à 8^h 46^m du matin (temps moyen local). On s'est repéré sur un tronc d'arbre situé sur une montagne au N.-N.-O., à une distance d'environ 3^{km}. Baromètre, 734^{mm}; thermomètre, 22°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	175.29,6
	175.29,4
	175.29,5
	175.29,8
	175.29,9
Moyenne.....	175.29,6
Azimut du repère (1).....	335° 1', 4.

Déclinaison.

La déclinaison a été déterminée par deux mesures complètes, effectuées avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 7^h 45^m à 8^h 20^m du matin (temps moyen local).

Les résultats sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 45 ^m à 8 ^h	161.30,9	} 161.30,8
» n° 2. — De 8 ^h 5 ^m à 8 ^h 20 ^m	161.30,8	
Méridien géographique.....	175.29,6	
Méridien magnétique.....	161.30,8	

(1) A moins d'indications contraires, les azimuts sont comptés à partir du Nord, par l'Est.

Déclinaison.....	13.58,8
Déclinaison correspondante au Parc S ^t -Maur.	15.53,0
Correction de latitude.....	+ 0,8
	15.53,8
Différence : Le Parc-Affreville.....	1.55,0

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Affreville.....	1.55,0
<i>Déclinaison</i> à Affreville le 1 ^{er} janvier 1888.....	13.57,2

Composante horizontale.

La composante horizontale a été observée également avec les deux barreaux de la boussole, de 6^h 20^m à 7^h 25^m du matin (temps moyen local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de cent oscillations du barreau déviant.

Les observations ont été faites à l'ombre, sous un des saules plantés sur les bords de l'oued. En voici les résultats :

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N ^o 1....	14° 15' 52"	3 ^s , 1940	14°, 2	14°, 1	0,25091	} 0,25096
N ^o 2....	16° 41' 58"	2 ^s , 9735	15°, 4	15°, 3	0,25102	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19456	
Différence : Affreville-Le Parc.....					0,05640	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Affreville-Le Parc.....	0,05640
<i>Composante horizontale</i> à Affreville le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25120

Inclinaison.

L'inclinaison a été obtenue par une seule observation, faite avec l'aiguille n^o 2 de la boussole, de 5^h 30^m à 6^h du matin (temps local). On a trouvé :

Marque en haut.....	54° 0', 2	} 53.59,2
Marque en bas.....	53° 58', 2	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,3	
Différence : Le Parc-Affreville.....	11.16,1	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Affreville.....	11.16,1
<i>Inclinaison</i> à Affreville le 1 ^{er} janvier 1888.....	53.58,8

D'après les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, les observations d'Affreville correspondent à une très faible agitation magnétique.

II. — AIN TEMOUCHENT.

5 JUIN 1887.

Station.

La ville est bâtie à la limite orientale de la région volcanique qui s'étend à l'Ouest jusqu'à la côte, vers l'embouchure de la Tafna.

Le trépied a été installé dans un champ situé à 300^m au sud-est du mur d'enceinte, près de la route de Sidi-bel-Abbès, à 1200^m environ au sud-est de la gare. Altitude, 247^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 3°28'6 O.
Latitude..... 35°17'0 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déduit de dix observations du Soleil, faites de 7^h16^m à 7^h34^m du matin (temps local). On s'est repéré sur un marabout bâti au sommet d'une montagne, à 10^{km} environ dans la direction du Nord-Ouest.

Baromètre, 743^{mm}; thermomètre, 19°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	84.18,4
	84.18,5
	84.19,2
	84.18,6
	84.19,0
Moyenne.....	84.18,7

L'azimut du marabout, compté à partir du Nord par l'Ouest, est de 27°52',7.

Déclinaison.

Quatre mesures complètes de la déclinaison ont été effectuées, savoir : deux de 6^h25^m à 7^h du matin, et deux de 0^h30^m à 1^h5^m du soir (temps local).

*Première série. — Matin.**Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.*

Barreau n° 1. — De 6 ^h 25 ^m à 6 ^h 40 ^m	69.11,1	} 69.10,7
Barreau n° 2. — De 6 ^h 45 ^m à 7 ^h 0 ^m	69.10,3	
Méridien géographique.....	84.18,7	
Méridien magnétique.....	69.10,7	
Déclinaison.....	15. 8,0	

Deuxième série. — Soir.

La seconde série a été faite exactement au même point, vers le moment du maximum de la déclinaison.

Visée sur le marabout.....	115°52',8	
Azimut du marabout.....	27°52',7	
Méridien géographique.....	143°45',5	

Trace du méridien magnétique.

Barreau n° 1. — De 0 ^h 30 ^m à 0 ^h 45 ^m	128.27,5	} 128.27,6	
Barreau n° 2. — De 0 ^h 50 ^m à 1 ^h 5 ^m	128.27,7		
Déclinaison.....	15.17,9		
Moyenne des deux séries d'observation.....	15.13,0		
Déclinaison moyenne correspondante au Parc Saint-Maur....	15.56,6	} 15.56,5	
Correction de latitude $\frac{(+ 0',7 - 1',0)}{2}$	— 0',1		
Différence : Le Parc-Aïn Temouchent.....	0.43,5		

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Aïn Temouchent.....	0.43,5
<i>Déclinaison</i> à Aïn Temouchent le 1 ^{er} janvier 1888..	15. 8,7

Composante horizontale.

La composante horizontale a été mesurée successivement avec les deux barreaux de la boussole, de 7^h 55^m à 9^h 10^m du matin (temps local). Le temps d'une oscillation a été, dans chaque cas, déduit de deux séries de 100 oscillations du barreau déviant. L'appareil était placé à l'ombre, sous un figuier au feuillage épais.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	14° 4' 37"	3 ^s , 1750	18°, 8	18°, 8	0,25406	} 0,25409
N° 2....	16° 27' 5"	2 ^s , 9585	19°, 2	19°, 1	0,25413	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19476	
Différence : Aïn Temouchent-Le Parc.....					0,05933	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Aïn Temouchent-Le Parc.....	0,05933
<i>Composante horizontale</i> à Aïn Temouchent le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25413

Inclinaison.

L'inclinaison n'a été observée qu'une seule fois, de 5^h à 5^h 40^m du matin (temps local), avec l'aiguille n° 2.

Marque en haut.....	53.31,4	} 53.29,7	
Marque en bas.....	53.28,0		
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.13,8		
Différence : Le Parc-Aïn Temouchent.....	11.44,1		

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Aïn Temouchent.....	11.44,1
<i>Inclinaison</i> à Aïn Temouchent le 1 ^{er} janvier 1888..	53.30,8

Les courbes magnétiques relevées à l'observatoire du Parc Saint-Maur sont agitées dans la journée du 5 juin, principalement après 8^h du matin.

III. — AJACCIO.

19 AVRIL 1887.

Station.

On s'est établi à l'École normale primaire d'instituteurs, située sur la côte, à 1200^m environ à l'ouest du port, à l'extrémité de la ville. Les appareils ont été placés à 40^m au nord du bâtiment principal, au milieu d'une allée du jardin. Altitude, 20^m.

M. Gagnière, directeur de l'École normale, a bien voulu se mettre à notre disposition et nous donner des indications de diverse nature qui nous ont été très utiles dans les autres stations qu'il nous a été possible de faire en Corse.

Coordonnées de l'École normale d'Ajaccio.

Longitude..... 6° 23', 4 E.
Latitude..... 41° 54', 7 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été conclue de dix observations du Soleil, faites de 3^h59^m à 4^h19^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur la pointe d'un rocher situé à 12^{km} environ dans la direction du Sud, au delà du golfe d'Ajaccio.

Baromètre, 766^{mm}; thermomètre, 15°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	263.42,5
	263.42,9
	263.42,4
	263.43,6
	263.42,9
Moyenne.....	263.42,9
Azimut du repère.....	181° 22', 6

Déclinaison.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement servi à la mesure de la déclinaison, de 2^h5^m à 2^h40^m du soir (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 2 ^h 5 ^m à 2 ^h 20 ^m	251.26,1	} 251.26,0
Barreau n° 2. — De 2 ^h 25 ^m à 2 ^h 40 ^m	251.25,8	
Méridien géographique.....	263.42,9	
Méridien magnétique.....	251.26,0	
Déclinaison.....		12.16,9
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	16. 1,1	} 16. 0,7
Correction de latitude.....	— 0,4	
Différence : Le Parc-Ajaccio.....		3.43,8

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Ajaccio.....	3.43,8
<i>Déclinaison</i> à Ajaccio le 1 ^{er} janvier 1888.....	12. 8,4

Composante horizontale.

La valeur de la composante horizontale a été déduite également d'observations faites avec les deux barreaux de la boussole, de 2^h45^m à 3^h50^m du soir (temps local). Dans chaque cas, il a été fait une série de 100 oscillations du barreau déviant avant et après les expériences de déviations.

L'appareil était placé au soleil.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	16° 6' 48"	3°, 3025	17°, 3	17°, 3	0,22865	} 0,22888
N° 2....	19° 29' 10"	3°, 0235	15°, 8	15°, 8	0,22912	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19463	
Différence : Ajaccio-Le Parc.....					0,03425	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Ajaccio-Le Parc.....	0,03425
<i>Composante horizontale</i> à Ajaccio le 1 ^{er} janvier 1888.	0,22905

Inclinaison.

Deux mesures absolues de l'inclinaison ont été effectuées de 4^h35^m à 5^h55^m du soir (temps local), avec les deux aiguilles de la boussole.

On a trouvé :

Aiguille n° 1. — Marque en haut.....	58.48,5	} 58.48,1
» Marque en bas.....	58.47,7	
Aiguille n° 2. — Marque en haut.....	58.48,1	} 58.48,9
» Marque en bas.....	58.49,6	
Inclinaison.....	58.48,5	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,7	
Différence : Le Parc-Ajaccio.....	6.26,2	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Ajaccio.....	6.26,2
<i>Inclinaison</i> à Ajaccio le 1 ^{er} janvier 1888.....	58.48,7

Les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur montrent que les expériences d'Ajaccio ont été faites en temps de calme magnétique.

IV. — ALGER (Jardin d'Essai).

24 MAI 1887.

Station.

Les observations ont été faites au *Jardin d'Essai*, situé près de la côte, à 3^{km} au sud-sud-est de la jetée du Sud, entre la route de Koubba et celle de Maison-Carrée. Terrain d'alluvion. On s'est établi dans la partie ouest du Jardin, sous une allée couverte, en un point distant de 100^m environ au nord-est de la route de Koubba, et de 500^m au sud-ouest de la ligne du chemin de fer. Altitude, 15^m (*voir* Boudzaréah).

M. Thévenet, Directeur du Service météorologique algérien, a bien voulu nous assister dans les opérations.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 0° 44', 3 E.
Latitude..... 36° 44', 9 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déduit de dix observations du Soleil, faites de 4^h 40^m à 4^h 56^m du soir (temps local). On s'est repéré sur la cheminée d'une maison située vers les Arcades, à 500^m à l'Ouest. Baromètre, 763^{mm}; thermomètre, 18°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	277.29,0
	277.28,9
	277.28,6
	277.28,1
	277.28,8
Moyenne....	277.28,7
Azimut du repère.....	260° 37', 5

Déclinaison.

La déclinaison a été observée seulement avec le barreau n° 1 de la boussole, de 5^h 10^m à 5^h 25^m du soir (temps local). Voici le résultat de l'observation :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 5 ^h 10 ^m à 5 ^h 25 ^m	263.38,1
Méridien géographique.....	277.28,7
Méridien magnétique.....	263.38,1
Déclinaison.....	13.50,6
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.58,0
Correction de la latitude.....	— 0,3
Différence : Le Parc-Alger.....	2. 7,1

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Alger.....	2. 7,1
<i>Déclinaison</i> à Alger (Jardin d'Essai) le 1 ^{er} janvier 1888.....	13.45,4

Composante horizontale.

La composante horizontale a été déterminée également avec le barreau n° 1, de 5^h 40^m à 6^h 10^m du soir (temps local). Les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de cent oscillations du barreau déviant.

Les observations ont été faites à l'ombre, l'appareil étant placé sous un néflier du Japon.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Déviations.	Oscillations.	
N° 1.....	14° 31' 30"	3 ^s , 1740	17°, 0	17°, 1	0,25027
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19462
Différence Alger-Le Parc.....					0,05565

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Alger-Le Parc.....	0,05565
<i>Composante horizontale</i> à Alger (Jardin d'Essai) le 1 ^{er} janvier 1888...	0,25045

Inclinaison.

Il n'a été fait qu'une mesure complète de l'inclinaison, de 3^h 50^m à 4^h 20^m du soir (temps local). On s'est servi de l'aiguille n° 2 de la boussole.

Les résultats de l'observation sont les suivants :

Marque en haut.....	54.19,1	} 54.19,6
Marque en bas.....	54.20,2	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,7	
Différence : Le Parc-Alger.....	10.56,1	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Alger.....	10.56,1
<i>Inclinaison</i> à Alger (Jardin d'Essai) le 1 ^{er} janvier 1888.	54.18,8

Les courbes relevées le 24 mai 1887 au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur montrent une faible agitation pendant les observations d'Alger.

Nota. — Le Jardin d'Essai et l'Observatoire (*voir* Boudzaréah) étant situés en des points symétriques par rapport à la ville, la moyenne des observations de ces deux stations donnerait assez exactement la valeur des éléments magnétiques pour le port d'Alger.

V. — ALGÉSIRAS.

12 JUIN 1887.

Station.

A défaut de Gibraltar, où il ne nous a pas été possible d'observer, nous avons pu effectuer des déterminations complètes à 8^{km} à l'ouest du Rocher, sur la côte espagnole de la baie d'Algésiras.

Les observations ont été faites en un point situé à 1^{km} ouest-sud-ouest de la ville de ce nom, à 1^{km} sud-ouest du feu de l'île Verte, à 200^m au sud de la route de Tarifa, sur le bord d'un ruisseau qui se jette directement dans la mer au sud du port. Altitude, 20^m.

Coordonnées du feu de l'île Verte.

Longitude..... 7° 46', 3 O.
Latitude..... 36° 7', 2 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déduit de douze observations du Soleil, faites de 2^h 29^m à 2^h 52^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur le phare de la Pointe-d'Europe, à Gibraltar, à environ 8^{km} à l'Est. Baromètre, 760^{mm}; thermomètre, 27°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

270.57,8
270.58,4
270.58,4
270.58,4
270.58,4
270.58,3
Moyenne..... 270.58,3
Azimut du repère..... 98° 8', 9

Déclinaison.

La déclinaison a été observée successivement avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 1^h 45^m à 2^h 20^m soir (temps local).

Les résultats sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 1 ^h 45 à 2 ^h 0 ^m	254.15,3	} 254.15,5
Barreau n° 2. — De 2 ^h 5 ^m à 2 ^h 20 ^m	254.15,8	
Méridien géographique.....	270.58,3	
Méridien magnétique.....	254.15,5	
Déclinaison		16.42,8
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	16. 1,2	} 16. 0,1
Correction de la latitude.....	— 1,1	
Différence : Algésiras-Le Parc.....		0.42,7

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15.52',2
Algésiras-Le Parc	0.42,7
<i>Déclinaison</i> à Algésiras le 1 ^{er} janvier 1888.....	16.34,9

Composante horizontale.

Comme la déclinaison, la composante horizontale a été mesurée avec les deux barreaux de la boussole, de 11^h15^m du matin à 0^h30^m du soir (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de cent oscillations du barreau déviant.

L'appareil était placé à l'ombre, sous un tremble planté dans une haie d'aloès, formant la clôture d'un jardin.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	14° 43' 20"	3°, 2230	23°, 1	23°, 0	0,24484	} 0,24502
N° 2....	17° 6' 58"	3°, 0080	23°, 3	23°, 3	0,24519	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19473	
Différence : Algésiras-Le Parc.....					0,05029	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Algésiras-Le Parc.....	0,05029
<i>Composante horizontale</i> à Algésiras le 1 ^{er} janvier 1888.	0,24509

Inclinaison.

On n'a fait qu'une seule mesure complète de l'inclinaison, avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 0^h45^m à 1^h20^m du soir (temps local).

Voici le résultat de cette observation :

Marque en haut.....	55° 28',5	} 55.26,8
Marque en bas.....	55° 25',2	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.13,9	
Différence : Le Parc-Algésiras.....	9.47,1	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Algésiras.....	9.47,1
<i>Inclinaison</i> à Algésiras le 1 ^{er} janvier 1888.....	55.27,8

Les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur montrent que les observations d'Algésiras ont été faites en temps de calme magnétique.

VI. — ALICANTE.

21 JUIN 1887.

Station.

Les opérations ont été faites au nord-est de la ville, au nord de l'Abattoir, dans un champ, à 60^m à l'est de la route de Valence, à 400^m au delà du point où cette route quitte la mer pour se diriger vers l'intérieur. La citadelle bâtie sur la montagne qui domine la ville est à 800^m environ du point où l'appareil a été établi. Altitude, 10^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude 2° 48', 8 O.
Latitude 38° 20', 8 N.

Méridien géographique.

Le ciel, couvert jusqu'à 8^h, s'est éclairci peu à peu, et l'on a pu faire douze pointés du Soleil, de 8^h 44^m à 9^h 3^m du matin (temps local), dans de bonnes conditions.

On s'est repéré sur le centre d'une croix placée sur le toit de l'Ermitage, à 600^m environ dans la direction du Nord. Baromètre, 763^{mm}; thermomètre, 26°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	0
	149.9,0
	149.9,3
	149.8,9
	149.9,4
	149.9,5
	149.9,3
Moyenne.....	149.9,2
Azimet du repère.....	352° 22', 6

Déclinaison.

On a mesuré la déclinaison avec les deux barreaux de la boussole, de 8^h 0^m à 8^h 35^m du matin (temps local). Voici les résultats obtenus :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 8 ^h 0 ^m à 8 ^h 15 ^m	133.54,8	} 133.54,6
Barreau n° 2. — De 8 ^h 20 ^m à 8 ^h 35 ^m	133.54,3	
Méridien géographique.....	149. 9,2	
Méridien magnétique.....	133.54,6	
Déclinaison.....		15,14,6
Déclin. correspondante au Parc Saint-Maur.	15.51,4	} 15.51,9
Correction de latitude.....	+0,5	
Différence : Le Parc-Alicante.....		0,37,3

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2 ⁰
Le Parc-Alicante.....	0.37,3
<i>Déclinaison</i> à Alicante le 1 ^{er} janvier 1888.....	15.14,9

Composante horizontale.

La composante horizontale a été déterminée également avec les deux barreaux de la boussole, de 5^h50^m à 7^h0^m du matin (temps local). Dans chaque cas, il a été fait une série de cent oscillations du barreau déviant avant et après les expériences de déviations.

Le ciel était complètement couvert.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	15° 4' 25"	3°, 2575	22°, 3	22°, 4	0, 239 17
N° 2....	17° 30' 48"	3°, 0485	22°, 7	22°, 7	0, 239 25
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0, 19476
Différence : Alicante-Le Parc.....					0, 04460

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0, 19480
Alicante-Le Parc.....	0, 04460
<i>Composante horizontale</i> à Alicante le 1 ^{er} janvier 1888..	0, 23940

Inclinaison.

L'inclinaison a été observée seulement avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 7^h10^m à 7^h40^m du matin (temps local). On a obtenu :

Marque en haut.....	56° 43', 1	} 56.42,5 ⁰
Marque en bas.....	56° 41', 9	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,8	
• Différence : Le Parc-Alicante.....	8.32,3	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9 ⁰
Le Parc-Alicante.....	8.32,3
<i>Inclinaison</i> à Alicante le 1 ^{er} janvier 1888.....	56.42,6

Les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur ont une allure à peu près régulière pendant le temps des opérations faites à Alicante le 21 juin 1887.

VII. — ALMERIA.

19 JUIN 1887.

Station.

Les maisons d'Almeria s'étalent le long de la côte; la ville est construite au pied d'un contrefort de la Sierra Nevada, dont les pentes abruptes s'avancent jusqu'à la mer. Les montagnes des environs renferment du minerai de plomb en exploitation.

On s'est placé à l'ouest de la ville, à 200^m de la jetée, au bord et sur la rive gauche d'un torrent. Altitude, 25^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude.....	4° 48' 4 O.
Latitude.....	36° 50' 3 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal a été déduite de dix observations du Soleil, faites de 7^h 51^m à 8^h 9^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la croix de la cathédrale, à 1200^m environ dans la direction presque exacte de l'Est. Baromètre, 761^{mm}; thermomètre, 23°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	53.26,4
	53.26,5
	53.26,1
	53.26,4
	53.26,5
Moyenne.....	53.26,4
Azimut du repère.....	89° 41', 2

Déclinaison.

On a observé la déclinaison avec les deux barreaux de la boussole, de 7^h 10^m à 7^h 45^m du matin (temps local). Les résultats sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 10 ^m à 7 ^h 25 ^m	37.41,8	} 37.41,9
Barreau n° 2. — De 7 ^h 30 ^m à 7 ^h 45 ^m	37.42,0	
Méridien géographique.....	53.26,4	
Méridien magnétique.....	37.41,9	
Déclinaison.....		15.44,5
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.51,2	} 15.51,9
Correction de latitude.....	+ 0,7	
Différence : Le Parc-Almeria.....		0. 7,4

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15.52,2
Le Parc-Almeria.....	0. 7,4
<i>Déclinaison</i> à Almeria le 1 ^{er} janvier 1888.....	15.44,8

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont été successivement employés à la mesure de la composante horizontale, de 5^h30^m à 6^h40^m du matin (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de cent oscillations du barreau déviant.

Le pays étant absolument dépourvu d'arbres, l'appareil a dû rester en plein soleil pendant les opérations.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	14° 43' 30"	3 ^a ,2245	20°,7	20°,8	0,24470
N° 2....	17° 7' 45"	3 ^a ,0130	21°,7	21°,7	0,24469
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19495
Différence : Almeria-Le Parc.....					0,04975

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Le Parc-Almeria.....	0,04975
<i>Composante horizontale</i> à Almeria le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,24455

Inclinaison.

L'inclinaison a été obtenue par une observation complète, faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 8^h40^m à 9^h20^m du matin (temps local).

Marque en haut.....	55°34',5	} 55°31',8
Marque en bas.....	55°29',2	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,4	
Différence : Le Parc-Almeria	9.42,6	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	65.14',9
Almeria-Le Parc.....	9.42,6
<i>Inclinaison</i> à Almeria le 1 ^{er} janvier 1888.....	55.32,3

L'allure des courbes magnétiques relevées à l'observatoire du Parc Saint-Maur est sensiblement régulière pendant le temps des observations faites à Almeria le 19 juin 1887.

VIII. — ARZEW.

30 MAI 1887.

Station.

On s'est établi au sud-ouest de la ville, à 300^m du rempart, à 600^m à l'ouest du chemin de fer, dans un champ récemment récolté, en un point situé à peu près sur le milieu de la ligne droite qui serait tracée entre le village nègre et le point de jonction des routes de Mostaganem et d'Oran. Altitude, 12^m. Terrain pliocène; au Nord, schistes qui s'étendent jusqu'au cap Carbon.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 2°38',9 O.
Latitude..... 35°51',6 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal résulte de dix observations du Soleil, faites de 6^h50^m à 7^h7^m du matin (temps local). On s'est repéré sur la croix du clocher de l'église d'Arzew, à 600^m au Nord-Est. Baromètre, 761^{mm}; thermomètre, 21°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

126.35,4
126.35,5
126.36,0
126.35,5
126.35,8

Moyenne..... 126.35,6
Azimut du repère 47°4',4

Déclinaison.

L'observation de la déclinaison a été effectuée avec un seul barreau, de 6^h30^m à 6^h45^m du matin (temps local).

On a trouvé :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 6 ^h 30 ^m à 6 ^h 45 ^m	111.35,7
Méridien géographique.....	126.35,6
Méridien magnétique.....	111.35,7
Déclinaison.....	14.59,9
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.51,8
Correction de latitude.....	+ 0,7

Différence : Le Parc-Arzew.....	0.52,6

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2 ⁰
Le Parc-Arzew.....	0.52,6
<i>Déclinaison</i> à Arzew le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>14.59,6</u>

Composante horizontale.

On n'a employé également qu'un seul barreau à la détermination de la composante horizontale, de 5^h40^m à 6^h10^m du matin (temps local); il n'a été fait qu'une série de cent vingt oscillations, immédiatement avant les expériences de déviations.

L'appareil était placé à l'ombre d'un amandier.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	14°24'3"	3°,1655	18°,6	18°,8	0,25199
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19475
Différence : Arzew-Le Parc.....					<u>0,05724</u>

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Arzew-Le Parc.....	0,05724
<i>Composante horizontale</i> à Arzew le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,25204</u>

Inclinaison.

L'inclinaison a été obtenue par une seule observation complète, effectuée avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 4^h50^m à 5^h20^m du matin (temps local). En voici les résultats :

Marque en haut.....	53°57',6	} 53.55,6
Marque en bas.....	53°53',6	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,0	
Différence : Le Parc-Arzew.....	<u>11.18,4</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9 ⁰
Le Parc-Arzew.....	11.18,4
<i>Inclinaison</i> à Arzew le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>53.56,5</u>

D'après les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, aucune perturbation ne s'est produite pendant les observations faites à Arzew le 30 mai 1887.

IX. — BARCELONE.

23 JUIN 1887.

Station.

La plaine qui s'étend au nord de Barcelone, vers le village de Gracia, est en lotissement pour l'agrandissement de la ville; de nouvelles rues sont tracées et des constructions s'élèvent de toutes parts. On s'est placé au milieu d'un des îlots les plus reculés vers le Nord: le terrain y est encore en culture et le sous-sol des voies n'a pas encore reçu de conduites d'eau et de gaz. Le point d'opération est à 300^m à l'est de l'usine à gaz, à 1^{km} au nord du chemin de fer de Tarragone. Altitude, 20^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude 0° 9', 3 O.
Latitude..... 41° 24', 0 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite résulte de quatorze observations du Soleil, faites de 3^h 19^m à 3^h 40^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur le mât du sémaphore situé sur la côte, au sommet d'une montagne, à 5^{km} au Sud. Baromètre, 761^{mm}; thermomètre, 26°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

217.29,9
217.29,1
217.28,8
217.29,3
217.29,7
217.29,3
217.29,0
Moyenne..... 217.29,3
Azimut du repère..... 179° 22', 5

Déclinaison.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement servi à la mesure de la déclinaison, de 2^h 40^m à 3^h 15^m du soir (temps local), immédiatement avant l'observation du Soleil.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 2 ^h 40 ^m à 2 ^h 55 ^m	202.39,2	} 202.39,3
Barreau n° 2. — De 3 ^h 0 ^m à 3 ^h 15 ^m	202.39,5	
Méridien géographique.....	217.29,3	
Méridien magnétique.....	202.39,3	
Déclinaison.....		14.50,0
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	15.59,2	} 15.58,8
Correction de latitude.....	— 0,4	
Différence : Le Parc-Barcelone.....		1. 8,8

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15° 52', 2
Le Parc-Barcelone	1. 8, 8
<i>Déclinaison</i> à Barcelone le 1 ^{er} janvier 1888	14.43, 4

Composante horizontale.

La détermination de la composante horizontale a été effectuée également avec les deux barreaux de la boussole, de 4^h 5^m à 5^h 30^m du soir (temps local). Il n'a été fait qu'une série de cent oscillations de chaque barreau déviant.

Le ciel, déjà nuageux à 2^h, s'est couvert peu à peu, et il n'a pas été nécessaire de déplacer l'appareil, comme on le faisait habituellement, pour le protéger de l'action des rayons solaires pendant la mesure de la composante horizontale.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	15° 52' 10"	3°, 3480	24°, 3	24°, 2	0,22722
N° 2....	18° 20' 53"	3°, 1390	23°, 9	23°, 8	0,22718
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur					0,19496
Différence : Barcelone-Le Parc					0,03224

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	0,19480
Barcelone-Le Parc	0,03224
<i>Composante horizontale</i> à Barcelone le 1 ^{er} janvier 1888	0,22704

Inclinaison.

L'inclinaison a été observée seulement avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 1^h 45^m à 2^h 15^m du soir (temps local).

On a trouvé :

Marque en haut	59° 16', 2	} 59.14, 3
Marque en bas	59° 12', 4	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	65.14, 6	
Différence : Le Parc-Barcelone	6. 0, 3	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	65.14, 9
Le Parc-Barcelone	6. 0, 3
<i>Inclinaison</i> à Barcelone le 1 ^{er} janvier 1888	59.14, 6

A l'observatoire du Parc Saint-Maur, la courbe du bifilaire est un peu agitée entre 4^h et 5^h du soir le 23 juin, au moment de la mesure de la composante horizontale faite à Barcelone.

X. — BASTIA.

25 AVRIL 1887.

Station.

Les observations ont été faites au nord et en dehors de la ville, sur le versant Sud de la colline qui domine Bastia. On s'est placé dans un terrain planté d'oliviers, situé sensiblement au milieu de la droite qui joindrait l'usine à gaz à la gare du chemin de fer, distantes l'une de l'autre d'environ 600^m. Altitude, 25^m.

A 8^{km} à l'ouest de Bastia, sur le versant occidental de la montagne du cap Corse, se trouve le village de Farinole, renommé par ses mines de fer.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 7° 7', 0 E.
Latitude..... 42° 42', 2 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été conclue de huit observations du Soleil, faites de 3^h 42^m à 3^h 58^m du soir (temps local), par un ciel clair.

On s'est repéré sur le clocher de l'église Sainte-Marie, à 2^{km} au Sud. Baromètre, 760^{mm}; thermomètre, 19°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	190.54',4
	190.55,4
	190.55,6
	190.55,3
Moyenne.....	190.55,2
Azimut du repère.....	172° 40', 3

Déclinaison.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement servi à la mesure de la déclinaison, de 4^h 15^m à 4^h 50^m du soir (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 4 ^h 15 ^m à 4 ^h 30 ^m	176°.56',0	} 176°.56',4
Barreau n° 2. — De 4 ^h 35 ^m à 4 ^h 50 ^m	176.56,8	
Méridien géographique.....	190.55,2	
Méridien magnétique.....	176.56,4	
Déclinaison.....	13.58,8 (1)	

(1) Ce résultat diffère notablement du nombre généralement admis; l'anomalie paraît due au voisinage de masses magnétiques. La distribution des divers éléments est d'ailleurs très irrégulière en Corse.

Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15° 59', 0	}	15° 58', 8
Correction de latitude.....	— 0,2		
Différence Le Parc-Bastia.....			2. 0,0

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Bastia.....	2. 0,0
<i>Déclinaison</i> à Bastia le 1 ^{er} janvier 1888.....	13.52,2

Composante horizontale.

La composante horizontale a été mesurée également avec les deux barreaux de la boussole, de 2^h 5^m à 3^h 25^m du soir (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de cent oscillations du barreau déviant.

L'appareil était placé à l'ombre, sous un olivier.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	16° 29' 25"	3 ^h 32 ^m 10	17°, 5	17°, 5	0,22483	} 0,22485
N° 2....	19° 55' 0"	3 ^h 04 ^m 85	17°, 6	17°, 7	0,22487	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19455	
Différence : Bastia-Le Parc.....					0,03030	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Bastia-Le Parc.....	0,03030
<i>Composante horizontale</i> à Bastia le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,22510

Inclinaison.

La valeur absolue de l'inclinaison a été déduite d'une seule mesure complète, effectuée avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 1^h 10^m à 1^h 45^m du soir (temps local).

On a trouvé :

Marque en haut.....	59° 10', 8	}	59° 11', 7
Marque en bas.....	59° 12', 6		
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.16,1		
Différence Le Parc-Bastia.....	6. 4,4		

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Bastia.....	6. 4,4
<i>Inclinaison</i> à Bastia le 1 ^{er} janvier 1888.....	59.10,5

Une faible agitation magnétique est signalée à l'observatoire du Parc Saint-Maur, sur la courbe du bifilaire, pendant les expériences relatives à la mesure de la composante horizontale.

XI. — BATNA.

17 MAI 1887.

Station.

Les observations ont été faites à 500^m de la limite de la ville, dans la direction du Sud, à 100^m au sud de la route de Biskra, à 1200^m au sud-est du chemin de fer. Terrain crétacé moyen.

Les appareils ont été placés en rase campagne, dans un champ récolté, en situation bien découverte. Altitude, 1054^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 3°50',5 E
Latitude..... 35°33',0 N

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été déduite de dix observations du Soleil, faites de 4^h18^m à 4^h39^m du soir (temps local), par un ciel nuageux.

On s'est repéré sur la boule du minaret de la mosquée du village arabe, au Sud-Est. Baromètre, 675^{mm}; thermomètre, 25°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

140°.53',4
140.54,3
140.54,1
140.53,0
140.54,1
Moyenne..... 140.53,8
Azimut du repère..... 120°52',2

Déclinaison.

Il a été fait deux mesures complètes de la déclinaison, avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 5^h à 5^h35^m du soir (temps local).

Les résultats de l'observation sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 5 ^h 0 ^m à 5 ^h 15 ^m	128°. 9',1	} 128°. 9',1
Barreau n° 2. — De 5 ^h 20 ^m à 5 ^h 35 ^m	128. 9,1	
Méridien géographique.....	140.53,8	
Méridien magnétique.....	128. 9,1	
Déclinaison.....		12.44,7
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.56,8	} 15.56,6
Correction de latitude.....	— 0,2	
Différence : Le Parc-Batna.....		3.11,9

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52,2
Le Parc-Batna.....	3.11,9
<i>Déclinaison</i> à Batna le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>12.40,3</u>

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont également servi à la mesure de la composante horizontale, de 3^h à 4^h 10^m du soir (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de cent oscillations du barreau déviant.

Le ciel étant voilé, on n'a pas déplacé l'appareil, et les observations ont été faites au même point que celles relatives à la déclinaison.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	14° 10' 30"	3°, 1148	25°, 9	25°, 9	0,25809
N° 2....	16° 53' 40"	2°, 8785	25°, 5	25°, 6	0,25784
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19470
Différence : Batna-Le Parc.....					<u>0,06327</u>

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Batna-Le Parc.....	0,06327
<i>Composante horizontale</i> à Batna le 1 ^{er} janvier 1888.	<u>0,25807</u>

Inclinaison.

La valeur absolue de l'inclinaison est le résultat d'une seule observation complète, faite avec l'aiguille n° 2, de 2^h à 2^h 40^m du soir (temps local).

On a trouvé :

Marque en haut.....	52° 17', 9	} 52°. 16', 9
Marque en bas.....	52° 15', 9	
Valeur correspondante de l'inclinaison au Parc Saint-Maur.	65. 13, 8	
Différence : Le Parc-Batna.....	<u>12.56, 9</u>	

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°. 14', 9
Le Parc-Batna.....	12.56, 9
<i>Inclinaison</i> à Batna le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>52.18, 0</u>

D'après les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, les observations de Batna, du 17 mai, ont été faites en temps de calme magnétique.

XII. — BISKRA.

16 MAI 1887.

Station.

Les expériences ont été faites au sud de la ville, à 100^m au delà des dernières maisons, à 30^m à l'ouest de la route de Tougourt, à 400^m au nord-ouest du village nègre. Altitude, 124^m. Terrain lacustre.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 3° 23', 3 E.
Latitude..... 34° 50', 8 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été conclu de dix observations du Soleil, faites de 8^h 34^m à 9^h 10^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur un sommet du Djebel Ahmarkaddou, montagne de l'Aurès, à 15^{km} environ dans la direction de l'Est-Nord-Est. Baromètre, 750^{mm}; thermomètre, 23°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

81.12,7
81.12,2
81.12,2
81.12,9
81.12,1
Moyenne..... 81.12,4
Azimut du repère..... 74° 21', 9

Déclinaison.

Deux mesures complètes de la déclinaison ont été effectuées le matin, de 7^h 55^m à 8^h 30^m, et deux autres le soir, de 1^h 0^m à 1^h 35^m (temps local). La première série a été faite immédiatement avant l'observation du Soleil, sans que le pied ait été déplacé entre les deux opérations. La série du soir a été obtenue exactement au même point; pour la calculer, on s'est servi de l'azimut du repère dont il a été parlé plus haut.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Matin. Barreau n° 1. — De 7.55^h à 8.10^h..... 68° 23', 4 }
» Barreau n° 2. — De 8.15^h à 8.30^h..... 68.23,2 } 68° 23', 3
Soir. Barreau n° 1. — De 1. 0^h à 1.15^h..... 8.25,6 }
» Barreau n° 2. — De 1.20^h à 1.35^h..... 8.25,6 } 8° 25', 6

	Matin.	Soir.	Moyenne.
Méridien géographique.....	81.12,4	21.23,4	
Méridien magnétique.....	68.23,3	8.25,6	
Déclinaison.....	12.49,1	12.57,8	12.53,4

Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15°.52',1	16°. 1',6	
Correction de latitude.....	+0,7	—1,1	
	15.52,8	16. 0,5	15°.56',6
Différence moyenne : Le Parc-Biskra.....			3. 3,2

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Biskra.....	3. 3,2
<i>Déclinaison</i> à Biskra le 1 ^{er} janvier 1888.....	12.49,0

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement servi à la mesure de la composante horizontale, de 6^h30^m à 7^h35^m du matin (temps local). Dans chaque cas, une série de cent oscillations du barreau déviant a précédé et suivi les expériences de déviations.

Les observations ont été faites à l'ombre, sous un palmier.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	14° 6'38"	3°,0980	20°,5	20°,6	0,26007	} 0,26007
N° 2....	16° 46'35"	2°,8635	20°,8	20°,9	0,26008	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19462	
Différence : Biskra-Le Parc.....					0,06545	

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Biskra-Le Parc.....	0,06545
<i>Composante horizontale</i> à Biskra le 1 ^{er} janvier 1888.	0,26025

Inclinaison.

La valeur de l'inclinaison a été déduite de deux mesures complètes, effectuées avec les deux aiguilles de la boussole, de 9^h30^m à 11^h du matin (temps local).

Aiguille n° 2. — Marque en haut.....	51°.33',7	} 51°.32',1
» Marque en bas.....	51.30,6	
Aiguille n° 1. — Marque en haut.....	51.29,9	} 51.32,9
» Marque en bas.....	51.36,0	
Inclinaison.....	51.32,5	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,6	
Différence : Le Parc-Biskra.....	13.42,1	

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Biskra.....	13.42,1
<i>Inclinaison</i> à Biskra le 1 ^{er} janvier 1888.....	51.32,8

On remarque une faible agitation magnétique pendant les observations faites à Biskra le 16 mai 1887.

XIII. — BÔNE.

13 MAI 1887.

Station.

Les observations ont été faites à l'ouest de la ville, à 200^m du rempart, au point de jonction du canal exutoire et du canal central, au milieu d'une plaine de grande étendue, peu élevée au-dessus du niveau de la mer (altitude 4^m).

Le point où a été placé le pied des appareils est à 1200^m de la base du massif montagneux de l'Edough, qui s'étend dans la direction du Nord-Ouest jusqu'à la côte et contient du minerai de fer oxydulé (*voir* Duzerville).

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 5°25', 1 E.
Latitude..... 36°54', 0 N.

Méridien géographique.

On a observé le Soleil de 4^h48^m à 5^h6^m du soir (temps local). Dans cet intervalle, on a pris dix pointés alternatifs de l'astre, lunette à droite et lunette à gauche.

On s'est repéré sur le paratonnerre de la cathédrale de Bône, à 800^m dans la direction E.-N.-E. Baromètre, 758^{mm}; thermomètre, 20°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	149.39,9
	149.40,5
	149.40,3
	149.39,5
	149.39,1
Moyenne.....	149.39,9
Azimut du repère.....	65°40', 6

Déclinaison.

La déclinaison a été observée avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 5^h20^m à 5^h55^m du soir (temps local). Les résultats sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 5 ^h 20 ^m à 5 ^h 35 ^m	137.17,5	} 137.17,8
Barreau n° 2. — De 5 ^h 40 ^m à 5 ^h 55 ^m	137.18,1	
Méridien géographique.....	149.39,9	
Méridien magnétique.....	137.17,8	
Déclinaison.....	12.22,1	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.57,0	} 15.56,8
Correction de latitude.....	—0,2	
Le Parc-Bône.....	3.34,7	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15°.52',2
Le Parc-Bône	3.34,7
<i>Déclinaison</i> à Bône le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>12.17,5</u>

Composante horizontale.

On a fait deux observations complètes de la composante horizontale, avec chacun des barreaux de la boussole, de 3^h20^m à 4^h25^m du soir (temps local). Dans chaque cas, il a été fait une série de 100 oscillations du barreau déviant avant et après les expériences de déviations.

L'appareil a été placé à l'ombre, sous un tamarin planté sur le bord du canal. Voici les résultats de l'observation :

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1	14°31'53"	3°,1370	20°,5	20°,5	0,25316	} 0,25314
N° 2	17°15'48"	2°,9015	20°,3	20°,3	0,25313	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19468	
Différence Bône-Le Parc.....					<u>0,05846</u>	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Bône-Le Parc.....	0,05846
<i>Composante horizontale</i> à Bône le 1 ^{er} janvier 1888..	<u>0,25326</u>

Inclinaison.

On a déterminé l'inclinaison au moyen d'une seule observation complète, faite de 6^h15^m à 6^h55^m du soir (temps local), avec l'aiguille n° 2. Les résultats sont les suivants :

Marque en haut.....	53°36',8	} 53.33,7
Marque en bas.....	53°30,6	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.12,7	
Différence Le Parc-Bône	<u>11.39,0</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Bône.....	11.39,0
<i>Inclinaison</i> à Bône le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>53.35,9</u>

Les courbes magnétiques de l'observatoire du Parc Saint-Maur sont agitées pendant le temps des expériences faites à Bône le 13 mai 1887.

XIV. — BONIFACIO.

21 AVRIL 1887.

Station.

Le 21 avril au matin, le ciel était pluvieux et le vent d'Est soufflait avec une grande violence à Bonifacio; il ne fut possible d'observer que la composante horizontale, en s'abritant derrière une maison abandonnée, située en haut du rocher sur lequel est bâtie la ville, sur le chemin du cimetière. Dans l'après-midi, la situation atmosphérique fut moins mauvaise, et l'on put terminer, bien que difficilement, la série des mesures magnétiques; ces dernières observations, comprenant la déclinaison et l'inclinaison, ont été faites à l'extrémité est de la baie de Bonifacio, à 100^m à l'est de la côte et de la route d'Ajaccio. Altitude, 2^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 6° 49', 7 E.
Latitude..... 41° 23', 0 N.

Méridien géographique.

Le ciel est resté presque constamment couvert; on n'a pu prendre que quatre pointés du Soleil, à la faveur d'une courte éclaircie, de 3^h 11^m à 3^h 19^m du soir (temps local), et ces observations ont été faites en supprimant le verre noirci devant l'oculaire de la lunette.

On s'est repéré sur la croix du clocher de l'église Sainte-Marie, à 1^{km} à l'Ouest-Sud-Ouest. Baromètre, 759^{mm}; thermomètre, 12°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

278.55,0
278.54,6
Moyenne..... 278.54,8
Azimut du repère..... 250° 34', 4

Déclinaison.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement servi à la mesure de la déclinaison, de 3^h 30^m à 4^h 5^m du soir (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 3 ^h 30 ^m à 3 ^h 45 ^m	266.49,1	} 266.49,3
Barreau n° 2. — De 3 ^h 50 ^m à 4 ^h 5 ^m	266.49,6	
Méridien géographique.....	278.54,8	
Méridien magnétique.....	266.49,3	
Déclinaison.....	12. 5, 5	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.59,2	} 15.58,9
Correction de latitude.....	—0,3	
Différence Le Parc-Bonifacio.....	3.53,4	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Bonifacio.....	3.53,4
<i>Déclinaison</i> à Bonifacio le 1 ^{er} janvier 1888.....	11.58,8

Composante horizontale.

La composante horizontale a été déterminée également avec les deux barreaux de la boussole, de 9^h à 10^h 10^m du matin (temps local).

La violence du vent et l'état du ciel ont rendu ces observations fort difficiles; il n'a été fait, dans chaque cas, qu'une seule série de 100 oscillations du barreau déviant. La température n'a d'ailleurs pas varié pendant le cours des opérations.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	15° 58' 45"	3°, 2570	12°, 6	12°, 6	0,23279
N° 2....	19° 12' 15"	2°, 9980	12°, 6	12°, 6	0,23270
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19435
Différence Bonifacio-Le Parc					0,03839

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Bonifacio-Le Parc	0,03839
<i>Composante horizontale</i> à Bonifacio le 1 ^{er} janvier 1888..	0,23319

Inclinaison.

Une première mesure de la déclinaison avait été commencée le matin, mais la pluie n'a pas permis de terminer l'opération : l'aimantation de l'aiguille n'a pas été renversée. On a trouvé :

11^h à 11^h 20^m m. — Aiguille n° 2. — Marque en haut..... 58° 8',9

Une mesure complète a pu être faite dans l'après-midi, près de la baie, de 4^h 30^m à 5^h 5^m du soir (temps local). En voici le résultat :

Aiguille n° 1. — Marque en haut.....	58° 8',9	} 58.11,4
» — Marque en bas.....	58° 13',9	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,0	
Différence Le Parc-Bonifacio.....	7. 3,6	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Bonifacio.....	7. 3,6
<i>Inclinaison</i> à Bonifacio le 1 ^{er} janvier 1888.....	58.11,3

Les expériences faites à Bonifacio le 21 avril 1887 correspondent à une époque de calme magnétique.

XV. — BORDJ-BOUIRA.

23 MAI 1887.

Station.

Bordj-Bouira est un village situé au pied du pic du Djurjura, dans la partie élevée de la vallée du Sahel, qui sépare le Djurjura de la chaîne des Biban, à l'extrême sud de la Grande Kabylie.

On s'est établi à 200^m à l'est de Bouira, entre le bordj et le village kabyle, en rase campagne. Le chemin de fer d'Alger à Constantine passe à 1200^m à l'ouest du point choisi. Altitude 550^m.

Terrain quaternaire.

Coordonnées de Bouira.

Longitude 1°35' E.
Latitude 36°23' N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été conclu de 14 observations du Soleil, faites de 8^h28^m à 8^h52^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la croix de la petite église de Bouira, adossée au bordj, à 600^m dans la direction Ouest-Nord-Ouest.

Baromètre, 716^{mm}; thermomètre, 18°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

214.7,8
214.8,3
214.8,2
214.9,1
214.8,2
214.7,9
214.8,0

Moyenne.... 214.8,2
Azimet du repère..... 286°22'3.

Déclinaison.

La déclinaison a été déterminée successivement avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 7^h30^m à 8^h5^m du matin (temps local), immédiatement avant l'observation du Soleil.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 30 ^m à 7 ^h 45 ^m	200.39,3	} 200.39,7
Barreau n° 2. — De 7 ^h 50 ^m à 8 ^h 5 ^m	200.40,1	
Méridien géographique.....	214. 8,2	
Méridien magnétique.....	200.39,7	
Déclinaison.....	13.28,5	

Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15° 52', 0	}	15° 52', 8
Correction de latitude.....	+ 0,8		
Différence : Le Parc-Bouira.....			2.24,3

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15° 52', 2
Le Parc-Bouira.....	2.24,3
Déclinaison à Bordj-Bouira le 1 ^{er} janvier 1888.....	13.27,9

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont également servi à la mesure de la composante horizontale, de 6^h à 7^h 5^m du matin (temps local). Les expériences de déviations ont, dans chaque cas, été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les observations ont été faites à l'ombre d'une haie épaisse.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations	Déviations.	
N° 1....	14° 30' 53"	3°, 15 15	13°, 4	13°, 4	0,25214
N° 2....	17° 21' 35"	2°, 90 50	13°, 6	13°, 5	0,25215
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19461
Différence : Bouira-Le Parc.....					0,05753

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Bouira-Le Parc.....	0,05753
Composante horizontale à Bordj-Bouira le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25233

Inclinaison.

La valeur de l'inclinaison a été déduite d'une seule observation complète, faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 9^h 15^m à 10^h du matin (temps local).

Marque en haut.....	53° 43', 7	}	53° 42', 3
Marque en bas.....	53° 40', 9		
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.13,8		
Différence : Le Parc-Bouira.....	11.31,5		

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	65° 14', 9
Le Parc-Bouira.....	11.31,5
Inclinaison à Bordj-Bouira le 1 ^{er} janvier 1888.....	53.43,4

Une perturbation magnétique assez forte est survenue le 23 mai dans l'après-midi, mais les courbes de variations sont très régulières pendant le temps des observations faites à Bouira dans la matinée.

XVI. — BOUDZARÉAH (Observatoire d'Alger).

26 MAI 1887.

Station.

L'observatoire d'Alger, dirigé par M. Trépied, est construit au sommet d'un mamelon de 340^m d'altitude, dépendant du territoire de la Boudzaréah, village situé à 4^{km} Ouest-Nord-Ouest d'Alger, à vol d'oiseau. Ce mamelon, de nature schisteuse, se trouve lui-même à 1^{km} au nord du bourg, dans une situation parfaitement découverte. (*Voir* Alger, *Jardin d'essai*.)

Les observations ont été faites au nord-ouest de l'observatoire, à 100^m en dehors de la limite de la propriété, sur le bord d'un petit chemin conduisant à une maison arabe.

Coordonnées de l'observatoire.

Longitude 0° 41', 9 E.
Latitude 36° 47', 9 N.

Méridien géographique.

Dix observations du Soleil ont été faites de 8^h 20^m à 8^h 37^m du matin (temps local), et ont servi à déterminer la trace du méridien géographique du lieu sur le cercle azimutal du théodolite.

On s'est repéré sur la tige surmontant la coupole de l'équatorial coudé, à 150^m à l'Est. Baromètre, 736^{mm}; thermomètre, 20°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

144.25, 1
144.25, 3
144.25, 1
144.25, 5
144.25, 2
Moyenne.... 144.25, 2
Azimut du repère..... 97° 1', 2.

Déclinaison.

La déclinaison a été observée avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 7^h 35^m à 8^h 10^m du matin (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 35 ^m à 7 ^h 50 ^m	130.34, 2	} 130.33, 9
Barreau n° 2. — De 7 ^h 55 ^m à 8 ^h 10 ^m	130.33, 6	
Méridien géographique.....	144.25, 2	
Méridien magnétique.....	130.33, 9	
Déclinaison.....		13.51, 3
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.50, 0	} 15.50, 7
Correction de latitude.....	+ 0, 7	
Différence · Le Parc-Boudzaréah.....		1.59, 4

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Boudzaréah.....	1.59,4
<i>Déclinaison</i> à Boudzaréah le 1 ^{er} janvier 1888.....	13.52,8

Composante horizontale.

La composante horizontale a été observée successivement avec les deux barreaux de la boussole, de 9^h à 10^h10^m du matin (temps local). Dans chaque cas, il a été fait une série de 100 oscillations avant et après les expériences de déviations.

Les observations ont été faites à l'ombre, sous un figuier.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	14° 31' 7"	3 ^s , 1750	18°, 2	18°, 1	0,25024	} 0,25024
N° 2....	17° 2' 48"	2 ^s , 9530	18°, 9	18°, 9	0,25025	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19440	
Différence : Boudzaréah-Le Parc.....					0,05584	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Boudzaréah-Le Parc.....	0,05584
<i>Composante horizontale</i> à Boudzaréah le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25064

Inclinaison.

On n'a fait qu'une seule observation complète de l'inclinaison, avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 6^h45^m à 7^h15^m du matin (temps local). En voici les résultats :

Marque en haut.....	54.20,7	} 54.20,7
Marque en bas.....	54.20,7	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,6	
Différence : Le Parc-Boudzaréah.....	10.54,9	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Boudzaréah.....	10.54,9
<i>Inclinaison</i> à Boudzaréah le 1 ^{er} janvier 1888.....	54.20,0

Les courbes relevées à l'observatoire du Parc Saint-Maur montrent que les observations ci-dessus ont été faites en temps de calme magnétique.

XVII. — BOUFARIK.

27 MAI 1887.

Station.

La ville de Boufarik est située au milieu de la vaste plaine de la Mitidja, sur la route d'Alger à Blida. Terrain d'alluvion.

On s'est établi à l'extrémité Nord de la ville, sous un massif de platanes situé dans un îlot de terrain à bâtir, mais sur lequel ne s'élève encore aucune construction. Altitude, 49^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude	6° 34', 6 E.
Latitude	36° 34', 7 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déduit de dix observations du Soleil, faites de 8^h 10^m à 8^h 30^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur un arbre situé au haut d'une colline, à 8^{km} dans la direction du Nord. Baromètre, 756^{mm}; thermomètre, 24°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

182.36,1
182.36,8
182.36,8
182.36,7
182.37,1
Moyenne..... 182.36,7
Azimet du repère..... 355° 33', 3

Déclinaison.

Les opérations relatives à la déclinaison ont été faites successivement avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 7^h 25^m à 8^h du matin (temps local). Les résultats suivants ont été obtenus :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 25 ^m à 7 ^h 40 ^m	168.47,8	} 168.47,2
Barreau n° 2. — De 7 ^h 45 ^m à 8 ^h	168.46,5	
Méridien géographique.....	182.36,7	
Méridien magnétique	168.47,2	
Déclinaison.....	13.49,5	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.50,9	} 15.51,7
Correction de latitude.....	+0,8	
Différence : Le Parc-Boufarik	2. 2,2	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15°.52',2
Le Parc-Boufarik	2. 2,2
<i>Déclinaison</i> à Boufarik le 1 ^{er} janvier 1888	13.50,0

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont été également employés à la mesure de la composante horizontale de 6^h 0^m à 7^h 5^m du matin (temps local). Dans chaque cas, le temps d'une oscillation du barreau déviant a été déduit de deux séries de 100 oscillations, effectuées avant et après les expériences de déviations.

L'appareil était placé à l'ombre, sous le massif de platânes dont il a été parlé plus haut.

Barreau.	α .	t .	Température.		H	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	14° 32' 40"	3 ^s , 1660	16°, 2	16°, 2	0,25073	} 0,25060
N° 2....	17° 3' 3"	2 ^s , 9500	17°, 5	17°, 4	0,25047	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur					0,19463	
Différence : Boufarik-Le Parc					0,05597	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	0,19480
Boufarik-Le Parc	0,05597
<i>Composante horizontale</i> à Boufarik le 1 ^{er} janvier 1888	0,25077

Inclinaison.

L'inclinaison résulte d'une seule observation complète, faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 5^h 10^m à 5^h 40^m du matin (temps local). Voici les résultats de cette observation :

Marque en haut	54° 8', 5	} 54. 7,7
Marque en bas	54° 6', 9	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	65. 14,6	
Différence : Le Parc-Boufarik	11. 6,9	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	65°.14',9
Le Parc-Boufarik	11. 6,9
<i>Inclinaison</i> à Boufarik le 1 ^{er} janvier 1888	54. 8,0

Une assez forte perturbation magnétique est survenue dans la nuit du 26 au 27 mai 1887, mais elle avait complètement cessé le matin du 27, et les observations de Boufarik ont été faites en temps de calme magnétique.

XVIII. — CARTHAGE.

10 MAI 1887.

Station.

Les travaux de construction d'une basilique au sommet de la colline de Carthage ne nous ont pas permis d'opérer sur le pilier géodésique, dont les abords étaient encombrés de matériaux de diverse nature.

Les appareils ont été installés sur le versant occidental du coteau, à 400^m au N.-O. du pilier, entre ce point et le chemin de fer de la Marsa à la Goulette, à 800^m environ de la station de la Malga, au sud du chemin qui conduit à Saint-Louis de Carthage, à 4^{km} au N.-N.-E. du port de la Goulette. Altitude, 40^m.

Coordonnées du pilier géodésique de Saint-Louis de Carthage.

Longitude 7° 59', 1 E.
Latitude 36° 51', 1 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déduit de dix observations du Soleil, faites de 7^h 37^m à 7^h 55^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la flèche du clocher de l'église de la Goulette, à 4^{km} au S.-S.-O.

Baromètre, 759^{mm}; thermomètre, 19°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	127°.22',4
	127°.21',7
	127°.22',0
	127°.22',4
	127°.22',0
Moyenne.....	127°.22',1
Azimut du repère.....	201° 16',6

Déclinaison.

La déclinaison a été observée successivement avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 8^h 10^m à 8^h 45^m du matin (temps local). Les résultats sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 8 ^h 10 ^m à 8 ^h 25 ^m	115°.58',7	} 115°.58',4
Barreau n° 2. — De 8 ^h 30 ^m à 8 ^h 45 ^m	115°.58',2	
Méridien géographique.....	127°.22',1	
Méridien magnétique.....	115°.58',4	
Déclinaison.....	11°.23',7	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15°.50',8	} 15°.51',4
Correction de latitude.....	+ 0,6	
Différence : Le Parc-Carthage.....	4°.27',7	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Carthage.....	4.27,7
<i>Déclinaison</i> à Carthage le 1 ^{er} janvier 1888.....	11.24,5

Composante horizontale.

La composante horizontale a été observée seulement avec le barreau n° 1 de la boussole, de 9^h à 9^h 20^m du matin (temps local). Le vent du N.-N.-O. soufflait alors avec force. En ouvrant la cage de l'appareil pour enlever le barreau dévié après les expériences de déviations, le fil de suspension s'est rompu, et les oscillations du barreau déviant n'ont pas été répétées.

L'observation a été faite au soleil.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	14° 26' 52"	3 ^s , 1240	20°, 9	20°, 9	0,25494
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19451
Différence : Carthage-Le Parc					0,06043

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Carthage-Le Parc.....	0,06043
<i>Composante horizontale</i> à Carthage le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25523

Inclinaison.

L'inclinaison a été observée seulement avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 11^h 30^m du matin à midi (temps local).

Voici les résultats de l'observation :

Marque en haut.....	53° 4', 1	} 53° 5', 2
Marque en bas.....	53° 6', 3	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65. 13,8	
Différence : Le Parc-Carthage.....	12. 8,6	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65. 14,9
Le Parc-Carthage.....	12. 8,6
<i>Inclinaison</i> à Carthage le 1 ^{er} janvier 1888.....	53. 6,3

D'après les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, les observations de Carthage ont été faites en temps de calme magnétique.

XIX. — CARTHAGÈNE.

20 JUIN 1887.

Station.

On s'est établi au nord-ouest de la ville, à 300^m au nord du mur d'enceinte et de l'arsenal, vers l'extrémité Nord d'une grande propriété plantée d'arbres, et située sur la rive droite du ruisseau qui coule vers l'arsenal. Altitude, 10^m.

Coordonnées de l'arsenal de Carthagène.

Longitude..... 3° 19', 3 O.
Latitude..... 37° 35', 8 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été conclue de dix observations du Soleil, faites de 8^h 35^m à 8^h 52^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la croix du clocher de l'église d'un village situé à 2^{km} dans la direction du Nord magnétique.

Baromètre, 763^{mm}; thermomètre, 25°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	147°.17',8
	147°.17,7
	147°.18,3
	147°.17,8
	147°.18,3
Moyenne.....	147°.18,0
Azimet du repère.....	347° 1', 8

Déclinaison.

La valeur absolue de la déclinaison résulte de deux mesures complètes, faites avec les deux barreaux de la boussole, de 7^h 50^m à 8^h 25^m du matin (temps local).

On a trouvé :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 50 ^m à 8 ^h 5 ^m	131°.58',4	} 131°.58',6
Barreau n° 2. — De 8 ^h 10 ^m à 8 ^h 25 ^m	131°.58,8	
Méridien géographique.....	147°.18,0	
Méridien magnétique.....	131°.58,6	
Déclinaison.....		15°.19,4
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15°.50,4	} 15°.51,0
Correction de latitude.....	— 0,6	
Différence : Le Parc-Carthagène.....		0.31,6

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52',2
Le Parc-Carthagène.....	0.31,6
<i>Déclinaison</i> à Carthagène le 1 ^{er} janvier 1888.....	15.20,6

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont également servi à la mesure de la composante horizontale, de 5^h45^m à 7^h0^m du matin (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

L'appareil, placé au milieu d'une allée bordée de palmiers, était protégé contre l'action directe des rayons solaires.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	14°57'28"	3°,2350	17°,1	17°,1	0,24205	} 0,24190
N° 2....	17°20'15"	3°,0320	18°,3	18°,3	0,24174	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19477	
Différence : Carthagène-Le Parc.....					0,04713	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Carthagène-Le Parc.....	0,04713
<i>Composante horizontale</i> à Carthagène le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,24193

Inclinaison.

L'inclinaison a été déterminée avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 9^h25^m à 9^h55^m du matin (temps local).

On a trouvé :

Marque en haut.....	56°6',4	} 56°. 5',0
Marque en bas.....	56°3',6	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,6	
Différence : Le Parc-Carthagène.....	9.10,6	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Carthagène.....	9.10,6
<i>Inclinaison</i> à Carthagène le 1 ^{er} janvier 1888.....	56.4,3

Les variations des éléments magnétiques au Parc Saint-Maur sont à peu près régulières pendant le temps des opérations faites à Carthagène le 20 juin 1887.

XX. — CONSTANTINE.

20 MAI 1887.

Station.

Les expériences ont eu lieu dans le champ de courses, situé à 4^{km} au sud de la ville. Terrain crétacé inférieur. On s'est établi à 1^{km} au nord-est de la ligne du chemin de fer et de la station de l'Hippodrome, à l'entrée du village de Sidi-Mabrouk, sur la limite Est d'un massif d'eucalyptus. Altitude, 620^m. (Voir Le Kroubs.)

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 4° 17', 0 E.
Latitude..... 36° 20', 3 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été conclue de dix observations du Soleil, faites de 5^h 5^m à 5^h 21^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur la flèche d'un pavillon situé à 2^{km} au Sud.

Baromètre, 710^{mm}; thermomètre, 18°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	246.7',5
	246.7,4
	246.8,1
	246.8,2
	246.7,8
Moyenne.....	246.7,8
Azimet du repère.....	173° 49', 5

Déclinaison.

Deux mesures complètes de la déclinaison ont été effectuées avec chacun des barreaux de la boussole, de 5^h 40^m à 6^h 15^m du soir (temps local).

On a trouvé :

Barreau n° 1. — De 5 ^h 40 ^m à 5 ^h 55 ^m	233.30,0	} 233.29,8
Barreau n° 2. — De 6 ^h 0 ^m à 6 ^h 15 ^m	233.29,7	
Méridien géographique.....	246. 7,8	
Méridien magnétique.....	233.29,8	
Déclinaison.....		12.38,0
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.54,2	} 15.54,2
Correction de latitude.....	0,0	
Différence : Le Parc-Constantine.....		3.16,2

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52',2
Le Parc-Constantine.....	3.16,2
<i>Déclinaison</i> à Constantine le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>12.36,0</u>

Composante horizontale.

La composante horizontale a été déterminée également avec les deux barreaux de la boussole, de 2^h35^m à 3^h50^m du soir (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les opérations ont été faites à l'ombre, sous le massif d'eucalyptus dont il a été parlé plus haut.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	14° 27' 15"	3 ^s , 1260	21°, 4	21°, 5	0,25472
N° 2....	17° 10' 0"	2 ^s , 8950	20°, 8	20°, 8	0,25439
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19465
Différence : Constantine-Le Parc.....					0,05991

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Constantine-Le Parc.....	0,05991
<i>Composante horizontale</i> à Constantine le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,25471</u>

Inclinaison.

La valeur absolue de l'inclinaison résulte d'une mesure complète, faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 4^h20^m à 4^h50^m du soir (temps local).

Voici les résultats de l'observation :

Marque en haut.....	53° 11',0	} 53°. 9',2
Marque en bas.....	53° 7',5	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,1	
Différence : Le Parc-Constantine.....	12. 4,9	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Constantine.....	12. 4,9
<i>Inclinaison</i> à Constantine le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>53.10,0</u>

D'après les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, les expériences faites à Constantine le 20 mai 1887 correspondent à un calme magnétique parfait.

XXI. — CORTE.

24 AVRIL 1887.

Station.

Les observations ont été faites derrière l'école communale des garçons, dans un jardin de grande étendue attenant à une des dernières maisons de la ville, dans la direction du Nord, à l'est de la route de Bastia. Les appareils ont été placés tout à l'extrémité du jardin, à 80^m à l'est de la maison. Altitude, 450^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 6° 48', 8 E.
Latitude..... 42° 18', 2 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique a été conclue de dix observations du Soleil, faites par un très beau temps, de 9^h3^m à 9^h21^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur un arbre au point culminant d'un coteau situé à 3^{km} dans la direction du Nord. Baromètre, 720^{mm}; thermomètre, 17°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	77.48,0
	77.48,9
	77.48,8
	77.48,3
	77.48,7
Moyenne.....	77.48,5
Azimet du repère.....	358° 33', 0

Déclinaison.

On a employé successivement chacun des deux barreaux de la boussole à la mesure de la déclinaison. Les observations ont été faites de 9^h30^m à 10^h5^m du matin (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 9 ^h 30 ^m à 9 ^h 45 ^m	65.30,0	} 65.29,6
Barreau n° 2. — De 9 ^h 50 ^m à 10 ^h 5 ^m	65.29,2	
Méridien géographique.....	77.48,5	
Méridien magnétique.....	65.29,6	
Déclinaison.....		12.18,9
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.53,3	} 15.53,3
Correction de latitude.....	0,0	
Différence : Le Parc-Corte.....		3.34,4

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Corte.....	3.34,4
<i>Déclinaison</i> à Corte le 1 ^{er} janvier 1888.....	12.17,8

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont également servi à la détermination de la composante horizontale, de 10^h15^m à 11^h20^m du matin (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

L'appareil a été placé sous un olivier, à quelques mètres du point d'observation de la déclinaison.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	16°22'8"	3 ^s ,2815	18°,3	18°,2	0,22836
N° 2.....	19°38'0"	3 ^s ,0230	19°,0	19°,0	0,22833
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19442
Différence : Corte-Le Parc.....					0,03393

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Corte-Le Parc.....	0,03393
<i>Composante horizontale</i> à Corte le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,22873

Inclinaison.

La valeur de l'inclinaison résulte d'une mesure complète, faite avec l'aiguille n° 2, de 11^h40^m du matin à 0^h20^m du soir (temps local). On a trouvé :

Marque en haut.....	58°58',3	} 58°59',2
Marque en bas.....	59° 0',1	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,2	
Différence : Le Parc-Corte.....	6.16,0	

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Corte.....	6.16,0
<i>Inclinaison</i> à Corte le 1 ^{er} janvier 1888.....	58.58,9

Aucune perturbation magnétique n'est survenue à l'observatoire du Parc Saint-Maur pendant le temps des observations faites à Corte le 24 avril 1887.

XXII. — DUZERVILLE.

14 MAI 1887.

Station.

Duzerville est un petit village situé à 11^{km} au sud de Bône, dans la vallée de la Seybouse, un peu au nord du point de jonction des routes départementales de Bône à Guelma et de Bone à Souk-Ahras. Terrain lacustre.

On s'est placé à l'ouest du bourg, à 500^m de la ligne du chemin de fer, sur le bord et au sud du chemin qui conduit à El-Hadjar. Altitude, 12^m.

Les observations de Duzerville ont eu pour objet le contrôle de celles de Bône (*voir* cette station).

Coordonnées du point choisi.

Longitude.....	5° 24', 0 E.
Latitude	36° 48', 3 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déduit de 10 observations du Soleil, faites de 7^h 57^m à 8^h 15^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la cheminée d'une ferme, à El-Hadjar, à 2^{km} à l'Ouest. Baromètre, 757^{mm}; thermomètre, 20°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

189°.53',5
189.53',6
189.53',5
189.53',5
189.53',2
Moyenne..... 189.53',5
Azimut du repère..... 286° 43', 0

Déclinaison.

Il n'a été fait qu'une seule observation complète de la déclinaison, avec le barreau n° 1 de la boussole, de 7^h 35^m à 7^h 50^m du matin (temps local).

Le résultat est le suivant :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 35 ^m à 7 ^h 50 ^m	177°.37',6
Méridien géographique.....	189° 53', 5
Méridien magnétique.....	177° 37', 6
Déclinaison.....	12.15,9
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15° 53', 5
Correction de latitude.....	+0', 7
Différence : Le Parc-Duzerville.....	3.38,3

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15.52,2
Le Parc-Duzerville	3.38,3
<i>Déclinaison</i> à Duzerville le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>12.13,9</u>

Composante horizontale.

La valeur de la composante horizontale a été déduite également d'une observation unique, faite avec le barreau n° 1, de 5^h 50^m à 6^h 20^m du matin (temps local). Les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

L'observation a été faite à l'ombre, l'appareil étant protégé des rayons solaires par une épaisse haie de grenadiers.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	14° 31' 45"	3 ^s , 1365	15°, 8	15°, 8	0,25322
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					<u>0,19470</u>
Différence : Duzerville-Le Parc.....					<u>0,05852</u>

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Duzerville-Le Parc	<u>0,05852</u>
<i>Composante horizontale</i> à Duzerville le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,25332</u>

Inclinaison.

Il n'a été fait qu'une mesure complète de l'inclinaison, avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 6^h 45^m à 7^h 15^m du matin (temps local).

En voici le résultat :

Marque en haut.....	53° 26', 4	} 53.26,3
Marque en bas.....	53° 26', 2	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,5	
Différence : Le Parc-Duzerville.....	<u>11.48,2</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Duzerville.....	<u>11.48,2</u>
<i>Inclinaison</i> à Duzerville le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>53.26,7</u>

D'après les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, les variations des éléments magnétiques présentent une faible irrégularité pendant les opérations faites à Duzerville le 14 mai 1887.

XXIII. — GABÈS.

5 MAI 1887.

Station.

Les observations ont été faites à 2^{km} à l'ouest de l'appontement, dans la propriété du général Allegro, gouverneur de l'Aarad; cette propriété est située sur la rive gauche de l'oued Gabès, à l'entrée de l'oasis. Le pied des appareils a été placé vers le milieu de la première allée parallèle au chemin qui réunit les villages arabes de Djara et de Petit Djara. Altitude, 10^m.

Le siroco observé la veille à Tripoli soufflait encore le 5 mai; à 5^h du soir, sur la côte, la température était de 37° à Gabès.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 7° 45', 9 E.
Latitude..... 33° 53', 0 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été conclue de 10 observations du Soleil, faites de 2^h 19^m à 2^h 40^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur l'angle d'une maison située à Djara, à 200^m au Sud-Est.

Baromètre, 762^{mm}; thermomètre, 33°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

161.24,5
161.23,6
161.23,0
161.23,5
161.24,6
Moyenne..... 161.23,8
Azimut du repère..... 143° 20', 2

Déclinaison.

La déclinaison a été déduite d'une seule observation complète, faite avec le barreau n° 1 de la boussole, de 3^h à 3^h 15^m du soir (temps local). La courte durée de l'escale n'a pas permis de répéter l'opération avec le deuxième barreau.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 3 ^h à 3 ^h 15 ^m	150. 1,7
Méridien géographique.....	161.23,8
Méridien magnétique.....	150. 1,7
Déclinaison.....	11.22,1
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.59,1
Correction de latitude.....	-1,0
Différence : Le Parc-Gabès.....	4 36,0

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52,2
Le Parc-Gabès.....	4.36,0
<i>Déclinaison</i> à Gabès le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>11.16,2</u>

Composante horizontale.

La valeur de la composante horizontale a été également conclue, faute de temps, d'une seule observation complète, faite avec le barreau n° 1 de la boussole, de 1^h30^m à 2^h du soir (temps local). Les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les observations ont été faites à l'ombre.

Barreau.	α .	t .	Température.		R.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	13°39'38"	3°,0470	31°,7	31°,8	0,26865
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					<u>0,19458</u>
Différence : Gabès-Le Parc.....					0,07407

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Gabès-Le Parc.....	0,07407
<i>Composante horizontale</i> à Gabès le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,26887</u>

Inclinaison.

L'aiguille n° 2 de la boussole a servi à la mesure de l'inclinaison; l'observation a été faite de 0^h30^m à 1^h5^m du soir (temps local).

On a trouvé :

Marque en haut.....	49°35,8	} 49.34,5
Marque en bas.....	49°33,2	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,0	
Différence : Le Parc-Gabès.....	<u>15.40,5</u>	

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14,9
Le Parc-Gabès.....	15.40,5
<i>Inclinaison</i> à Gabès le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>49.34,4</u>

Les courbes magnétiques de l'observatoire du Parc Saint-Maur témoignent d'une très faible agitation pendant les expériences faites à Gabès le 5 mai 1887.

XXIV. — LE KROUBS.

15 MAI 1887.

Station.

Ce village est bâti sur un mamelon qui domine l'oued Merzoug, à 16^{km} Sud-Sud-Est de Constantine, au point de jonction des lignes de chemins de fer d'Alger et de Tunis. Terrain lacustre. Il a paru important d'y faire une série d'observations à titre de contrôle de celles de Constantine (*voir* Constantine).

Un violent orage avait éclaté dans la nuit, et le 15 mai au matin le ciel était encore menaçant. Dans la crainte d'être surpris par le mauvais temps, on s'est établi vers les dernières maisons du village, à 20^m à l'ouest de la route de Constantine à Tébessa, qui traverse le Kroubs. Le chemin de fer se trouve à 600^m au Nord-Ouest. Altitude, 598^m.

Coordonnées du Kroubs.

Longitude.....	4° 22' E.
Latitude.....	36° 15' N.

Méridien géographique.

L'observation du Soleil a été fort difficile, en raison de l'état du ciel. On n'a pu prendre que huit pointés du Soleil, de 7^h 24^m à 7^h 49^m du matin (temps local), et les quatre premières de ces observations ont été faites sans le secours du verre noir devant l'oculaire de la lunette.

On s'est repéré sur une fenêtre d'une ferme située à 2500^m à l'Ouest-Nord-Ouest.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	253.17,5
	253.17,3
	253.18,0
	253.17,6
Moyenne.....	253.17,6
Azimut du repère.....	298° 31',4

Déclinaison.

La déclinaison n'a été observée qu'avec le barreau n° 1 de la boussole, de 6^h 50^m à 7^h 5^m du matin (temps local).

On a trouvé :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 6 ^h 50 ^m à 7 ^h 5 ^m	240.43,9
Méridien géographique.....	253.17,6
Méridien magnétique.....	240.43,9
Déclinaison.....	12.33,7
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.53,1
Correction de latitude.....	+ 0,8
Différence : Le Parc-Le Kroubs.....	3.20,2

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52',2
Le Parc-Le Kroubs.....	3.20,2
<i>Déclinaison</i> au Kroubs le 1 ^{er} janvier 1888.....	12.32,0

Composante horizontale.

La mesure de la composante horizontale a été effectuée avec le barreau n° 1 de la boussole, de 6^h à 6^h 30^m du matin (temps local). L'obligation de quitter le Kroubs de bonne heure n'a pas permis de répéter les observations avec le barreau n° 2, et il n'a été fait qu'une seule série de 100 oscillations du barreau déviant n° 1, avant les expériences de déviations. Les observations ont d'ailleurs été faites par un ciel couvert.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	14° 29' 52"	3 ^s , 1160	12°, 2	12°, 3	0,25516
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19469
Différence : Le Kroubs-Le Parc.....					0,06047

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Le Kroubs-Le Parc.....	0,06047
<i>Composante horizontale</i> au Kroubs le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25527

Inclinaison.

L'inclinaison a été observée de 5^h 10^m à 5^h 40^m du matin (temps local), avec l'aiguille n° 2 de la boussole.

On a trouvé :

Marque en haut.....	53° 5', 2	} 53° 5', 0
Marque en bas.....	53° 4', 8	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65. 14, 8	
Différence : Le Parc-Le Kroubs.....	12. 9, 8	

En ramenant cette observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Le Kroubs.....	12. 9,8
<i>Inclinaison</i> au Kroubs le 1 ^{er} janvier 1888.....	53. 5,1

Les variations des éléments magnétiques au Parc Saint-Maur sont sensiblement régulières pendant les observations faites au Kroubs le 15 mai 1887.

XXV. — LIVOURNE.

26 AVRIL 1887.

Station.

Le P. Monte, professeur au Lycée de Livourne, a bien voulu nous conduire à la villa où M. Chistoni a fait des déterminations absolues, en mars 1885. Cette propriété est située à l'extrémité du faubourg de *La Vigna*, au sud-est de la ville.

On s'est placé vers le haut de l'allée centrale du jardin, à quelques mètres à l'est du point d'opération de M. Chistoni. Altitude, 15^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude 7° 59', 7 E.
Latitude 43° 33', 1 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déduit de dix observations du Soleil, effectuées de 4^h 0^m à 4^h 18^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur la boule du clocher de Saint-André, à 1^{km} à l'Ouest-Sud-Ouest. Baromètre, 760^{mm}; thermomètre, 17°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

214°.32',2
214°.32',3
214°.32',3
214°.32',2
214°.32',0

Moyenne..... 214°.32',2
Azimut du repère..... 251° 5', 3

Déclinaison.

La déclinaison a été observée seulement avec le barreau n° 2 de la boussole, de 4^h 30^m à 4^h 45^m du soir (temps local). Le temps a manqué pour répéter l'opération avec l'autre barreau.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 2. — De 4 ^h 30 ^m à 4 ^h 45 ^m	202°.37',5
Méridien géographique	214°.32',2
Méridien magnétique	202°.37',5
-----	-----
Déclinaison	11.54,7
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15° 56', 6 } 15.56,3
Correction de latitude	— 0', 3 {
Différence : Le Parc-Livourne	4. 1,6

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52',2
Le Parc-Livourne.....	4. 1,6
<i>Déclinaison</i> à Livourne le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>11.50,6</u>

Composante horizontale.

Le barreau n° 2 de la boussole a seul servi à la mesure de la composante horizontale, de 5^h à 5^h 30^m du soir (temps local). Les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Le ciel était très nuageux, et l'appareil est resté au point d'observation de la déclinaison.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 2.....	20° 5' 25"	3°,0560	17°,0	16°,9	0,22339
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19479
Différence : Livourne-Le Parc.....					<u>0,02860</u>

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Livourne-Le Parc..	0,02860
<i>Composante horizontale</i> à Livourne le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,22340</u>

Inclinaison.

La valeur absolue de l'inclinaison a été conclue d'une seule observation complète, faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 5^h 40^m à 6^h 20^m du soir (temps local).

On a trouvé :

Marque en haut.....	59° 59',8	} 59°.59',2
Marque en bas.....	59° 58',6	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.13,8	
Différence : Le Parc-Livourne.....	<u>5.14,6</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Livourne.....	5.14,6
<i>Inclinaison</i> à Livourne le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>60. 0,3</u>

D'après les courbes relevées à l'observatoire du Parc Saint-Maur, les éléments magnétiques ont une variation très régulière pendant le temps des opérations faites à Livourne le 26 avril 1887.

XXVI. — MAGENTA.

3 JUIN 1887.

Station.

Cette station est l'une des dernières de la ligne ferrée de Sainte-Barbe du Tlélat à Ras-el-Mâ; le village se trouve à 100^{km} au sud de Sidi-bel-Abbès. Terrain jurassique supérieur.

Les appareils ont été placés en un point situé à 600^m à l'est de la gare, à 1^{km} du village, au delà et à 50^m de l'oued el Hacaïba, sur la limite d'une forêt de pins. Altitude, 927^m.

Coordonnées de Magenta.

Longitude.....	3° 5' O.
Latitude.....	34° 43' N.

Méridien géographique.

Le ciel, d'abord voilé, s'est éclairci peu à peu, et l'observation du Soleil a pu être faite dans de bonnes conditions. Le méridien géographique a été conclu de dix pointés de l'astre, pris de 3^h 10^m à 3^h 27^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur le disque Sud de la gare de Magenta, à 1^{km} au Sud-Sud-Ouest. Baromètre, 684^{mm}; thermomètre, 28°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

120.11,2
120.11,2
120.11,3
120.10,8
120.10,6
Moyenne..... 120.11,0
Azimut du repère 213° 29', 5

Déclinaison.

La déclinaison a été observée seulement avec le barreau n° 1 de la boussole, de 2^h 45^m à 3^h du soir (temps local). Le court séjour que nous avons fait à Magenta ne nous a pas laissé le temps de répéter l'observation.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 2 ^h 45 ^m à 3 ^h	105° 14', 1
Méridien géographique	120° 11', 0
Méridien magnétique	105° 14', 1
Déclinaison	14.56, 9
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	15° 58', 0
Correction de latitude	— 1', 0
Différence : Le Parc-Magenta	1. 0, 1

En ramenant cette observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15°.52',2
Le Parc-Magenta.....	1. 0,1
<i>Déclinaison</i> à Magenta le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>14.52,1</u>

Composante horizontale.

Il a été possible de faire deux mesures de la composante horizontale, de 1^h20^m à 2^h25^m du soir (temps local), avec les deux barreaux de la boussole. Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les observations ont été faites à l'ombre, sous un pin de haute futaie.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	14° 8' 58"	3 ^s ,1495	23°,8	23°,9	0,25547	} 0,25550
N° 2....	16° 26' 15"	2 ^s ,9435	23°,7	23°,7	0,25553	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur					0,19467	
Différence : Magenta-Le Parc					0,06083	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	0,19480
Magenta-Le Parc.....	0,06083
<i>Composante horizontale</i> à Magenta le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,25563</u>

Inclinaison.

L'inclinaison a été obtenue par une seule observation complète, faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 0^h30^m à 1^h5^m du soir (temps local).

Marque en haut.....	52° 49',0	} 52°.48',1
Marque en bas	52° 47',1	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,0	
Différence : Le Parc-Magenta	<u>12.25,9</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	65°.14,9
Le Parc-Magenta.....	12.25,9
<i>Inclinaison</i> à Magenta le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>52.49,0</u>

Les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur montrent que les variations des éléments magnétiques ont été très régulières pendant le temps des opérations faites à Magenta le 3 juin 1887.

XXVII. — MAISON CARRÉE.

25 MAI 1887.

Station.

Le village de Maison Carrée est à 10^{km} au sud-est d'Alger. Terrain d'alluvion. On s'est établi dans le lit (rive gauche) de l'oued el Harrach, à 100^m en amont du pont jeté sur la route de Tizi-Ouzou, à 500^m Est-Nord-Est du point de jonction des lignes de chemins de fer d'Oran et de Constantine à Alger. Altitude, 3^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 0° 47', 9 E.
Latitude..... 36° 43', 2 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déduit de dix observations du Soleil, faites de 7^h 28^m à 7^h 44^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la croix de l'église de Maison Carrée, à 600^m dans la direction du Nord-Est.

Baromètre, 763^{mm}; thermomètre, 14°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

192.12,7
192.12,5
192.12,5
192.12,7
192.13,3

Moyenne..... 192.12,7
Azimut du repère..... 51° 22', 8

Déclinaison.

L'observation de la déclinaison a été faite avec le barreau n° 1 de la boussole, de 7^h 5^m à 7^h 20^m du matin (temps local); elle n'a pas été répétée avec le second barreau.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 5 ^m à 7 ^h 20 ^m	178.20,7
Méridien géographique.....	192° 12' 7
Méridien magnétique.....	178° 20' 7
Déclinaison.....	13.52,0
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15° 54' 4
Correction de latitude.....	+ 0,7
Différence : Le Parc-Maison Carrée.....	2. 3,1

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52',2
Le Parc-Maison Carrée.....	2. 3,1
<i>Déclinaison</i> à Maison Carrée le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>13.49,1</u>

Composante horizontale.

Comme la déclinaison, la composante horizontale a été mesurée seulement avec le n° 1 de la boussole; cette observation a été faite de 6^h 20^m à 6^h 50^m du matin (temps local). Les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant. L'appareil était au soleil.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	14° 35' 35"	3 ^s , 17 10	11°, 8	11°, 8	0,24993
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					<u>0,19445</u>
Différence : Maison Carrée-Le Parc.....					0,05548

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Maison Carrée-Le Parc.....	<u>0,05548</u>
<i>Composante horizontale</i> à Maison Carrée le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,25028</u>

Inclinaison.

L'observation de l'inclinaison a été faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 5^h 35^m à 6^h 5^m du matin (temps local). En voici les résultats :

Marque en haut.....	54° 11',9	} 54°.12,8
Marque en bas.....	54° 13',7	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,3	
Différence : Le Parc-Maison Carrée.....	<u>11. 2,5</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Maison Carrée.....	<u>11. 2,5</u>
<i>Inclinaison</i> à Maison Carrée le 1 ^{er} janvier 1888....	<u>54.12,4</u>

D'après les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, les observations faites à Maison Carrée, le 25 mai 1887, correspondent à une situation magnétique presque calme. On remarque toutefois une légère anomalie en comparant les résultats obtenus à cette station avec ceux d'Alger (Jardin d'Essai) et de Boudzaréah (*voir* ces deux stations).

XXVIII. — MALAGA.

8 JUIN 1887.

Station.

Les observations ont été faites dans l'hacienda de San José. Cette magnifique propriété, située à 4^{km} au nord du port, sur la rive gauche d'un torrent, appartient à M. Heredia; l'entrée nous en a été gracieusement accordée sur la recommandation de M. le baron de Collonges, consul de France à Malaga. On s'est installé dans la partie supérieure, au milieu d'une allée bordée d'arbres. Altitude, 30^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 6° 45', 3 O.
Latitude..... 36° 44', 6 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été déduite de huit observations du Soleil, faites de 3^h 43^m à 3^h 56^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur un tronc d'arbre au sommet d'une colline au Nord-Ouest, à la distance de 1^{km} environ.

Baromètre, 758^{mm}; thermomètre, 25°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	101.49,3
	101.49,5
	101.49,3
	101.48,8
Moyenne.....	101.49,2
Azimut du repère.....	315° 43', 8

Déclinaison.

Nous n'avons pu rester que quelques heures à terre à Malaga; cette circonstance n'a pas permis de répéter les observations.

Il n'a donc été fait qu'une mesure complète de la déclinaison, avec le barreau n° 1 de la boussole, de 4^h 15^m à 4^h 30^m du soir (temps local).

On a trouvé :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 4 ^h 15 ^m à 4 ^h 30 ^m	85.21,6
Méridien géographique.....	101° 49', 2
Méridien magnétique.....	85° 21', 6
Déclinaison.....	16.27,6
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15° 58', 8
Correction de latitude.....	— 0,5
Différence : Malaga-Le Parc.....	0.29,3

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52',2
Malaga-Le Parc.....	0.29,3
<i>Déclinaison</i> à Malaga le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>16.21,5</u>

Composante horizontale.

Comme la déclinaison, la composante horizontale n'a pu être observée qu'avec un des barreaux de la boussole, de 3^b à 3^h 30^m du soir (temps local), et il n'a été fait qu'une seule série de 1200 scillations, avant les expériences de déviations. L'appareil était placé à l'ombre.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	14° 49' 45"	3 ^s , 2420	25°, 4	25°, 3	0,24255
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19493
Différence : Malaga-Le Parc.....					<u>0,04762</u>

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Malaga-Le Parc.....	0,04762
<i>Composante horizontale</i> à Malaga le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,24242</u>

Inclinaison.

L'inclinaison résulte d'une seule observation, faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 2^h 10^m à 2^h 40^m du soir (temps local).

Marque en haut.....	55° 57',3	} 55°.54',4
Marque en bas.....	55° 51',5	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.13.0	
Différence : Le Parc-Malaga.....	<u>9.18,6</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Malaga.....	9.18,6
<i>Inclinaison</i> à Malaga le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>55.56,3</u>

On remarque une faible agitation sur les courbes du magnétographe pendant le temps des observations faites à Malaga le 8 juin 1887.

XXIX. — MALTE (LA VALETTE).

2 MAI 1887.

Station.

On s'est établi sur la colline de Taxbiesch, située à l'ouest et en dehors de la ville de La Valette, en face et au sud-est du lazaret, à 2^{km} Ouest du port (*voir* Malte, Città Vecchia).

Le pied des appareils a été installé au sommet de la colline, dans un champ récolté. Altitude, 25^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude.....	12° 10', 8 E.
Latitude.....	35° 53', 8 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été déduite de dix observations du Soleil, faites de 7^h52^m à 8^h10^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la croix de l'église anglaise Saint-Paul, à 1500^m à l'Est. Baromètre, 760^{mm}; thermomètre, 22°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

154.°53',9
154.53,9
154.53,9
154.54,4
154.54,2

Moyenne..... 154.54,1
Azimet du repère..... 82° 43',6

Déclinaison.

On a observé la déclinaison avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 8^h20^m à 8^h55^m du matin (temps local).

Les résultats sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 8 ^h 20 ^m à 8 ^h 35 ^m	144.°59',3	} 144.°59',6
Barreau n° 2. — De 8 ^h 40 ^m à 8 ^h 55 ^m	145. 0,0	
Méridien géographique.....	154.54,1	
Méridien magnétique.....	144.59,6	
Déclinaison	9.54,5	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.58,0	} 15.58,7
Correction de latitude	+ 0,7	
Différence Le Parc-Malte (La Valette).....	6. 4,2	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-La Valette.....	6. 4,2
<i>Déclinaison</i> à Malte (La Valette) le 1 ^{er} janvier 1888.....	9.48,0

Composante horizontale.

La composante horizontale a été mesurée également avec les deux barreaux de la boussole; les opérations ont été effectuées de 9^h15^m à 10^h20^m du matin (temps local). Une série de 100 oscillations du barreau déviant a précédé et suivi les expériences de déviations.

L'appareil était placé à l'ombre d'un caroubier.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	14° 5' 0"	3,0740	22°, 2	22°, 2	0,26234
N° 2....	16° 51' 48"	2,8315	22°, 7	22°, 7	0,26236
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19474
Différence : La Valette-Le Parc					0,06761

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
La Valette-Le Parc	0,06761
<i>Composante horizontale</i> à Malte (La Valette) le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,26241

Inclinaison.

Il n'a été fait qu'une mesure complète de l'inclinaison, de 10^h45^m à 11^h25^m du matin (temps local). L'aiguille n° 1 de la boussole a servi à cette opération.

Marque en haut.....	51° 22', 2	} 51.22,1
Marque en bas.....	51° 22', 0	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	65.14,2	
Différence : Le Parc-La Valette.....	13.52,1	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-La Valette	13.52,1
<i>Inclinaison</i> à Malte (La Valette) le 1 ^{er} janvier 1888	51.22,8

Une assez forte agitation des barreaux aimantés se montre sur les courbes du magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, pendant les opérations faites à Malte (La Valette) le 2 mai 1887.

XXX. — MALTE (CITTA VECCHIA).

3 MAI 1887.

Station.

Les observations faites le 2 mai à La Valette ont pu être contrôlées par de nouvelles déterminations effectuées le lendemain dans l'intérieur de l'île, à 9^{km} Ouest-Sud-Ouest du port, dans le voisinage de Città Vecchia, ancienne capitale de Malte.

On s'est placé à 1500^m au sud-est de la ville, à 400^m au sud de la voie ferrée de La Valette à Notabile. Altitude, 150^m.

Coordonnées de Città Vecchia.

Longitude.....	12° 3'E.
Latitude.....	35° 52'N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déduit de dix pointés du Soleil, observés de 8^h 5^m à 8^h 23^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la croix qui surmonte le dôme de la cathédrale de Città Vecchia, à 1500^m dans la direction du Nord-Ouest. Baromètre, 747^{mm}; thermomètre, 22°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	91.59,1	
	91.58,0	
	91.58,1	
	91.57,6	
	91.57,9	
Moyenne.....	91.58,1	
Azimat du repère		332° 47',6

Déclinaison.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement servi à la mesure de la déclinaison, de 7^h 25^m à 8^h du matin (temps local).

Les résultats de l'observation sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 25 ^m à 7 ^h 40 ^m	82. 8,3	} 82. 8,1
Barreau n° 2. — De 7 ^h 45 ^m à 8 ^h	82. 7,9	
Méridien géographique.....	91.58,1	
Méridien magnétique.....	82. 8,1	
Déclinaison.....		9. 50,0
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.53,0	} 15.53,7
Correction de latitude.....	+0,7	
Différence : Le Parc-Città Vecchia.....		6. 3,7

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Città Vecchia.....	6. 3,7
<i>Déclinaison</i> à Malte (Città Vecchia) le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>9.48,5</u>

Composante horizontale.

La composante horizontale a été observée seulement avec le barreau n° 1 de la boussole, de 8^h35^m à 9^h10^m du matin (temps local). Les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

La partie intérieure de l'île étant à peu près dépourvue d'arbres, il n'a pas été possible de protéger l'appareil de l'action directe du Soleil pendant la mesure de la composante horizontale.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	14°6'38"	3 ^s ,0730	22°,2	22°,4	0,26218
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					<u>0,19437</u>
Différence : Città Vecchia-Le Parc					<u>0,06781</u>

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Città Vecchia-Le Parc	<u>0,06781</u>
<i>Composante horizontale</i> à Malte (Città Vecchia) le 1 ^{er} janvier 1888	<u>0,26261</u>

Inclinaison.

Une mesure complète de l'inclinaison a été faite avec l'aiguille n° 2 de la-boussole, de 9^h40^m à 10^h20^m du matin (temps local).

En voici les résultats :

Marque en haut	51°23',6	} 51.22,6
Marque en bas	51°21',6	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,8	
Différence : Le Parc-Città Vecchia.....	<u>13.53,2</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Città Vecchia	<u>13.53,2</u>
<i>Inclinaison</i> à Malte (Città Vecchia) le 1 ^{er} janvier 1888	<u>51.21,7</u>

Les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur témoignent encore, comme la veille, d'une certaine agitation pendant les expériences faites à Malte (Città Vecchia), le 3 mai 1887.

XXXI. — MANOUBA (LA).

11 MAI 1887.

Station.

Le 10 mai, à Carthage, le fil du théodolite-boussole s'est rompu à son extrémité inférieure, près de l'étrier. Il n'a pas été nécessaire de le remplacer, la partie enroulée sur le treuil étant de longueur suffisante pour qu'il ait été possible de le rétablir facilement. L'opération a été faite à Tunis, le même jour à 3^h; l'appareil, surveillé pendant toute l'après-midi, est resté monté jusqu'au lendemain matin, au moment du départ pour La Manouba : le fil était alors bien détordu.

Les observations ont eu pour objet le contrôle de celles du Bardo (*voir* Tunis); elles ont été faites dans le parc du palais Khérédine, situé à 1500^m au sud-ouest de la gare de La Manouba, à 9^{km} Ouest-Nord-Ouest de Tunis. On s'est installé sur le bord de l'allée principale, plantée de poivriers. Altitude, 25^m.

Notre ami M. Ch. Gauthier, professeur à l'École nationale des Arts décoratifs de Paris, a bien voulu nous assister dans ces opérations.

Coordonnées du point choisi.

Longitude 7° 44' E.
Latitude 36° 50' N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal a été déduite de dix observations du Soleil, faites de 8^h 26^m à 8^h 43^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur le faite de la cheminée centrale du Palais, à 200^m dans la direction Ouest-Sud-Ouest.

Baromètre, 763^{mm}; thermomètre, 20°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

120.27,3
120.27,1
120.27,5
120.26,8
120.26,9
Moyenne..... 120.27,1

Azimut du repère 240° 57', 2

Déclinaison.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement servi à la mesure de la déclinaison, de 9^h à 9^h 35^m du matin (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 9 ^h à 9 ^h 15 ^m	108.59,2	} 108.59,1
Barreau n° 2. — De 9 ^h 20 ^m à 9 ^h 35 ^m	108.59,0	
Méridien géographique	120.27,1	
Méridien magnétique	108.59,1	
Déclinaison	11.28,0	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.53,6	} 15.53,8
Correction de latitude	+ 0,2	
Différence : Le Parc-La Manouba	4.25,8	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15.52,2
Le Parc-La Manouba	4.25,8
<i>Déclinaison</i> à La Manouba le 1 ^{er} janvier 1888	11.26,4

Composante horizontale.

On a employé également les deux barreaux de la boussole à la mesure de la composante horizontale, de 7^h à 8^h 10^m du matin (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant. Les opérations ont été faites à l'ombre.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	14° 29' 32"	3°, 1120	14°, 6	14°, 6	0,25553
N° 2....	17° 7' 52"	2°, 8850	15°, 5	15°, 6	0,25553
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur					0,19462
Différence : La Manouba-Le Parc					0,06091

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	0,19480
La Manouba-Le Parc	0,06091
<i>Composante horizontale</i> à La Manouba le 1 ^{er} janvier 1888	0,25571

Inclinaison.

L'aiguille n° 2 de la boussole a seule servi à la mesure de l'inclinaison; l'observation a été faite de 10^h à 10^h 40^m du matin (temps local). On a trouvé :

Marque en haut	53° 3', 2	} 53° 3', 9
Marque en bas	53° 4', 6	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	65.14,8	
Différence : Le Parc-La Manouba	12.10,9	

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	65.14,9
Le Parc-La Manouba	12.10,9
<i>Inclinaison</i> à La Manouba le 1 ^{er} janvier 1888	53. 4,0

Les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur ont une allure très régulière pendant le temps des observations faites à la Manouba le 11 mai 1887.

XXXII. — MASCARA.

2 JUIN 1887.

Station.

Les observations ont été faites sur le mamelon situé à l'ouest de la gare, du côté opposé à la ville. Terrain miocène helvétique. Le point où ont été placés les appareils se trouve à 250^m à l'ouest du chemin de fer. Altitude, 588^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 2° 11', 9 O.
Latitude..... 35° 23'. 5 N.

Méridien géographique.

Le ciel, pluvieux au lever du Soleil, s'est éclairci peu à peu, mais les observations ont été contrariées par un vent de Nord-Ouest qui soufflait avec une grande force.

La trace du méridien géographique a été conclue de dix observations du Soleil, faites de 8^h 41^m à 8^h 59^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur une ancienne tour du télégraphe aérien, à 2^{km} au Nord-Ouest.

Baromètre, 714^{mm}; thermomètre, 18°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	186.36,6
	186.37,3
	186.36,7
	186.35,9
	186.36,6
Moyenne.....	186.36,6
Azimut du repère.....	320° 41', 1

Déclinaison.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement été employés à la mesure de la déclinaison, de 9^h 10^m à 9^h 45^m du matin (temps local).

Voici les résultats de l'observation :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 9 ^h 10 ^m à 9 ^h 25 ^m	171.57,1	} 171.57,0
Barreau n° 2. — De 9 ^h 30 ^m à 9 ^h 45 ^m	171.56,9	
Méridien géographique.....	186.36,6	
Méridien magnétique.....	171.57,0	
Déclinaison.....		14.39,6
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.54,0	} 15.54,2
Correction de latitude.....	+ 0,2	
Différence : Le Parc-Mascara ..		1.14,6

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Mascara.....	1.14,6
<i>Déclinaison</i> à Mascara le 1 ^{er} janvier 1888.....	14.37,6

Composante horizontale.

La composante horizontale a été observée seulement avec le barreau n° 1 de la boussole, de 10^h à 10^h30^m du matin (temps local), et il n'a été fait qu'une série de 100 oscillations du barreau déviant, immédiatement avant les expériences de déviations.

Les opérations ont été faites à l'ombre, sous un amandier.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviation.	
N° 1.....	14° 19' 45"	3°, 1590	19°, 0	19°, 1	0,25313
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19460
Différence : Mascara-Le Parc.....					0,05853

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Mascara-Le Parc.....	0,05853
<i>Composante horizontale</i> à Mascara le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25333

Inclinaison.

La valeur de l'inclinaison a été conclue d'une seule observation complète, faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 10^h50^m à 11^h30^m du matin (temps local).

Marque en haut.....	53° 22', 4	} 53°. 22', 0
Marque en bas.....	53° 21', 7	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,2	
Différence : Le Parc-Mascara.....	11.52,2	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°. 14', 9
Le Parc-Mascara.....	11.52,2
<i>Inclinaison</i> à Mascara le 1 ^{er} janvier 1888.....	53.22,7

Les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur montrent que les observations de Mascara, du 2 juin 1887, ont été faites en temps de calme magnétique.

XXXIII. — MECHERIA.

31 MAI ET 1^{er} JUIN 1887.

Station.

Mecheria est un poste militaire établi sur les hauts plateaux du Sud-Oranais, à 180^{km} au sud de Saïda, au pied du Djebel Antar, dont le massif se rapporte au terrain crétacé inférieur. La porte d'entrée du camp retranché est à 1170^m d'altitude. Un village européen s'est formé dans le voisinage. Les observations ont été faites à 100^m au delà des dernières maisons, dans la direction de l'Est, à 500^m à l'est de la voie ferrée.

Coordonnées de Mecheria.

Longitude 2° 32' O.
Latitude 33° 37' N.

Méridien géographique.

Des mesures de la déclinaison ont été faites le 31 mai et le 1^{er} juin, sensiblement au même point; on a, pour chaque série, déterminé le méridien géographique par dix observations du Soleil. On s'est repéré sur le sommet du poste B de Télégraphie optique, situé sur le Djebel Antar, à 2^{km} environ au Nord-Nord-Ouest.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

31 mai, de 5 ^h 25 ^m à 5 ^h 47 ^m s. (t. l.).	1 ^{er} juin, de 7 ^h 25 ^m à 7 ^h 42 ^m m. (t. l.).
Baromètre, 664 ^{mm} ; thermomètre, 32°.	Baromètre, 664 ^{mm} ; thermomètre, 24°.
122.5,7	180.28,8
122.5,1	180.28,4
122.5,6	180.28,5
122.5,3	180.28,6
122.5,1	180.28,0
Moyenne..... 122.5,4	Moyenne..... 180.28,5

Déclinaison.

La déclinaison a été mesurée avec les deux barreaux de la boussole le 31 mai, de 6^h 10^m à 6^h 45^m du soir, et avec le barreau n° 1 seulement, le 1^{er} juin, de 7^h 5^m à 7^h 20^m du matin (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

31 mai. Barreau n° 1. — De 6 ^h 10 ^m à 6 ^h 25 ^m	107°.24,7	} 107°.24,8
31 » Barreau n° 2. — De 6 ^h 30 ^m à 6 ^h 45 ^m	107.24,8	
1 ^{er} juin. Barreau n° 1. — De 7 ^h 5 ^m à 7 ^h 20 ^m	165.52,5	
	31 mai.	1 ^{er} juin.
Déclinaison	14.40,6	14.36,0
Déclinaison corresp. au Parc S ^t -Maur... 15.55,3	} 15.55,3	} 15.53,4
Correction de latitude 0,0		
Différences	1.14,7	1.17,4
Différence moyenne : Le Parc-Mecheria	1.16,0	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15°.52',2
Le Parc-Mecheria	1.16,0
<i>Déclinaison</i> à Mecheria le 1 ^{er} janvier 1888	14.36,2

Composante horizontale.

La composante horizontale a été mesurée avec les deux barreaux de la boussole, le 1^{er} juin, de 4^h20^m à 5^h30^m du matin (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Le pays est absolument dépourvu d'arbres; mais les opérations ont commencé avant le lever du Soleil, et, comme une brume épaisse couvrait l'horizon jusqu'à 10° environ de hauteur, on a pu les achever avant que l'appareil fût exposé aux rayons solaires. Pendant toute la durée des observations, la température extérieure a varié seulement de 0°,3.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	13° 51' 8"	3 ^s , 1060	16°, 4	16°, 4	0,26176
N° 2....	16° 7' 25"	2 ^s , 9020	16°, 6	16°, 6	0,26163
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur					0,19474
Différence : Mecheria-Le Parc					0,06695

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	0,19480
Mecheria-Le Parc	0,06695
<i>Composante horizontale</i> à Mecheria le 1 ^{er} janvier 1888	0,26175

Inclinaison.

Il a été fait deux mesures de l'inclinaison, le 1^{er} juin, de 5^h50^m à 6^h55^m du matin (temps local).

Aiguille n° 2. — Marque en haut	51°.17',3	} 51°.14',8
» — Marque en bas	51.12,3	
Aiguille n° 1. — Marque en haut	51.14,1	} 51.16,5
» — Marque en bas	51.19,0	
Inclinaison	51.15,7	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	65.14,9	
Différence : Le Parc-Mecheria	13.59,2	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	65°.14',9
Le Parc-Mecheria	13.59,2
<i>Inclinaison</i> à Mecheria le 1 ^{er} janvier 1888	51.15,7

Les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur témoignent d'une certaine agitation dans la matinée du 1^{er} juin 1887.

XXXIV. — MÉNERVILLE.

23 MAI 1887.

Station.

Le village de Ménerville est bâti au col des Beni Aïcha, point culminant de la route d'Alger à Tizi-Ouzou, entre les vallées du Bou Merdès et de l'Isser. Terrain miocène.

On s'est établi à 300^m au sud du bourg et de la gare du chemin de fer, en haut de l'allée principale d'une grande propriété plantée en vigne. Altitude, 150^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude.....	1° 13', 4 E.
Latitude.....	36° 43', 5 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal a été déduite de huit observations du Soleil, faites de 4^h32^m à 4^h45^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur la boule du clocher de l'église de Ménerville, à 400^m dans la direction du Nord.

Baromètre, 750^{mm}; thermomètre, 19°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal

	98.5,7
	98.5,3
	98.5,4
	98.5,5
Moyenne.....	98.5,5
Azimet du repère.....	7° 31', 9

Déclinaison.

La déclinaison a été déduite d'une observation unique, faite de 5^h5^m à 5^h20^m du soir (temps local), avec le barreau n° 1 de la boussole.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 5 ^h 5 ^m à 5 ^h 20 ^m	84.19,9
Méridien géographique.....	98. 5,5
Méridien magnétique.....	84.19,9
Déclinaison.....	13.45,6
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.57,6
Correction de latitude.....	— 0,2
	15.57,4
Différence : Le Parc-Ménerville.....	2.11,8

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52',2
Le Parc-Ménerville.....	2.11,8
<i>Déclinaison</i> à Ménerville le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>13.40,4</u>

Composante horizontale.

On n'a employé également qu'un seul barreau à la détermination de la composante horizontale. L'observation a été faite au soleil, de 5^h30^m à 6^h du soir (temps local). Une série de 100 oscillations du barreau déviant a précédé et suivi les expériences de déviations.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviation.	
N° 1.....	14°29'45"	3°,1650	17°,9	17°,9	0,25123
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					<u>0,19485</u>
Différence : Ménerville-Le Parc.....					0,05638

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Ménerville-Le Parc.....	<u>0,05638</u>
<i>Composante horizontale</i> à Ménerville le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,25118</u>

Inclinaison.

L'inclinaison a été observée avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 6^h15^m à 6^h45^m du soir (temps local). Voici le résultat de l'observation :

Marque en haut.....	54°7',1	} 54°. 5',6
Marque en bas.....	54°4',1	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.12,9	
Différence : Le Parc-Ménerville.....	<u>11. 7,3</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Ménerville.....	<u>11. 7,3</u>
<i>Inclinaison</i> à Ménerville le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>54. 7,6</u>

D'après les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, la variation de la déclinaison est régulière pendant les observations faites à Ménerville; mais on remarque une certaine agitation aux courbes des deux composantes pendant la mesure de l'inclinaison et de la composante horizontale.

XXXV. — NAPLES.

29 AVRIL 1887.

Station.

Les observations ont été faites à l'observatoire de Naples, situé sur la colline de Capodimonte, qui domine la ville au Nord. M. F. Brioschi s'est mis à notre disposition avec la plus grande obligeance, et MM. Contarino et Angelitti ont bien voulu suivre nos opérations.

La barre d'appui des fenêtres du pavillon magnétique étant trop élevée pour que la lunette du théodolite de voyage puisse viser les repères habituels, on s'est placé à l'extérieur du pavillon, devant la fenêtre de l'Est. Altitude, 149^m.

Coordonnées de l'observatoire.

Longitude.....	11° 54', 9 E.
Latitude.....	40° 51', 8 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite n'a pas été déterminée directement; M. Brioschi a bien voulu nous communiquer l'azimut de la flèche Sud de l'église de Santa Justina in Cercola, située dans la direction de l'Est. Cet azimut est, il est vrai, compté du centre du pilier du pavillon magnétique; mais notre appareil était placé à quelques mètres seulement en avant du pilier, dans la direction aussi exacte que possible du repère, distant de 10^{km}.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

Visée sur le repère. — Lunette à droite.....	266° 56', 0	} 266° 56', 5
» — Lunette à gauche.....	266° 57', 0	
Azimut du repère.....	93. 9, 6	
Méridien géographique.....	173. 46, 9	

Déclinaison.

La déclinaison a été observée successivement avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 3^h 35^m à 4^h 20^m du soir (temps local).

On a trouvé :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 3 ^h 35 ^m à 3 ^h 50 ^m	163° 26', 0	} 163° 26', 0
Barreau n° 2. — De 4 ^h à 4 ^h 20 ^m	163° 26', 0	
Méridien géographique.....	173. 46, 9	
Méridien magnétique.....	163. 26, 0	
Déclinaison.....	10. 20, 9 (1)	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15. 59, 0	} 15. 58, 7
Correction de latitude.....	— 0, 3	
Différence : Le Parc-Naples.....	5. 37, 8	

(1) Le déclinomètre de l'observatoire de Naples indiquait simultanément 10° 19', 7.

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52',2
Le Parc-Naples.....	5.37,8
<i>Déclinaison</i> à Naples le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>10.14,4</u>

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont été également employés à la détermination de la composante horizontale, de 4^h30^m à 5^h30^m du soir (temps local). Les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les opérations ont été faites à l'ombre.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	15°30'15"	3 ^s ,2125	17°,7	17°,8	0,23951	{ 0,23944
N° 2....	18°34'8"	2 ^s ,9620	17°,2	17°,3	0,23937	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19462	
Différence : Naples-Le Parc.....					<u>0,04482</u>	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Naples-Le Parc.....	0,04482
<i>Composante horizontale</i> à Naples le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,23962</u>

Inclinaison.

L'inclinaison a été déduite d'une seule mesure complète, faite avec l'aiguille n° 2, de 5^h50^m à 6^h20^m du soir (temps local). Voici les résultats de l'observation :

Marque en haut.....	56°51',3	{ 56°.50',3
Marque en bas.....	56°49',3	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,4	
Différence : Le Parc-Naples.....	<u>8.24,1</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Naples.....	8.24,1
<i>Inclinaison</i> à Naples le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>56.50,8</u>

Une assez forte perturbation s'était produite dans la nuit du 28 au 29 avril; une très faible agitation se montre encore sur les courbes, notamment sur celle du bifilaire, pendant le temps des observations faites à Naples.

XXXVI. — ORAN.

6 JUIN 1887.

Station.

Les observations ont été faites dans le champ de courses d'Oran, situé en dehors de la ville, à 4^{km} à l'est du port, au delà du *Ravin blanc*, entre la côte et le village neuf de Gambetta. Terrain pliocène.

On s'est placé vers la limite Sud-Est de l'hippodrome, à 250^m des tribunes et à égale distance environ de la ligne de chemin de fer spéciale au service du port. Altitude, 108^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 2° 57', 4 O.
Latitude..... 35° 42', 5 N.

Méridien géographique.

On a calculé le méridien géographique d'après dix observations du Soleil, faites de 7^h 44^m à 7^h 59^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur un marabout situé au sud-ouest du fort Santa-Cruz, au sommet de la montagne qui domine la ville à l'Ouest. Ce repère est à 5^{km} à l'ouest du point d'observation. Baromètre, 763^{mm}; thermomètre, 20°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	216.32,1
	216.33,1
	216.32,8
	216.32,2
	216.32,3
Moyenne.....	216.32,5
Azimut du repère.....	264° 42', 8

Déclinaison.

Deux mesures complètes de la déclinaison ont été effectuées de 6^h 55^m à 7^h 30^m du matin (temps local). En voici les résultats :

Barreau n° 1. — De 6 ^h 55 ^m à 7 ^h 10 ^m	201.28,2	} 201.28,0
Barreau n° 2. — De 7 ^h 15 ^m à 7 ^h 50 ^m	201.27,8	
Méridien géographique.....	216.32,5	
Méridien magnétique.....	201.28,0	
Déclinaison.....		15. 4,5
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.51,0	} 15.51,8
Correction de latitude.....	+0,8	
Différence : Le Parc-Oran		0.47,3

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52',2
Le Parc-Oran.....	0.47,3
<i>Déclinaison</i> à Oran le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>15. 4,9</u>

Composante horizontale.

La composante horizontale a été déterminée avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 8^h20^m à 9^h35^m du matin (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

L'appareil était placé à l'ombre, sous un figuier isolé.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	14° 17' 20"	3 ^s , 1715	20°, 6	20°, 6	0,25248
N° 2....	16° 36' 55"	2 ^s , 9605	21°, 1	21°, 1	0,25274
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19462
Différence : Oran-Le Parc					<u>0,05799</u>

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Oran-Le Parc.....	0,05799
<i>Composante horizontale</i> à Oran le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,25279</u>

Inclinaison.

Une mesure complète de l'inclinaison a été effectuée avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 10^h à 10^h30^m du matin (temps local).

Les résultats de cette observation sont les suivants :

Marque en haut	53° 46',9	} 53°.45',4
Marque en bas	53° 43',9	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,1	
Différence : Le Parc-Oran	<u>11.29,7</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Oran.....	11.29,7
<i>Inclinaison</i> à Oran le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>53.45,2</u>

Les observations faites à Oran le 6 juin 1887 correspondent à une période de calme magnétique.

XXXVII. — ORLÉANSVILLE.

29 MAI 1887.

Station.

Les observations ont été faites, à l'est et en dehors de la ville, sur la rive gauche du Chéloff, à 50^m du mur d'enceinte et à la même distance au nord de la route d'Orléansville à Miliana. Terrain miocène helvétien. Altitude, 136^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 1° 0', 0 O.
Latitude..... 36° 9', 9 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été conclue de dix observations du Soleil, faites par un très beau temps, de 8^h 6^m à 8^h 24^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur un marabout situé à 4^{km} environ dans la direction du Nord-Nord-Est.

Baromètre, 749^{mm}; thermomètre, 23°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	174°. 22', 7
	174. 22, 7
	174. 23, 1
	174. 22, 1
	174. 22, 1
Moyenne.....	174. 22, 5
Azimut du repère.....	24° 43', 0

Déclinaison.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement servi à la mesure de la déclinaison, de 7^h 25^m à 8^h 0^m du matin (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 25 ^m à 7 ^h 40 ^m	159°. 59', 2	} 159°. 59', 3
Barreau n° 2. — De 7 ^h 45 ^m à 8 ^h 0 ^m	159. 59, 4	
Méridien géographique.....	174. 22, 5	
Méridien magnétique.....	159. 59, 3	
Déclinaison.....		14. 23, 2
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15. 52, 1	} 15. 52, 9
Correction de latitude.....	+ 0, 8	
Différence : Le Parc-Orléansville.....		1. 29, 7

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15.52,2
Le Parc-Orléansville	1.29,7
<i>Déclinaison</i> à Orléansville le 1 ^{er} janvier 1888	14.22,5

Composante horizontale.

La composante horizontale a été mesurée également avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 5^h40^m à 6^h45^m du matin (temps local). Une série de 100 oscillations a, dans chaque cas, précédé et suivi les expériences de déviations.

Les observations ont été faites à l'ombre, sous un pin.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	14° 22' 37"	3 ^a , 1850	19°, 3	19°, 3	0,25066
N° 2....	16° 50' 45"	2 ^a , 9670	20°, 0	20°, 0	0,25050
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19458
Différence : Orléansville-Le Parc.....					0,05600

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Orléansville-Le Parc.....	0,05600
<i>Composante horizontale</i> à Orléansville le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25080

Inclinaison.

La valeur absolue de l'inclinaison a été conclue d'une seule observation complète, faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 4^h50^m à 5^h20^m du matin (temps local).

Marque en haut	54° 3', 9	} 54. 2,9
Marque en bas	54° 1', 9	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	65.14,7	
Différence : Le Parc-Orléansville.....	11.11,8	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Orléansville.....	11.11,8
<i>Inclinaison</i> à Orléansville le 1 ^{er} janvier 1888.....	54. 3,1

Les variations des éléments magnétiques sont très régulières pendant le temps des observations faites à Orléansville le 29 mai 1887.

XXXVIII. — PERPIGNAN.

24 ET 25 JUIN 1887.

Station.

Après avoir terminé à Barcelone nos opérations à l'étranger, nous sommes rentré en France par Perpignan, où M. le Dr Fines, directeur de l'observatoire météorologique et magnétique, nous attendait, et se mettait à notre disposition avec son obligeance accoutumée. Le 24 juin au soir et le 25 au matin, nous pûmes faire des mesures des trois éléments, avec nos appareils de voyage, pendant que M. Cœurdevache opérait de son côté en se servant des boussoles de l'observatoire.

Nos observations ont été faites sur le pilier du jardin. Altitude, 30^m.

Coordonnées de l'observatoire.

Longitude..... 0° 32', 8 E.
Latitude..... 42° 42', 1 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été déduit de dix observations, faites le 25 juin de 9^h 3^m à 9^h 37^m du matin (temps local). On s'est repéré sur le candélabre situé vers le milieu du pont de la Pierre, à 700^m dans la direction Est-Nord-Est. Baromètre, 762^{mm}; thermomètre, 25°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

75.6,6
75.6,8
75.6,5
75.6,4
75.7,1
Moyenne..... 75.6,7
Azimut du repère..... 69° 24', 5

Déclinaison.

La déclinaison a été observée avec les deux barreaux de la boussole, le 25 juin, de 8^h 10^m à 8^h 55^m du matin (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 8^h 10^m à 8^h 25^m..... 60.29,0 } 60.29,0
Barreau n° 2. — De 8^h 30^m à 8^h 55^m..... 60.28,9 }
Méridien géographique..... 75. 6,7
Méridien magnétique..... 60.29,0
Déclinaison..... 14.37,7

Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15°.50',7	}	15°.51',0
Correction de latitude.....	+ 0,3		
Différence : Le Parc-Perpignan.....			1.13,3

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15°.52',2
Le Parc-Perpignan.....	1.13,3
<i>Déclinaison</i> à Perpignan le 1 ^{er} janvier 1888.....	14.38,9

Composante horizontale.

La composante horizontale a été mesurée avec les deux barreaux de la boussole, le 25 juin, de 6^h20^m à 7^h40^m du matin (temps local). Une série de 100 oscillations du barreau déviant a été faite avant et après les expériences de déviations. Les observations ont été faites à l'ombre, sous une tente.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	16° 19' 40"	3 ^a , 3845	21°, 9	21°, 7	0,22168	} 0,22166
N° 2....	18° 50' 12"	3 ^a , 1770	22°, 1	22°, 1	0,22164	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19488	
Différence : Perpignan-Le Parc.....					0,02678	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Perpignan-Le Parc.....	0,02678
<i>Composante horizontale</i> à Perpignan le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,22158

Inclinaison.

Deux mesures complètes de l'inclinaison ont été effectuées, avec les deux aiguilles de la boussole, le 24 juin, de 5^h à 6^h du soir (temps local).

Aiguille n° 2. — Marque en haut.....	60°.20',6	}	60°.20',5
» — Marque en bas.....	60.20,4		
Aiguille n° 1. — Marque en haut.....	60.18,9	}	60.21,3
» — Marque en bas.....	60.23,7		
Inclinaison.....			60.20,9
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....			65.13,6
Différence : Le Parc-Perpignan.....			4.52,7

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Perpignan.....	4.52,7
<i>Inclinaison</i> à Perpignan le 1 ^{er} janvier 1888.....	60.22,2

Les observations de Perpignan ont été faites en temps de calme magnétique.

XXXIX. — PHILIPPEVILLE.

19 MAI 1887.

Station.

Les observations ont été faites au sud de la ville et du faubourg de l'Espérance, à 1^{km} du rempart, dans un chemin bordé d'arbres, situé à l'ouest de la route de Constantine, sur la rive droite et au bord de l'oued Ouach, affluent du Zéramna. Le chemin de fer de Constantine passe à plus de 1500^m à l'Est. Altitude, 9^m.

Gneiss; le Djebel Skikda, qui domine la grande darse à l'Est, contient des affleurements de minerai oxydulé magnétique. Cette montagne se trouve à 2500^m au nord-est du point d'observation.

Coordonnées du point choisi.

Longitude	4° 34', 0 E.
Latitude	36° 52', 0 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite résulte de dix observations du Soleil, faites de 7^h 37^m à 7^h 55^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la faite de la cheminée d'une maison, à 400^m au Nord. Baromètre, 765^{mm}; thermomètre, 16°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	235°.1',5	
	235.0,9	
	235.1,4	
	235.0,8	
	235.1,3	
Moyenne.....	235.1,2	
Azimet du repère		8°7',8

Déclinaison.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement servi à la mesure de la déclinaison, qui a été observée de 8^h 20^m à 8^h 55^m du matin (temps local).

Les résultats sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 8 ^h 20 ^m à 8 ^h 35 ^m	222°.26',4	} 222°.26',2
Barreau n° 2. — De 8 ^h 40 ^m à 8 ^h 55 ^m	222.26,1	
Méridien géographique.....	235. 1,2	
Méridien magnétique.....	222.26,2	

Déclinaison		12.35,0
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.54,3	} 15.54,9
Correction de latitude.....	+0,6	

Le Parc-Philippeville.....		3.19,9

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15°.52',2
Le Parc-Philippeville	3.19,9
<i>Déclinaison</i> à Philippeville le 1 ^{er} janvier 1888	12.32,3

Composante horizontale.

La composante horizontale a également été observée avec les deux barreaux de la boussole, de 6^h15^m à 7^h20^m du matin (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les observations ont été faites à l'ombre, l'appareil étant placé sous un mûrier au feuillage épais.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	14°37' 3"	3°, 1342	13°, 6	13°, 6	0,25266
N° 2....	17°19'38"	2°, 8990	14°, 0	14°, 0	0,25290
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur					0,19475
Différence : Philippeville-Le Parc					0,05803

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	0,19480
Philippeville-Le Parc	0,05803
<i>Composante horizontale</i> à Philippeville le 1 ^{er} janvier 1888	0,25283

Inclinaison.

L'aiguille n° 2 a été employée à la mesure de l'inclinaison, qui a été observée de 9^h40^m à 10^h20^m du matin (temps local).

On a trouvé :

Marque en haut	53°37',4	} 53°.37',0
Marque en bas	53°36',5	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	65,14,7	
Différence : Le Parc-Philippeville	11.37,7	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	65°.14',9
Le Parc-Philippeville	11.37,7
<i>Inclinaison</i> à Philippeville le 1 ^{er} janvier 1888	53.37,2

Les courbes magnétiques relevées à l'observatoire du Parc Saint-Maur le 19 mai 1887 montrent une faible agitation pendant les expériences faites à Philippeville,

XL. — ROME.

28 AVRIL 1887.

Station.

Les observations ont été faites dans le jardin de l'École d'Agriculture, située à 3^{km} à l'ouest de la ville, au delà du Tibre, derrière le Vatican. Le pied des appareils a été placé dans une prairie artificielle, à quelques mètres du point où M. Chistoni fait habituellement ses déterminations absolues. Altitude, 90^m.

M. Chistoni a bien voulu nous accompagner et suivre toutes nos opérations.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 10° 6', 0 E.
Latitude..... 41° 53', 2 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été conclue de dix observations du Soleil, effectuées de 8^h 27^m à 8^h 44^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la boule du clocher de Sainte-Marie-Majeure, à 6^{km} dans la direction de l'Est. Baromètre, 761^{mm}; thermomètre, 17°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	223.55,7
	223.54,7
	223.55,0
	223.55,0
	223.54,9
Moyenne.....	223.55,1
Azimet du repère.....	85° 53', 4

Déclinaison.

La déclinaison a été observée avec les deux barreaux de la boussole, de 9^h à 9^h 35^m du matin (temps local), après l'observation du Soleil.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 9 ^h à 9 ^h 15 ^m	212.53,5	} 212.53,4
Barreau n° 2. — De 9 ^h 20 ^m à 9 ^h 35 ^m	212.53,2	
Méridien géographique.....	223.55,1	
Méridien magnétique.....	212.53,4	
Déclinaison.....	11. 1,7	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.52,2	} 15.52,4
Correction de latitude.....	+0,2	
Différence : Le Parc-Rome	4.50,7	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Rome.....	4.50,7
<i>Déclinaison</i> à Rome le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>11. 1,5</u>

Composante horizontale.

La composante horizontale a été déterminée également avec les deux barreaux de la boussole, de 9^h55^m à 11^h du matin (temps local).

Dans chaque cas, il a été fait une série de 100 oscillations du barreau déviant avant et après les expériences de déviations.

L'appareil a été reporté à 50^m au sud du point d'observation de la déclinaison, à l'ombre d'un amandier.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	15° 58' 15"	3 ^s , 2560	18°, 0	18°, 1	0,23292
N° 2....	19° 6' 58"	3 ^s , 0040	18°, 5	18°, 5	0,23275
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19467
Différence : Rome-Le Parc.....					<u>0,03816</u>

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Rome-Le Parc.....	0,03816
<i>Composante horizontale</i> à Rome le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,23296</u>

Inclinaison.

Il n'a été fait qu'une seule mesure complète de l'inclinaison, avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 11^h10^m à 11^h40^m du matin (temps local).

On a trouvé :

Marque en haut.....	58° 11', 4	} 58.10,6
Marque en bas.....	58° 9', 8	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.13,3	
Différence : Le Parc-Rome.....	7. 2,7	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Rome.....	7. 2,7
<i>Inclinaison</i> à Rome le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>58.12,2</u>

D'après les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, on remarque une légère agitation pendant le temps des opérations faites à Rome le 28 avril 1887. Une assez forte perturbation s'est produite la nuit suivante.

XLI. — SAÏDA.

30 ET 31 MAI 1887.

Station.

Les observations ont été faites à 500^m à l'ouest de la ville, à 400^m à l'ouest de la gare, sur la rive gauche de l'oued Saïda, qui descend des hauteurs d'Aïn-el-Hadjar. Altitude, 867^m.

Terrain jurassique.

Coordonnées de Saïda.

Longitude 2° 11' O.
Latitude 34° 50' N.

Méridien géographique.

Le ciel, très beau le matin à Arzew, était très chargé de nuages à notre arrivée à Saïda, le 30 mai au soir. Dans la crainte de ne pouvoir observer le lendemain, nous rendîmes immédiatement au point indiqué plus haut. Il ne fut possible de prendre que six pointés du Soleil, de 5^h 35^m à 5^h 45^m du soir (temps local); quelques minutes plus tard, le ciel était tout à fait couvert.

On s'est repéré sur une borne placée au point culminant d'une colline, à 700^m au Sud. Baromètre, 691^{mm}; thermomètre, 13°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

103.53,5
103.53,5
103.53,3
Moyenne..... 103.53,4
Azimut du repère..... 182° 10',9

Déclinaison.

La déclinaison a été observée successivement avec les deux barreaux de la boussole, le 30 mai, de 6^h 5^m à 6^h 40^m du soir (temps local), après l'observation du Soleil.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 6^h 5^m à 6^h 20^m..... 88.59,1 } 88.58,9
Barreau n° 2. — De 6^h 25^m à 6^h 40^m..... 88.58,7 }
Méridien géographique..... 103.53,4
Méridien magnétique..... 88.58,9
Déclinaison..... 14.54,5
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur..... 15.55,0 } 15.55,0
Correction de latitude..... 0,0 }
Différence : Le Parc-Saïda..... 1. 0,5

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15.52,2
Le Parc-Saïda.....	1. 0,5
<i>Déclinaison</i> à Saïda le 1 ^{er} janvier 1888	14.51,7

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont également servi à la mesure de la composante horizontale, le 31 mai, de 5^h 20^m à 6^h 45^m du matin (temps local). Dans chaque cas, il n'a été fait qu'une seule série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les observations ont été faites à l'ombre d'un talus très élevé, à l'entrée d'une ancienne carrière.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviation.		
N° 1....	14° 13' 45"	3 ^s , 1440	11°, 7	11°, 7	0,25521	} 0,25538
N° 2....	16° 32' 42"	2 ^s , 9340	11°, 9	11°, 9	0,25555	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19470	
Différence : Saïda-Le Parc.....					0,06068	

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Saïda-Le Parc.....	0,06068
<i>Composante horizontale</i> à Saïda le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25548

Inclinaison.

L'aiguille n° 2 de la boussole a seule servi à la mesure de l'inclinaison, de 4^h 35^m à 5^h 5^m du matin (temps local), le 31 mai.

Marque en haut.....	52° 51', 3	} 52.49,5
Marque en bas.....	52° 47', 8	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.13,5	
Différence : Le Parc-Saïda	12.24,0	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	65.14,9
Le Parc-Saïda.....	12.24,0
<i>Inclinaison</i> à Saïda le 1 ^{er} janvier 1888.....	52.50,9

Les courbes magnétiques de l'observatoire du Parc Saint-Maur sont légèrement agitées pendant les observations faites à Saïda les 30 et 31 mai 1887.

XLII. — SAN FERNANDO (CADIX).

13 JUIN 1887.

Station.

L'Observatoire de San Fernando, près Cadix, est en dehors du bassin de la Méditerranée; mais, à défaut de magnétographe en Algérie, il importait de comparer nos appareils de voyage avec les boussoles d'un observatoire du midi de l'Europe, et San Fernando se trouve précisément à la latitude moyenne de nos stations d'Algérie et de Tunisie.

Les observations ont été faites à l'observatoire même, dans la salle du rez-de-chaussée du pavillon magnétique, sur les piliers qui servent habituellement aux mesures absolues. Altitude, 20^m.

Coordonnées de l'Observatoire.

Longitude.....	8°32',6 O.
Latitude.....	36°27',7 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique n'a pas été déterminé directement.

Le repère ordinairement employé à l'observatoire n'était visible avec notre appareil que dans l'une des deux positions de la lunette. M. Pujazon a bien voulu déterminer par comparaison l'azimut d'un repère plus découvert, un candélabre de ville, situé à 350^m environ dans la direction de l'Est.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

Visée sur le repère. — Lunette à droite.....	260°55'0	{	260.55,5
» — Lunette à gauche.....	260°56'0		
Azimut du repère.....	83. 3,4		
Méridien géographique.....	177.52,1		

Déclinaison.

La déclinaison a été successivement mesurée avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 0^h50^m à 1^h25^m du soir (temps local). Voici les résultats obtenus :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 0 ^h 50 ^m à 1 ^h 5 ^m	160.50,9	{	160.51,1
Barreau n° 2. — De 1 ^h 10 ^m à 1 ^h 25 ^m	160.51,3		
Méridien géographique.....	177.52,1		
Méridien magnétique.....	160.51,1		
Déclinaison.....	17. 1,0		
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	16. 0,3	{	15.59,2
Correction de latitude.....	— 1,1		
Différence : San Fernando-Le Parc.....	1. 1,8		

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15.52,2
San Fernando-Le Parc	1. 1,8
<i>Déclinaison</i> à San Fernando le 1 ^{er} janvier 1888	<u>16.54,0</u>

Composante horizontale.

La composante horizontale a été observée également avec les deux barreaux de la boussole, sur le second pilier du pavillon magnétique, de 8^h45^m à 9^h55^m du matin (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	14°50'48"	3 ^s ,2350	25°,6	25°,6	0,24293	} 0,24293
N° 2....	17°16'30"	3 ^s ,0225	25°,9	25°,9	0,24292	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19445	
Différence : San Fernando-Le Parc.....					0,04848	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
San Fernando-Le Parc.....	0,04848
<i>Composante horizontale</i> à San Fernando le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,24328</u>

Inclinaison.

Les deux aiguilles de la boussole ont été employées à la mesure de l'inclinaison, de 10^h10^m à 11^h5^m du matin (temps local). On a trouvé :

Aiguille n° 2.	{	Marque en haut	55°.59,7	} 55°.59,3
	{	Marque en bas.....	55.58,8	
Aiguille n° 1.	{	Marque en haut	55.58,2	} 55.59,7
	{	Marque en bas.....	56. 1,3	
Moyenne.....			55.59,5	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....			65.15,2	
Différence : Le Parc-San Fernando.....			9.15,7	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14,9
Le Parc-San Fernando.....	9.15,7
<i>Inclinaison</i> à San Fernando le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>55.59,2</u>

Les observations faites à San Fernando le 13 juin 1887 correspondent à une époque de calme magnétique.

XLIII. — SÉTIF.

21 MAI 1887.

Station.

On s'est établi à 1^{km} à l'ouest de Sétif, à 30^m au sud de la route d'Alger, à 1500^m au nord du chemin de fer. Altitude, 1085^m. Terrain suessonien.

Coordonnées du point choisi.

Longitude 3° 3',8 E.
Latitude 36° 11',3 N.

Méridien géographique.

Les observations magnétiques proprement dites ont été commencées par un ciel couvert, puis les nuages se sont dissipés peu à peu, et l'observation du Soleil a été faite dans les conditions habituelles. On a pris dix pointés de l'astre, de 3^h28^m à 3^h46^m du soir (temps local).

Une ancienne tour de télégraphe aérien, située à 5^{km} dans la direction de l'Ouest, a servi de repère.

Baromètre, 670^{mm}; thermomètre, 22°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	262.6,3
	262.5,6
	262.5,6
	262.5,9
	262.5,4
Moyenne.....	262.5,8
Azimet du repère.....	267°25',7

Déclinaison.

On a observé la déclinaison avec les deux barreaux de la boussole, de 2^h40^m à 3^h15^m du soir (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 2 ^h 40 ^m à 2 ^h 55 ^m	249. 0',8	} 249. 0',8
Barreau n° 2. — De 3 ^h 0 ^m à 3 ^h 15 ^m	249. 0,8	
Méridien géographique.....	262. 5,8	
Méridien magnétique.....	249. 0,8	
Déclinaison.....	13. 5,0	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	15.57,6	} 15.56,7
Correction de latitude.....	— 0,9	
Différence : Le Parc-Sétif.....	2.51,7	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15.°52',2
Le Parc-Sétif.....	2.51,7
<i>Déclinaison</i> à Sétif le 1 ^{er} janvier 1888.....	13. 0,5

Composante horizontale.

La composante horizontale a été mesurée également avec les deux barreaux de la boussole, de 1^h10^m à 2^h20^m du soir (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les opérations ont été faites à l'ombre, sous un massif de tamaris.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	14°16'20"	3 ^s ,1445	20°,6	20°,6	0,25479
N° 2....	17° 9'20"	2 ^s ,8930	21°,1	21°,0	0,25465
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19483
Différence : Sétif-Le Parc					0,05989

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Sétif-Le Parc.....	0,05989
<i>Composante horizontale</i> à Sétif le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25469

Inclinaison.

L'aiguille n° 2 de la boussole a seule servi à la détermination de l'inclinaison, de 0^h10^m à 0^h40^m du soir (temps local).

Voici les résultats de l'observation :

Marque en haut.....	53°8',9	} 53. 7,1
Marque en bas.....	53°5',4	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.13,3	
Différence : Le Parc-Sétif	12. 6,2	

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	65.°14',9
Le Parc-Sétif.....	12. 6,2
<i>Inclinaison</i> à Sétif le 1 ^{er} janvier 1888.....	53. 8,7

Les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur montrent que les observations de Sétif ont été faites en temps de calme magnétique.

XLIV. — SFAX.

6 MAI 1887.

Station.

Les expériences ont été faites à l'ouest et en dehors de la ville, à 1^{km} de la côte. On s'est placé à peu près à égale distance de l'angle du mur d'enceinte et des Jardins, dans le cimetière arabe. Altitude, 12^m.

Comme à Tripoli et à Gabès, le ciel était très voilé.

Coordonnées du point choisi.

Longitude..... 8° 25', 5 E.
Latitude..... 34° 44', 0 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été déduite de dix observations du Soleil, faites de 7^h 57^m à 8^h 15^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la boule du minaret de la mosquée de la Kasbah, à 500^m dans la direction de l'Est.

Baromètre, 765^{mm}; thermomètre, 22°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	141.50,6
	141.50,0
	141.51,6
	141.50,6
	141.50,7
Moyenne.....	141.50,7
Azimut du repère.....	86° 11', 9

Déclinaison.

La valeur de la déclinaison a été conclue de deux observations complètes, faites avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 8^h 30^m à 9^h 5^m du matin (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 8 ^h 30 ^m à 8 ^h 45 ^m	130.44,7	} 130.44,3
Barreau n° 2. — De 8 ^h 50 ^m à 9 ^h 5 ^m	130.44,0	
Méridien géographique.....	141.50,7	
Méridien magnétique.....	130.44,3	
Déclinaison.....		11. 6,4
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.53,1	} 15.53,8
Correction de latitude.....	+ 0,7	
Différence : Le Parc-Sfax		4.47,4

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Sfax.....	4.47,4
<i>Déclinaison</i> à Sfax le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>11. 4,8</u>

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont également servi à la mesure de la composante horizontale, de 9^h20^m à 10^h30^m du matin (temps local). Il a été fait une série de 100 oscillations du barreau déviant avant et après les déviations, pour chacun des barreaux.

Les opérations ont été faites en plein air, par un ciel très voilé.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1..	13°55'20"	3 ^s ,0560	24°,1	23°,9	0,26538	} 0,26536
N° 2....	16°38'17"	2 ^s ,8180	25°,3	25°,3	0,26534	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19457	
Différence : Sfax-Le Parc.....					0,07079	

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Sfax-Le Parc.....	0,07079
<i>Composante horizontale</i> à Sfax le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,26559</u>

Inclinaison.

L'aiguille n° 2 de la boussole a été employée à la mesure de l'inclinaison ; l'observation a été faite de 10^h50^m à 11^h30^m du matin (temps local).

On a trouvé :

Marque en haut.....	50°28',0	} 50°.27',3
Marque en bas.....	50°26',6	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,2	
Différence : Le Parc-Sfax.....	14.46,9	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14',9
Le Parc-Sfax.....	14.46,9
<i>Inclinaison</i> à Sfax le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>50.28,0</u>

D'après les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, les expériences faites à Sfax le 6 mai 1887 ont eu lieu en temps de calme magnétique.

XLV. — SIDI-BEL-ABBÈS.

3 JUIN 1887.

Station.

On s'est établi au nord-est de la ville, à 400^m au delà du mur d'enceinte, entre les portes d'Oran et de Mascara, au milieu d'un terrain de grande étendue, planté en blé, et dont la moisson était achevée. Le chemin de fer passe à près de 1^{km} au sud-est du point d'observation. Altitude, 476^m.

Terrain miocène helvétique.

Coordonnées du point choisi.

Longitude.....	2°58',0 O.
Latitude.....	35°12',3 N.

Méridien géographique.

Les observations ont été faites par un ciel très pur. On a pris dix pointés du Soleil, de 8^h 11^m à 8^h 27^m du matin (temps local).

Un poteau télégraphique, situé à 1^{km} dans la direction du Nord magnétique, a servi de repère. Baromètre, 722^{mm}; thermomètre, 23°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	194.25',2
	194.24,8
	194.25,4
	194.25,7
	194.25,9
Moyenne.....	194.25,4
Azimut du repère	342°46',3

Déclinaison.

La valeur de la déclinaison a été conclue de deux observations complètes, faites avec chacun des barreaux de la boussole, de 7^h 20^m à 7^h 55^m du matin (temps local).

On a trouvé :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 20 ^m à 7 ^h 35 ^m	179.31',8	} 179.31',4
Barreau n° 2. — De 7 ^h 40 ^m à 7 ^h 55 ^m	179.31,0	
Méridien géographique.....	194.25,4	
Méridien magnétique.....	179.31,4	
Déclinaison.....	14.54,0	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.50,6	} 15,51,4
Correction de latitude	+ 0,8	
Différence : Le Parc-Sidi-bel-Abbès	0.57,4	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Sidi-bel-Abbès.....	0.57,4
<i>Déclinaison</i> à Sidi-bel-Abbès le 1 ^{er} janvier 1888	<u>14.54,8</u>

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont été successivement employés à la mesure de la composante horizontale, de 5^h40^m à 6^h50^m du matin (temps local). Dans chaque cas, il a été fait une série de 100 oscillations du barreau déviant avant et après les expériences de déviations.

Les observations ont été faites à l'ombre d'acacias élevés.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	14°24'8"	3 ^s ,1410	9°,3	9°,4	0,25395
N° 2.....	16°36'5"	2 ^s ,9450	10°,7	10°,7	0,25417
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19467
Différence : Sidi-bel-Abbès-Le Parc					<u>0,05939</u>

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Sidi-bel-Abbès-Le Parc.....	0,05939
<i>Composante horizontale</i> à Sidi-bel-Abbès le 1 ^{er} janvier 1888	<u>0,25419</u>

Inclinaison.

L'inclinaison a été observée avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 4^h45^m à 5^h20^m du matin (temps local).

Les résultats de l'observation sont les suivants :

Marque en haut.....	53°17',7	} 53.17,9
Marque en bas.....	53°18',1	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,5	
Différence : Le Parc-Sidi-bel-Abbès.....	<u>11.56,6</u>	

Au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Sidi-bel-Abbès.....	11.56,6
<i>Inclinaison</i> à Sidi-bel-Abbès le 1 ^{er} janvier 1888....	<u>53.18,3</u>

Les courbes de l'observatoire du Parc Saint-Maur ont une allure très régulière pendant le temps des observations faites à Sidi-bel-Abbès le 3 juin 1887.

XLVI. — SOUK-AHRAS.

12 MAI 1887.

Station.

Souk-Ahras est située vers le cours supérieur de la Medjerda, au pied des montagnes de ce nom. Terrain crétacé inférieur. On s'est établi au sud de la ville, sur le mamelon où est construit l'hôpital militaire. Le point d'observation se trouve à 100^m au nord-est de cet établissement, à 400^m à l'est de la gare, et du chemin de fer de Bone à Tunis. Altitude, 680^m.

Coordonnées de Souk-Ahras.

Longitude	5°37' E.
Latitude	36°17' N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été conclue de dix observations du Soleil, faites de 4^h5^m à 4^h27^m du soir (temps local), par un ciel nuageux.

On s'est repéré sur un pic des monts de la Medjerda, à 10^{km} environ dans la direction du Nord-Est. Baromètre, 703^{mm}; thermomètre, 23°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

261.14,3
261.14,6
261.14,2
261.14,3
261.13,7
—
Moyenne..... 261.14,2
Azimat du repère..... 54°23',8

Déclinaison.

La déclinaison a été mesurée avec les deux barreaux de la boussole, de 4^h40^m à 5^h15^m du soir (temps local).

On a trouvé :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 4 ^h 40 ^m à 4 ^h 55 ^m	249. 1,9	} 249. 1,9
Barreau n° 2. — De 5 ^h à 5 ^h 15 ^m	249. 1,9	
Méridien géographique.....	261.14,2	
Méridien magnétique.....	249. 1,9	
Déclinaison	12.12,3	
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.59,1	} 15.58,7
Correction de latitude.....	— 0,4	
Différence : Le Parc-Souk-Ahras.....	3.46,4	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Souk-Ahras.....	3.46,4
<i>Déclinaison</i> à Souk-Ahras le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>12. 5,8</u>

Composante horizontale.

Il n'a été fait qu'une seule détermination de la composante horizontale, avec le barreau n° 1 de la boussole, de 5^h25^m à 5^h55^m du soir (temps local). Les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

L'observation a été faite en plein air, mais par un ciel très voilé, qui s'est couvert tout à fait à 5^h30^m.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	14°21'10"	3, 1240	19°, 2	19°, 1	0,25576
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					<u>0,19480</u>
Différence : Souk-Ahras-Le Parc.....					<u>0,06096</u>

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Le Parc-Souk-Ahras.....	0,06096
<i>Composante horizontale</i> à Souk-Ahras le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,25576</u>

Inclinaison.

L'aiguille n° 2 de la boussole a servi à la mesure de l'inclinaison, de 6^h15^m à 6^h55^m du soir (temps local).

Voici les résultats de l'observation :

Marque en haut.....	52°47',8	} 52.46,7
Marque en bas.....	52°45',6	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.12,8	
Différence : Le Parc-Souk-Ahras.....	<u>12.26,1</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Souk-Ahras.....	12.26,1
<i>Inclinaison</i> à Souk-Ahras le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>52.48,8</u>

Une forte agitation se montre sur les courbes magnétiques de l'observatoire du Parc Saint-Maur, principalement sur celle du bifilaire, pendant le temps des observations faites à Souk-Ahras le 12 mai 1887.

XLVII. — SOUK-EL-ARBA.

12 MAI 1887.

Station.

Cette station est située dans la vallée de la Medjerda, à 8^{km} en amont du confluent de cette rivière avec l'oued Mellègue.

On s'est installé au nord-ouest de la gare, à peu près à égale distance (400^m) du chemin de fer et de la Medjerda, au milieu d'une vaste plaine cultivée. Altitude, 140^m.

Coordonnées de Souk-el-Arba.

Longitude..... 6°26' E.
Latitude..... 36°30' N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique du lieu a été déduit de dix observations du Soleil, faites de 8^h24^m à 8^h46^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la cheminée centrale de la gare, à 400^m à l'Est-Sud-Est.

Baromètre, 750^{mm}; thermomètre, 19°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

142.33,5
142.33,6
142.33,1
142.32,6
142.32,8

Moyenne..... 142.33,1
Azimut du repère..... 110°9',2

Déclinaison.

La valeur absolue de la déclinaison a été déduite de deux observations complètes, faites avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 7^h40^m à 8^h15^m du matin (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 40 ^m à 7 ^h 55 ^m	130.45,1	}	130.44,7
Barreau n° 2. — De 8 ^h 0 ^m à 8 ^h 15 ^m	130.44,3		
Méridien géographique.....	142.33,1		
Méridien magnétique.....	130.44,7		
Déclinaison.....			11.48,4
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.51,4	}	15.52,1
Correction de latitude.....	+ 0,7		
Différence : Le Parc-Souk-el-Arba			4. 3,7

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Souk-el-Arba	4. 3,7
<i>Déclinaison</i> à Souk-el-Arba le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>11.48,5</u>

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont successivement servi à la mesure de la composante horizontale, de 6^h 15^m à 7^h 20^m du matin (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les observations ont été faites au soleil.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	14° 28' 2"	3 ^s , 1125	12°, 1	12°, 0	0,25571	} 0,25568
N° 2....	17° 6' 52"	2 ^s , 8850	12°, 7	12°, 9	0,25565	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19474	
Différence : Souk-el-Arba-Le Parc.....					0,06094	

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Souk-el-Arba-Le Parc.....	0,06094
<i>Composante horizontale</i> à Souk-el-Arba le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,25574</u>

Inclinaison.

L'inclinaison a été conclue d'une seule observation complète, faite avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 9^h 15^m à 9^h 55^m du matin (temps local).

Les résultats sont les suivants :

Marque en haut.....	52° 57', 9	} 52.57,4
Marque en bas.....	52° 56', 9	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.12,8	
Différence : Le Parc-Souk-el-Arba.....	<u>12.15,4</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Souk-el-Arba	12.15,4
<i>Inclinaison</i> à Souk-el-Arba le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>52.59,5</u>

Nous avons vu (Souk-Ahras) qu'une perturbation magnétique s'est produite dans l'après-midi du 12 mai; le matin, les courbes de l'observatoire du Parc Saint-Maur présentaient déjà de faibles irrégularités, pendant les expériences faites à Souk-el-Arba.

XLVIII. — SOUSSE.

8 MAI 1887.

Station.

On s'est placé au nord et en dehors de la ville, à 400^m du mur d'enceinte, entre la route de Kairouan et la mer, vers la limite du cimetière arabe, à 200^m à l'ouest des bureaux du Génie. Le chemin de fer Decauville établi sur la route de Kairouan passe à 200^m au sud-ouest du point d'observation. Altitude, 7^m.

Coordonnées de Sousse.

Longitude..... 8° 16', 0 E.
Latitude..... 35° 49', 9 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique du lieu a été déterminé au moyen de quatorze observations du Soleil, faites de 6^h 59^m à 7^h 31^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur le minaret de la grande mosquée, à 500^m dans la direction du Sud.
Baromètre, 764^{mm}; thermomètre, 19°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

	187.41,9
	187.42,3
	187.42,6
	187.42,7
	184.43,0
	184.42,9
	184.42,9
	184.42,9
Moyenne.....	184.42,6
Azimet du repère.....	163° 31', 2

Déclinaison.

On a mesuré la déclinaison successivement avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 6^h 15^m à 6^h 50^m du matin (temps local).

Les résultats sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 6 ^h 15 ^m à 6 ^h 30 ^m	176.29,4	} 176.29,6
Barreau n° 2. — De 6 ^h 35 ^m à 6 ^h 50 ^m	176.29,8	
Méridien géographique.....	187.42,6	
Méridien magnétique.....	176.29,6	
Déclinaison.....		11.13,0
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.51,0	} 15.51,7
Correction de latitude.....	+ 0,7	
Différence : Le Parc-Sousse.....		4.38,7

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Sousse.....	4.38,7
<i>Déclinaison</i> à Sousse le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>11.13,5</u>

Composante horizontale.

La valeur absolue de la composante horizontale a été conclue également de deux mesures complètes, faites avec les deux barreaux de la boussole, de 7^h55^m à 9^h10^m du matin (temps local). Dans chaque cas, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les observations ont été faites à l'ombre, sous un groupe d'oliviers.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	13°57'30"	3 ^s ,1140	19°,7	19°,7	0,26011	} 0,26012
N° 2....	16°49'25"	2 ^s ,8590	20°,0	19°,9	0,26013	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19444	
Différence : Sousse-Le Parc					0,06568	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Sousse-Le Parc.....	0,06568
<i>Composante horizontale</i> à Sousse le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,26048</u>

Inclinaison.

L'inclinaison a été observée avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 9^h30^m à 10^h15^m du matin (temps local).

Les résultats sont les suivants :

Marque en haut	51°50',9	} 51.49,1
Marque en bas	51°47',3	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,5	
Différence : Le Parc-Sousse.....	<u>13.25,4</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Sousse.....	13.25,4
<i>Inclinaison</i> à Sousse le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>51.49,5</u>

La variation des éléments magnétiques est régulière à l'observatoire du Parc Saint-Maur pendant le temps des expériences faites à Sousse le 8 mai 1887.

XLIX. — TANGER.

9 ET 10 JUIN 1887.

Station.

Les observations ont été faites dans le voisinage de l'*Hôtel de France*, situé à l'extérieur de Tanger, du côté opposé au port, sur la crête du plateau qui domine la ville vers l'intérieur, à 1^{km} au sud de la côte.

Pour les opérations relatives à la déclinaison et à la composante horizontale, on s'est placé en dehors de la vaste propriété dans laquelle est bâti l'hôtel, sur le bord du chemin qui sépare cette propriété de la villa du consul d'Autriche. L'inclinaison a été observée dans le jardin même de l'hôtel, en situation bien isolée. Altitude, 80^m.

Coordonnées de Tanger (Consulat de France).

Longitude..... 8° 9', 1 O.
Latitude..... 35° 47', 1 N.

Méridien géographique.

La trace du méridien géographique sur le cercle azimutal du théodolite a été déduite de quatorze observations du Soleil, faites de 3^h 57^m à 4^h 22^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur le minaret de la mosquée, à 1^{km} N.-N.-E. Baromètre, 756^{mm}; thermomètre, 24°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

262.40,6	262.39,8
262.40,2	362.39,8
262.40,4	262,39,9
262.40,4	Moyenne... 262.40,2
Azimet du repère.....	16° 19', 5

Déclinaison.

La déclinaison a été observée, le 9 juin au soir, avec les deux barreaux de la boussole. Au début des opérations, le ciel était couvert; les nuages s'étant momentanément dissipés dans l'Ouest, on s'est interrompu après la première mesure de la déclinaison pour déterminer le méridien géographique. Les opérations relatives au barreau n° 2 ont été effectuées seulement après l'observation du Soleil.

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 3 ^h 35 ^m à 3 ^h 50 ^m (t. l.).....	245.49,5	} 245.49,7
Barreau n° 2. — De 4 ^h 45 ^m à 5 ^h (t. l.).....	245.49,9	
Méridien géographique.....	262.40,2	
Méridien magnétique.....	245.49,7	
Déclinaison.....		16.50,5
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	15.57,2	} 15.56,7
Correction de latitude.....	— 0,5	
Différence : Tanger-Le Parc.....		0.53,8

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Tanger-Le Parc.....	0.53,8
<i>Déclinaison</i> à Tanger le 1 ^{er} janvier 1888.....	16.46,0

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont été successivement employés à la mesure de la composante horizontale ; les observations ont été faites le 9 juin, de 5^h20^m à 6^h35^m du soir (temps local). Pour chacun des barreaux, les expériences de déviations ont été précédées et suivies d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

L'appareil était à découvert, mais le ciel s'était de nouveau chargé de nuages, qui ont persisté jusqu'à la fin des opérations.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.	
			Oscillations.	Déviations.		
N° 1....	14° 35' 23"	3°, 2220	25°, 0	25°, 0	0,24600	} 0,24610
N° 2....	17° 3' 8"	3°, 0010	24°, 7	24°, 4	0,24621	
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....						0,19494
Différence : Tanger-Le Parc.....						0,05116

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Tanger-Le Parc.....	0,05116
<i>Composante horizontale</i> à Tanger le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,24596

Inclinaison.

Deux mesures complètes de l'inclinaison ont été effectuées le 10 juin, de 5^h30^m à 6^h40^m du matin (temps local), avec chacune des aiguilles de la boussole.

Aiguille n° 2. — Marque en haut.....	55.14,4	} 55.12,9
» — Marque en bas.....	55.11,4	
Aiguille n° 1. — Marque en haut.....	55.12,9	} 55.15,0
» — Marque en bas.....	55.17,2	
Inclinaison.....	55.14,0	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.14,4	
Différence : Le Parc-Tanger.....	10. 0,4	

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Tanger.....	10. 0,4
<i>Inclinaison</i> à Tanger le 1 ^{er} janvier 1888.....	55.14,5

L'allure des courbes magnétiques relevées à l'observatoire du Parc Saint-Maur est régulière pendant le temps des observations faites à Tanger les 9 et 10 juin 1887.

L. — TRIPOLI.

4 MAI 1887.

Station.

Les observations ont été faites à 3^{km} environ du port, au sud de la ville, au delà de l'oasis, à l'entrée du désert. On s'est placé vers la limite Sud du massif d'oliviers que l'on rencontre après avoir franchi les dernières plantations de palmiers. Altitude 20^m.

La courte durée de l'escale, l'état défavorable du ciel, la violence du siroco, indépendamment d'autres difficultés matérielles, n'ont pas permis de répéter les observations.

Coordonnées de Tripoli (La Santé).

Longitude.....	10° 50', 6 E.
Latitude.....	32° 54', 0 N.

Méridien géographique.

Il n'a pas été possible d'observer le Soleil dans le voisinage du premier vertical; les pointés, au nombre de dix, ont été pris de 1^h 53^m à 2^h 11^m du soir (temps local). Le ciel était très voilé, et l'on a dû rejeter les deux dernières observations, faites dans des conditions de netteté insuffisantes. Sous l'influence du siroco, la température atteignait 41°, 7 pendant la détermination du méridien géographique. A 2^h 30^m, le ciel était tout à fait couvert. Baromètre, 760^{mm}.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

329.3,8
329.4,6
329.4,1
329.4,0
Moyenne..... 329.4,1

Déclinaison.

La déclinaison a été observée seulement avec le barreau n° 1 de la boussole, immédiatement après l'observation du Soleil, de 2^h 20^m à 2^h 35^m du soir (temps local).

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 2 ^h 20 ^m à 2 ^h 35 ^m	318.23,9
Méridien géographique.....	329. 4,1
Méridien magnétique.....	318.23,9
Déclinaison.....	10.40,2
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur....	16. 1,7
Correction de latitude.....	—1,1
Différence : Le Parc-Tripoli	5.20,4

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Tripoli.....	5.20,4
<i>Déclinaison</i> à Tripoli le 1 ^{er} janvier 1888	10.31,8

Composante horizontale.

La valeur de la composante horizontale a été déduite d'une seule observation, faite de 1^h 15^m à 1^h 45^m du soir (temps local), avec le barreau n° 1 de la boussole. Il n'a été fait qu'une série de 100 oscillations du barreau déviant, avant les expériences de déviations.

L'appareil était placé sous un olivier, et d'ailleurs le ciel, comme nous l'avons dit, était très voilé.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviation.	
N° 1.....	13° 13' 15"	3°, 0120	39°, 8	40°, 2	0,27617
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19454
Différence : Tripoli-Le Parc					0,08163

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint Maur.....	0,19480
Tripoli-Le Parc.....	0,08163
<i>Composante horizontale</i> à Tripoli le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,27643

Inclinaison.

L'inclinaison a été observée seulement avec l'aiguille n° 2 de la boussole, de 0^h 30^m à 1^h du soir (temps local). La deuxième partie de l'opération (deuxième aimantation) a été faite avec quelque difficulté, à cause d'une fine poussière de sable, enlevée par le siroco, et qui pénétrait jusque dans la cage de l'appareil.

Marque en haut.....	47° 36', 8	} 47° 37', 1
Marque en bas.....	47° 37', 4	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.15,5	
Différence : Le Parc-Tripoli.....	17.38,4	

Au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	65°.14',9
Le Parc-Tripoli.....	17.38,4
<i>Inclinaison</i> à Tripoli le 1 ^{er} janvier 1888.....	47.36,5

On remarque une faible agitation aux courbes du magnétographe pendant les expériences faites à Tripoli le 4 mai 1887.

LI. — TUNIS (LE BARDO).

9 MAI 1887.

Station.

Les observations ont été faites à 4^{km} au nord-ouest de la ville, à 500^m au sud-sud-ouest du palais du Bardo, à 450^m au sud de la ligne du chemin de fer de Tunis à Bône, et de l'extrémité de la voie spéciale au service du Bey, de Tunis au Bardo (*voir La Manouba*).

On s'est installé en rase campagne, sur le bord d'un chemin qui, partant du Palais, traverse le chemin de fer et se dirige au Sud-Sud-Ouest. Altitude, 25^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude.....	7° 48', 3 E.
Latitude.....	36° 49', 2 N.

Méridien géographique.

On a déduit le méridien géographique de dix observations du Soleil, faites de 4^h52^m à 5^h10^m du soir (temps local).

On s'est repéré sur la boule qui termine l'extrémité supérieure d'un mât, devant l'entrée du palais du Bey, à 500^m au Nord-Nord-Est.

Baromètre, 761^{mm}; thermomètre, 19°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

242.44,7
242.44,3
242.44,6
242.44,5
242.44,4
Moyenne..... 242.44,5
Azimut du repère..... 24°35',0

Déclinaison.

La déclinaison a été observée seulement avec l'un des barreaux, celui qui porte le n° 1. L'observation a été faite de 5^h35^m à 5^h50^m du soir (temps local).

En voici les résultats :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 5 ^h 35 ^m à 5 ^h 50 ^m	231.13,3
Méridien géographique.....	242.44,5
Méridien magnétique	231.13,3
Déclinaison.....	11.31,2
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	15.56,4
Correction de latitude.....	— 0,2
Différence : Le Parc-Tunis.....	4.25,0

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	15.52,2
Le Parc-Tunis.....	4.25,0
<i>Déclinaison</i> à Tunis (Le Bardo) le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>11.27,2</u>

Composante horizontale.

Il n'a été fait qu'une mesure de la composante horizontale, avec le barreau n° 1, de 4^h 0^m à 4^h 30^m du soir (temps local). Les expériences de déviations ont été précédées seulement d'une série de 100 oscillations du barreau déviant.

Les observations ont eu lieu à l'ombre, l'appareil étant protégé contre les rayons solaires par une haie de cactus très élevés.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1.....	14° 23' 8"	3 ^s , 1280	19°, 7	19°, 6	0,25515
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					<u>0,19477</u>
Différence : Tunis-Le Parc					0,06038

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	0,19480
Tunis-Le Parc.....	<u>0,06038</u>
<i>Composante horizontale</i> à Tunis (Le Bardo) le 1 ^{er} janvier 1888.....	0,25518

Inclinaison.

On a déterminé l'inclinaison à l'aide de l'aiguille n° 2 de la boussole, de 2^h 40^m à 3^h 15^m du soir (temps local).

Les résultats de l'observation sont les suivants :

Marque en haut.....	53° 2', 8	} 53. 2,5
Marque en bas.....	53° 2', 1	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.13,9	
Différence : Le Parc-Tunis.....	<u>12.11,4</u>	

En ramenant l'observation au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur	65.14,9
Le Parc-Tunis.....	<u>12.11,4</u>
<i>Inclinaison</i> à Tunis (Le Bardo) le 1 ^{er} janvier 1888..	53. 3,5

Les courbes relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur ont une allure très régulière pendant le temps des observations faites à Tunis le 9 mai 1887.

LII. — VALENCE (Espagne).

22 JUIN 1887.

Station.

Les observations ont été faites dans le voisinage du Grao, qui est le port de Valence. On s'est placé vers la limite Ouest du champ de manœuvres, au sud-ouest du port, à 150^m de la côte, au bord et sur la rive gauche du ruisseau de Valence, à 100^m en aval du bac. Cette position est à 2500^m environ au sud-est de Valence. Altitude, 2^m.

Coordonnées du point choisi.

Longitude 2° 39', 10.
Latitude 39° 27', 1 N.

Méridien géographique.

Le méridien géographique a été conclu de dix observations du Soleil, faites de 7^h 49^m à 8^h 5^m du matin (temps local).

On s'est repéré sur la flèche d'une église de Valence, à 2500^m au Nord-Ouest.

Baromètre, 760^{mm}; thermomètre, 26°.

Trace du méridien géographique sur le cercle azimutal.

145.57,8
145.57,4
145.57,5
145.57,3
145.56,6
Moyenne..... 145.57,3
Azimet du repère 295° 14', 4

Déclinaison.

On a observé la déclinaison avec chacun des deux barreaux de la boussole, de 7^h à 7^h 35^m du matin (temps local). Les résultats sont les suivants :

Trace du méridien magnétique sur le cercle azimutal.

Barreau n° 1. — De 7 ^h 0 ^m à 7 ^h 15 ^m	130.37,8	} 130.38,1
Barreau n° 2. — De 7 ^h 20 ^m à 7 ^h 35 ^m	130.38,5	
Méridien géographique	145.57,3	
Méridien magnétique	130.38,1	
Déclinaison		15.19,2
Déclinaison correspondante au Parc Saint-Maur	15.49,8	} 15.50,3
Correction de latitude	+0,5	
Différence : Le Parc-Valence		0.31,1

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	15.52,2
Le Parc-Valence.....	0.31,1
<i>Déclinaison</i> à Valence le 1 ^{er} janvier 1888	<u>15.21,1</u>

Composante horizontale.

Les deux barreaux de la boussole ont également servi à la mesure de la composante horizontale, de 5^h25^m à 6^h30^m du matin (temps local). On a compté une série de 100 oscillations de chaque barreau déviant avant et après les expériences de déviations.

L'observation a été faite au soleil.

Barreau.	α .	t .	Température.		H.
			Oscillations.	Déviations.	
N° 1....	15°28'28"	3 ^s ,2890	19°,4	19°,4	0,23416
N° 2....	17°43' 0"	3 ^s ,0870	20°,9	21°,0	0,23442
Valeur correspondante de H au Parc Saint-Maur.....					0,19473
Différence : Valence-Le Parc.....					<u>0,03956</u>

En ramenant les observations au 1^{er} janvier 1888, on a :

Le Parc Saint-Maur.....	0,19480
Valence-Le Parc.....	0,03956
<i>Composante horizontale</i> à Valence le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>0,23436</u>

Inclinaison.

L'aiguille n° 2 de la boussole a servi à la mesure de l'inclinaison, de 8^h25^m à 9^h15^m du matin (temps local).

Voici les résultats de l'observation :

Marque en haut.....	57°51',7	} 57°.49',4
Marque en bas.....	57°47',1	
Inclinaison correspondante au Parc Saint-Maur.....	65.16,0	
Différence Le Parc-Valence.....	7.26,6	

Ramenée au 1^{er} janvier 1888, l'observation devient :

Le Parc Saint-Maur.....	65.14,9
Le Parc-Valence.....	7.26,6
<i>Inclinaison</i> à Valence le 1 ^{er} janvier 1888.....	<u>57.48,3</u>

On remarque une certaine agitation sur les courbes de variations relevées au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur le 22^e juin 1887.

CHAPITRE III.

CARTES MAGNÉTIQUES DU BASSIN OCCIDENTAL DE LA MÉDITERRANÉE.

I. — RÉSUMÉ DES OBSERVATIONS.

Les valeurs absolues des éléments magnétiques au 1^{er} janvier 1888, pour chacune des stations de notre réseau, sont résumées dans le Tableau suivant.

La déclinaison, l'inclinaison et la composante horizontale ont été déterminées directement; la composante verticale et la force totale ont été calculées au moyen des relations connues.

TABLEAU I.

VALEURS ABSOLUES DES ÉLÉMENTS MAGNÉTIQUES AU 1^{er} JANVIER 1888.

Stations.	Longitude.	Latitude Nord.	Déclinaison occidentale.	Inclinaison.	Composante		Force totale.
					hori- zontale.	verti- cale.	
Corse.							
Ajaccio	6.23,4 E	41.54,7	12. 8,4	58.48,7	0,22905	0,37838	0,44231
Bastia	7. 7,0 E	42.42,2	13.52,2	59.10,5	0,22510	0,37723	0,43929
Bonifacio	6.49,7 E	41.23,0	11.58,8	58.11,3	0,23319	0,37593	0,44238
Corte	6.48,8 E	42.18,2	12.17,8	58.58,9	0,22873	0,38039	0,44387
Italie.							
Livourne	7.59,7 E	43.33,1	11.50,6	60. 0,3	0,22340	0,38702	0,44687
Naples	11.54,9 E	40.51,8	10.14,4	56.50,8	0,23962	0,36683	0,43816
Rome	10. 6,0 E	41.53,2	11. 1,5	58.12,2	0,23296	0,37577	0,44213
Malte.							
La Valette	12.10,8 E	35.53,8	9,48,0	51.22,8	0,26241	0,32848	0,42043
Città-Vecchia	12. 3 E	35.52	9,48,5	51.21,7	0,26261	0,32851	0,42058
Tripolitaine.							
Tripoli	10.50,6 E	32.54,0	10.31,8	47.36,5	0,27643	0,30282	0,41001

Stations.	Longitude.	Latitude Nord.	Déclinaison occidentale.	Inclinaison.	Composante		Force totale.
					hori- zontale.	verti- cale.	
Tunisie.							
Carthage.....	7.59,1 E	36.51,1	11.24,5	53. 6,3	0,25523	0,34000	0,42514
Gabès	7.45,9 E	33.53,0	11.16,2	49.34,4	0,26887	0,31562	0,41462
La Manouba.....	7.44 E	36.50	11.26,4	53. 4,0	0,25571	0,34016	0,42546
Sfax.....	8.25,5 E	34.44,0	11. 4,8	50.28,0	0,26559	0,32180	0,41725
Souk-el-Arba.....	6.26 E	36.30	11.48,5	52.59,5	0,25574	0,33928	0,42487
Sousse.....	8.16,0 E	35.49,9	11.13,5	51.49,5	0,26048	0,33131	0,42144
Tunis.....	7.48,3 E	36.49,2	11.27,2	53. 3,5	0,25518	0,33935	0,42459
Algérie.							
Affreville.....	0. 6,9 O	36.15,5	13.57,2	53.58,8	0,25120	0,34558	0,42716
Aïn-Temouchent.	3.28,6 O	35.17,0	15. 8,7	53.30,8	0,25413	0,34360	0,42737
Alger.....	0.44,3 E	36.44,9	13.45,1	54.18,8	0,25045	0,34871	0,42933
Arzew.....	2.38,9 O	35.51,6	14.59,6	53.56,5	0,25204	0,34616	0,42820
Batna.....	3.50,5 E	35.33,0	12.40,3	52.18,0	0,25807	0,33390	0,42201
Biskra	3.23,3 E	34.50,8	12.49,0	51.32,8	0,26025	0,32773	0,41849
Bône	5.25,1 E	36.54,0	12.17,5	53.35,9	0,25326	0,34349	0,42676
Bordj-Bouira....	1.35 E	36.23	13.27,9	53.43,4	0,25233	0,34380	0,42646
Boudzaréah(obs.).	0.41,9 E	36.47,9	13.52,8	54.20,0	0,25064	0,34923	0,42986
Boufarik	0.34,6 E	36.34,7	13.50,0	54. 8,0	0,25077	0,34685	0,42801
Constantine.....	4.17,0 E	36.20,3	12.36,0	53.10,0	0,25471	0,34007	0,42488
Duzerville.....	5.24,0 E	36.48,3	12.13,9	53.26,7	0,25332	0,34166	0,42532
Le Kroubs.....	4.22 E	36.15	12.32,0	53. 5,1	0,25527	0,33980	0,42500
Magenta.....	3. 5 O	34.43	14.52,1	52.49,0	0,25563	0,33698	0,42297
Maison Carrée...	0.47,9 E	36.43,2	13.49,1	54.12,4	0,25028	0,34711	0,42793
Mascara	2.11,9 O	35.23,5	14.37,6	53.22,7	0,25333	0,34084	0,42467
Mecheria.....	2.32 O	33.37	14.36,2	51.15,7	0,26175	0,32627	0,41829
Ménerville.....	1.13,4 E	36.43,5	13.40,4	54. 7,6	0,25118	0,34733	0,42864
Oran	2.57,4 O	35.42,5	15. 4,9	53.45,2	0,25279	0,34480	0,42754
Orléansville.....	1. 0,0 O	36. 9,9	14.22,5	54. 3,1	0,25080	0,34585	0,42722
Philippeville....	4.34,0 E	36.52,0	12.32,3	53.37,2	0,25283	0,34318	0,42626
Saïda.....	2.11 O	34.50	14.51,7	52.50,9	0,25548	0,33717	0,42303
Sétif.....	3. 3,8 E	36.11,3	13. 0,5	53. 8,7	0,25469	0,33977	0,42463
Sidi-bel-Abbès...	2.58,0 O	35.12,3	14.54,8	53.18,3	0,25419	0,34108	0,42538
Souk-Ahras.....	5.37 E	36.17	12. 5,8	52.48,8	0,25576	0,33711	0,42315
Maroc.							
Tanger.....	8. 9,1 O	35.47,1	16.46,0	55.14,5	0,24596	0,35444	0,43142
Espagne.							
Algésiras.....	7.46,3 O	36. 7,2	16.34,9	55.27,8	0,24509	0,35612	0,43231
Alicante.....	2.48,8 O	38.20,8	15.14,9	56.42,6	0,23940	0,36459	0,43616
Almeria.....	4.48,4 O	36.50,3	15.44,8	55.32,3	0,24455	0,35633	0,43218
Barcelone.....	0. 9,3 O	41.24,0	14.43,4	59.14,6	0,22704	0,38152	0,44396
Carthagène.....	3.19,3 O	37.35,8	15.20,6	56. 4,3	0,24193	0,35965	0,43345
Malaga.....	6.45,3 O	36.44,6	16.21,5	55.56,3	0,24242	0,35857	0,43283
San Fernando....	8.32,6 O	36.27,7	16.54,0	55.59,2	0,24328	0,36050	0,43491
Valence.....	2.39,1 O	39.27,1	15.21,1	57.48,3	0,23436	0,37223	0,43986

Nous donnons également ci-dessous, pour le 1^{er} janvier 1888, les Tableaux des observations les plus récentes faites dans les limites du cadre de notre Carte. Ces Tableaux comprennent, outre nos mesures personnelles dans le midi de la France en 1884 et 1885, celles de M. de Bernardières en différents points de la côte méditerranéenne, de M. Hatt en Corse, de la Mission hydrographique française en Tunisie, de M. Ciro Chistoni en Italie, en Sardaigne et en Sicile, de l'observatoire de Pola, de la Commission hydrographique espagnole sur la côte méditerranéenne de l'Espagne (1). Nous avons tenu compte également des observations, encore inédites, faites par M. d'Abbadie aux environs d'Hendaye et dans le Guipuzcoa, de M. Le Cannellier dans la région de Toulon, et du P. Martin Juan en Espagne.

Le réseau comprend ainsi, outre les îles principales, toute la côte européenne entre Cadix et le détroit de Messine, et la côte d'Afrique depuis Tanger jusqu'à Tripoli.

TABLEAU II.

OBSERVATIONS RÉCENTES (1879-1887) FAITES PAR DIVERS OBSERVATEURS DANS LES LIMITES DE LA CARTE DU BASSIN OCCIDENTAL DE LA MÉDITERRANÉE.

Stations.	Longitude.	Latitude Nord.	Déclinaison occidentale.	Inclinaison.	Composante horizontale.
I. — <i>Observations faites par M. Th. Moureaux, dans le midi de la France, en 1884 et 1885, et ramenées au 1^{er} janvier 1888.</i>					
(Déterminations des éléments magnétiques en France. — Extrait.)					
Agen.....	1.44 O	44.12	15.50	61.59	0,2130
Avignon.....	2.28 E	43.57	14. 5	61. 6	0,2173
Bordeaux.....	2.52 O	44.50	16.28	62.40	0,2095
Cette.....	1.21 E	43.25	14.27	60.48	0,2189
Marseille.....	3. 3 E	43.18	13.42	60.24	0,2208
Monaco.....	5. 5 E	43.44	12.53	60.39	0,2191
Nice.....	4.58 E	43.43	13. 0	60.34	0,2201
Tarbes.....	2.16 O	43.15	15.49	61.13	0,2163
Toulouse.....	0.52 O	43.37	15.23	61.22	0,2160
Villefranche-sur-Mer.....	4.59 E	43.42	12.59	60.32	0,2200
II. — <i>Observations faites par M. A. d'Abbadie, membre de l'Institut et du Bureau des Longitudes, en 1887 et 1888, et ramenées au 1^{er} janvier 1888.</i>					
(Communiquées par l'Auteur.)					
Hendaye.....	4. 6 O	43.23	16.35	61.41	0,2146
Saint-Martin-de-Illinx.....	3.36 O	43.35	16.28	61.48	»
Urnieta (Espagne).....	4.20 O	43.17	»	61.30	0,2152

(1) Plusieurs de ces observations, notamment celles d'Italie et d'Espagne, n'ont pas été comparées directement aux indications d'un magnétographe. Les résultats sont donc sujets à deux causes d'erreur, provenant de l'incertitude de l'état magnétique pendant les mesures et de l'établissement de la variation séculaire.

Stations.	Longitude.	Latitude Nord.	Déclinaison occidentale.	Inclinaison.	Composante horizontale.
-----------	------------	-------------------	-----------------------------	--------------	----------------------------

III. — *Observations faites par M. de Bernardières, capitaine de frégate, de 1879 à 1886, et ramenées au 1^{er} janvier 1888.*

(Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1887.)

Ajaccio	6.24' E	41.55'	12. 6'	58.43'	0,2309
Alger	0.45 E	36.46	13.46	»	0,2505
Alicante	2.49 O	38.21	15.20	»	»
Barcelone	0.10 O	41.22	14.34	»	»
Cadix	8.37 O	36.31	16.57	»	»
Carthagène	3.18 O	37.36	15.19	»	»
Gibraltar.....	7.41 O	36. 9	16.38	»	»
Malte.....	12.11 E	35.53	9.48	»	0,2639
Mers-el-Kébir.....	3. 2 O	35.44	15. 6	53.47	0,2537
Naples.....	11.55 E	40.52	10. 2	»	»
Palma.....	0.16 E	39.34	14.21	»	»
Port-Vendres.....	0.46 E	42.51	14.27	»	»
Rosas.....	0.49 E	42.16	14.20	»	»
Salins d'Hyères.....	3.52 E	43. 7	13.18	»	0,2232
Sainte-Marguerite (île)....	4.42 E	43.31	13. 7	»	0,2200
Toulon.....	3.35 E	43. 7	13.29	60.15	0,2220

IV. — *Observations faites par M. Le Cannellier, lieutenant de vaisseau, en 1886, et ramenées au 1^{er} janvier 1888.*

(Communiquées par l'Auteur.)

Aubagne.....	3.14 E	43.18	13.30	»	0,2214
Draguignan.....	4. 8 E	43.32	13.18	»	0,2215
Les Arcs.....	4. 9 E	43.27	13.19	»	»
Salins d'Hyères.....	3.52 E	43. 7	»	»	0,2228
Toulon.....	3.35 E	43. 7	13.27	»	0,2226

V. — *Observation faite par M. Hatt, ingénieur hydrographe de la Marine, en 1887, et ramenée au 1^{er} janvier 1888.*

(Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1888.)

Ile Rousse	6.35 E	42.38	12.26	»	»
------------------	--------	-------	-------	---	---

VI. — *Observations faites en Tunisie par la Mission hydrographique française, de 1884 à 1886, et ramenées au 1^{er} janvier 1888.*

Observateurs : MM. HÉRAUD, HANUSSE, BOUILLET, ingénieurs hydrographes, et MURET DE PAGNAC, enseigne de vaisseau.

(Comptes rendus des séances de l'Académie des Sciences, 1887.)

Bizerte.....	7.32 E	37.16	11.37	53.44	»
Bordj-Djilidj (Djerba).....	8.25 E	33.53	11. 4	»	»
Cap Serrat.....	6.53 E	37.13	11.46	»	»
Gabès.....	7.47 E	33.53	11.15	49.33	»
Hammamet.....	8.16 E	36.24	11.13	52.36	»
Hergla.....	8.10 E	36. 2	11.21	»	»

Stations.	Longitude.	Latitude Nord.	Déclinaison occidentale.	Inclinaison.	Composante horizontale.
Humt-Suk (Djerba).....	8.31 E	33.53'	11. 0'	»	»
Ile Plane.....	7.59 E	37.11	11.29	»	»
Ilot Zembretta.....	8.32 E	37. 6	11.12	»	»
La Goulette.....	7.57 E	36.48	11.25	53. 7	»
La S'rira (baie Surkennis)..	7.45 E	34.17	11.14	»	»
Mahdia.....	8.44 E	35.30	11. 2	51.24	»
Monastir.....	8.30 E	35.45	11. 9	51.13	»
Ras-Ajdir.....	9.13 E	33.10	10.44	»	»
Ras-el-Hems.....	8.48 E	33.21	10.53	»	»
Ras-Kapudiah.....	8.49 E	35.14	10.55	»	»
Sfax.....	8.26 E	34.44	11. 5	50.40	»
Sidi Mansur.....	8.32 E	34.48	11. 2	»	»
Sidi Yussuf (ile Kerkenna)..	8.38 E	34.39	10.56	»	»
Sousse.....	8.16 E	35.50	11.14	51.57	»
Ungha.....	8. 4 E	34.28	11.12	»	»

VII. — *Observations faites par M. Ciro Chistoni, assistant au Bureau central météorologique d'Italie, de 1881 à 1886, et ramenées au 1^{er} janvier 1888.*

(Annali della Meteorologia italiana.)

Italie continentale.

Albissola.....	6.11 E	44.20	12. 6	61.10	0,2166
Alexandrie.....	6.17 E	44.55	12.39	61.29	0,2145
Anzio....	10.17 E	41.28	10.46	57.41	0,2353
Arenzano.....	6.21 E	44.24	13.41	60.50	0,2249
Brà.....	5.31 E	44.42	13. 1	61.20	0,2152
Campiglia marittima.....	8.17 E	43. 3	11.45	59.38	0,2253
Civita-Vecchia.....	9.28 E	42. 6	11.13	58.25	0,2301
Cosenza.....	13.54 E	39.19	9.27	54.59	0,2466
Cuneo.....	5.13 E	44.23	13. 4	61. 9	0,2169
Florence.....	8.56 E	43.45	11.32	60. 4	0,2222
Foggia.....	13.13 E	41.28	9.40	57.15	0,2360
Gênes.....	6.35 E	44.25	13.17	60.48	0,2179
Livourne.....	8. 0 E	43.33	11.50	60. 0	0,2226
Manfredonia.....	13.35 E	41.38	9.37	57.27	0,2352
Moncalieri.....	5.21 E	45. 0	12.31	62.38	0,2079
Oneglia.....	5.42 E	43.54	12.45	60.34	0,2191
Orbetello.....	8.53 E	42.26	11.22	58.51	0,2281
Parme.....	7.59 E	44.47	11.54	61.11	0,2165
Pise.....	8. 4 E	43.43	11.49	60. 6	0,2218
Pontremoli.....	7.33 E	44.22	12.12	60.48	0,2183
Reggio.....	13.18 E	38. 6	9.36	53.46	0,2514
Rome.....	10.10 E	41.55	10.41	58.11	0,2330
Sestri Levante.....	7. 3 E	44.16	12.34	60.44	0,2187
Spartivento (cap).....	13.43 E	37.56	9.32	53.29	0,2527
Spezia.....	7.32 E	44. 6	12.12	60.33	0,2197
Torre Pellice.....	4.54 E	44.49	13. 2	61.44	0,2147
Zinola.....	6. 7 E	44.17	12.22	61. 9	0,2177

Sardaigne.

Cagliari.....	6.47 E	39.13	11.57	55.57	0,2421
Golfe Aranci.....	7.18 E	41. 0	12. 2	57.44	0,2328

Stations.	Longitude.	Latitude Nord.	Déclinaison occidentale.	Inclinaison.	Composante horizontale.
Sardaigne. (Suite.)					
Iglesias.....	6.12 E	39.19	12. 4	56. 2	0,2406
Maddalena.....	7. 5 E	41.13	12. 6	57.58	0,2327
Muravera.....	7.15 E	39.20	11.37	56. 2	0,2411
Oristano.....	6.16 E	39.54	12. 0	56.39	0,2396
Ozieri.....	6.41 E	40.35	12. 7	57.18	0,2348
Sassari.....	6.14 E	40.44	13.55	57.37	0,2325
Tortoli.....	7.19 E	39.56	11.42	56.36	0,2392

Sicile.					
Caltanissetta.....	11.42 E	37.27	10. 6	53.19	»
Catane.....	12.45 E	37.30	10.40	53. 8	»
Girgenti.....	11.11 E	37.17	10.20	53.13	»
Messine.....	13.14 E	38.12	9.43	53.44	»
Palerme.....	11. 1 E	38. 7	10. 4	53.59	»
Syracuse.....	12.57 E	37. 3	9.22	52.25	»
Trapani.....	10.12 E	38. 3	10. 6	54.10	»

VIII. — *Valeurs absolues des éléments magnétiques à l'observatoire de Pola, pour le 1^{er} janvier 1888.*

(Communiquées par M. R. Müller, directeur.)

Pola.....	10.31 E	44.52	10.37	60.44	0,2191
-----------	---------	-------	-------	-------	--------

IX. — *Observations faites par la Commission hydrographique espagnole, de 1878 à 1885, et ramenées au 1^{er} janvier 1888 (1).*

(Communiquées par M. C. Pujazon, directeur de l'observatoire de San Fernando.)

Aguilas.....	3.56 O	37.24	15.31	»	»
Alicante.....	2.51 O	38.20	15.14	»	»
Ampolla.....	1.38 O	40.49	15. 9	»	»
Badalona.....	0. 5 O	41.28	14.42	»	»
Benicarlo.....	1.55 O	40.25	15. 5	»	»
Benicasim.....	2.16 O	40. 3	15. 8	»	»
Benidorme.....	2.27 O	38.32	15.12	»	»
Blanes.....	0.27 E	41.41	14.37	»	»
Carboneras.....	4.14 O	37. 0	15.36	»	»
Carthagène.....	3.20 O	37.36	15.11	»	»
Denia.....	2.14 O	38.51	15.10	»	»
Mazarron.....	3.36 O	37.34	15.24	»	»
Rosas.....	0.50 E	42.16	14.20	»	»
San Carlos-de-la-Rapita.....	1.45 O	40.36	15.12	»	»
Sitges.....	0.31 O	41.14	14.49	»	»
Tarragone.....	1. 8 O	41. 6	15. 5	»	»
Torre-Vieja.....	3. 2 O	37.58	15.11	»	»
Valence.....	2.41 O	39.27	15.13	»	»

(1) Tableau reçu après le tirage des Cartes.

Stations.	Longitude.	Latitude Nord.	Déclinaison occidentale.	Inclinaison.	Composante horizontale.
X. — <i>Observations faites par le P. Martin Juan, sous-directeur de l'observatoire de la Havane, en 1886, et ramenées au 1^{er} janvier 1888.</i>					

(Communiquées par l'Auteur.)

Madrid	6. 2 O	40.24	16.41	59.22	0,2274
Tortose.....	1.47 O	40.49	15.17	59. 4	0,2287

XI. — *Observations faites par MM. les Officiers du « Challenger », le 22 janvier 1873.*

(Communiquées par l'Amirauté anglaise.)

Gibraltar (1).....	7.41 O	36. 8	18.28	56.28	0,2406
--------------------	--------	-------	-------	-------	--------

M. L. Teisserenc de Bort, chef du Service de la Météorologie générale au Bureau central météorologique, a effectué, de 1883 à 1888, de nombreuses observations en Tunisie, en Algérie et dans le Sahara adjacent, en vue d'établir la Carte magnétique de ces régions; les résultats généraux ont été résumés dans une Note insérée aux *Comptes rendus de l'Académie des Sciences* (2), mais, le calcul de certaines positions géographiques n'étant pas achevé, les observations ne sont pas encore publiées. D'un autre côté, le P. F. Denza, Directeur de l'observatoire de Moncalieri, a également, de 1875 à 1879, déterminé les éléments magnétiques en un très grand nombre de points d'Italie, dans les îles de la Méditerranée, ainsi qu'à Tunis et à Carthage; le Mémoire est actuellement à l'impression.

II. — CONSTRUCTION DES CARTES MAGNÉTIQUES.

Les observations que nous venons de résumer ont servi à construire des Cartes magnétiques du bassin occidental de la Méditerranée. Ces Cartes, dressées sur une projection de Mercator, sont au nombre de trois :

- 1^o Carte des lignes d'égale déclinaison;
- 2^o Carte des lignes d'égale composante horizontale;
- 3^o Carte des lignes d'égale inclinaison.

Carte des lignes d'égale déclinaison.

Les lignes d'égale déclinaison au 1^{er} janvier 1888 sont figurées sur la Carte (Pl. B.X); elles sont tracées de degré en degré; ces lignes font avec le méridien

(1) Une mesure effectuée à Gibraltar par MM. les Officiers de la Marine anglaise, le 1^{er} décembre 1886, à 8^h du matin, a donné pour valeur de la déclinaison à cette date 17° 12'. Ce nombre semble bien élevé.

(2) *Comptes rendus*, t. CVII, p. 147.

dien géographique un angle qui diminue de l'Ouest à l'Est. Leur direction générale entre le Sud et le Sud-Sud-Ouest persiste sur la partie occidentale du réseau; mais, vers la Tripolitaine, et déjà à Gabès, elles s'infléchissent vers l'Est, c'est-à-dire dans une direction opposée relativement aux méridiens : les lignes isogones s'étalent ainsi en éventail sur le nord de l'Afrique. La différence de déclinaison entre deux lieux de distance donnée situés sur le même parallèle diminue donc avec la latitude.

L'isogone de 10° passe à Salerne, traverse irrégulièrement la Sicile, laisse Malte à l'Est, et aborde la côte de la Tripolitaine vers le 13° degré de longitude. La ligne de 11° va de Rome à l'île de Djerba; celle de 12° coupe la côte d'Italie par le 44° parallèle, près de Carrare, présente des sinuosités très remarquables en Corse et en Sardaigne, et atteint l'Algérie près de La Calle. L'isogone de 14° , qui part de l'embouchure du Rhône, entre en Algérie à l'ouest d'Alger; elle est rejetée ensuite vers l'Ouest dans les environs de Miliana. La ligne de 15° quitte l'Espagne entre Barcelone et l'embouchure de l'Èbre; elle s'infléchit à l'Ouest vers la côte, au large d'Alicante, puis présente une courbure de sens opposé en arrivant à la côte d'Algérie, par Arzew. Enfin, l'isogone de 17° , qui passe à l'ouest de Madrid, rencontre la côte d'Espagne sur l'Océan, vers l'embouchure du Guadalquivir.

En prolongeant la Carte vers l'Est, à l'aide des observations faites dans le Levant par M. J. Lephay en 1885-1886, et que nous publions plus loin (*voir l'Appendice*), on trouverait que la ligne de déclinaison 7° part du golfe de Salonique, coupe l'isthme de Corinthe, et touche à la côte occidentale de l'île de Candie. L'isogone de 6° longe la côte Ouest de l'Asie Mineure; celle de 5° passe dans le voisinage du Caire, et se dirige au Nord vers Constantinople. M. d'Abbadie, au cours de son voyage en Orient, en 1884-1885, a trouvé à Jérusalem une déclinaison de $3^{\circ}52'$, d'après la moyenne de deux mesures faites dans la même journée, l'une le matin, l'autre le soir ⁽¹⁾. Enfin, au fond du golfe d'Iskandéroun, au nord-est de l'île de Chypre, point le plus oriental de la Méditerranée, la déclinaison n'est plus que de 3° .

La Carte des isogones met en évidence un assez grand nombre d'anomalies. A Bastia, la déclinaison observée est supérieure de plus d'un degré et demi à la valeur qu'on aurait obtenue par interpolation, en admettant l'uniformité des lignes isogones. La montagne qui domine la ville au Nord-Ouest renferme d'ailleurs des affleurements ferrugineux très importants; elle est formée de schistes talqueux passant à la pierre ollaire, et quelquefois à la serpentine. Gueymard, dans son *Voyage géologique en Corse*, en parlant d'une des mines de Farinole, village situé à 9^{km} Ouest-Nord-Ouest de Bastia, dit : « On juge cette mine très

(1) *Annuaire du Bureau des Longitudes* pour 1888, p. 768.

abondante, car, en approchant la boussole de l'entrée, l'aiguille se dirige de l'Ouest à l'Est. » Notre observation conclut à une courbe fermée, de déclinaison supérieure à 13° , dans le voisinage de Bastia.

Au contraire, l'observation de Bonifacio, et surtout celle d'Ajaccio, indiquent une anomalie de sens opposé : la déclinaison y est plus faible que celle qui résulterait des isogones régulières. La valeur que nous avons trouvée pour Ajaccio concorde d'ailleurs avec celle que M. de Bernardières a obtenue dans une de ses récentes croisières. D'autre part, l'observation faite par M. Hatt à l'île Rousse est d'accord avec le tracé régulier des isogones.

Notre séjour en Corse n'a pas été assez prolongé pour que nos résultats puissent suffire à établir les isogones dans l'île; les discordances constatées montrent tout l'intérêt que présenterait une étude complète, basée sur un plus grand nombre d'observations.

Les déterminations faites en 1885 par M. C. Chistoni mettent également en évidence l'influence considérable de la nature du sol sur l'aiguille aimantée en certains points, notamment en Sardaigne, en Sicile, dans le voisinage de Turin et de Gênes. Il résulte de ces observations que, dans la région de Gênes, la déclinaison, comme à Bastia, passe par un maximum anormal : on rencontre des masses de serpentine sur la côte de Ligurie, ainsi que dans les terrains d'alluvion sur lesquels est bâtie la ville de Turin.

Les phénomènes sont réguliers sur la côte de la Tunisie.

Nos observations de Bône et de Philippeville ne présentent rien de particulièrement remarquable quant à la déclinaison, malgré le voisinage du cap de Fer et du massif ferrugineux de l'Edough; l'isogone de 12° est seulement un peu rejetée vers l'Est près de la côte d'Algérie. Les montagnes qui s'étendent à l'ouest d'Alger ont une influence mieux marquée sur la direction de l'aiguille aimantée : les isogones de 14° et de 15° se rapprochent visiblement l'une de l'autre entre Miliana et Oran. On signale des gisements ferrugineux dans le massif du Dahra, entre le Chelif et la côte; et le bassin inférieur de la Tafna à l'ouest d'Aïn Temouchent, d'origine volcanique, renferme d'abondantes roches de nature magnétique : trachytes, basaltes, amphibolites, etc. Le port de Beni Saf doit principalement son importance au commerce du minerai de fer exploité dans la région.

A Saïda, vers la limite Nord des hauts plateaux du Sud oranais, on rencontre encore une anomalie qui se traduit par un excès marqué de la déclinaison. Enfin, l'isogone de 15° est déformée également au large de la côte d'Espagne, vers Alicante et Carthagène.

Les particularités que nous avons signalées précédemment pour la France, relativement à la direction de l'aiguille aimantée, se retrouvent donc ici. Nos observations actuelles fournissent une nouvelle preuve que la représentation des

phénomènes magnétiques n'a pas la régularité avec laquelle on les a figurés jusqu'ici, faute d'un nombre suffisant d'observations comparables.

Carte des lignes d'égale composante horizontale.

La Pl. B.XI est relative aux lignes d'égale composante horizontale au 1^{er} janvier 1888. Ces lignes, tracées de cinq en cinq unités du troisième ordre (C. G. S.), sont orientées dans une direction sensiblement perpendiculaire à celle des méridiens magnétiques.

D'une manière générale, la distance entre deux lignes consécutives d'égale composante horizontale diminue avec la latitude; pourtant, dans la partie Nord de la province d'Alger, et jusqu'à Philippeville, ce décroissement est assez irrégulier, et les courbes d'intensité 0,250 et 0,255 sont relativement très espacées.

Dans les limites de notre réseau, et abstraction faite de la perturbation constatée à Gênes par M. Chistoni, la composante horizontale a son minimum, 0,2166, non loin de cette ville, à Albissola, et sa plus grande valeur à Tripoli, 0,2764. D'après les observations de M. J. Lephay dans le Levant, la ligne 0,255, qui passe à Tunis, se prolonge à travers la Grèce et passe au nord de l'île de Négrepont; la ligne 0,260 va de Sousse à l'isthme de Corinthe. A Latakieh, sur la côte Nord de la Syrie, la composante horizontale atteint 0,2845. M. d'Abbadie a trouvé 0,298 à Jérusalem en 1885. Enfin, sur la rive du canal de Suez, au sud des Lacs amers, M. Favereau a observé 0,3018, le 16 avril 1884⁽¹⁾.

Les anomalies signalées plus haut se retrouvent sur la Carte d'intensité. Les phénomènes observés sont très irréguliers en Corse et en Sardaigne; à Arenzano, près de Gênes, l'anomalie est plus accentuée encore, et M. Chistoni a trouvé la valeur 0,225, au lieu de 0,218 qui résulterait de la régularité des courbes; l'influence perturbatrice est donc égale à environ $\frac{1}{30}$ de la valeur de la composante en ce point. L'influence du cap de Fer, peu sensible sur la déclinaison, est plus nette sur la Carte de la composante horizontale, et la courbe d'intensité 0,250 est rejetée sur la mer, au large de Philippeville.

En comparant la Carte actuelle, basée sur l'observation, avec les Cartes les plus récentes, on voit, comme M. L. Teisserenc de Bort l'a remarqué déjà pour l'inclinaison en Algérie, que les courbes ne font pas, avec les parallèles, un angle aussi grand que celui sous lequel on les a figurées. D'après ces Cartes, la composante horizontale serait plus élevée à Naples qu'à Tanger, alors que les valeurs de cet élément, en ces deux points, sont respectivement 0,240 et 0,246. La

(1) *Annales hydrographiques*, 1886.

I. — *Mémoires de 1887*.

ligne 0,240, que l'on fait passer à Tanger, doit être reportée beaucoup plus au Nord; elle coupe la côte d'Espagne dans le voisinage d'Alicante.

Carte des lignes d'égale inclinaison.

La Carte (*Pl. B.XII*) représente les lignes d'égale inclinaison, tracées de degré en degré. Ces lignes, sur la Méditerranée, ont sensiblement la même allure que les lignes d'égale composante horizontale; les deux systèmes de courbes font avec les parallèles géographiques des angles à peu près égaux, au moins dans les régions où les phénomènes sont réguliers; toutefois, entre la Sicile et Tripoli, les lignes d'égale composante horizontale font un angle plus grand que les isoclines.

D'une manière générale, la distance entre deux isoclines consécutives diminue assez régulièrement avec la latitude, comme les lignes d'égale intensité. Ici encore, on retrouve la trace des actions perturbatrices signalées sur les Cartes précédentes. Les isoclines sont irrégulières en Corse, en Sardaigne, en Sicile, vers Gênes, etc. En Algérie, la courbe de 54° est rejetée sur la mer au nord du cap de Fer et de la montagne de Bône.

Sur la côte, la moindre inclinaison a été observée à Tripoli ($47^{\circ}36'$), et l'inclinaison la plus élevée, d'après les observations de M. Chistoni, se rencontre près de Gênes, à Albissola ($61^{\circ}10'$).

M. J. Lephay n'a malheureusement pas eu les moyens de compléter ses importantes observations dans le Levant par des mesures de l'inclinaison. Nous rappellerons seulement que M. d'Abbadie, pendant l'hiver de 1884-1885, a observé $43^{\circ}15'$ à Jérusalem et $40^{\circ}47'$ au sommet de la grande pyramide d'Égypte.

Comme en Algérie, les isoclines, sur la Méditerranée occidentale, font avec les parallèles géographiques un angle moins grand que ne l'indiquent les Cartes les plus récentes. La ligne de 57° , par exemple, coupe effectivement la côte d'Italie à Naples; mais dans l'Ouest on la fait passer près de Tanger, alors qu'en réalité elle atteint l'Espagne au nord d'Alicante. L'inclinaison à Tanger est seulement de $55^{\circ}14'$.

Lignes d'égale composante verticale.

Dans le Tableau I du présent Chapitre, nous avons donné les valeurs calculées de la composante verticale et de la force totale pour toutes les stations de notre réseau. Ces nombres permettraient de tracer également des courbes de la distribution de ces deux éléments dans le bassin occidental de la Méditerranée.

On trouverait ainsi que les lignes d'égale composante verticale y sont sensiblement parallèles aux courbes relatives à la composante horizontale, mais le sens de la variation suivant la latitude est nécessairement opposé : la valeur

absolue de la composante verticale augmente du Sud au Nord le long des méridiens magnétiques. Comme pour l'inclinaison, le minimum (0,3028) se rencontre à Tripoli et le maximum (0,3934) dans le voisinage de Gênes.

Lignes d'égale force totale.

Les courbes relatives aux deux composantes de la force terrestre ayant sensiblement la même orientation, les lignes d'égale intensité totale seraient donc également disposées à peu près perpendiculairement à la direction de l'aiguille aimantée horizontale.

Comme la composante verticale et l'inclinaison, la force totale augmente avec la latitude le long des méridiens magnétiques. Sur la Méditerranée occidentale, le minimum, 0,4100, a été observé à Tripoli, et le maximum, 0,4491, vers le golfe de Gênes.

III. — VARIATION SÉCULAIRE DES ÉLÉMENTS MAGNÉTIQUES.

Déclinaison. — Les observations anciennes les plus complètes permettant de déterminer la variation séculaire de la déclinaison se rapportent à l'Espagne; la plupart de nos stations dans ce pays sont également des points où avait observé Lamont en 1857. Les mesures de Lamont, comparées préalablement aux variations observées simultanément à Munich, ont été ramenées par lui au 1^{er} janvier 1858 (1).

La comparaison des deux séries est donnée dans le Tableau suivant, dans lequel nous avons compris également les observations de Perpignan.

Variation séculaire de la déclinaison.

Stations.	Lamont, 1858,0.	Moureaux, 1888,0.	Variation séculaire.	
			30 années.	Moyenne annuelle.
Almeria.....	19° 3',6	15° 44',8	— 3° 18',8	— 6',63
Barcelone.....	18. 5,0	14. 43,4	— 3. 21,6	— 6,72
Carthagène.....	18.36,5	15. 20,6	— 3. 15,9	— 6,53
Malaga.....	19. 43,3	16. 21,5	— 3. 21,8	— 6,73
San Fernando.....	20. 12,5	16. 54,0	— 3. 18,5	— 6,62
Valence.....	18. 39,2	15. 21,1	— 3. 18,1	— 6,60
Perpignan.....	17. 59,2	14. 38,9	— 3. 20,3	— 6,68

En comparant nos observations de Malte et d'Alger avec celles de M. de Ber-

(1) *Untersuchungen über die Richtung und Stärke des Erdmagnetismus an verschiedenen Punkten des südwestlichen Europa*; ausgeführt von Dr J. LAMONT. Munich, 1858.

nardières, faites en 1879, on trouve que, dans ces neuf dernières années, la variation moyenne annuelle a été de $-5',6$ à Alger et $-5',5$ à Malte.

A Alger, hors de la ville, Aimé a trouvé une déclinaison de $18^{\circ}36',3$ le 25 mai 1842; notre observation du 24 mai 1887 au *Jardin d'Essai* a donné $13^{\circ}50',6$: la variation moyenne annuelle dans l'intervalle de ces deux mesures serait ainsi de $-6',3$. Antérieurement, le commandant Bérard avait observé $19^{\circ}25'$ le 1^{er} août 1832, et $19^{\circ}4'$ le 19 octobre 1833, sur la terrasse de la Marine (1).

A Tripoli, Vogel (2) a observé une déclinaison de $14^{\circ}25'$ en avril 1853. En comparant cette valeur à celle que nous avons obtenue le 4 mai 1887, on trouve une variation moyenne annuelle de $-6',6$.

Duperrey (3) rapporte que Bérard a observé à Mers-el-Kébir, en novembre 1831, une déclinaison de $20^{\circ}10'$, ce qui donnerait $-5',5$ comme valeur moyenne annuelle de la variation séculaire dans le voisinage d'Oran.

Ces nombres, déduits d'observations faites à des époques différentes, ne sont d'ailleurs pas absolument comparables entre eux; ils ne représentent qu'une moyenne, et l'on ne saurait les appliquer aux observations de la période actuelle, qui correspond à un ralentissement marqué de la variation séculaire.

Composante horizontale. — La comparaison des observations, pour celles de nos stations qui sont communes avec celles de Lamont, permet de déterminer la variation séculaire de la composante horizontale sur la côte occidentale de la Méditerranée, entre Perpignan et le détroit de Gibraltar.

Variation séculaire de la composante horizontale.

Stations.	Lamont, 1858,0.	Mourcaux, 1888,0.	Variation séculaire.	
			30 années.	Moyenne annuelle.
Almeria.....	0,23460	0,24455	+ 0,00995	+ 0,00033
Barcelone.....	0,21891	0,22704	+ 0,00813	+ 0,00027
Carthagène.....	0,23246	0,24193	+ 0,00947	+ 0,00032
Malaga.....	0,23350	0,24242	+ 0,00892	+ 0,00030
San Fernando.....	0,23300	0,24328	+ 0,01028	+ 0,00034
Valence.....	0,22456	0,23436	+ 0,00980	+ 0,00033
Perpignan.....	0,21357	0,22158	+ 0,00801	+ 0,00027

Aimé a déterminé la composante horizontale à Alger, d'après la méthode de Gauss, le 1^{er} juin et le 24 novembre 1842; les deux valeurs obtenues, exprimées en unités C.G.S., sont respectivement 0,2387 et 0,2360, ce qui donne-

(1) *Comptes rendus de l'Académie des Sciences*, t. XVII, p. 1036.

(2) *Petermann's Mittheilungen*, 1855, p. 240.

(3) *Voyage autour du monde; Physique*, p. *153.

rait une variation moyenne annuelle de $+0,00029$ environ, tandis qu'elle est de $+0,00034$ à San Fernando. M. J. Lephay admet que, dans le Levant, d'après la comparaison de ses observations avec celles de M. de Bernardières, cette variation est de $+0,00025$. Bien que ces nombres soient déduits de mesures faites à des époques différentes, il ne semble pas douteux que la variation annuelle de la composante horizontale ne diminue de l'Ouest à l'Est. D'ailleurs, les observations relatives à la déclinaison montrent que la variation séculaire de cet élément augmente avec la latitude : elle est moindre à Alger qu'à Marseille, et moindre à Marseille qu'à Dunkerque. Les méridiens magnétiques se rapprochant par suite des méridiens géographiques, il est naturel d'admettre que les lignes isodynamiques, qui sont sensiblement normales à la direction de l'aiguille aimantée horizontale, se rapprochent simultanément des parallèles géographiques.

Inclinaison. — Nous comparerons encore nos résultats en Espagne et à Perpignan avec les observations de Lamont, afin d'en déduire la variation séculaire de l'inclinaison pendant les trente dernières années.

Variation séculaire de l'inclinaison.

Stations.	Lamont, 1858,0.	Moureaux, 1888,0.	Variation séculaire.	
			30 années.	Moyenne annuelle.
Almeria.....	57°26',9	55°32',3	1°54',6	— 3',8
Barcelone.....	60°42',2	59°14',6	1°27',6	— 2',9
Carthagène.....	57°51',6	56°4',3	1°47',3	— 3',6
Malaga.....	57°49',4	55°56',3	1°53',1	— 3',8
San Fernando.....	58°3',7	55°59',2	2°4',5	— 4',1
Valence.....	59°28',0	57°48',3	1°39',7	— 3',3
Perpignan.....	61°47',8	60°22',2	1°25',6	— 2',9

Bérard avait observé $58^{\circ}23',5$ à Alger en juillet 1831 ⁽¹⁾ et $58^{\circ}2',4$ à Mers-el-Kébir en novembre de la même année ⁽²⁾; on en déduit pour la variation moyenne annuelle, de 1831 à 1888, $-4',6$ près d'Oran et $-4',3$ à Alger. Les observations d'Aimé à Alger ($57^{\circ}23'$ le 2 juin et $57^{\circ}13'$ le 11 novembre 1842) conduiraient à une diminution légèrement plus faible. En comparant notre valeur de l'inclinaison à Tripoli à celle obtenue par Vogel ⁽³⁾ dans cette ville au mois d'avril 1853 ($49^{\circ}22'$), la variation moyenne serait de $-3',0$ par an. Enfin, la différence des inclinaisons obtenues par M. d'Abbadie au sommet de la grande

(1) *Comptes rendus (ibid.)*.

(2) DUPERREY, *Ibid.*

(3) Petermann's *Mittheilungen (ibid.)*.

pyramide d'Égypte, en 1839 et en 1885, est seulement de $0^{\circ}55'$, soit une variation annuelle de $-1',2$.

Ces résultats montrent que les lignes d'égale inclinaison, comme les lignes d'égale composante horizontale, ne se déplacent pas parallèlement à elles-mêmes avec le temps, mais que leur direction se rapproche actuellement de celle des parallèles géographiques.

D'après la comparaison de nos observations avec celles d'Aimé et de Lamont, on trouve que la variation séculaire de la composante verticale et celle de la force totale ont également une valeur négative en Espagne et sur la côte d'Algérie.

APPENDICE.

✓ OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES FAITES DANS LE LEVANT, EN 1885-1886 ✓

PAR M. J. LEPHAY,

Lieutenant de vaisseau ⁽¹⁾.

Les Tableaux qui suivent résument à peu près 180 mesures de la déclinaison et 40 mesures de la composante horizontale, faites en divers points du Levant, au cours d'un embarquement sur la *Vénus*. Ces déterminations ne portent malheureusement que sur quelques stations, et leur nombre diffère considérablement en chaque relâche, suivant la durée du séjour ou selon les nécessités du service à bord.

A Naxos, Alexandrie et Latakieh, par exemple, c'est à peine si j'ai pu obtenir 2 ou 3 déclinaisons, tandis qu'au Pirée, centre de stationnement de la frégate, j'ai relevé à loisir plus de 120 déclinaisons et calculé une trentaine de valeurs de la composante horizontale.

C'est avec ces observations du Pirée, faites presque régulièrement à dix jours d'intervalle et pendant huit mois consécutifs, que les résultats des autres stations ont été, après comparaison avec les relevés du magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur, ramenés au 1^{er} janvier 1886 à 9^h 30^m du matin, heure approchée de la valeur moyenne diurne de la déclinaison.

De l'ensemble de ces observations dans l'Archipel et sur les côtes de l'Asie mineure, il me paraît ressortir les faits suivants :

1^o La déclinaison varie assez régulièrement du lever au coucher du Soleil; elle passe par un minimum entre 7^h 30^m et 8^h du matin et par un maximum entre 2^h et 3^h 30^m du soir;

(1) Cette Note, encore inédite, nous a été obligeamment communiquée par l'Auteur.

2° L'amplitude moyenne de cette variation diurne a été comprise entre 7' et 9', pendant la période considérée;

3° La déclinaison diminue actuellement à très peu près de 5' par an (1).

L'instrument constamment employé pour toutes les déterminations est le grand théodolite Brunner n° 51, du Dépôt de la Marine, déjà entre nos mains à la Mission du cap Horn en 1882-1883; les constantes de l'instrument et les méthodes d'observations ont été indiquées en détail dans le Tome III des documents de cette Mission scientifique. Il paraît donc inutile de les décrire ici.

En moyenne, une observation de déclinaison, soit 4 lectures avec retournement du barreau, durait de 4^m à 6^m; la détermination des éléments de calcul d'une composante horizontale prenait environ 25^m, dont 12^m à 14^m pour les 4 lectures des déflections du barreau auxiliaire, et de 10^m à 15^m, suivant le moment magnétique du barreau employé, pour la durée totale d'une centaine d'oscillations très petites de ce même barreau.

Pour l'observation de ces durées d'oscillations, j'employais, à défaut d'un compteur à pointage, un compteur ordinaire battant les $\frac{4}{10}$ de seconde.

Un aide signalait les battements à haute voix, et je lui donnais le top en répétant fortement le numéro du battement qui venait de coïncider avec le passage du trait du barreau au fil du réticule du microscope. J'estime que, de cette façon, l'erreur commise sur la durée totale d'une centaine d'oscillations ne dépassait guère un battement, ce qui, en somme, produisait à peine sur la composante horizontale une erreur de $\pm 0,0001$.

Dans certaines relâches, où le temps manquait, la composante horizontale a été déterminée par la seule expérience des oscillations des barreaux.

Soient t et t' les durées d'oscillation d'un même barreau en deux points de composantes H et H' ; on sait que l'on a, pour des moments identiques du barreau,

$$\frac{t'^2}{t^2} = \frac{H}{H'}.$$

C'est de cette manière qu'ont été obtenues les valeurs de la composante à Latakieh, à Volo, à Nauplie et à Kalamaki.

Les observations sont résumées dans les Tableaux suivants. Pour les ramener au 1^{er} janvier 1888 (Tableau III), on a admis que la variation annuelle est égale à $-5'$ pour la déclinaison, et à $+0,00025$ pour la composante horizontale.

La position géographique des stations est donnée également dans le Tableau III.

(1) D'après mes propres observations de novembre 1885 à juillet 1886, et d'après ces mêmes observations comparées à celles que M. de Bernardières a faites au Pirée en 1879 et en 1885.

I. — DÉCLINAISON.

Stations.	Dates.	Heures.	Nombre d'observa- tions.	observée.	Déclinaison	
					ramenée au 1 ^{er} jan- vier 1886.	moyenne au 1 ^{er} jan- vier 1886.
Pirée (pointe Miltiade).....	1885. Nov. 15	^h ^m 3.34 s.	4	7° 6',0	7° 3',4	7° 1,2
Id.	» » 22	3.32 s.	2	7. 6 8	7. 3,6	
Id.	» » 27	3.48 s.	4	7. 4,5	7. 1,5	
Pirée (côté du lazaret).....	» Déc. 6	3.17 s.	5	7. 2,4	7. 0,0	
Pirée (pointe Miltiade).....	1886. Janv. 13	4.13 s.	5	7. 5,7	7. 4,0	
Pirée (côté Nord de l'entrée du port).....	» » 19	2. 0 s.	2	7. 2,3	7. 0,5	
Pirée (côté Nord de l'entrée du port).....	» » 25	4. 5 s.	2	7. 0,1	7. 0,0	
Pirée (pointe Miltiade).....	» Févr. 7	3.15 s.	8	7. 3,5	7. 0,5	
Pirée (lazaret).....	» Mars 5	4.20 s.	2	6.58,7	6.57,5 ⁽¹⁾	
Pirée (pointe Miltiade).....	» Avril 5	9.15 m.	4	6.57,4	7. 0,0	
Id.	» Mai 24	9.30 m.	6	7. 0,9	7. 2,5	5.41,7
Id.	» » 29	2.45 s.	24	7. 3,1	7. 1,0	
Smyrne (Cordelio).....	1885. Juill. 24	7.45 m.	2	5.39,0	5.42,0	
Id.	» » 31	8. 2 m.	1	5.42,5	5.43,0	
Id.	1886. Juin 28	7.45 m.	4	5.34,2	5.41,2	
Alexandrie (Égypte).....	1885. Sept. 6	4.10 s.	2	5.33,0	5.28,0 ⁽²⁾	5.28,0
Latakiah (Syrie).....	» » 26	4. 0 s.	2	5.18,2	3.13,3 ⁽²⁾	5.13,3
Nauplie.....	» Déc. 27	9.15 m.	2	7.19,3	7.19,5	7.19,5
Syra.....	1886. Janv. 5	9.10 m.	4	6.31,2	6.31,5	6.31,5
Égine (pied du temple, bord de la mer).....	» Avril 9	0.20 s.	5	7. 2,5	7. 3,0	7. 3,0
Égine (cap Tourlo).....	» Juill. 15	7.10 s.	2	6.55,0	7. 0,0 ⁽²⁾	
Volo (pied du Pélion).....	» Juin 15	7.40 m.	3	7. 3,0	7. 9,8	
Kalamaki (isthme de Co- rinthe).....	» Juill. 16	7. 0 m.	4	7. 2,6	7.10,1 ⁽²⁾	7.10,1
Naxos (bord de la mer; à 500 ^m du temple de Bacchus)...	1885. Juill. 2	8.30 m.	1	6.21,5	6.22,0	6.22,0

II. — COMPOSANTE HORIZONTALE.

Stations.	Dates.	Heures.	Nombre d'observa- tions.	observée.	Composante horizontale	
					ramenée au 1 ^{er} jan- vier 1886.	
Pirée (pointe Miltiade).....	1885. Nov. 22	^h ^m 3.30 s.	2	0,26182	0,26175	}
Id.	» » 27	4.15 s.	2	0,26185		
Id.	1886. Janv. 13	3.56 s.	2	0,26195		
Pirée (côté Nord de l'entrée du port).....	» » 25	4.17 s.	2	0,26140		
Pirée (pointe Miltiade).....	1885. Nov. 7	3.55 s.	2	0,26193		
Id.	» » 15	3.27 s.	2	0,26210		
Id.	1886. Févr. 7	3.50 s.	4	0,26197		
Pirée (côté du lazaret).....	» » 22	3.30 s.	2	0,26142		
Id.	» Mars 5	5.15 s.	2	0,26172		
Pirée (pointe Miltiade).....	» Avril 5	9.50 m.	2	0,26161		
Id.	» » 26	8.40 m.	2	0,26170		
Id.	» » 30	8.40 m.	2	0,26160		
Id.	» Mai 10	9. 2 m.	4	0,26183		

(1) Vent fort.

(2) Courbe agitée au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur.

B.194 OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES FAITES DANS LE LEVANT.

Stations.	Dates.	Heures.	Nombre d'observa- tions.	Composante horizontale	
				observée.	ramenée au 1 ^{er} jan- vier 1886.
Smyrne (Cordelio).....	1885. Juill. 24	9. 0 m.	1	0,26222	} 0,26223
Id.	» » 31	8.30 m.	1	0,26223	
Smyrne (Cordelio, à 500 ^m des points précédents).....	1886. Juin 28	7.30 m.	2	0,26224	
Syra (jetée).....	» Janv. 5	10. 0 m.	2	0,2655	0,2655
Latakiah (au sud de l'ancien port de Laodicée).....	1885. Sept. 26	4. 0 s.	2	0,2839 (1)	0,2840
Nauplie (pointe Ayaapostoli).	» Déc. 27	9.20 m.	1	0,2622	0,2622
Volo (pied du Pélion).....	1886. Juin 15	7.30 m.	2	0,2535	0,2536
Kalamaki (isthme de Co- rinthe).....	» Juill. 16	7. 0 m.	2	0,2587? (1)	0,2590
Égine (cap Tourlo).....	» » 15	7. 0 s.	2	0,26145? (1)	0,2616

III. — RÉSUMÉ.

Observations ramenées au 1^{er} janvier 1888.

Stations.	Longitude Est.	Latitude Nord.	Déclinaison occidentale.	Composante horizontale.
Le Pirée	21. 18,0	37.56,2	6.51'	0,2622
Smyrne.....	24.49,0	38.27,5	5.31	0,2627
Alexandrie.....	27.31,3	31.11,7	5.18	»
Latakiah.....	33.26,3	35.32,5	3. 3	0,2845
Nauplie.....	20.27,7	37.33,7	7.10	0,2627
Syra	22.36,0	37.26,0	6.21	0,2660
Égine	21.13,0	37.44,2	6.53	0,2621
Volo	20.38,0	39.22,0	7. 0	0,2541
Kalamaki	20.40,0	37.55,0	7. 0	0,2595
Naxos.....	23. 2,0	37. 5,5	6.12	»

(1) Courbe agitée au magnétographe de l'observatoire du Parc Saint-Maur.

✓ ÉTUDES SUR LE CLIMAT DE PARIS,

PAR M. E. RENOU.

✓ TROISIÈME PARTIE.

✓ TEMPÉRATURE ⁽¹⁾.

La troisième Partie des *Études sur le climat de Paris* comprend les résumés de la température de l'air.

Ce n'est pas la première fois qu'on donne de pareils résumés : il y a même un grand nombre de Recueils scientifiques qui les ont reproduits ; mais ces résumés sont de simples travaux d'arithmétique sans aucune critique ni discussion. Or il s'en faut de beaucoup que les chiffres thermométriques recueillis à Paris puissent être admis sans contrôle ; j'ai fait voir, il y a longtemps, que les thermomètres placés à des fenêtres à l'intérieur des villes ne donnent point du tout la température de l'air ; les observations anciennes principalement ont un grand nombre de défauts, qu'on peut résumer ainsi :

Incertitude sur la nature et la graduation des thermomètres ;

Emplacement défectueux ;

Heures mal choisies pour donner, soit la moyenne température, soit son oscillation diurne ;

Moment de l'observation peu précis, variant souvent de plusieurs heures ;

Erreurs fréquentes, soit dans la lecture des instruments, soit dans le calcul des moyennes, soit dans l'impression.

D'après cela, on est fort peu fondé à chercher dans les chiffres résumés des anciennes observations des nombres représentant les températures absolues des

(¹) La première Partie (pression barométrique) a été publiée dans le tome I des *Annales du Bureau central météorologique* pour 1880, et la seconde Partie (pluie) dans le tome I des *Annales* pour 1885.

saisons ou des années à différentes époques. C'est pourtant ce qu'on a fait et qu'on fait encore, mais moins, il est vrai. Si l'on n'a pas de chiffres absolus, on a, jusqu'à un certain point, les variations journalières. Je dis *jusqu'à un certain point*, car les courbes des températures diurnes trouvées à Paris ne sont pas parallèles à celles de la campagne; les différences des lectures thermométriques, dans les deux positions, varient continuellement suivant l'état du ciel, la direction et l'intensité du vent, la rapidité et le sens de la variation de la température; néanmoins, dans les moyennes d'un grand nombre d'années, ces différences se régularisent.

Paris amoindrit les oscillations de la température, que la plupart des séries anciennes ne peuvent d'ailleurs pas donner. Ainsi, dans des observations faites à 7^h du matin, 2^h et 10^h du soir, on est obligé de prendre la température de 7^h pour le minimum; or, en été, dans les journées froides de mai ou de juin, par exemple, le thermomètre, à 7^h, est souvent remonté de 5° ou 6° depuis le moment du minimum; la masse de Paris produit une erreur aussi grande, de sorte que, pour des stations situées moins favorablement que l'Observatoire, la différence avec la campagne atteint facilement 8° ou 10°. Quoique les vignes gèlent souvent en mai autour de Paris, et dans la moitié de la France, les thermomètres de l'Observatoire n'ont jamais atteint dans ce mois le terme de la congélation; le 5 mai 1870, alors que l'Observatoire notait un minimum de 2°, je trouvais en plaine, au sud de Choisy-le-Roi, au lever du Soleil, avec le thermomètre fronde, une température de 4°,9 au-dessous de zéro, plus basse de 7° environ que celle de l'Observatoire. Deux mois et demi après, le 24 juillet, l'Observatoire notait un maximum de 33°,1; mais au sud de Choisy je trouvais une température de 36°. A la même heure, et dans une bonne situation aussi, on observait à Vendôme 37°, et M. Contejean, à Poitiers, 41°,2. Voilà une intempérie très remarquable qui n'aurait laissé aucune trace dans les registres de l'Observatoire, car une chaleur de 33°,7 n'y est pas rare. J'ajouterai qu'au Parc de Saint-Maur j'ai trouvé fréquemment des différences semblables.

Vingt années d'observations faites avec soin, dans une situation acceptable, et d'une façon identique, fournissent toujours la même température annuelle à 0°,1 près; dix ans donnent en général le même résultat. Cela permet d'utiliser les séries un peu longues. Celles qui ont été mises à contribution dans le présent travail n'étant pas toutes dans les mêmes conditions, il a fallu les fractionner en plusieurs parties qui ne sont pas directement comparables entre elles.

Les observations que j'ai employées pour la température sont d'abord celles qui m'ont servi pour la pression atmosphérique, mais il y en a quelques autres. En voici la nomenclature :

1664-1718	Lahire; continuées après sa mort à l'Observatoire.
1682-1731	} Cassini et ses descendants.
1750-1755	
1764-1793	
1732-1740	Réaumur.
1747-1768	Delisle.
1753-1776	<i>Journal économique</i> et <i>Journal de Médecine</i> .
1768-1814	Cotte, à Montmorency (lacunes).
1763-1793	Messier.
1771-1792	<i>Journal de Paris</i> .
1785 jusqu'à présent.	Observatoire (manuscrit jusqu'en 1797, publié dans le <i>Journal de Physique</i> , les <i>Annales de Chimie et de Physique</i> , les <i>Comptes rendus de l'Académie des Sciences</i> , les <i>Annales de l'Observatoire</i>).

On trouve dans l'*Annuaire météorologique de la France* (qui a précédé celui de la Société météorologique), t. II, année 1850, des observations faites de trois en trois heures par Delcros, d'avril 1839 à mars 1840, dans un jardin de la rue Poullétier, n° 14, à l'angle de la rue Saint-Louis-en-l'Île, faisant face diagonalement à l'église de ce nom. La moyenne des vingt-quatre heures qui s'en déduit immédiatement est supérieure de 0°,36 à celle qu'on déduit des minima et maxima diurnes à l'Observatoire pendant le même temps. La différence de niveau, de 30^m environ, devrait donner dans l'île Saint-Louis une température plus haute de 0°,17. Le thermomètre de Delcros donnait donc 0°,2 de plus que l'Observatoire au même niveau. L'état du ciel y est indiqué quatre fois par jour, à 6^h m., midi, 6^h s. et minuit.

Barral a publié, dans le *Journal d'Agriculture pratique*, des observations qu'il a faites à son domicile, rue Notre-Dame-des-Champs, 82, d'abord à une fenêtre, ensuite sous un abri, dans son jardin; les résultats très différents ne peuvent servir qu'à montrer que, dans l'intérieur de Paris, les observations ont bien peu de valeur. Ces observations embrassent les années 1854 à 1866.

Lemaire (1) a fait avec beaucoup de soin et d'assiduité pendant cinq ans et demi, de 1877 à 1882, des observations de minima et maxima de la température, avec le thermomètre Six. Cet instrument était placé au côté droit d'une fenêtre exposée droit à l'Est, au quatrième étage d'une maison sise rue Denfert-Rochereau, 28. Ces observations, dont je possède le manuscrit, donnent une moyenne de 12° environ : la plus basse température, celle du 10 décembre 1879, atteint — 16°,9 quand on a eu — 21°,8 à l'Observatoire, situé à quelques centaines de mètres et au même niveau, et — 25°,6 au Parc de Saint-Maur. La plus haute température de Lemaire est 38°,8, tandis qu'au Parc je trouvais le même jour, 19 juillet 1881, 38°,4.

Le *Bulletin de la Société d'Horticulture* renferme une série d'observations faites

(1) Décédé en septembre 1888.

par Jacques, jardinier du roi Louis-Philippe, dans le parc de Neuilly, trois fois par jour, à 6^h du matin, midi et 6^h du soir, de 1832 à 1850. Depuis le 1^{er} avril 1850 jusqu'à la fin de 1854, Jacques a fait des observations semblables à Ivry-sur-Seine, route de Vitry, n° 5.

Ces observations sont surtout intéressantes par le journal météorologique et les remarques agricoles qui les accompagnent, pendant des années où l'Observatoire ne donnait que l'état du ciel à midi, en un seul mot.

M. Gruby a installé depuis plus de quarante années un observatoire sur la butte Montmartre, à l'altitude de 118^m; depuis le 1^{er} janvier 1882 ces observations sont autographiées textuellement et distribuées à quelques personnes. Les observations sont faites à midi et 8^h du soir, avec le minimum et le maximum diurnes de la température, la pluie et les notations ordinaires du vent et de l'état du ciel. Elles sont un peu influencées par le voisinage des maisons et donnent une moyenne un peu plus élevée que le Parc de Saint-Maur, situé 80^m plus bas.

L'observatoire de Montsouris, situé à 1500^m au sud de l'observatoire de Paris et à une altitude de 78^m, publie une série régulière depuis 1869. Les chiffres thermométriques se ressentent de la masse de Paris et diffèrent peu en général de ceux de l'Observatoire astronomique.

M. Raymond a fait à Marly, de 1881 à 1885, à une altitude de 138^m, d'excellentes observations qui ont toujours présenté l'accord le plus satisfaisant avec celles du Parc de Saint-Maur, eu égard à la différence d'altitude de près de 90^m.

Enfin, l'on peut citer des journaux météorologiques sans thermomètres, mais qui n'en ont pas moins un grand intérêt.

M. Nouel, professeur de Physique au lycée de Vendôme, possède un in-folio manuscrit relié, fort bien écrit, rédigé par Bertrand, et contenant jour par jour l'état du ciel à Paris, de 1698 à 1716, avec tous les détails nécessaires, et comprenant la nuit et le jour.

L'*Annuaire de la Société météorologique de France*, t. XIV, année 1866, contient un journal météorologique de l'état du ciel à Versailles, de 1709 à 1745, par Narbonne.

Nous allons passer en revue les différentes séries que nous avons utilisées.

Cassini et ses descendants ont fait des observations pendant plus d'un siècle, les premières avec des thermomètres à échelle arbitraire dont la graduation a été rapportée postérieurement au thermomètre de Réaumur. Malheureusement, les comparaisons ont été faites on ne sait comment, avec des thermomètres fort mal connus eux-mêmes. Les registres d'où étaient extraits ces résumés, qu'on trouve dans les *Mémoires de l'Académie*, ont été perdus, probablement par la faute du dernier des Cassini, qui les avait entre les mains.

Lahire a commencé, dès 1664, des observations, mais d'abord dans l'intérieur des salles de l'Observatoire. Il appelait cela prendre la température *dans un lieu où l'air n'avait pas un libre accès*.

Longtemps après, il a placé son thermomètre dans la partie orientale de l'Observatoire, alors inachevée et n'offrant que les quatre murs. Cet instrument, conservé pendant un siècle à l'Observatoire, a subi de nombreuses comparaisons, depuis 1732, avec le thermomètre de Réaumur. J'ai fait voir, dans l'histoire du thermomètre (*Annales de la Société météorologique de France*, t. XXIV, année 1876), que cet instrument avait son point de la glace fondante à $31^{\circ},25$ et que son degré équivalait à $0^{\circ},70$ C. Il a disparu vers 1776, et lorsque, à la suite du rigoureux hiver de cette année, on le rechercha pour le soumettre à des comparaisons, on ne put savoir ce qu'il était devenu. Or Cotte nous apprend que Mossy, constructeur d'instruments à Paris, en possédait un tout pareil : il est fort probable que cet instrument de Mossy n'était autre que celui de Lahire, qu'on lui aura donné comme une relique inutile.

La première observation de Lahire que nous connaissions est une température de 7° de son thermomètre, observée le 6 février 1695, et équivalant à -17° C. Dans les *OEuvres d'Arago* (p. 362), la première observation de froid faite à Paris est rapportée au 6 février 1665 et donnée comme égale à $-21^{\circ},2$. Cette erreur, quant à la date, est bien d'Arago, car on la trouve dans un article qu'il a inséré dans les *Annales de Chimie et de Physique* (t. XXVII, année 1824) et dans l'*Annuaire du Bureau des Longitudes pour 1825*. La traduction du 7° degré de Lahire par $-21^{\circ},2$ C. se rattache à une autre erreur, ainsi que nous allons le voir.

La deuxième observation de Lahire est celle des 13 et 14 janvier 1709; son thermomètre est descendu au 5° degré, qu'Arago assimile à $-23^{\circ},1$ C.; or, d'après les comparaisons et les valeurs que j'ai trouvées, le 5° degré de Lahire correspond à $-18^{\circ},4$ C. Le chiffre de $-23^{\circ},1$ est emprunté à Van Swinden, qui dit (*Journal de Physique*, t. L, p. 277) que le gros thermomètre de Lahire, placé comme il l'était, ne pouvait donner la vraie température de l'air et que le froid a dû atteindre $-18^{\circ},5$ R. L'évaluation de Van Swinden, qui équivaut à $-23^{\circ},1$ C., est encore trop modérée; car, les vignes et les noyers ayant gelé presque partout, le froid a dû descendre à -25° ou -26° .

Le froid du 6 février 1695 a été évalué d'après les mêmes considérations à $-21^{\circ},2$. Dans le même Volume des *OEuvres d'Arago* (p. 232), on trouve le froid de février 1695 porté à la date du 7 et évalué à $-17^{\circ},9$ C.

Après la mort de Lahire (21 avril 1718), ses observations ont été continuées; à partir de 1732 on a donné simultanément les chiffres de l'ancien thermomètre et ceux d'un thermomètre de Réaumur placé à côté : c'est ce qui m'a permis de déterminer la valeur des degrés de Lahire.

Nous ne connaissons avant 1785 que les minima et les maxima annuels de la température à l'observatoire de Paris, mais les registres des observations astronomiques contiennent de nombreuses observations météorologiques accompagnant les premières; M. Hauvel en a copié une partie.

De 1732 à 1740, Réaumur fit des observations chez lui, à l'hôtel d'Uzès, rue Saint-Thomas-du-Louvre, dans un quartier qui occupait une partie de la place du Carrousel, voisine de la Seine, et qui a disparu il y a trente ou trente-cinq ans. On ne trouve pour les premières années que les extrêmes de chaque mois; mais, de 1735 à 1740, les observations faites vers 7^h m. et 2^h s. sont presque complètes, si ce n'est qu'elles étaient faites tantôt à Paris, tantôt à Charenton, à Réaumur ou dans quelques autres endroits. L'emplacement défectueux et le changement de lieu empêchent de rien tirer de satisfaisant de cette série. Dans une telle situation, ce sont les minima qui sont le plus erronés. Ainsi, en 1740, le plus grand froid observé par Réaumur a été $-10^{\circ},25$ de son thermomètre ou $-12^{\circ},3$ C. (1° R. à cette époque ne valait que $1^{\circ},2$ C.). Mais, les vignes ayant gelé, il a fait dans la campagne -25° au moins.

L'année 1740 est si exceptionnelle par sa basse température que j'ai cru devoir en donner les résumés mensuels. J'ai calculé les moyennes d'après le Tableau des *Mémoires de l'Académie*, en les réduisant avec la valeur $1^{\circ},2$ C. que j'ai trouvée pour le thermomètre de cette époque. Il y a des fautes dans le Tableau de Cotte; la plus grosse est celle du mois d'avril 1735, portée à $2^{\circ},4$, lisez $8^{\circ},4$: c'est probablement une erreur typographique; il faut de plus ajouter $0^{\circ},8$ R. ou 1° C., Cotte ayant supposé à tort que le zéro de tous les thermomètres de Réaumur était trop bas de cette quantité. Ce chiffre faux se trouve reproduit dans quelques Ouvrages, notamment dans les *Annuaire de Montsouris*.

Températures moyennes mensuelles et annuelle en 1740 à Paris, d'après Réaumur
(thermomètre centigrade).

Décembre 1739.....	5,28
Janvier 1740.....	— 2,03
Février.....	— 2,83
Mars.....	4,68
Avril.....	8,79
Mai.....	10,01
Juin.....	17,90
Juillet.....	19,08
Août.....	17,80
Septembre.....	17,59
Octobre.....	8,73
Novembre.....	2,89
Moyenne.....	8,99

Laissant de côté l'année exceptionnelle 1740, nous trouvons pour les cinq autres années une moyenne de $11^{\circ},23$ C., c'est-à-dire $1^{\circ},23$ de plus que la cam-

pagne; il paraît donc que l'année 1740 a eu une moyenne de 7°,76. Les moyennes de février et de mai (environ — 4°,1 et 8°,8 dans la campagne) sont beaucoup plus basses que tout ce que nous connaissons depuis 1757.

De l'Isle, après son voyage en Russie, a fait à Paris des observations du baromètre et du thermomètre, plusieurs fois par jour. Le manuscrit de ces observations, de 1747 à 1760, existe à l'observatoire de Paris; mais elles ont dû être continuées ensuite, car le *Journal économique* donne celles de 1766 à 1768; elles n'ont cessé peut-être qu'à la mort de de l'Isle en 1771. Je n'ai pas fait usage de cette série.

A partir du 1^{er} janvier 1753, le *Journal économique*, et quelques années après le *Journal de Médecine* donnent une série météorologique à 3 observations par jour, qui par différents observateurs se continue jusqu'à nos jours. Les observations de la première année étaient relevées sur un thermomètre exposé du côté du Sud; ce thermomètre cassa le 8 juillet et fut remplacé par un autre de graduation singulière, difficile à rapporter à nos instruments. Enfin, à partir de novembre 1756, les observations sont d'Adanson. Elles étaient faites dans la rue de la Victoire, d'après un renseignement que je tiens de son arrière-petit-fils, M. Doumet-Adanson. Ce savant a rapporté aussi quelques observations qu'il a faites à Neuilly, pendant le grand froid de janvier 1767 (*Mémoires de l'Académie des Sciences* pour 1778).

Les observations publiées par le *Journal de Médecine* sont de Roux, à partir du 1^{er} juin 1762 : le thermomètre était exposé à une fenêtre du troisième étage d'une maison de la rue de Seine. Peu après la mort de Roux, le journal publie, à partir du 1^{er} août 1776, les observations de Cotte à Montmorency.

La première série, comprenant les observations d'Adanson et de Roux, est complète; les vingt années donnent une moyenne annuelle de 11°,7, dépassant précisément de 1° la moyenne de Paris, relevée à l'Observatoire, et celle de Cotte à Montmorency. La moyenne de janvier y est 2°,14; celle de juillet, 20°,95, offrant ainsi une différence de 18°,8, tandis qu'à l'Observatoire, de 1797 à 1886, pendant quatre-vingt-dix ans, on ne trouve que 16°,4. Y avait-il plus de différence entre les saisons à cette époque? Cela paraît probable, car les maxima extrêmes ne sont pas exagérés, ainsi que cela aurait lieu pour un thermomètre mal garanti; néanmoins, les observations faites à des fenêtres, dans l'intérieur de Paris, ont en général ce défaut : les observations de Lemaire, rue Denfert-Rochereau, n° 28, de 1877 à 1882, donnent entre janvier et juillet une différence plus grande de 0°,9 qu'au Parc de Saint-Maur.

La série météorologique de Cotte, à Montmorency, s'étend de 1768 à 1814, avec quelques lacunes. Les chiffres de Cotte sont comparables à ceux de l'Observatoire; mais je n'ai utilisé que ceux de 1776 à 1796, alors que ceux de l'Observatoire faisaient défaut. Les comparaisons que l'on peut faire entre les séries simultanées ne leur sont pas favorables, ainsi que je l'avais fait remarquer pour

le baromètre. Voici, en effet, les températures moyennes à l'Observatoire et à Montmorency en 1791 et 1792 :

Moyennes températures mensuelles à Paris et Montmorency.

	1791.			1792.		
	Paris.	Montmorency.	Différ.	Paris.	Montmorency.	Différ.
Janvier.....	5,40	5,25	0,15	3,96	3,12	0,84
Février.....	4,15	4,12	0,03	2,97	2,50	0,47
Mars.....	6,07	6,62	—0,55	7,36	6,25	1,11
Avril.....	12,71	14,00	—1,29	12,32	11,62	0,70
Mai.....	12,29	14,00	—1,71	12,98	11,88	1,10
Juin.....	17,01	19,12	—2,11	15,91	14,88	1,03
Juillet.....	17,96	18,50	—0,54	18,74	17,25	1,49
Août.....	19,72	20,12	—0,40			
Septembre...	15,60	14,62	0,98			
Octobre.....	9,89	10,38	—0,49			
Novembre...	4,87	4,88	—0,01			
Décembre....	3,42	2,13	1,29			

On ne comprend guère comment peuvent se rencontrer de si grandes différences entre deux observatoires voisins. Il faut que l'on ait changé de thermomètre. Peut-être y a-t-il des fautes dans les nombres imprimés.

A la fin d'octobre 1796, Cotte, obligé de quitter l'Oratoire, alla s'installer dans un autre domicile; il ne décrit pas son nouvel observatoire, il se borne à dire que sa position est moins bonne que la première. Cotte, nommé en 1798 un des conservateurs de la Bibliothèque du Panthéon, alla demeurer à Paris, rue de la Vieille-Estrapade, n° 2, au 3^e étage, et ne continua ses observations de Montmorency que pendant la belle saison. Elles redeviennent complètes dans les dernières années de sa vie. J'ai comparé, mois par mois, ses moyennes à celles obtenues en même temps à l'Observatoire. Voici les différences moyennes ou les fractions de degré dont les chiffres de Montmorency surpassent ceux de Paris; la deuxième colonne indique le nombre de mois d'observation :

Montmorency—Paris 1797-1814.

	Différences.	Nombre de mois.
Décembre.....	0,5	3
Janvier.....	0,4	3
Février.....	0,3	2
Mars.....	0,3	2
Avril.....	0,7	7
Mai.....	0,8	13
Juin.....	0,6	14
Juillet.....	0,6	15
Août.....	0,6	14
Septembre.....	0,6	15
Octobre.....	0,6	15
Novembre.....	0,7	12
Moyenne.....	0,56	

La moyenne température annuelle au Parc de Saint-Maur, à l'altitude de 50^m, étant 10°, 0, Montmorency doit avoir une température moindre de 0°, 08 par sa latitude et de 0°, 32 par différence d'altitude; elle serait donc 9°, 6. En ajoutant 0°, 56 à 10°, 7, température moyenne trouvée à l'Observatoire, on voit que la moyenne de Cotte, après 1796, est trop haute de 1°, 66. Sa position devait être fort défectueuse.

Ses maxima n'étaient pas très exagérés; car il a eu, le 15 juillet 1808, une température de 37°C., alors que l'Observatoire en notait une de 36°, 2. Mais l'erreur la plus grande portait sur les minima; car en mai 1802, lors de la célèbre gelée qui détruisit une grande partie des vignes en France, et lorsque Bouvard, à l'Observatoire, notait des minima de 0°, 3 et 0°, 4 R., les 15 et 16 mai, le thermomètre de Cotte ne descendait qu'à 4° R., les 15 et 17. Il devait être dans une situation beaucoup trop abritée, probablement dans une cour de petite dimension.

Pour se faire une idée précise de l'erreur énorme que l'on a à craindre dans ces circonstances, il suffit de rapporter l'observation que j'ai faite en rase campagne, au sud de Choisy-le-Roi, avec le thermomètre fronde, le 5 mai 1870, et que j'ai déjà mentionnée. Je trouvais une température de - 4°, 9 au lever du Soleil; l'Observatoire n'a eu qu'un minimum de + 2°, présentant une différence de 7° environ avec la campagne. Il est donc probable qu'il a fait autour de Paris, les 15 et 16 mai 1802, au moins 6° au-dessous de zéro; le thermomètre de Cotte devait marquer, à ce moment, une température trop haute de 10°.

Pour compléter les vingt années 1757-76, j'ai emprunté à Cotte les quatre mois d'août à novembre, en leur ajoutant 1°. Depuis le 1^{er} décembre 1776, les nombres sont ceux de Cotte ou de l'Observatoire.

Je n'ai fait aucun usage des nombres de Messier, n'ayant jamais eu sous les yeux sa série textuelle. Je me borne à donner les extrêmes de cet auteur, que nous connaissons, parce qu'ils ont été souvent cités, faussement traduits en centigrades.

Le *Journal de Paris* a publié chaque jour, en tête de sa feuille, des observations faites trois fois par jour, à 7^h m., à midi et à 5^h s., de 1777 à 1788; puis, au mois d'avril de cette année, il donne les chiffres de l'Observatoire jusqu'au 10 août 1792. Le successeur de Cotte à Montmorency, le P. Jaucour, ayant cessé d'observer en 1787, j'ai substitué aux observations de Montmorency celles du *Journal de Paris* pendant une année.

D'août 1792 à avril 1797, j'ai repris les chiffres de Cotte à Montmorency, sur ses Manuscrits (*Bibliothèque de la Société d'Agriculture*).

De 1797 à 1878, les observations sont celles de l'Observatoire; de 1878 à 1886, j'y ai substitué les observations du Parc de Saint-Maur et les moyennes calculées, comme à l'Observatoire, par les minima et maxima diurnes.

J'ai réuni en plusieurs Tableaux (Tableaux III, IV, V et V bis) les minima et

maxima de la température avec leurs dates, sans lacune depuis 1701 jusqu'à présent; j'y ai joint la date de plusieurs de ces extrêmes qui se trouvent dans différentes chroniques et portent leur nombre total à près de deux cents pour chacun des extrêmes de la température annuelle.

On trouve dans les OEuvres dites d'Arago (t. VIII, p. 362 et 396) les minima et maxima de Paris, mais avec de nombreuses lacunes, difficiles à comprendre, puisque ces nombres sont imprimés dans les *Mémoires de l'Académie des Sciences* et dans la *Connaissance des Temps* : c'est ainsi que pour les soixante-dix ans de 1709 à 1778 il n'y a que les minima de vingt-trois années; il en manque autant pour les maxima. Les minima antérieurs à 1740 sont faussement traduits en degrés centigrades. Quant aux maxima, les erreurs sont nombreuses : ainsi la température de 40° C., qui appartient au 26 août 1765, est la traduction fautive des 32° observés par Messier sur la tourelle de l'hôtel de Cluny. Or le thermomètre de Messier, réglé pour marquer 10° dans les caves de l'Observatoire, ou 11°,72 C., avait son point d'ébullition à 85°,3; son degré équivalait à 1°,172 C., les 32° Messier font donc 37°,5, et non pas 40°. Arago connaissait la valeur des degrés des thermomètres de Messier puisqu'il dit (p. 431) que cet instrument marquait 85° dans l'eau bouillante; l'erreur n'est donc pas de lui.

On ne peut reprocher davantage à Arago les innombrables erreurs qui se trouvent dans les OEuvres publiées sous son nom. Comment, dans un livre fait avec quelque soin, aurait-on mis (p. 397) : maximum en 1757, le 14 juillet 37°,7, tandis que (p. 431) on lit que, le 20, la température s'éleva à 38°,8.

Quand on confie à des calculateurs des Tableaux à dresser, ils ne peuvent que copier les chiffres qu'on leur a fournis. Ainsi, à la page 370, on voit dans les observations de Duhamel, à Denainvilliers, le minimum de l'année 1756 — 7°,5, le 10 avril. Cette énormité aurait frappé un météorologiste chargé de la révision de ces Tableaux; les *Mémoires de l'Académie* portent bien la température — 6°,0 R. à la date du 10; mais c'est une faute de signe, car le 10 avril se trouve au milieu d'une série de temps chauds, avec vent de S.-W. Le minimum de l'année civile 1756 tombe à Denainvilliers le 11 décembre, il atteint — 4°,0 R. ou — 5°,0 C.

Le passage le plus curieux du tome VIII d'Arago est la page 546. Les chiffres des températures moyennes de Paris sont empruntés à Cotte (*Mémoires*, t. II, p. 493); ils sont tous faux. Prenons, par exemple, l'année 1781; Cotte donne 11°,4 R. qui, traduits en centigrades, donnent bien 14°,2. Or le thermomètre de Messier n'était point un thermomètre de Réaumur; de plus, le calcul de Cotte est faux. La Société de Médecine ayant publié quelques années des observations de Messier, j'ai calculé la moyenne annuelle de 1781 et j'ai trouvé 10°,52 Messier, qui équivalent à 12°,33 C., nombre trop élevé parce que la position de Messier était mauvaise, mais moindre néanmoins que la moyenne de 1822 à l'Observa-

toire. Ainsi disparaît une anomalie qui aurait frappé, comme je l'ai dit tout à l'heure, le météorologiste le moins exercé.

Les calculateurs qui ont dressé ces Tableaux y ont mis fort peu de soin; car on lit, au haut de la page 546, que de 1804 à 1853 la différence des moyennes de janvier s'élève à 7°, tandis que la différence de 1834 à 1838 est de 11°, 7.

On remarque encore des négligences singulières : ainsi, à la page 601, dans un Tableau donnant les températures les plus élevées du mois d'avril, le calculateur a réduit la température 25°, 1 comme une indication du thermomètre de Réaumur et a mis 31°, 4, sans faire attention que depuis 1809 les chiffres de tous les Tableaux de l'Observatoire appartiennent à l'échelle centigrade. A cette même page 546, nous lisons que les observations de 1787 à 1802 sont empruntées aux *Philosophical Transactions*, parce que les registres français offrent de nombreuses lacunes. Or ces observations existent en manuscrits à l'Observatoire. Je n'ai d'ailleurs réussi à trouver dans le Recueil anglais aucun article relatif à ces années.

Tous les Tableaux que je donne plus loin se rapportent à l'année météorologique commençant au 1^{er} décembre. Il n'y a aucune raison, autre que celle de l'habitude, pour les commencer au 1^{er} janvier : on partage ainsi l'hiver entre deux années différentes, ce qui a les plus graves inconvénients. Passons, par exemple, en revue le Tableau des minima de Paris (*Œuvres d'Arago*, tome VIII, p. 362), nous trouvons en 1788 : minimum 31 décembre, — 21°, 8; et en 1789 : minimum le 4 janvier, — 15°, 0; ces deux minima, à 4 jours d'intervalle, sont d'un même hiver et d'une même période de froid. Le minimum de l'hiver doux de 1787 à 1788 n'y figure pas. Le même fait se présente pour un grand nombre d'autres années; de sorte que, dans une telle liste, les hivers doux n'y sont pas mentionnés et que la moyenne des minima, calculée pour un certain nombre d'hivers, est beaucoup trop basse.


Le plus grand froid annuel tombant tantôt en décembre et tantôt en janvier, la date moyenne calculée sur les Tableaux des années civiles tomberait au milieu de l'été; là, l'évidence est trop grande, et l'on revient forcément aux années météorologiques, les seules rationnelles.

J'ai donné (Tableau VI) les minima et les maxima observés par Cotte à Montmorency, et ceux de Messier, convenablement traduits en centigrades, espérant empêcher que l'on continue à citer des chiffres faux. J'ai donné aussi en remarques quelques températures que j'ai obtenues à Choisy-le-Roi, parce que ce sont des chiffres certains qui peuvent servir de contrôle à ceux de l'Observatoire. La plaine au sud de Choisy est à une altitude de quarante et quelques mètres et dans les mêmes conditions que l'observatoire du Parc de Saint-Maur.

Un Tableau (Tableau I) est consacré aux moyennes de chaque jour pendant

130 ans, 1757-1886. On a supposé autrefois que la température devait varier dans l'année comme le sinus de la longitude moyenne du Soleil; la courbe qui représente la marche de la température (*fig. 1*) ne s'éloigne pas trop, en effet, d'une sinusoïde, mais il y a des inflexions qui sont réelles et ne tiennent pas du tout aux irrégularités de la température ni au hasard. Par exemple, les refroidissements du 11 février et du 11 mars se reproduisent fréquemment; les Saints

Fig. 1.



de glace de mai sont peu prononcés, ils le sont plus dans notre temps qu'autrefois; l'été de la Saint-Martin, si connu autrefois, a disparu de nos jours; mais il y a un minimum très net le 21 novembre, d'autant plus certain que M. Lancaster vient de le signaler, à Bruxelles, en même temps qu'il fait voir que l'été de la Saint-Martin a également disparu. Pourtant les observations de Bruxelles s'appliquent à d'autres années (1835-1884).

Le jour le plus chaud de l'année tombe d'une manière très nette le 18 juillet; il est suivi d'une chute rapide de la température : cela provient de ce que presque toujours, à cette date, il y a des orages après lesquels le temps se refroidit. Dans le siècle dernier, le maximum de la température tombait plus tard, et il y a de longues séries d'années pendant lesquelles le mois d'août est à peu près aussi chaud que le mois de juillet. J'ai fait voir, il y a longtemps, que le mois de juin éprouve une variation périodique d'une soixantaine d'années.

Dans nos 130 années, le jour le plus froid tombe le 10 janvier; le plus

chaud, le 18 juillet; les jours de températures moyennes sont le 18 avril et le 18 octobre. Mais il y a des anomalies dans la marche des températures pendant l'année; ainsi, après le froid du 10 janvier, le temps se réchauffe et il y a un autre abaissement le 20; deux froids remarquables les 3 et 11 février: ce dernier se remarque presque chaque année. Celui du 11 mars est très tranché et se reproduit aussi très fréquemment. Le froid du 10 mai est assez nettement accusé: il suit à quelques jours d'intervalle une grande élévation de la température déjà signalée par Sainte-Claire Deville.

Dans la partie descendante de la courbe, nous rencontrons un minimum très tranché le 21 novembre. Ce minimum, nous l'avons déjà dit, est signalé à Bruxelles par M. Lancaster. Ce savant a trouvé, par les mêmes séries, que l'été de la Saint-Martin n'existe pas; la même conclusion ressort de notre courbe. On en a tant parlé depuis plusieurs siècles, que je regarde comme probable qu'il a existé et qu'il a disparu de notre temps. Par contre, les Saints de glace du mois de mai, dont il n'était pas question autrefois, sont plus accusés de notre temps. Il est fort possible que de telles anomalies se produisent pendant quelques siècles et disparaissent ensuite pour revenir après une certaine période.

Il serait important de connaître le retour de ces intempéries, qui intéressent particulièrement l'agriculture. Quoique nous n'en soyons pas encore là, il est intéressant aussi de connaître les écarts que l'on a à craindre; ces écarts sont, en général, d'autant plus grands que l'on considère un plus grand nombre d'années. Quelques météorologistes, notamment Plantamour, à Genève, ont appliqué à ces écarts le Calcul des probabilités et fait voir qu'ils se distribuent à peu près comme le calcul le faisait prévoir. Je n'ai aucune confiance dans le Calcul des probabilités appliqué aux phénomènes naturels; en suivant le même ordre d'idées, il suffirait d'un certain nombre de siècles, facile à calculer, pour que notre pays fût affligé d'un minimum de -30° ; or ce froid détruirait à peu près toutes nos plantes indigènes, ce qui n'est certainement pas possible. Il y a tout lieu de croire, au contraire, que les minima des grands hivers ont une limite, et c'est ce que prouve l'uniformité des dégâts produits depuis les temps historiques, sur la vigne et le noyer principalement.


J'ai tracé sur la *fig. 2* la courbe qui représente les écarts des moyennes mensuelles à Paris pour les 130 années (1756-1885), en y faisant entrer, en plus, l'année 1840, ramenée, comme je l'ai dit, aux chiffres de l'Observatoire et en diminuant de 1° la série de 1756 à 1775.

Voici les chiffres qui indiquent les écarts des moyennes mensuelles et qui ont servi à tracer les courbes de la *fig. 2*:

Écarts de la normale.

1879. Décembre...	— 10,7	1869. Décembre...	+ 5,2
1838. Janvier.....	— 6,9	1796. Janvier.....	5,5
1740. Février.....	— 8,4	1767. Février.....	4,2
1845. Mars.....	— 5,3	1880. Mars.....	4,1
1837. Avril.....	— 4,5	1865. Avril.....	4,9
1740. Mai.....	— 5,3	1868. Mai.....	3,9
1797. Juin.....	— 3,2	1822. Juin.....	4,2
1795. Juillet.....	— 3,3	1757. Juillet.....	4,8
1844. Août.....	— 3,4	1780. Août.....	4,2
1792. Septembre..	— 2,7	1865. Septembre..	3,8
1757. Octobre....	— 4,0	1831. Octobre....	3,5
1782. Novembre..	— 4,2	1852. Novembre..	4,7

On voit immédiatement que les écarts en dessous sont beaucoup plus grands que ceux en dessus pour l'hiver, et que le contraire a lieu pour l'été, mais d'une façon moins tranchée. Le mois de janvier le plus froid de la série est celui de 1838 avec un écart de $-6^{\circ},9$; mais la marche de la courbe rend très probable qu'il y a des mois de janvier descendant beaucoup plus bas que tous ceux de la série de 130 ans; c'est ce qui est arrivé sans doute en 1408, 1565, 1608.



Il doit y avoir aussi des mois de mars plus froids que celui de 1845. La pointe formée par le mois d'avril 1865 montre tout ce que ce mois a eu d'extraordinaire. Mai a un écart en plus moins grand qu'avril et juin; novembre, qui est à six mois d'intervalle, offre, au contraire, un écart en moins, beaucoup plus faible qu'on ne le calculerait par ceux d'octobre et de décembre. Il y a peut-être là quelque chose de relatif aux Saints de glace et à l'été de la Saint-Martin qui seraient un obstacle, pour le premier, à une très grande chaleur, pour novembre, à un très grand froid.

Les mois de février et de mars peuvent avoir, dans la série des siècles, des températures plus élevées que dans les 130 ans dont nous disposons. C'est ce que l'examen de la courbe des écarts rend très probable; nous trouvons, en effet,

dans les Chroniques des indications qui, malgré un peu d'exagération sans doute, tendent à la même conclusion; telles sont les indications suivantes (*Œuvres d'Arago*, t. VIII, p. 390) :

1204. Depuis la fin de janvier jusqu'au mois de mai, il régna une sécheresse continuelle et une chaleur ardente comme celle de l'été.

1529. Il n'y eut nulle gelée en hiver et il fit aussi chaud au mois de mars qu'il fait d'ordinaire à la Saint-Jean.

1573. Les arbres se couvrirent de feuilles en janvier et abritèrent en février les nids des oiseaux.

Nombre de jours de gelée.

Le nombre de jours de gelée est un élément important de nos climats froids. Pour avoir une certaine valeur, il a besoin d'une définition. Nous appelons aujourd'hui *jour de gelée* toute journée dans laquelle, au commencement, le thermomètre sous abri, à 2^m au-dessus du sol, descend à zéro ou au-dessous. Les jours de gelée blanche seront ceux où il y a de la gelée blanche ou de la glace sur le sol, sans que le thermomètre à 2^m de hauteur soit descendu à 0°.

C'est surtout dans ce cas que le thermomètre placé à une fenêtre, à l'intérieur des villes, donne des indications fautives.

Dans les résumés publiés par l'observatoire de Paris, on trouve souvent indiqués plus de jours de gelée qu'il n'y a de minima au-dessous de zéro, parce que l'on a noté les jours où l'on a vu de la gelée blanche ou de la glace dans les jardins. Dans les relevés que nous avons faits, nous ne notons, d'après ce que nous avons dit tout à l'heure, que le nombre de jours pendant lesquels le thermomètre est descendu le matin au-dessous de zéro.

Le nombre de jours de gelée à Paris est beaucoup moindre que dans la campagne. On en peut juger par le Tableau qui donne le nombre de jours de gelée relevé à Choisy-le-Roi pendant 10 ans, de 1860 à 1870, avec les nombres correspondants de l'Observatoire (Tableau VIII).

Les observations ont été faites à Choisy avec un thermomètre à alcool incolore, à 1^m,50 de hauteur, dans un grand jardin, sous un petit abri formé d'une planche unique, à l'extrémité d'un mur finissant à l'exposition du NNW.

Il y avait en pleine campagne un peu plus de jours de gelée que dans ce jardin, ce qui explique la différence avec le Parc de Saint-Maur où je trouve 63 à 64 jours par an (1873-1888).

Dans l'intérieur de Paris, ce nombre de jours est variable selon la position plus ou moins désavantageuse. Lemaire a trouvé en 5 ans, 1877-1882, 35 jours de gelée, pendant que le nombre au Parc de Saint-Maur était de 64 pour les mêmes années.

Il y aurait encore bien des choses à dire pour donner des notions complètes

sur le climat de Paris ; mais c'est un travail que je réserve, et qui viendra avec un résumé des observations faites au Parc de Saint-Maur depuis la fin de 1872, mais surtout d'une manière complète depuis juin 1873.

TABLEAU I. — *Température moyenne pour chaque jour d'après 130 ans d'observation* ⁽¹⁾
(moyenne des maxima et des minima).

	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.
1.....	4,85	2,32	3,76	5,62	8,59	12,18	16,35	18,26	19,49	17,76	14,25	8,68
2.....	4,62	2,17	3,83	6,00	9,03	12,28	16,70	18,42	19,88	17,63	13,64	8,58
3.....	4,42	2,09	3,88	5,96	9,04	12,66	16,80	18,56	19,84	17,66	13,47	8,56
4.....	4,66	2,16	3,47	6,05	9,46	12,97	16,76	18,84	19,48	17,64	13,27	8,23
5.....	4,62	2,12	3,58	5,74	9,23	13,03	16,58	19,21	19,66	17,62	13,10	8,10
6.....	4,71	2,29	3,84	5,94	9,62	13,32	16,69	19,22	19,43	17,48	13,02	8,50
7.....	4,20	1,97	4,36	5,74	9,72	13,68	16,78	19,06	19,40	17,36	13,14	8,07
8.....	3,80	1,64	4,36	5,58	9,88	13,73	16,86	18,99	19,48	17,12	13,00	7,72
9.....	3,48	1,62	4,24	5,39	9,88	13,62	17,04	19,08	19,47	16,92	12,78	7,19
10.....	3,35	1,52	4,10	5,37	9,80	13,55	17,18	19,12	19,48	16,92	12,20	6,90
11.....	3,34	1,62	3,80	5,28	9,86	13,58	17,24	19,52	19,49	16,64	12,04	7,21
12.....	3,48	1,91	3,60	5,78	10,00	13,68	17,28	19,49	19,51	16,20	11,64	6,96
13.....	4,00	1,94	3,82	5,95	10,28	13,81	17,32	19,66	19,64	16,32	11,41	6,86
14.....	3,60	2,32	4,22	6,32	10,26	13,83	17,75	19,74	19,44	16,36	11,86	6,82
15.....	3,82	2,20	4,61	6,68	10,43	13,98	17,95	19,85	19,12	16,32	11,42	6,50
16.....	3,80	2,34	4,74	6,71	10,60	14,30	17,59	19,88	19,20	16,24	10,80	6,48
17.....	3,54	2,29	4,60	6,94	10,40	14,72	17,34	19,94	18,96	16,43	10,84	6,20
18.....	3,73	2,22	4,27	6,90	10,41	14,79	17,36	20,18	18,94	16,22	10,82	6,20
19.....	3,60	1,98	4,40	6,78	10,78	14,48	17,54	19,94	18,80	15,77	10,80	5,93
20.....	3,36	1,90	4,25	7,22	10,88	14,96	17,58	19,51	18,64	15,25	10,54	5,54
21.....	3,20	2,15	4,88	7,30	11,18	15,20	17,56	19,15	18,83	15,03	10,00	5,11
22.....	3,26	2,54	5,20	7,15	11,56	15,34	17,72	19,10	18,52	15,04	10,07	5,32
23.....	2,84	2,58	5,32	6,85	11,40	15,53	17,92	19,34	18,54	14,78	10,38	5,44
24.....	2,50	2,87	5,18	7,18	11,34	15,50	18,02	19,36	18,56	14,82	10,06	5,52
25.....	2,17	2,75	5,54	7,43	11,31	15,42	18,26	19,55	18,52	14,60	9,74	5,22
26.....	1,92	3,02	5,70	7,58	11,68	15,74	18,54	19,39	18,32	14,64	9,20	5,52
27.....	2,24	3,39	5,56	7,66	11,65	15,68	18,52	19,39	18,08	14,51	9,15	5,36
28.....	1,99	3,48	5,81	7,92	11,76	15,64	18,48	19,34	18,11	14,34	8,96	5,30
29.....	2,26	3,53		8,18	12,02	15,66	18,36	19,49	18,06	14,24	8,78	5,24
30.....	2,32	3,60		8,22	12,00	15,64	18,16	19,52	18,18	14,14	8,58	5,13
31.....	2,09	3,39		8,42		15,86		19,50	17,84		8,62	

(¹) La période d'observation commence au 1^{er} décembre 1756 et se termine au 30 novembre 1886.

TABLEAU II. — Moyennes mensuelles de la température à Paris (1757-1886) (1).

	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Année.
1757.....	0,4	-0,3	3,7	6,0	11,2	14,5	19,0	24,6	19,6	16,2	8,2	9,0	11,0
58.....	3,1	1,6	3,9	7,9	10,0	18,5	20,3	17,9	20,8	15,4	9,8	5,6	11,2
89.....	3,1	4,5	6,0	7,3	11,7	15,3	19,1	23,9	20,1	17,7	12,6	3,7	12,1
1760.....	1,4	0,2	3,6	6,6	12,3	16,0	20,0	21,6	19,7	18,7	11,8	7,5	11,6
61.....	6,4	1,8	6,3	8,7	10,8	16,2	19,5	21,1	21,9	18,3	10,4	5,6	12,3
62.....	2,6	4,9	4,0	4,0	13,8	17,3	19,9	23,3	19,6	16,8	9,8	5,8	11,8
63.....	-0,7	-2,1	7,7	6,1	10,6	13,0	18,9	20,0	21,7	15,6	10,3	6,7	10,6
64.....	6,1	6,7	5,9	5,0	10,0	12,9	19,4	21,3	18,6	15,1	9,6	6,1	11,4
65.....	3,4	6,3	0,8	8,4	11,3	14,9	19,1	20,5	22,4	18,6	13,0	6,4	12,1
66.....	1,1	-1,6	2,7	8,2	12,3	16,6	18,8	20,8	20,7	17,9	13,5	7,8	11,6
67.....	2,1	-1,1	9,5	7,7	9,6	13,5	17,1	19,9	20,5	17,0	13,2	9,0	11,5
68.....	0,3	2,0	7,5	5,8	12,3	16,2	18,0	20,9	20,1	16,4	12,7	7,7	11,7
69.....	4,2	3,9	4,6	6,3	11,9	15,8	17,3	20,5	19,3	17,0	8,8	7,2	11,4
1770.....	5,3	3,5	3,4	4,8	8,1	15,4	17,6	19,0	20,8	19,1	11,3	7,9	11,1
71.....	6,3	1,6	3,6	4,5	7,8	17,5	17,7	20,6	19,2	16,6	12,1	5,8	11,1
72.....	6,5	1,2	6,1	7,6	9,8	13,2	20,9	20,1	20,2	18,0	14,1	8,3	12,2
73.....	4,3	5,2	3,6	7,3	10,3	14,7	18,1	19,4	20,9	17,7	13,3	7,3	11,9
74.....	5,2	3,5	5,3	9,7	11,6	14,6	19,6	20,3	20,6	16,5	12,1	5,1	12,0
75.....	4,2	5,3	7,8	7,9	11,7	14,4	21,1	21,5	20,9	19,4	12,1	5,7	12,7
76.....	4,0	-1,9	6,7	9,2	11,5	12,5	18,3	21,5	19,9	15,4	13,3	8,0	11,4
77.....	3,4	0,7	2,2	8,2	8,3	12,6	15,6	17,8	19,7	16,5	11,5	7,1	10,3
78.....	0,6	1,7	1,8	5,8	9,8	14,6	17,1	20,2	20,1	14,2	9,9	8,3	10,3
79.....	6,0	-1,0	7,2	8,8	10,7	15,6	15,9	19,8	21,0	17,9	11,0	7,2	11,9
1780.....	6,1	-0,4	1,6	9,3	8,0	15,5	18,2	19,6	22,7	17,3	12,3	5,9	11,3
81.....	0,4	2,6	5,6	8,7	13,0	17,0	18,6	20,2	20,5	16,7	10,8	6,4	11,7
82.....	5,8	4,8	0,3	5,7	7,9	10,8	18,2	18,4	15,8	15,2	8,5	2,3	9,5
83.....	2,3	5,5	5,5	1,7	11,6	13,1	16,6	21,4	18,3	15,0	11,0	6,8	11,0
84.....	-0,7	-1,4	0,4	4,2	7,1	16,1	16,8	17,7	16,2	17,1	7,4	6,5	9,0
85.....	-0,1	3,8	0,2	1,2	8,1	13,9	17,1	17,7	16,0	16,3	10,4	5,3	9,2
86.....	2,3	4,4	3,2	2,6	10,5	13,6	18,3	16,5	17,2	13,8	8,2	3,2	9,5
87.....	3,3	1,3	5,5	8,1	9,1	12,1	18,4	19,1	19,8	16,8	12,9	6,0	11,0
88.....	5,7	4,1	5,7	6,6	11,6	16,1	17,7	18,8	18,1	16,4	10,4	2,8	11,2
89.....	-6,8	1,5	5,6	1,8	9,1	16,2	15,3	17,8	19,2	14,7	9,9	4,7	9,1
1790.....	4,8	3,5	5,9	8,0	8,5	14,3	17,7	17,0	18,2	13,9	12,2	6,4	10,9
91.....	4,9	5,5	1,1	6,1	12,7	12,3	17,0	18,0	19,7	15,6	9,9	4,9	10,9
92.....	3,4	4,0	3,0	7,4	12,3	13,0	15,9	18,7	18,4	12,9	10,7	4,6	10,4
93.....	3,6	0,6	1,7	5,7	7,5	11,2	14,5	20,0	17,9	13,0	11,2	6,0	9,7
94.....	3,8	0,6	6,8	8,7	12,5	12,9	18,0	22,6	16,1	14,0	10,2	7,4	11,2
95.....	0,7	-6,3	3,2	5,4	10,8	13,2	15,9	15,5	18,1	18,5	11,1	5,8	9,6
96.....	7,4	7,8	4,0	4,4	10,8	13,1	15,5	17,4	18,3	17,4	10,1	5,5	10,9
97.....	1,1	3,7	3,8	5,8	10,8	14,7	13,8	20,0	18,8	15,1	10,3	7,4	10,4
98.....	6,4	3,7	4,8	6,0	11,6	11,2	18,5	18,7	19,1	16,0	12,3	6,4	11,5
99.....	0,1	-2,1	5,0	4,6	7,0	11,9	15,2	18,1	18,3	15,6	10,5	6,5	9,2

(1) L'année météorologique commençant au 1^{er} décembre, les nombres portés dans la colonne *Décembre* appartiennent en réalité à l'année civile précédente; ainsi la moyenne 0,4 donnée pour décembre à la première ligne du Tableau est celle de décembre 1756, et ainsi de suite.

	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Année.
1800.....	1,4	5,0	3,3	4,3	12,7	15,4	14,5	18,5	20,1	16,5	10,6	7,0	10,5
01.....	4,8	4,7	3,8	9,0	10,3	13,3	16,1	17,5	18,5	16,9	12,1	6,5	11,1
02.....	4,3	1,4	4,4	6,3	10,5	14,1	16,7	16,5	21,9	16,9	12,2	6,4	10,7
03.....	4,4	0,9	0,7	6,2	11,3	11,6	16,3	20,3	19,6	14,0	10,6	7,2	10,3
04.....	5,9	6,6	2,3	6,3	9,5	16,4	18,7	18,4	18,5	18,2	11,7	7,3	11,6
05.....	1,2	1,7	4,4	6,7	9,0	12,3	15,1	17,4	18,0	16,5	9,6	3,6	9,6
06.....	2,5	6,0	6,0	7,0	8,0	17,1	18,0	19,3	18,0	16,2	10,9	8,9	11,5
07.....	8,6	2,3	5,9	3,7	9,2	16,2	16,6	21,8	21,4	12,9	12,8	5,8	11,4
08.....	1,5	2,5	2,6	3,9	8,0	17,5	16,3	21,6	19,3	14,6	9,0	7,5	10,4
09.....	1,3	5,0	7,9	7,2	6,5	15,2	15,4	17,3	17,9	15,0	9,7	5,0	10,3
1810.....	5,3	1,5	2,9	8,1	9,4	13,7	17,0	17,7	17,6	17,6	11,5	7,8	10,6
11.....	5,3	0,3	6,9	9,0	11,9	17,1	17,4	19,2	17,7	16,8	11,6	8,6	12,0
12.....	4,5	1,5	6,2	5,7	7,1	15,6	16,1	17,7	18,0	15,4	11,9	4,4	10,4
13.....	1,0	0,3	6,0	6,1	10,6	15,2	15,6	17,1	16,8	13,9	11,6	6,1	9,9
14.....	3,1	0,2	0,1	3,8	11,5	12,3	15,6	19,3	17,4	15,3	9,7	6,1	9,5
15.....	6,2	0,6	7,3	9,6	10,3	11,8	16,0	17,6	17,9	15,5	12,2	3,4	10,8
16.....	1,8	2,6	2,0	5,6	9,9	12,7	14,8	15,6	15,5	14,1	11,6	4,1	9,2
17.....	3,7	5,0	6,9	6,3	7,3	12,4	17,8	17,1	16,4	16,9	7,3	9,6	10,6
18.....	2,6	4,3	3,9	6,5	11,1	13,7	19,2	20,1	18,2	15,7	11,7	9,1	11,4
19.....	2,1	4,9	5,5	6,9	11,6	14,6	16,0	19,1	19,2	16,4	11,1	4,8	11,0
1820.....	3,3	0,7	2,9	4,0	11,6	14,1	15,6	18,3	18,7	14,2	10,1	5,1	9,8
21.....	3,3	3,1	1,0	7,3	11,6	12,1	14,5	17,0	20,1	16,7	11,1	10,2	10,7
22.....	7,5	4,1	6,1	9,9	11,1	16,7	21,2	18,9	18,9	15,9	13,2	9,0	12,7
23.....	0,5	0,3	5,3	6,5	9,2	15,2	15,0	17,1	19,1	15,7	10,6	5,7	9,9
24.....	5,6	2,7	5,1	5,8	9,0	12,6	16,5	18,7	18,1	16,5	11,9	9,6	11,0
25.....	7,1	3,5	4,3	5,6	11,9	14,2	17,0	20,3	19,4	17,9	12,2	7,3	11,7
26.....	6,4	1,7	6,1	7,1	10,2	12,6	18,8	20,7	21,2	17,1	13,1	5,4	11,5
27.....	5,8	0,2	0,9	8,0	11,1	14,6	17,0	19,8	18,2	16,2	13,1	5,8	10,7
28.....	6,9	5,9	5,2	7,0	10,8	15,1	17,5	19,1	17,6	16,6	10,8	7,4	11,7
29.....	4,5	2,1	2,7	5,7	9,8	14,9	17,2	18,6	17,0	13,7	10,0	4,7	9,7
1830.....	3,5	2,5	1,2	8,9	12,0	14,6	16,1	18,9	17,0	13,8	10,6	7,9	9,6
31.....	2,6	1,9	6,0	9,1	11,5	14,2	16,9	19,7	18,7	15,4	14,7	6,6	11,4
32.....	5,5	1,5	3,4	5,6	10,7	13,2	17,3	19,5	20,8	15,5	11,3	6,7	10,9
33.....	4,3	0,3	7,1	4,2	9,6	17,7	18,4	18,3	16,5	13,7	12,3	6,0	10,6
34.....	7,9	7,1	3,8	7,5	8,7	16,2	18,7	20,4	19,5	17,6	11,9	7,1	12,2
35.....	4,0	3,6	6,3	6,5	9,4	13,8	17,3	21,1	19,3	16,1	10,1	5,1	11,1
36.....	0,1	2,6	2,9	8,8	8,6	12,4	18,4	19,4	18,9	14,1	11,2	7,6	10,4
37.....	4,1	2,4	5,4	2,6	5,7	11,0	18,5	18,3	20,1	14,6	11,3	6,0	10,0
38.....	4,4	4,6	2,1	7,0	6,7	14,2	16,2	18,3	18,0	15,5	11,2	7,7	9,7
39.....	1,8	2,8	5,1	5,9	7,7	13,6	19,1	18,6	17,4	15,7	10,6	8,2	10,5
1840.....	5,7	3,4	3,6	3,4	12,7	15,1	18,3	17,3	19,8	14,8	9,5	8,0	11,0
41.....	2,7	2,1	2,1	8,7	10,0	16,9	15,0	16,1	17,4	18,1	11,0	6,4	10,1
42.....	5,1	1,8	4,2	7,9	9,8	11,2	19,9	18,8	22,0	15,1	8,1	5,0	10,7
43.....	3,7	4,1	3,3	7,6	10,1	13,6	15,4	17,6	18,9	17,4	11,0	7,0	10,8
44.....	4,0	2,5	2,2	6,5	12,3	12,4	17,2	16,8	15,1	15,6	10,1	6,7	10,1
45.....	1,0	2,0	0,2	1,1	10,8	10,6	17,3	16,6	15,5	14,8	10,1	7,8	8,8
46.....	5,2	4,8	6,2	7,3	9,7	13,5	20,5	20,3	19,6	17,3	11,1	5,7	11,8
47.....	0,8	2,1	2,7	5,3	7,8	15,3	15,3	20,1	18,4	13,8	11,9	8,0	10,0
48.....	3,6	1,1	6,5	7,1	11,1	15,8	17,5	19,0	17,8	14,8	11,3	6,2	10,8
49.....	5,4	4,9	6,1	5,8	8,3	15,1	17,9	17,8	17,9	15,7	11,7	5,9	11,0

ÉTUDES SUR LE CLIMAT DE PARIS.

B.213

	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Année.
1830.....	3,6	—0,4	7,1	4,4	11,0	12,7	17,9	18,6	17,2	13,8	8,5	8,4	10,2
51.....	3,4	4,5	3,9	7,0	10,1	11,3	17,0	17,3	18,8	13,5	11,2	3,5	10,1
52.....	2,4	5,0	4,3	5,7	9,0	14,3	16,1	22,0	18,4	15,0	9,9	10,5	11,0
53.....	7,7	6,0	1,0	3,6	8,9	13,0	16,3	17,9	18,0	14,8	12,2	5,3	10,4
54.....	—1,1	3,9	3,8	7,9	12,1	12,6	15,0	19,0	17,6	16,3	12,3	5,3	10,4
55.....	5,3	0,2	0,1	5,4	9,4	11,7	15,9	18,4	18,9	15,7	11,8	4,1	9,8
56.....	1,6	5,1	5,7	5,8	10,6	11,7	17,3	18,2	20,4	13,9	11,7	4,8	10,6
57.....	4,4	2,6	3,5	6,4	9,5	14,8	18,0	20,1	19,8	17,0	12,4	8,0	11,4
58.....	4,7	0,3	2,3	6,1	11,2	12,1	20,5	17,1	17,8	17,2	10,8	3,1	10,3
59.....	4,3	3,5	5,5	8,4	10,8	14,4	18,2	22,6	20,4	15,5	12,5	5,8	11,8
1860.....	1,4	4,9	1,4	5,0	7,9	14,5	15,8	16,1	16,9	14,1	10,8	5,0	9,5
61.....	2,9	—1,3	5,2	7,9	9,6	13,2	18,8	18,2	19,9	15,8	13,0	6,2	10,8
62.....	3,9	3,1	5,4	9,5	12,0	15,5	16,0	18,4	17,3	16,2	12,6	5,3	11,3
63.....	6,0	5,1	4,8	7,0	11,2	13,8	16,8	18,3	19,7	13,6	11,8	7,1	11,3
64.....	5,6	1,0	2,4	8,0	10,9	14,3	15,8	19,0	17,0	15,4	10,4	5,0	10,4
65.....	0,4	3,1	2,3	2,7	15,1	16,1	17,4	19,8	17,9	19,4	12,4	7,7	11,2
66.....	2,2	5,5	6,4	5,9	11,6	11,7	18,5	18,6	16,5	15,2	11,2	7,5	10,9
67.....	5,4	2,1	7,8	5,5	10,9	14,4	15,9	17,4	18,8	15,6	9,8	5,3	10,7
68.....	1,6	1,0	5,5	7,0	10,5	17,9	18,5	21,2	18,7	17,7	10,6	4,9	11,3
69.....	8,7	3,3	7,9	3,6	12,6	13,7	14,5	20,2	17,5	16,5	10,1	7,4	11,3
1870.....	3,0	3,6	1,1	5,0	11,2	14,6	18,2	21,1	17,5	14,5	11,2	6,1	10,6
71.....	—0,7	0,9	6,0	8,0	11,2	13,0	14,8	18,9	20,1	16,7	9,5	3,1	10,0
72.....	—0,1	4,2	7,3	8,5	10,4	12,0	17,0	20,3	17,9	16,3	10,3	8,5	11,1
73.....	6,5	4,9	2,2	8,3	8,9	12,0	16,9	20,0	19,3	14,5	11,3	7,4	11,0
74.....	3,6	4,9	4,7	7,4	11,9	11,8	17,4	20,9	17,8	16,7	11,9	6,2	11,3
75.....	1,1	5,5	1,8	5,8	10,4	15,5	17,3	17,7	19,5	17,5	10,1	6,6	10,7
76.....	2,4	0,3	4,8	7,3	10,4	11,5	16,8	20,5	19,9	15,1	13,2	7,3	10,8
77.....	7,2	6,6	7,3	6,0	10,1	11,4	19,6	18,2	18,6	13,0	10,3	8,5	11,4
78.....	3,9	3,0	5,3	6,7	11,5	14,7	17,6	18,8	18,5	15,5	11,8	5,2	11,0
79.....	0,9	0,0	4,6	7,1	8,6	10,6	16,3	16,2	18,6	15,5	10,0	3,7	9,3
1880.....	—7,6	—0,7	5,4	10,3	10,3	13,9	16,0	19,2	19,4	16,5	10,1	5,9	9,9
81.....	7,3	—1,2	5,1	8,3	9,7	13,5	16,3	20,4	17,1	14,5	7,7	8,6	10,6
82.....	2,6	2,2	4,1	8,9	10,5	13,2	15,3	17,4	16,9	14,0	11,5	7,9	10,4
83.....	4,7	4,3	5,5	3,4	9,7	14,0	16,9	17,2	18,1	15,4	9,9	6,7	10,5
84.....	4,3	5,8	6,1	7,8	8,6	14,8	14,9	19,7	20,0	16,4	9,7	4,3	11,0
85.....	4,6	—0,1	7,5	5,7	10,6	11,5	18,5	18,8	16,8	14,7	9,1	6,7	10,4
1886.....	2,4	2,4	1,8	6,0	11,0	14,5	15,8	18,7	18,7	17,5	12,8	7,3	10,7
Minima.	—6,8	—6,3	—0,9	1,1	5,7	10,6	13,8	15,5	15,5	12,9	7,3	2,3	8,8
Années.	1788	1795	1827	1845	1837	1845	1797	1795	1816 1845	1792	1817	1782	1845
Maxima.	8,6	7,8	7,9	10,3	15,1	17,9	21,2	22,6	22,7	19,4	14,7	10,5	12,7
Années.	1806	1796	1869	1880	1865	1868	1822	1859	1780	1865	1831	1852	1822
Excurs.	15,4	14,1	8,8	9,2	9,4	7,3	7,4	7,1	7,2	6,5	7,4	8,2	3,9

Décembre 1879, moyenne à l'observatoire du Parc de Saint-Maur : — 8°,0 doit peu différer de décembre 1788; mars 1785, peu différent de mars 1845. Août 1780 n'est peut-être pas plus chaud qu'août 1842.

TABLEAU III. — *Minima absolus de la température à Paris pour chaque mois (1757-1886) (1).*

	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Minima.
1757.....	6,3	11,9	7,5	5,0	3,7	6,2	8,7	11,1	9,6	6,2	0,0	1,2	11,9
58.....	6,9	12,5	3,8	2,5	1,2	4,4	11,2	11,2	13,7	6,2	1,3	4,4	12,5
59.....	3,7	3,1	4,7	1,2	2,5	6,5	12,5	15,0	11,2	10,0	4,4	6,3	6,3
1760.....	6,9	9,4	5,0	1,2	8,7	7,5	10,0	13,7	12,5	12,5	2,5	0,0	9,4
61.....	0,0	5,6	2,5	2,5	2,5	7,5	10,6	11,2	11,7	8,7	0,0	3,1	5,6
62.....	3,8	3,1	2,5	5,0	2,5	5,0	12,8	12,8	11,2	7,5	0,6	1,6	5,0
63.....	10,3	8,8	0,0	5,6	0,6	3,7	8,1	13,1	12,5	6,2	1,2	6,3	10,3
64.....	2,2	1,6	3,7	3,1	2,5	6,9	8,1	12,5	10,0	1,9	0,6	0,0	3,7
65.....	6,9	0,0	6,9	0,0	3,7	5,0	11,2	10,6	12,5	8,7	3,7	4,1	6,9
66.....	6,9	10,9	7,5	0,9	5,0	9,7	11,9	13,7	12,2	8,8	4,7	1,3	10,9
67.....	4,7	13,1	1,2	0,6	2,2	4,1	8,1	13,1	12,5	10,0	3,1	1,2	13,1
68.....	10,0	16,3	1,2	5,0	2,5	6,9	10,6	13,7	13,7	10,0	6,6	1,6	16,3
69.....	7,8	5,0	1,3	1,3	0,9	6,2	10,3	12,8	12,5	10,0	1,3	5,0	7,8
1770.....	2,8	7,8	3,1	5,6	1,9	1,9	10,4	10,0	10,2	11,2	2,8	0,0	7,8
71.....	0,0	7,8	12,2	3,7	1,3	5,9	9,4	13,7	11,9	6,2	3,7	1,3	12,2
72.....	0,6	7,5	2,2	1,3	0,0	3,7	11,9	11,9	12,5	11,9	8,1	3,4	7,5
73.....	5,0	5,0	8,8	1,2	1,9	5,0	8,7	11,9	12,5	10,0	5,6	0,0	8,8
74.....	0,9	4,4	6,3	0,0	3,7	6,6	13,1	15,0	14,4	9,4	1,9	6,9	6,9
75.....	5,9	8,8	1,9	1,2	1,2	7,5	12,5	15,6	15,0	11,9	2,5	3,8	8,8
76.....	3,7	17,2	15,0	1,2	3,4	4,7	10,9	13,7	10,9	4,2	0,0	3,9	17,2
77.....	8,0	11,3	6,3	2,8	2,5	3,1	5,6	10,3	9,4	5,6	1,9	1,4	11,3
78.....	7,5	7,0	3,7	1,6	0,0	6,9	7,2	12,5	9,3	3,7	0,1	2,5	7,5
79.....	1,7	9,4	1,0	0,0	2,5	2,5	8,0	12,5	11,6	8,2	7,2	0,0	9,4
1780.....	3,2	8,5	7,5	1,5	0,1	6,2	6,1	10,0	15,6	10,0	4,6	2,2	8,5
81.....	7,5	6,9	1,3	0,5	2,1	3,2	11,0	12,4	12,5	5,0	0,2	1,2	7,5
82.....	1,5	3,6	13,8	4,0	0,6	0,5	5,4	8,2	8,7	6,3	0,1	8,3	13,8
83.....	4,4	3,3	5,4	4,1	2,1	1,2	7,7	11,6	8,0	6,1	1,2	3,9	5,4
84.....	18,8	15,0	10,4	5,4	4,6	3,6	8,6	9,8	8,9	7,7	0,6	1,4	18,8
85.....	7,6	3,8	10,2	12,5	3,8	3,8	8,2	11,3	9,8	5,2	2,1	3,6	12,5
86.....	10,0	10,9	8,4	9,9	2,0	0,0	8,7	7,3	8,5	5,9	3,1	6,0	10,9
87.....	8,6	6,8	2,5	0,4	1,0	1,4	12,2	14,1	12,8	9,4	3,7	3,1	8,6
88.....	2,2	2,5	1,3	0,6	1,2	8,1	11,1	10,0	12,7	7,5	1,5	11,1	11,1
89.....	21,8	15,1	0,9	8,1	2,0	7,5	7,9	12,0	10,9	7,0	3,7	6,3	21,8
1790.....	2,0	2,9	1,6	1,8	1,4	5,5	8,9	10,5	8,4	4,4	3,1	2,1	2,9
91.....	5,0	4,3	3,0	1,6	1,0	3,7	5,7	11,0	11,4	5,1	1,0	7,8	7,8
92.....	2,5	12,4	14,0	6,3	1,9	4,2	9,0	10,4	8,6	3,6	2,6	2,0	14,0
93.....	3,0	5,8	2,6	2,6	0,8	2,0	4,0	7,0	6,9	3,2	1,2	0,0	5,8
94.....	3,9	6,3	1,8	0,7	4,0	5,2	8,8	11,0	7,5	2,0	1,5	1,7	10,2
95.....	10,2	16,0	6,0	2,3	2,6	2,2	4,5	4,2	7,2	5,0	5,4	1,6	16,0
96.....	1,0	0,6	6,2	6,1	1,0	3,2	6,0	8,0	7,5	8,2	1,7	0,3	6,2
97.....	8,0	3,0	4,0	2,2	0,2	3,5	5,0	8,2	7,1	6,3	1,5	0,8	8,0
98.....	0,8	6,9	5,7	2,0	2,3	5,0	9,0	8,0	9,6	5,7	0,0	5,0	6,9
99.....	17,0	13,6	5,5	3,7	3,9	1,4	6,2	8,1	6,4	5,0	1,6	3,0	17,0

(1) Voir la note, p. B.211.

ÉTUDES SUR LE CLIMAT DE PARIS.

B.215

	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Minima.
1800.....	—13,1 ⁰	—12,6 ⁰	—6,9 ⁰	—6,9 ⁰	2,5 ⁰	3,1 ⁰	5,6 ⁰	9,5 ⁰	8,7 ⁰	9,4 ⁰	0,9 ⁰	—1,3 ⁰	—13,1 ⁰
01.....	—0,3	—3,5	—10,1	0,0	0,8	1,5	6,4	10,1	11,0	10,0	0,7	—0,6	10,1
02.....	—4,6	—15,5	—3,6	—2,3	0,7	0,3	8,7	7,5	12,0	7,1	1,3	0,0	—15,5
03.....	—3,8	—10,2	—15,5	—6,0	0,5	1,9	7,5	9,1	9,4	4,9	1,7	—4,5	—15,5
04.....	—3,8	—3,0	—6,6	—4,3	0,5	2,4	7,7	11,4	10,1	5,9	3,6	—2,6	—6,6
05.....	—8,3	—5,0	—6,1	—4,5	1,0	2,2	5,4	9,2	9,4	5,0	—3,5	—3,9	—8,3
06.....	—12,5	—3,1	—2,4	—3,4	—0,6	4,4	6,7	11,9	9,6	8,1	—1,6	—1,5	—12,5
07.....	2,7	—3,6	—1,2	—5,5	—3,5	6,0	6,5	11,7	10,3	3,5	2,2	—3,0	—5,5
08.....	—7,4	—7,3	—8,0	—3,5	—2,6	2,2	6,5	8,1	9,7	4,0	—0,9	—0,4	—8,0
09.....	—12,3	—9,6	—1,0	—1,8	—3,6	0,5	7,6	6,2	9,2	1,7	—2,0	—5,0	—12,3
1810.....	—2,1	—12,5	—9,7	—0,7	—2,0	4,5	6,2	8,2	8,0	9,5	—1,5	0,0	—12,5
11.....	—5,4	—10,3	—1,8	—0,4	0,9	7,3	8,0	9,5	7,0	7,8	6,8	—1,9	—10,3
12.....	—6,3	—5,9	—2,8	—1,4	—2,0	4,2	6,8	7,7	8,5	3,7	0,9	—8,3	—8,3
13.....	—10,6	—7,0	—5,8	—5,2	0,5	6,0	7,2	8,0	8,3	5,7	—2,4	—5,3	—10,6
14.....	—4,5	—10,3	—12,5	—8,2	1,7	2,2	8,8	8,2	7,5	5,8	—0,5	—4,5	—12,5
15.....	—1,8	—10,2	1,0	1,7	0,3	5,5	7,2	8,8	7,2	3,9	4,3	—7,5	—10,2
16.....	—9,8	—8,0	—10,7	—3,0	—3,2	2,0	6,2	8,0	8,5	2,7	—0,7	—6,9	—10,7
17.....	—10,0	—5,4	—1,5	—3,0	—1,9	4,2	4,5	9,0	8,1	7,7	0,0	0,7	—10,0
18.....	—9,3	—4,7	—4,5	—1,5	—0,7	6,0	7,4	10,2	8,7	5,7	1,8	—0,1	—9,3
19.....	—6,4	—5,0	—2,2	—1,0	1,0	1,8	7,5	11,0	11,0	5,9	0,1	1,2	—6,4
1820.....	—6,3	—14,3	—6,2	—5,5	2,2	3,5	5,2	10,7	8,2	4,4	3,1	—2,6	—14,3
21.....	—13,0	—11,6	—6,6	—0,9	1,5	1,3	6,0	8,8	9,8	8,1	1,0	1,6	—13,0
22.....	1,8	—3,5	—3,8	—1,5	1,3	5,3	11,8	9,2	10,0	6,2	3,2	1,2	—3,8
23.....	—8,8	—14,6	—1,0	—3,2	—1,2	5,3	5,3	8,8	7,8	4,3	1,1	—4,5	—14,6
24.....	—2,5	—4,8	—3,0	—2,3	—0,8	5,0	6,0	9,0	9,5	4,8	0,5	—0,2	—4,8
25.....	—3,0	—2,5	—2,2	—5,0	0,8	4,5	5,9	9,5	10,3	8,1	1,5	—1,3	—5,0
26.....	—8,0	—11,8	—2,9	—2,0	—1,0	2,5	8,7	11,8	9,8	6,6	2,8	—3,5	—11,8
27.....	—0,6	—11,2	—12,8	—1,2	2,0	6,5	6,5	11,7	6,8	7,2	3,8	—4,2	—12,8
28.....	—1,2	—7,8	—6,3	0,0	—0,9	4,5	7,5	8,0	9,7	7,3	2,0	2,0	—7,8
29.....	—5,2	—17,0	—7,8	—3,2	—1,0	6,2	5,0	12,0	8,2	3,7	1,3	—5,3	—17,0
1830.....	—14,5	—17,2	—15,6	—2,3	0,8	6,1	6,5	9,3	9,0	5,2	1,0	—2,5	—17,2
31.....	—8,7	—10,2	—8,0	0,3	0,0	4,2	7,5	11,0	9,5	7,5	5,2	—3,1	—10,2
32.....	—6,7	—5,9	—5,0	—1,7	2,2	1,7	9,2	10,2	11,2	7,2	0,2	0,3	—6,7
33.....	—3,3	—8,5	—0,4	—3,5	0,5	3,2	8,7	8,8	9,2	6,6	5,3	—2,8	—8,5
34.....	—0,2	—2,2	—4,0	—2,7	0,0	5,7	10,8	12,4	10,0	6,4	1,0	—2,6	—4,0
35.....	—2,8	—6,8	—1,2	0,6	—0,3	6,4	4,8	9,5	8,4	5,2	0,5	—5,2	—6,8
36.....	—9,6	—10,0	—7,0	—0,4	0,5	1,1	9,9	7,8	8,4	5,4	—1,8	—0,1	—10,0
37.....	—9,8	—8,9	—5,0	—7,0	—3,3	2,0	9,3	10,7	9,5	5,3	2,0	—3,2	—9,8
38.....	—5,1	—19,0	—8,7	—4,0	—1,6	3,2	7,5	8,3	6,8	5,9	1,0	—5,4	—19,0
39.....	—6,0	—5,8	—8,1	—2,9	—0,3	1,2	9,4	8,0	6,3	6,3	0,3	—1,2	—8,1
1840.....	—2,6	—11,9	—6,0	—5,0	0,0	4,2	7,2	7,9	10,8	3,3	1,7	0,0	—11,9
41.....	—13,6	—13,5	—9,6	—0,1	0,4	6,7	4,7	8,8	8,8	7,8	—0,6	—1,8	—13,6
42.....	—3,4	—10,4	—4,4	—2,2	—1,4	3,6	7,9	9,6	11,6	6,9	—1,4	—6,1	—10,4
43.....	—3,9	—3,5	—4,2	—3,4	—2,3	3,9	6,9	10,0	9,6	4,6	0,5	—3,3	—4,2
44.....	—4,4	—7,4	—5,2	—3,3	3,6	3,4	5,0	9,3	8,1	6,6	1,6	—2,7	—7,4
45.....	—9,7	—4,3	—12,2	—8,4	1,8	3,1	7,6	8,9	7,6	5,0	1,1	—1,2	—12,2
46.....	—1,7	—6,4	—6,1	—0,4	1,4	4,6	9,9	11,3	11,4	5,6	0,8	—2,0	—6,4
47.....	—15,1	—8,3	—5,4	—7,8	—1,2	4,5	6,0	10,6	9,1	5,5	1,3	—1,6	—15,1
48.....	—6,2	—10,1	—2,0	—1,0	3,1	5,1	8,2	10,1	9,6	6,0	0,7	—0,4	—10,1
49.....	—6,7	—7,7	—1,9	—2,1	—0,8	3,3	7,7	9,3	8,3	7,3	1,8	—6,4	—7,7

	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Minima.
1850.....	— 6,3	— 7,4	— 1,6	— 4,4	1,9	1,7	7,4	9,8	7,9	5,2	— 1,4	— 1,6	— 7,4
51.....	— 3,9	— 2,6	— 3,3	— 3,7	1,1	2,4	5,5	9,5	7,1	3,9	0,5	— 1,6	— 3,9
52.....	— 6,7	— 7,4	— 2,6	— 3,1	— 1,4	2,8	8,4	9,1	10,4	6,0	1,0	— 0,5	— 7,4
53.....	0,3	— 0,4	— 7,2	— 5,3	0,5	2,4	7,6	9,1	10,4	5,2	0,5	— 3,9	— 7,2
54.....	— 14,4	— 3,9	— 5,5	— 0,8	1,5	4,6	7,3	10,3	9,0	5,8	1,5	— 2,1	— 14,4
55.....	— 0,5	— 13,3	— 10,3	— 2,6	— 0,8	2,0	8,2	8,2	10,5	4,4	3,2	— 2,5	— 13,3
56.....	— 12,3	— 6,5	— 2,0	— 2,1	— 0,2	1,4	4,7	8,5	10,0	7,0	0,0	— 3,1	— 12,3
57.....	— 4,5	— 4,5	— 6,6	— 3,9	2,1	2,8	8,1	10,7	10,8	8,6	4,1	0,0	— 6,6
58.....	— 4,4	— 9,8	— 6,1	— 3,4	0,7	2,3	10,9	7,9	9,3	9,1	— 0,5	— 3,8	— 9,8
59.....	— 2,2	— 6,4	— 2,2	— 1,9	— 0,7	6,5	8,1	12,4	11,0	6,7	— 0,7	— 3,4	— 6,4
1860.....	— 16,2	— 2,4	— 7,8	— 5,3	— 0,5	6,0	7,5	8,0	8,9	4,9	1,9	— 3,9	— 16,2
61.....	— 8,6	— 10,9	— 5,1	0,2	2,0	1,5	9,0	10,7	11,2	4,8	1,6	— 6,0	— 10,9
62.....	— 6,0	— 9,4	— 7,6	— 4,8	— 1,0	6,0	8,2	10,1	10,0	7,6	2,5	— 5,7	— 9,4
63.....	— 2,2	— 1,7	— 2,4	— 2,5	1,8	4,1	8,5	9,7	10,9	5,6	2,8	— 0,4	— 2,5
64.....	0,5	— 10,1	— 5,7	— 0,5	0,2	5,5	8,5	8,0	7,7	7,4	1,5	— 4,4	— 10,1
65.....	— 8,3	— 3,5	— 8,3	— 5,6	1,5	5,0	7,4	10,3	10,0	11,3	1,8	— 0,5	— 8,3
66.....	— 5,7	— 1,4	— 2,1	— 2,9	2,4	3,4	7,3	9,7	9,9	7,8	1,8	— 1,4	— 5,7
67.....	— 3,3	— 9,0	1,0	— 3,1	3,4	2,0	8,0	9,6	10,0	4,7	2,3	— 3,4	— 9,0
68.....	— 9,1	— 11,1	— 2,0	— 0,8	— 0,4	8,2	7,1	11,5	8,8	9,7	2,1	— 3,5	— 11,1
69.....	0,2	— 9,0	— 1,0	— 2,6	1,2	6,0	5,0	11,6	9,0	8,3	— 3,3	— 1,7	— 9,0
1870.....	— 6,2	— 6,2	— 10,9	— 3,0	0,3	2,2	9,0	9,9	8,9	7,1	2,8	0,2	— 10,9
71.....	— 11,2	— 11,0	— 4,6	— 0,6	3,0	2,2	4,4	10,9	10,4	6,1	— 2,1	— 3,4	— 11,2
72.....	— 21,5	— 2,5	— 1,3	— 2,6	2,7	2,3	7,5	10,0	8,6	1,9	0,3	0,1	— 21,5
73.....	— 0,8	— 4,3	— 3,4	— 1,3	— 2,7	2,7	5,8	11,7	11,3	7,7	2,0	— 1,1	— 4,3
74.....	— 4,2	— 2,7	— 7,3	— 3,0	0,6	2,3	6,5	12,1	10,0	7,5	2,0	— 4,7	— 7,3
75.....	— 11,2	— 12,0	— 5,7	— 3,5	2,0	5,6	9,0	9,1	11,4	9,7	2,3	— 3,4	— 12,0
76.....	— 8,0	— 8,7	— 10,8	— 1,3	— 1,4	2,7	7,0	10,5	8,3	7,7	3,2	— 4,2	— 10,8
77.....	— 0,3	— 3,6	— 2,0	— 5,1	2,0	1,7	9,0	8,4	10,5	4,0	— 0,7	2,2	— 5,1
78.....	— 3,0	— 6,5	— 3,5	— 1,9	0,0	6,5	9,5	9,4	12,0	6,2	2,0	— 2,4	— 6,5
79.....	— 7,3	— 9,2	— 4,5	— 3,1	— 3,0	0,2	6,8	7,8	9,0	2,3	— 1,9	— 6,7	— 9,2
1880.....	— 25,6	— 11,5	— 6,6	— 1,4	1,3	0,5	5,3	8,3	8,3	6,2	— 4,3	— 3,9	— 25,6
81.....	— 2,2	— 13,6	— 4,6	— 6,0	— 1,3	1,3	2,1	6,9	6,3	5,4	— 2,7	— 4,8	— 13,6
82.....	— 5,6	— 4,2	— 6,2	— 1,4	— 1,3	2,0	4,0	7,6	7,2	3,4	— 0,1	— 0,1	— 6,2
83.....	— 2,8	— 5,3	— 3,1	— 7,2	— 0,7	0,5	5,1	6,3	6,4	5,8	0,6	— 2,1	— 7,2
84.....	— 6,9	— 1,0	— 2,1	— 4,7	— 1,5	3,1	5,6	7,6	9,0	4,1	— 1,7	— 6,1	— 6,9
85.....	— 4,2	— 10,9	— 1,6	— 3,7	0,3	— 0,3	6,5	9,0	5,3	0,7	0,0	— 2,7	— 10,9
1886.....	— 6,4	— 8,6	— 7,0	— 6,5	— 0,8	1,3	6,2	5,9	8,0	4,2	4,1	— 1,3	— 8,6
Minima...	— 25,6	— 19,0	— 15,6	— 12,5	— 4,6	— 0,3	2,1	4,2	5,3	0,7	— 4,3	— 14,1	— 25,6
Année....	1880	1838	1830	1785	1784	1885	1881	1795	1885	1885	1880	1788	1880
Maxima...	2,7	0,6	1,9	2,5	8,7	9,7	13,1	15,6	15,6	12,5	8,1	3,4	
Année....	1807	1796	1775	1761	1760	1766	1774	1775	1780	1760	1772	1772	

TABLEAU IV. — *Maxima absolus de la température à Paris pour chaque mois*
(1757-1886) (1).

	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Max.
1757.....	7,5 ⁰	8,8 ⁰	14,4 ⁰	17,5 ⁰	23,8 ⁰	25,0 ⁰	33,1 ⁰	37,5 ⁰	32,5 ⁰	25,6 ⁰	15,6 ⁰	15,0 ⁰	37,5 ⁰
58.....	11,9	11,9	10,6	18,8	22,5	30,0	34,4	27,5	30,0	23,8	18,7	15,6	34,4
59.....	8,7	11,3	17,5	13,8	26,3	21,2	30,0	33,8	32,5	28,7	21,3	12,5	33,8
1760.....	8,8	10,0	12,5	17,5	25,0	27,5	32,5	34,4	31,2	26,2	24,4	13,8	34,4
61.....	11,9	10,0	13,8	16,2	21,9	28,7	32,5	32,5	31,9	31,9	18,8	13,1	32,5
62.....	7,5	11,3	15,0	13,7	26,2	31,2	31,9	34,4	31,2	28,4	25,6	13,8	34,4
63.....	8,1	11,3	15,6	16,2	25,0	25,0	35,0	30,0	36,2	26,9	21,3	18,8	36,2
64.....	16,6	13,1	13,7	20,0	20,0	28,7	34,4	31,2	31,2	30,0	19,1	17,2	34,4
65.....	12,5	12,8	8,1	18,7	24,4	27,5	31,3	33,1	35,3	30,0	20,6	14,4	35,3
66.....	10,6	5,4	9,7	19,4	23,7	26,9	29,4	32,8	32,5	28,8	24,7	17,5	32,8
67.....	10,8	10,9	17,5	19,4	19,4	25,4	30,0	30,6	32,8	31,6	21,3	17,5	32,8
68.....	10,4	11,9	16,2	19,4	20,9	27,9	28,8	31,6	28,8	23,7	22,5	14,1	31,6
69.....	10,3	12,2	13,1	14,4	25,3	29,6	25,3	30,6	29,4	25,6	20,0	19,1	30,6
1770.....	11,9	12,5	9,4	16,2	17,5	27,5	28,1	27,5	33,8	30,3	20,6	15,0	33,8
71.....	12,5	12,8	14,1	16,9	19,1	30,0	32,2	32,5	32,5	28,8	21,9	13,4	32,5
72.....	13,4	10,6	16,2	18,4	18,1	25,6	35,6	29,4	30,3	29,4	21,9	16,9	35,6
73.....	12,8	12,9	11,6	19,4	21,9	27,8	28,7	31,9	35,3	26,9	21,6	14,7	35,3
74.....	13,8	12,5	14,1	22,2	21,7	24,7	31,2	32,2	32,5	29,1	19,4	20,0	32,5
75.....	14,1	11,9	14,4	15,0	27,8	25,6	32,8	31,3	29,7	30,9	23,1	15,6	32,8
76.....	10,3	9,4	13,1	18,7	21,6	26,9	29,4	28,8	32,5	24,4	22,0	16,1	32,5
77.....	12,8	10,9	15,3	22,2	21,3	25,0	27,5	33,8	31,2	27,5	20,9	17,5	33,8
78.....	10,9	10,0	8,9	15,5	23,7	22,2	28,7	31,9	30,0	21,7	20,0	14,0	31,9
79.....	12,9	5,9	14,5	20,0	26,2	30,0	28,0	33,8	31,2	31,2	22,5	17,8	33,8
1780.....	17,0	9,5	10,6	20,1	20,9	30,5	33,5	31,6	33,8	32,5	22,7	13,5	33,8
81.....	7,5	11,6	12,4	20,0	25,6	30,5	31,9	32,5	31,9	30,6	18,2	16,5	32,5
82.....	13,4	12,2	10,8	15,4	17,1	26,0	33,5	33,0	24,9	24,4	14,7	11,9	33,5
83.....	8,8	12,1	12,9	17,1	28,1	26,9	31,0	33,8	33,8	25,9	20,5	17,1	33,8
84.....	8,9	9,4	12,8	14,7	23,7	29,1	27,0	31,9	25,4	29,4	18,0	15,2	31,9
85.....	7,9	9,6	7,9	13,1	24,0	28,8	32,2	30,6	27,9	24,7	18,9	16,9	32,2
86.....	10,4	12,6	11,8	17,1	21,6	28,1	31,0	26,2	27,5	22,5	16,8	12,1	31,0
87.....	13,7	8,6	12,8	18,1	20,2	23,4	26,3	27,8	30,3	24,1	21,2	16,9	30,3
88.....	13,8	11,2	12,5	15,6	20,6	27,6	29,6	33,5	24,9	26,6	20,0	14,3	33,5
89.....	3,9	14,8	11,0	13,2	19,5	29,0	27,1	27,8	30,2	16,8	18,3	12,9	30,2
1790.....	12,9	9,8	14,1	20,1	17,9	25,9	34,6	28,2	31,0	28,1	20,5	15,3	34,6
91.....	13,2	13,0	13,4	17,4	22,2	23,6	31,6	32,2	32,0	28,4	21,1	12,6	32,2
92.....	11,5	13,2	13,1	20,0	27,2	29,4	27,4	30,5	22,4	19,6	15,2	10,0	30,5
93.....	9,5	6,4	8,6	10,8	14,2	16,9	22,0	27,3	24,0	19,0	16,8	10,3	27,3
94.....	10,6	7,6	10,0	13,4	19,6	20,2	23,5	27,7	22,5	18,7	16,2	14,0	27,7
95.....	7,4	6,8	9,8	10,9	16,4	20,6	22,5	20,5	22,2	22,0	17,8	11,0	22,5
96.....	10,2	11,0	8,4	13,0	20,2	18,0	22,2	21,0	23,2	23,0	14,6	10,0	23,2
97.....	9,8	8,3	10,3	11,8	16,2	23,3	18,5	26,6	22,3	19,2	15,7	12,4	26,6
98.....	14,4	10,0	13,9	16,6	21,9	25,5	31,8	31,4	32,7	29,8	20,6	17,0	32,7
99.....	11,9	8,1	16,9	16,7	20,6	24,8	26,3	29,7	30,0	26,0	20,4	15,0	30,0

(1) Voir la note, p. B.211.

ÉTUDES SUR LE CLIMAT DE PARIS.

	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Max.
1800.....	9,6	13,4	13,5	19,4	26,3	26,5	27,9	30,6	35,5	26,2	19,4	18,5	35,5
01.....	10,5	11,8	13,1	17,3	21,8	26,7	26,9	28,2	28,1	25,9	21,0	16,5	28,2
02.....	14,0	8,6	11,0	18,7	19,3	27,9	25,8	28,2	36,4	30,6	24,5	13,1	36,4
03.....	11,1	10,6	14,0	20,0	23,9	26,6	27,5	36,8	30,9	25,0	18,4	13,7	36,8
04.....	13,7	14,1	11,4	18,5	23,6	25,5	33,8	31,6	31,0	29,8	22,2	18,4	33,8
05.....	10,5	7,9	12,4	17,7	19,1	22,9	28,1	31,6	28,0	26,9	19,0	13,1	31,6
06.....	14,2	12,0	13,4	15,8	20,2	27,5	29,5	33,6	29,7	28,0	20,6	17,0	33,6
07.....	15,6	10,8	14,2	14,8	25,9	28,0	29,5	34,1	33,5	25,4	22,4	14,1	34,1
08.....	8,0	12,3	12,4	15,4	18,5	31,7	26,0	36,2	30,0	23,3	17,5	15,0	36,2
09.....	10,3	14,5	14,7	17,5	17,7	27,5	25,5	28,5	31,2	25,9	19,4	11,2	31,2
1810.....	13,5	9,2	14,7	18,5	23,2	24,0	30,5	29,6	29,5	30,7	21,7	15,7	30,7
11.....	13,3	10,5	14,3	18,2	25,1	30,0	30,7	31,0	29,7	29,4	22,9	18,3	31,0
12.....	12,3	7,7	14,0	17,2	18,4	26,7	32,5	32,5	29,9	26,9	23,8	15,8	32,5
13.....	9,7	8,8	14,7	19,3	22,2	28,0	27,8	29,6	28,0	24,7	23,5	14,5	29,6
14.....	11,3	11,9	11,5	15,0	22,5	25,0	29,2	33,8	31,2	25,3	19,1	15,2	33,8
15.....	16,8	8,6	12,2	22,5	22,3	25,2	24,9	28,9	30,0	28,3	20,3	14,5	30,0
16.....	10,0	11,9	10,4	14,1	22,9	24,4	25,7	28,0	27,9	25,0	21,9	12,7	28,0
17.....	13,1	13,0	11,5	16,2	18,1	24,5	31,0	28,5	29,0	26,4	19,5	16,2	31,0
18.....	11,7	12,2	12,5	14,6	21,8	21,8	29,7	34,5	31,5	28,0	20,0	17,0	34,5
19.....	11,7	11,8	13,2	18,9	21,8	26,0	28,5	31,2	30,2	26,5	24,3	12,5	31,2
1820.....	14,3	13,4	14,2	20,8	21,8	24,3	31,0	32,2	31,4	24,1	19,5	14,9	32,2
21.....	11,4	13,3	11,8	15,1	25,0	22,0	24,1	27,3	31,0	27,5	22,8	17,6	31,0
22.....	13,0	9,8	12,0	21,8	23,3	29,6	33,8	29,1	30,2	27,8	24,0	18,9	33,8
23.....	8,5	12,0	12,1	18,8	20,6	29,4	25,4	30,9	31,3	30,0	19,3	15,8	31,3
24.....	16,0	11,8	12,0	15,0	25,0	23,0	28,8	35,3	28,9	29,3	21,0	16,1	35,3
25.....	13,0	10,8	13,0	18,4	22,8	26,9	28,8	36,3	33,0	27,1	22,0	13,8	36,3
26.....	15,6	8,1	13,6	20,4	23,2	24,8	33,1	33,5	36,2	25,6	21,7	12,8	36,2
27.....	13,5	9,5	11,5	17,0	23,3	25,3	28,3	30,5	33,8	28,7	21,9	13,7	33,8
28.....	13,5	12,0	14,7	15,5	23,8	26,7	32,0	31,2	27,5	26,0	19,0	13,7	32,0
29.....	12,0	8,2	12,0	17,5	19,8	23,6	29,5	31,3	27,5	21,5	21,8	14,5	31,3
1830.....	7,8	6,8	17,5	22,5	22,5	26,3	29,0	31,0	28,0	22,2	19,0	17,5	31,0
31.....	10,5	11,5	17,9	18,0	23,0	23,8	27,2	29,5	28,5	26,5	22,8	14,8	29,5
32.....	14,0	14,0	11,5	14,8	21,6	27,5	29,0	34,8	35,0	24,5	22,5	15,9	35,0
33.....	13,4	7,3	13,5	15,1	19,5	28,0	29,8	27,5	25,9	24,3	19,0	16,0	29,8
34.....	14,0	13,8	14,7	16,5	22,0	28,6	32,2	32,6	29,8	30,0	24,8	19,6	32,6
35.....	13,1	13,2	12,0	15,8	21,7	22,2	30,8	34,0	32,0	29,2	18,7	16,0	34,0
36.....	12,0	12,3	11,3	22,0	19,5	25,7	32,0	34,3	31,2	26,0	22,3	17,4	34,3
37.....	13,2	11,2	12,9	13,9	17,3	25,7	28,7	28,6	31,1	23,7	21,9	15,3	31,1
38.....	15,1	8,5	12,8	14,6	18,3	27,5	28,9	34,3	32,0	27,4	19,9	18,1	34,3
39.....	14,3	11,6	12,0	14,3	19,6	26,6	30,2	31,6	33,1	31,9	22,9	14,9	33,1
1840.....	14,0	14,6	12,4	12,3	29,6	26,2	31,7	29,1	33,0	30,6	16,8	18,4	33,0
41.....	7,2	14,0	13,0	21,5	28,7	33,3	28,6	27,5	30,7	30,9	19,4	16,0	33,3
42.....	12,5	6,2	12,4	15,5	25,7	25,4	35,5	32,5	36,7	30,0	15,5	15,3	36,7
43.....	12,5	13,4	12,7	19,6	24,5	22,5	27,8	34,4	30,3	28,2	24,0	16,3	34,4
44.....	12,2	11,2	11,3	15,2	25,2	21,2	30,9	30,2	23,3	27,3	20,5	13,7	30,9
45.....	7,1	8,5	8,5	13,4	22,5	22,0	28,8	29,6	26,1	25,2	22,3	16,1	29,6
46.....	11,3	13,5	17,6	15,5	20,0	25,5	32,6	36,0	34,8	26,7	19,3	14,0	36,0
47.....	8,5	10,3	12,5	19,1	16,6	31,7	26,2	34,6	29,8	26,2	21,0	16,3	34,6
48.....	12,7	8,4	14,2	20,1	23,2	27,5	25,7	31,1	29,8	24,9	21,5	12,2	31,1
49.....	13,2	13,2	12,5	15,5	16,6	29,7	31,5	31,0	28,3	28,9	19,5	17,2	31,5

ÉTUDES SUR LE CLIMAT DE PARIS.

B.219

	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Max.
1830.....	14,7 ⁰	10,3 ⁰	14,3 ⁰	16,3 ⁰	20,1 ⁰	25,1 ⁰	32,5 ⁰	32,5 ⁰	33,1 ⁰	22,4 ⁰	16,6 ⁰	16,3 ⁰	33,1 ⁰
31.....	12,4	11,2	13,9	15,1	21,6	21,1	28,6	28,7	30,5	20,5	20,1	10,7	30,5
32.....	11,2	13,5	12,3	18,0	19,2	28,4	24,8	34,6	30,3	24,4	19,7	19,9	34,6
33.....	13,3	11,6	5,5	14,9	16,6	24,5	29,6	31,5	29,4	23,0	20,6	15,7	31,5
34.....	11,0	12,3	13,0	18,7	23,5	21,4	27,1	33,6	27,2	27,7	23,0	12,3	33,6
35.....	12,0	10,4	12,5	15,8	22,6	30,0	27,7	27,9	30,5	24,4	19,9	12,1	30,5
36.....	12,5	13,9	16,1	15,6	21,9	23,9	29,2	31,5	33,4	23,4	22,4	11,6	33,4
37.....	14,8	11,0	12,4	16,6	22,3	26,8	31,8	34,2	36,2	25,5	21,6	19,0	36,2
38.....	12,7	8,3	12,3	19,3	22,4	28,4	33,5	31,4	29,1	26,5	21,1	12,8	33,5
39.....	11,7	12,9	13,3	19,6	25,4	24,7	30,4	34,5	33,0	26,5	25,0	17,2	34,5
1860.....	13,5	12,4	12,6	13,5	18,9	25,4	25,6	27,8	23,8	21,0	19,2	12,8	27,8
61.....	12,0	11,6	13,3	17,0	21,3	27,0	29,7	27,2	32,7	28,3	23,8	17,4	32,7
62.....	14,7	13,6	15,9	20,5	27,3	27,1	26,0	30,6	29,5	24,6	23,7	14,8	30,6
63.....	13,9	12,4	10,7	16,4	20,7	23,1	30,1	29,6	35,9	25,1	18,7	14,6	35,9
64.....	11,4	11,2	12,8	15,8	22,5	27,8	25,7	29,4	28,0	25,9	21,3	12,6	29,4
65.....	10,5	14,9	10,6	10,3	26,5	29,2	27,9	33,3	31,0	29,4	23,3	15,0	33,3
66.....	9,3	11,3	14,0	14,7	24,5	20,7	28,6	32,6	26,9	24,5	20,1	15,7	32,6
67.....	12,2	12,2	16,2	16,7	22,7	26,9	30,0	27,9	33,0	27,5	19,9	18,1	33,0
68.....	11,0	11,8	15,1	15,4	22,2	31,7	31,3	34,0	30,6	29,5	20,4	14,3	34,0
69.....	16,9	15,0	15,2	11,3	25,2	22,2	29,0	31,1	30,7	26,6	24,2	14,2	31,1
1870.....	12,5	11,2	16,5	17,9	25,8	31,9	31,3	33,1	25,8	25,0	19,3	13,5	33,1
71.....	14,5	6,3	14,6	19,3	19,9	28,7	29,3	33,9	30,0	30,4	20,3	13,5	33,9
72.....	7,6	12,8	14,0	21,6	22,4	22,3	29,4	34,4	28,1	30,6	19,5	16,0	34,4
73.....	13,1	12,3	12,6	20,4	23,5	23,4	31,8	32,0	34,8	23,1	25,6	14,5	34,8
74.....	11,9	12,7	13,4	18,9	25,9	29,7	29,4	35,3	26,1	31,5	20,1	15,8	35,3
75.....	12,3	12,1	10,0	19,0	24,6	26,1	30,9	27,4	33,9	27,4	19,4	16,9	33,9
76.....	13,8	11,2	15,8	18,2	21,1	25,5	31,0	31,4	33,6	23,9	24,0	17,8	33,6
77.....	16,0	14,1	13,2	17,0	20,9	21,5	31,5	30,5	30,1	24,3	22,3	14,2	31,5
78.....	11,9	11,3	16,2	14,3	21,6	27,0	29,3	28,8	26,5	25,9	21,6	15,0	29,3
79.....	13,8	12,4	14,3	20,1	17,9	23,8	26,4	28,0	31,9	26,4	19,8	13,2	31,9
1880.....	7,7	9,8	16,3	22,7	22,3	32,2	29,5	31,0	28,4	30,0	22,6	14,9	32,2
81.....	13,6	11,9	14,9	18,6	23,1	25,7	28,1	38,4	31,5	23,4	16,4	19,9	38,4
82.....	12,2	11,5	16,8	20,5	26,2	24,8	26,3	29,5	31,5	26,5	23,0	16,0	31,5
83.....	13,8	14,8	13,1	17,4	22,5	28,9	30,2	30,3	29,9	24,3	18,0	16,0	30,3
84.....	11,4	14,5	16,1	20,9	21,5	29,0	30,0	33,9	33,8	28,4	21,9	19,1	33,9
85.....	13,3	13,3	17,7	15,4	25,1	30,4	31,4	30,6	31,5	29,1	16,7	15,4	31,5
1886.....	13,5	10,8	11,0	21,3	26,3	28,6	27,3	33,0	31,4	31,6	25,6	16,5	33,0
Minima.	3,9	5,4	6,0	10,3	16,2	16,9	18,5	20,5	22,2	16,8	14,6	10,0	
Années.	1789	1766	1853	1865	1797	1793	1797	1795	1795	1789	1796	1792-96	
Maxima.	17,0	15,0	17,9	22,7	29,6	33,3	35,6	38,4	36,7	31,9	25,6	20,0	38,4
Années.	1780	1869	1831	1880	1840	1841	1772	1881	1842	1839	1762 1873-86	1774	1881

TABLEAU V. — *Températures extrêmes à l'Observatoire de Paris.*

Année.	Date.	Minimum.		Date.	Maximum.	
		La Hire.	Centigrades.		La Hire.	Centigr.
1695.	6 février.....	7	— 17,0			
1701.	»	28 $\frac{1}{2}$	— 2,0	17 août.....	77 $\frac{1}{2}$	32,3
02.	1 ^{er} janvier.....	14 $\frac{1}{2}$	— 11,8	5 août.....	71 $\frac{1}{2}$	28,1
03.	1 ^{er} janvier.....	26	— 3,7	12 août (2).....	64	22,9?
04.	23 janvier.....	14 $\frac{2}{3}$	— 11,6	28 juillet.....	75	30,6
05.	2 février.....	25	— 4,4	6 août.....	80	34,1
06.	21 janvier.....	20	— 7,9	8 août.....	82	35,5
07.	1 ^{er} février.....	27 $\frac{1}{3}$	— 3,2	21 août.....	82	35,5
08.	13 février.....	27 $\frac{1}{2}$	— 2,7	15 et 16 août.....	76	31,3
	12 décembre.....	25	— 4,4			
09.	13, 14 janvier.....	5	— 18,4	11 août.....	75	30,6
1710.	11 janvier.....	14 $\frac{1}{2}$	— 11,8	3 août.....	71 $\frac{1}{2}$	28,1
11.	15 février.....	20	— 7,9	16 juin.....	73 $\frac{1}{2}$	29,5
12.	8 janvier.....	25	— 4,4			
	31 décembre.....	24 $\frac{3}{4}$	— 4,6	16 août.....	76?	31,3
13.	15 janvier.....	18 $\frac{1}{2}$	— 9,0			
	6 décembre.....	22 $\frac{1}{2}$	— 6,1	30 août.....	69?	26,4?
14.	5 février.....	20 $\frac{1}{2}$	— 7,5	10 juillet.....	74	29,9
15.	18 janvier.....	18	— 9,3	2 juillet.....	76	31,3
16.	22 janvier.....	4 $\frac{2}{3}$	— 18,6	23 août.....	76?	31,3
17.	13 février.....	24	— 5,1	1 ^{er} août.....	78?	32,7
18.	10 février.....	21 $\frac{1}{2}$	— 6,9	11, 21, 22, 23 août....	82	35,5
19.	2 janvier (1).....	27 $\frac{1}{3}$	— 2,8	16 juillet.....	82 $\frac{1}{2}$	35,8
1720.	5, 10 janv., 21, 22 févr.			9, 30 juillet.....	75	30,6
	14 mars, 23 décembre..	30	— 0,9	20 juillet.....	77	32,0
21.	22 février.....	19	— 8,6	7, 8 août, 7, 28 sept..	72	28,5
22.	24 janvier.....	25	— 4,1	15, 16, 27 juin.....	72	28,5
23.	10 février.....	17	— 10,0	20 août, 5 septembre..	75	30,6
24.	Janv., févr., mars ..	30	— 0,9	3 juillet (3).....	80	34,1
	26 novembre.....	26	— 3,7	23 août.....	80 $\frac{1}{2}$	34,5
25.	23, 26 février.....	26	— 3,7	13 juillet.....	76	31,3
26.	19, 21 janvier.....	20	— 7,9	27, 28 août.....	77	32,0
27.	7 février.....	28	— 2,3	7 août.....	80	34,1
28.	6 janvier.....	19 $\frac{1}{2}$	— 8,3			
	31 décembre.....	21	— 7,2	17 juillet.....	75	30,6
29.	19 janvier.....	9 $\frac{3}{4}$	— 15,1	21, 22 juin.....	78	32,7
1730.	27 janvier.....	23	— 5,8	5 août.....	76	31,3
31.	25 janvier.....	21	— 7,2	10, 11 août.....	82	35,5
	5 et 6 février.....	22	— 6,5			

(1) La *Connaissance des Temps* et les *Mémoires de l'Académie* ne donnent pas les mêmes chiffres; mais il ressort qu'il a fait à peu près le même froid le 29 mars qu'au courant de janvier.

(2) Lever du Soleil. Manuscrit Bertrand: la grande chaleur dans le jour est du 11; le lendemain couvert: c'est ainsi qu'est arrivé le maximum du matin.

(3) 1^{er} septembre, 82^d = 35°, 5 C.

ÉTUDES SUR LE CLIMAT DE PARIS.

B.221

Année.	Date.	Minimum.			Date.	Maximum.		
		La Hire.	Réaumur.	Centigrades.		La Hire.	Réaumur.	Centigr.
1732.	26 janvier.	19 $\frac{3}{4}$	— 6	— 7,7	30 juillet, 2 août.	74	24 $\frac{1}{2}$	29,9
	27 janvier.	21	— 5	— 7,2				
	33. 31 janv., 1 ^{er} févr.	26 $\frac{1}{2}$	— 1 $\frac{3}{4}$	— 3,3	7, 8, 9 juillet ..	77	26	32,0
	34. 23, 24 janvier...	23 $\frac{1}{2}$	— 4	— 5,5	6 septembre...	76	25 $\frac{1}{2}$	31,3
	28 janvier.	28	— 1	— 2,3	8 septembre...	75	25 $\frac{1}{2}$	30,6
	30 novembre ...	22 $\frac{1}{2}$	— 5 $\frac{1}{2}$	— 6,2				
	35. 5 février.	27	— 1 $\frac{1}{2}$	— 3,0	15 juillet... ..	72 $\frac{3}{4}$	24	29,0
	23 décembre....	26 $\frac{1}{2}$	— 1 $\frac{2}{3}$	— 3,3				
	36. 3 janvier.	25 $\frac{1}{2}$	— 3 $\frac{1}{4}$	— 4,0	30 juill., 14 août.	80 $\frac{1}{2}$	28 $\frac{1}{2}$	34,5
	24, 25 février...	24	— 3 $\frac{1}{2}$	— 5,1				
37.	Janvier.	»	0	0				
	29 décembre....	25	— 3	— 4,4	16, 17, 21 juillet.	75 $\frac{1}{2}$	25 $\frac{1}{2}$	31,0
	En dehors...		— 4		En dehors...		23 $\frac{1}{2}$	
	38. 8 janvier.	21 $\frac{1}{2}$	— 5 $\frac{2}{3}$	— 6,8	5 août.	82 $\frac{1}{4}$	29 $\frac{1}{2}$	35,7
	En dehors...		— 6		En dehors...		27	
	39. 26 novembre ...	15	»	— 11,4	22 juillet.	75 $\frac{2}{3}$	27	31,1
	En dehors...		— 4					
	27 novembre ...	23		— 5,8				
	En dehors...		— 5					
1740.	10 janvier.	14	— 10	— 12,1	15 juillet.	69	22 $\frac{1}{2}$	26,4
	En dehors...		— 11					
	41. 26 janvier.	18	— 7	— 9,3	8 août.	75 $\frac{1}{2}$	27	30,6
	En dehors...		— 8					
	42. 10 janvier.	8 $\frac{7}{8}$	— 12 $\frac{1}{8}$	— 15,7	2 juillet.	80	28	34,1
	En dehors...		— 14 $\frac{1}{2}$	(— 17,4)	En dehors...		29	(34,8)
	27 décembre.		— 8 $\frac{1}{2}$	(— 10,4)				
	43. 7 janvier.	22	— 4	— 6,5	17 juin.	74 $\frac{2}{3}$	24 $\frac{8}{10}$	30,4
	En dehors...		— 5	(— 6,0)	En dehors...		26	(31,2)
	44. 14 janvier.	20		— 7,9	29 juin.	73	23 $\frac{1}{2}$	29,2
45.	En dehors...		— 8	(— 9,6)	En dehors...		24	(28,8)
	14 janvier.	11 $\frac{1}{2}$	— 10 $\frac{1}{4}$	— 13,8	9 juillet.	69	24 $\frac{1}{2}$	26,4
	46. 15 février.	18 $\frac{2}{3}$	— 7 $\frac{1}{4}$	— 8,8	15 juillet.	69 $\frac{3}{4}$	26 $\frac{1}{4}$	26,9
	47. 14 janvier.	12	— 11 $\frac{3}{4}$	— 13,5	6 septembre...	77 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$	32,4
	48. 13 janvier.	12 $\frac{1}{2}$	— 10 $\frac{1}{8}$	— 13,1	23 juin.	82 $\frac{1}{4}$	29 $\frac{1}{2}$	35,5
	49. 9 février.	18	— 6 $\frac{3}{4}$	— 9,3	13 juillet.	83	29 $\frac{1}{2}$	36,2
	6 janvier.	19 $\frac{3}{4}$	— 5 $\frac{1}{2}$	— 8,0	22, 26 juillet...	79 $\frac{1}{2}$	27 $\frac{1}{2}$	33,7
	51. 10 février.	11 $\frac{1}{4}$	— 10	— 14,0	17 juin.	82 $\frac{1}{4}$	29 $\frac{1}{2}$	35,5
	52. 16 janvier, 30 déc.	20	— 5 $\frac{1}{4}$	— 7,9	29 juin.	78 $\frac{1}{2}$	27	33,0
	53. 27 janvier.	11	— 9 $\frac{1}{4}$	— 14,2	7 juillet.	84 $\frac{1}{2}$	{ 30 $\frac{1}{2}$ (36,6) }	
1754.	8 janvier.	11 $\frac{1}{2}$	— 12	— 13,8	14 juillet.	84	30	36,9

TABLEAU V bis. — *Minima et maxima de la température à Paris*
(minima entre deux étés).

Année.	Date.	Minimum.	Date.	Maximum.
<i>Journal économique.</i>				
		Centigrades.		Centigrades.
1753.	27 janvier.....	— 7,9	8 juillet.....	37,5
54.	7 février.....	— 17,0	20 août.....	36,0
55.	6 janvier.....	— 18,0	20 juin.....	39,0
56.	31 janvier.....	— 3,6	16 juillet.....	33,8
<i>Journal de Médecine.</i>				
57.	8 janvier.....	— 11,9	14, 20 juillet.....	37,5
58.	21, 22 janvier.....	— 12,5	9 juin.....	34,4
59.	13 février.....	— 4,7	24 juillet.....	33,8
1760.	13 janvier.....	— 9,4	19 juillet.....	34,4
61.	30 janvier.....	— 5,6	24 juin, 11 juillet.....	32,5
62.	2 mars.....	— 5,0	14, 15, 21 juillet.....	34,4
63.	29 décembre 1762.....	— 10,3	19 août.....	36,2
64.	28 février.....	— 3,7	18 juin.....	34,4
65.	28 décembre, 19 février.....	— 6,9	26 août.....	35,3
66.	11 janvier.....	— 10,9	21 juillet.....	32,8
67.	12 janvier.....	— 13,1	5, 6 août.....	32,8
68.	5 janvier.....	— 16,3	28 juillet.....	31,6
69.	14 décembre.....	— 7,8	7 juillet.....	30,6
1770.	7 janvier.....	— 7,8	9 août.....	33,8
71.	13 février.....	— 12,2	18 juillet, 7 août.....	32,5
72.	20 janvier.....	— 7,5	26 juin.....	35,6
73.	5 février.....	— 8,8	14 août.....	35,3
74.	4 février.....	— 6,3	8 août.....	32,5
75.	25 janvier.....	— 8,8	22 juin.....	32,8
76.	28 janvier.....	— 17,2	»	»
<i>Journal de Paris.</i>				
77.	8 janvier.....	— 9,4	18 juillet.....	37,5
78.	13 décembre.....	— 7,5	5, 15, 16 juillet.....	35,0
79.	5 janvier.....	— 10,0	18 juillet.....	35,0
1780.	25, 28 janvier.....	— 8,8	3 juin.....	35,0
81.	19, 22 décembre.....	— 7,5	2 juin, 31 juillet.....	31,2
82.	17 février.....	— 12,5	18 juin, 16 juillet.....	32,5
83.	27 novembre 1782.....	— 5,0	10 juillet.....	33,8
84.	30 décembre.....	— 17,5	7 juillet.....	30,6
85.	1 ^{er} mars.....	— 10,0	28 juin.....	26,9
86.	4 janvier.....	— 8,8	25 juillet.....	27,5
87.	25, 26 décembre.....	— 6,3	6, 8, 9 août.....	28,8
88.	30 novembre 1787.....	— 2,5	»	»

ÉTUDES SUR LE CLIMAT DE PARIS.

B.223

Année.	Date.	Minimum. Centigrades.	Date.	Maximum. Centigrades.
1784.	30 décembre 1783.....	—19,1	7 juillet.....	29,6
85.	1 ^{er} mars.....	—10,9	26 juillet.....	30,2
86.	4 janvier.....	—13,0	12 juin.....	29,1
87.	25 décembre.....	—7,6	5 août.....	31,5
88.	1 ^{er} décembre (1).....	—4,4	12 juillet.....	33,5
89.	31 décembre.....	—21,8	29 août.....	30,2
1790.	20 janvier (2).....	—3,2	22 juin.....	34,6
91.	1 ^{er} décembre.....	—5,0	15 août.....	32,0
92.	19 février.....	—14,0	13 août.....	31,1
93.	20 janvier.....	—7,6	8 juillet.....	38,4
94.	9 janvier.....	—6,0	30 juillet.....	32,5
95.	23 janvier.....	—23,5	13 août.....	29,5
96.	7 février.....	—8,1	21 août.....	29,5
97.	11 décembre.....	—13,4	9 juillet.....	34,5
98.	11 janvier.....	—6,9	1 ^{er} août.....	32,7
99.	26 décembre.....	—17,0	8 août.....	30,0
1800.	31 décembre.....	—13,1	18 août.....	35,5
01.	13 février.....	—10,1	6 juillet.....	28,2
02.	16 janvier.....	—15,5	8 août.....	36,4
03.	12 février.....	—15,5	31 juillet.....	36,8
04.	15 février.....	—6,6	5 juin.....	33,8
05.	20 décembre.....	—8,3	4 juillet.....	31,6
06.	18 décembre.....	—12,5	11 juillet.....	33,6
07.	7 mars.....	—5,5	11 juillet.....	34,1
08.	26 février.....	—8,0	15 juillet.....	36,2
09.	21 décembre.....	—12,3	17 août.....	31,2
1810.	31 janvier.....	—12,5	2 septembre (3).....	30,7
11.	2 janvier.....	—10,3	19 juillet.....	31,0
12.	31 décembre.....	—6,3	14 juin, 27 juillet.....	32,5
13.	9 décembre.....	—10,6	30 juillet.....	29,6
14.	24 février.....	—12,5	28 juillet.....	33,8
15.	20 janvier.....	—10,2	5 août.....	30,0
16.	11 février.....	—10,7	20 juillet.....	28,0
17.	23 décembre.....	—10,0	20 juin.....	31,0
18.	31 décembre.....	—9,3	24 juillet.....	34,5
19.	27 décembre.....	—6,4	5 juillet.....	31,2
1820.	11 janvier.....	—14,3	31 juillet.....	32,2
21.	31 décembre.....	—13,3	24 août.....	31,0
22.	1 ^{er} février.....	—3,8	10 juin.....	33,8
23.	14 janvier.....	—14,6	26 août.....	31,1
24.	14 janvier.....	—4,8	14 juillet.....	35,3
25.	17 mars.....	—5,0	19 juillet.....	36,3
26.	10 janvier.....	—11,8	1 ^{er} août.....	36,2
27.	18 février.....	—12,8	2 août.....	33,8
28.	10 janvier.....	—7,8	29 juin.....	32,0
29.	24 janvier.....	—17,0	24 juillet.....	31,3

(1) Minimum anomal le 30 novembre 1787 : — 5°,4.

(2) Minimum, 27 novembre 1789 : — 6°,3.

(3) Maximum presque égal, 29 juin : 30°,5.

ÉTUDES SUR LE CLIMAT DE PARIS.

Année.	Date.	Minimum. Centigrades.	Date.	Maximum. Centigrades.
1830.	17 janvier	-17,2	29 juillet	31,0
31.	31 janvier	-10,2	8 juillet	29,5
32.	31 décembre	-6,7	13 août	35,0
33.	11 janvier	-8,5	2 juin.	29,8
34.	2, 11 février	-4,0	12, 18 juillet	32,6
35.	6 janvier	-6,8	23 juillet	34,0
36.	2 janvier	-10,0	1 ^{er} juillet	34,3
37.	28 décembre	-9,8	19 août	31,1
38.	20 janvier	-19,0	13 juillet	34,3
39.	1 ^{er} février	-8,1	3 août	33,1
1840.	13 janvier	-11,9	6 août	33,0
41.	17 décembre	-13,6	26 mai	33,3
42.	10 janvier	-10,4	18 août	36,6
43.	9 novembre 1842	-6,1	5 juillet	34,4
44.	16 janvier	-7,4	22 juin	30,9
45.	21 février	-12,2	7 juillet	29,6
46.	6 janvier	-6,4	5 juillet	36,0
47.	19 décembre	-15,1	17 juillet	34,6
48.	28 janvier	-10,1	7 juillet	31,1
49.	2 janvier	-7,7	1 ^{er} juin	31,5
1850.	11 janvier	-7,4	5 août	33,1
51.	25 décembre	-3,9	23 août	30,5
52.	1 ^{er} , 2 janvier	-7,4	16 juillet	34,6
53.	20 février	-7,2	7 juillet	31,5
54.	30 décembre	-14,4	25 juillet	33,6
55.	21 janvier	-13,3	23 août	30,5
56.	21 décembre	-12,3	11 août	33,4
57.	6 février	-6,6	4 août	36,2
58.	5, 7 janvier	-9,8	3, 15 juin	33,5
59.	10 janvier	-6,4	13 juillet	34,5
1860.	20 décembre	-16,2	16 juillet	27,8
61.	16 janvier	-10,9	12 août	32,7
62.	19 janvier	-9,4	26 juillet	30,6
63.	22 novembre	-5,7	9 août	35,9
64.	6 janvier	-10,1	31 juillet	29,4
65.	27 déc., 11 février	-8,3	6 juillet	33,3
66.	26 décembre	-5,7	13 juillet	32,6
67.	22 janvier	-9,0	14 août	33,0
68.	7 janvier	-11,1	22 juillet	34,0
69.	25 janvier	-9,0	22 juillet	31,1
1870.	12 février	-10,9	24 juillet	33,1
71.	24 décembre	-11,2	18 juillet	33,9
72.	9 décembre	-21,5	22 juillet	34,4
73.	29 janvier	-4,3	8 août	34,8
74.	11 février	-7,3	9 juillet	35,3
75.	1 ^{er} janvier	-12,0	17 août	33,9
76.	12 février	-10,8	13 août	33,6
77.	12 mars	-5,1	11 juin	31,5
78.	12 janvier	-6,5	25 juin	29,3

TABLEAU VI. — *Minima et maxima annuels d'après Messier au Collège de France et à l'hôtel de Cluny, et d'après Cotte à Montmorency* ⁽¹⁾.

Observations de Messier.				Observations de Cotte.			
Thermom. de Messier.		Thermom. centigrade.		Thermom. de Cotte.		Thermom. centigrade.	
Minima.	Maxima.	Minima.	Maxima.	Minima.	Maxima.	Minima.	Maxima.
1763.....	— 6,5	31,2	— 7,6	36,6	0	0	0
64.....	— 2,5	30,0	— 4,2	35,2	»	»	»
65.....	— 6,2	32,0	— 7,2	37,5	»	»	»
66.....	— 10,0	30,2	— 11,7	35,4	»	»	»
67.....	— 13,0	27,0	— 15,2	31,6	»	»	»
68.....	— 14,0	28,2	— 16,4	33,0	— 13,5	24,7	— 16,2
69.....	— 4,3	29,5	— 5,0	34,6	— 5,0	24,0	— 6,2
1770.....	— 7,2	28,0	— 8,0	33,8	— 7,0	28,0	— 8,7
71.....	— 11,5	28,0	— 13,5	33,8	— 10,2	27,0	— 12,7
72.....	— 4,5	29,5	— 5,3	34,6	— 6,8	28,5	— 8,5
73.....	— 8,5	31,5	— 9,9	36,9	— 8,0	27,8	— 9,9
74.....	— 7,0	27,0	— 8,2	31,6	— 6,5	25,5	— 8,1
75.....	— 8,0	28,0	— 9,4	33,4	— 8,5	27,8	— 10,5
76.....	— 16,3	26,5	— 19,1	31,1	— 15,1	27,5	— 18,8
77.....	— 6,5	28,9	— 7,6	33,9	— 9,0	27,0	— 11,2
78.....	— 4,7	29,0	— 5,5	34,0	— 5,6	25,5	— 7,0
79.....	— 8,5	27,5	— 10,0	32,2	— 7,5	27,0	— 9,3
1780.....	— 8,5	28,0	— 10,0	33,8	— 6,8	27,0	— 8,5
81.....	— 5,7	27,5	— 6,7	32,2	— 5,5	26,0	— 6,8
82.....	— 10,0	31,0	— 11,7	36,3	— 11,0	26,7	— 13,7
83.....	— 14,0	29,0	— 16,4	34,0	— 4,3	27,8	— 5,4
84.....	— 11,7	24,0	— 13,7	28,1	— 15,0	25,5	— 18,7
85.....	— 8,5	22,5	— 10,0	26,4	— 10,0	25,7	— 12,4
86.....	»	»	»	»	— 8,8	24,8	— 10,8
87.....	»	»	»	»	— 6,9	»	— 8,6
1791.....	»	»	»	»	»	26,0	— 5,0
92.....	»	»	»	»	— 11,8	22,4	— 14,8
93.....	»	»	»	»	— 5,5	27,3	— 6,9
94.....	»	»	»	»	— 6,3	27,7	— 7,9
95.....	»	»	»	»	— 16,0	23,2	— 20,0
96.....	»	»	»	»	— 6,2	26,4	— 7,8

(1) Les chiffres de Cotte, réduits en centigrades, sont diminués de $\frac{1}{1,8}$.

TABLEAU VII. — *Nombre de jours de gelée et de jours sans dégel à Montmorency.*

Totaux de la saison froide : A, jours de gelée; B, jours sans dégel; C, D, jours sans dégel consécutifs.

	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	A.	B.	C.	D.
1767-68.....	» »	0 »	16 11	10 8	4 0	0 0	0 »	30	19	20	10
68-69.....	» »	3 »	8 4	11 3	6 0	7 0	3 »	38	7	6	4
69-70.....	3 »	7 2	8 4	13 5	11 1	17 2	1 »	62	14	15	8
1770-71.....	» »	2 »	2 0	18 9	8 3	15 0	6 »	51	12	13	8
71-72.....	» »	8 »	2 0	22 6	4 0	2 »	3 »	41	6	12	4
72-73.....	» »	0 »	12 4	9 2	18 4	10 »	3 »	52	10	13	4
73-74.....	» »	3 »	1 0	13 1	10 2	3 »	0 »	30	3	7	2
74-75.....	» »	11 7	9 5	5 1	1 0	4 »	0 »	30	13	10	4
75-76.....	» »	6 »	9 1	24 21	2 1	3 »	1 »	45	23	24	10
76-77.....	1 »	4 »	8 2	19 6	19 2	6 »	7 »	64	10	11	4
77-78.....	3 »	4 »	21 9	19 9	16 2	5 »	1 »	69	20	16	4
78-79.....	2 »	0 »	4 1	23 12	1 0	1 »	0 »	31	13	6	6
79-80.....	» »	2 »	7 0	21 15	15 3	0 »	2 »	47	18	15	7
1780-81.....	» »	7 »	18 12	16 5	3 0	0 »	0 »	44	17	12	5
81-82.....	» »	4 1	4 1								
90-91.....				4 0	5 0	2 0	0 0				
91-92.....	3 »	12 »	10 2	11 4	11 6	5 3	1 »	53	15	9	6
92-93.....	» »	8 2	8 2	21 12	3 0	4 0	3 »	47	16	10	6
93-94.....	» »	1 »	7 2	18 10	1 0	0 0	0 »	27	12	14	3
94-95.....	» »	3 »	15 11	28 23	12 3	5 0	0 »	63	37	19	14
95-96.....	» »	4 »	4 0	0 0	6 2	11 4	0 »	25	6	15	4
96-97.....	» »	2 »	19 11	5 5	9 2	9 0	0 »	41	18	7	5
1797-98.....	» »	1 »	0 0	7 4							
Sommes.....								893	289	254	118
Moyennes.....								14,7	14,5	12,7	5,9

Nota. — Dans le nombre de jours de gelée de 1770, figurent 2 jours de gelée en mai qui ne se trouvent pas dans le Tableau.

TABLEAU VIII. — *Nombre de jours de gelée à Choisy-le-Roi et à l'Observatoire.*

	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Année.	
									Choisy.	Paris.
1860-61....	»	12	17	27	12	4	1	»	71	55
61-62....	»	9	15	15	8	4	4	»	55	48
62-63....	1	9	5	4	19	8	1	»	47	31
63-64....	»	8	9	21	17	6	2	»	63	43
64-65....	1	7	23	15	11	18	0	»	75	56
65-66....	»	5	17	9	6	6	0	»	43	23
66-67....	1	7	10	17	3	11	0	»	49	38
67-68....	»	11	21	17	13	5	1	»	68	48
68-69....	»	11	2	15	6	15	0	»	49	33
1869-70....	5	6	15	14	21	10	2	1	74	51
Totaux...	8	73	117	127	104	83	10	1	594	423

A Choisy-le-Roi, 20 décembre 1859, à 8^h matin, minimum : — 21°,7; à l'Observatoire : — 16°,2.
Choisy, 5 décembre 1869, au lever du Soleil : — 12°,1; à l'Observatoire, minimum : — 6°,2.

✓ SUR LE CALCUL

DE LA

VARIATION ANNUELLE DES ÉLÉMENTS MÉTÉOROLOGIQUES,

PAR M. ALFRED ANGOT.

On a souvent besoin, en Météorologie, pour certaines recherches, de représenter la variation annuelle d'un élément quelconque, pression atmosphérique, température, humidité, etc., par une formule telle que

$$(1) \quad h = m + b_1 \sin x + c_1 \cos x + b_2 \sin 2x + c_2 \cos 2x + b_3 \sin 3x + \dots;$$

h est la valeur de l'élément considéré à une époque de l'année x comptée en angles depuis le 1^{er} janvier à minuit, à raison de 360° pour l'année entière; $m, b_1, c_1, b_2, c_2, \dots$ sont des coefficients qui varient d'une station à l'autre et qui, une fois connus, permettent de déterminer la valeur de h à une époque quelconque. En posant

$$\alpha_n = \sqrt{b_n^2 + c_n^2}, \quad \tan \varphi_n = \frac{-b_n}{c_n},$$

la formule (1) prend la forme

$$(2) \quad h = m + \alpha_1 \cos(x + \varphi_1) + \alpha_2 (\cos 2x + \varphi_2) + \alpha_3 \cos(3x + \varphi_3) + \dots,$$

qui est le plus généralement usitée; c'est la série de Fourier ou de Bessel, au moyen de laquelle l'oscillation considérée est représentée par une série d'oscillations harmoniques, dont les diverses périodes ont pour durée, par rapport à celle de l'oscillation considérée, respectivement les valeurs $1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots$.

La détermination des coefficients $m, b_1, c_1, b_2, c_2, \dots$ n'offrirait aucune difficulté si l'on connaissait *a priori* plusieurs valeurs $h_1, h_2, h_3, \dots$ de la fonc-

tion correspondant aux époques $x_1, x_2, x_3, \dots$. On aurait, en effet, directement un certain nombre d'équations de condition du premier degré qui pourraient être résolues par les méthodes connues, méthode des moindres carrés, méthode de Cauchy, etc.

Mais ce n'est pas ainsi que le problème se présente d'ordinaire en Météorologie; le plus souvent, en effet, on a, pour déterminer les paramètres de l'équation (1), non pas les valeurs que prend directement la fonction h à différentes époques, mais les valeurs moyennes de cette fonction pour certains intervalles et, en particulier, les douze moyennes mensuelles. Comme le calcul est alors long et compliqué, nous croyons être utile aux météorologistes en donnant deux méthodes qui permettent d'arriver rapidement au résultat.

Première méthode.

Si l'on appelle $H_{1,2}$ la valeur moyenne de h pendant l'intervalle de temps compris entre les époques x_1 et x_2 , on a

$$H_{1,2} = \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} h dx$$

ou

$$(3) \quad \left\{ \begin{aligned} H_{1,2} = & m + \frac{1}{x_2 - x_1} [c_1(\sin x_2 - \sin x_1) - b_1 \cos(x_2 - \cos x_1)] \\ & + \frac{1}{2(x_2 - x_1)} [c_2(\sin 2x_2 - \sin 2x_1) - b_2(\cos 2x_2 - \cos 2x_1)] \\ & + \frac{1}{3(x_2 - x_1)} [c_3(\sin 3x_2 - \sin 3x_1) - b_3 \cos(3x_2 - \cos 3x_1)] + \dots \end{aligned} \right.$$

Les mois ayant des longueurs inégales, il est indispensable d'abord de connaître les valeurs angulaires de x qui correspondent au commencement de chaque mois. Pour cela, nous supposons que l'année comprend exactement $365^{\text{d}}, 24$; l'intervalle d'un jour a donc comme valeur angulaire

$$\frac{360^\circ}{365,24} = 0^\circ,985653.$$

Les mois de 31 jours : janvier, mars, mai, juillet, août, octobre et décembre, ont ainsi, en angle, une valeur de $30^\circ,5553$; les mois de 30 jours : avril, juin, septembre et novembre, ont une valeur angulaire de $29^\circ,5696$; enfin le mois de février, qui compte en moyenne $28^{\text{d}}, 24$, a une valeur angulaire de $27^\circ,8349$.

Le commencement de chaque mois correspond alors aux valeurs angulaires suivantes :

Janvier.....	0°. 0'. 0"	Juillet.....	178°. 38'. 23"
Février.....	30. 33. 19	Août.....	209. 11. 42
Mars.....	58. 23. 24	Septembre.....	239. 45. 1
Avril.....	88. 56. 43	Octobre.....	269. 19. 12
Mai.....	118. 30. 54	Novembre.....	299. 52. 31
Juin.....	149. 4. 13	Décembre.....	329. 26. 41

Quant aux valeurs de $x_2 - x_1$, qui figurent dans la formule (3), elles sont respectivement :

$$\text{Pour les mois de 31 jours..... } \pi \times \frac{30,5553}{180} = 0,533290$$

$$\text{Pour les mois de 30 jours..... } \pi \times \frac{29,5696}{100} = 0,516087$$

$$\text{Pour février..... } \pi \times \frac{27,8349}{180} = 0,485810$$

Avec ces données, il est facile de calculer les coefficients de l'équation (3) pour chaque mois; si I est la moyenne de l'élément considéré pour le mois de janvier, II la moyenne de février, ..., XII la moyenne de décembre, les équations de condition pour le calcul des paramètres $m, b_1, c_1, b_2, c_2, \dots$ deviennent :

$$\begin{aligned}
 (1) \quad & m + 0,2604 b_1 + 0,9533 c_1 + 0,4846 b_2 + 0,8209 c_2 + 0,6432 b_3 + 0,6248 c_3 + 0,7187 b_4 + 0,3966 c_4 = \text{I}, \\
 & m + 0,6937 b_1 + 0,7066 c_1 + 0,9610 b_2 + 0,0177 c_2 + 0,6638 b_3 - 0,6281 c_3 + 0,0313 b_4 - 0,8493 c_4 = \text{II}, \\
 & m + 0,9484 b_1 + 0,2779 c_1 + 0,5145 b_2 - 0,8025 c_2 - 0,5883 b_3 - 0,6767 c_3 - 0,7460 b_4 + 0,3426 c_4 = \text{III}, \\
 & m + 0,9606 b_1 - 0,2347 c_1 - 0,4409 b_2 - 0,8485 c_2 - 0,6796 b_3 + 0,5947 c_3 + 0,6806 b_4 + 0,4780 c_4 = \text{IV}, \\
 & m + 0,7133 b_1 - 0,6839 c_1 - 0,9524 b_2 - 0,0402 c_2 + 0,5927 b_3 + 0,6729 c_3 + 0,0691 b_4 - 0,8180 c_4 = \text{V}, \\
 & m + 0,2750 b_1 - 0,9499 c_1 - 0,5108 b_2 + 0,8083 c_2 + 0,6757 b_3 - 0,5992 c_3 - 0,7512 b_4 + 0,3570 c_4 = \text{VI}, \\
 & m - 0,2377 b_1 - 0,9592 c_1 + 0,4451 b_2 + 0,8430 c_2 - 0,5971 b_3 - 0,6690 c_3 + 0,6779 b_4 + 0,4629 c_4 = \text{VII}, \\
 & m - 0,6923 b_1 - 0,7052 c_1 + 0,9531 b_2 + 0,0175 c_2 - 0,6513 b_3 + 0,6163 c_3 + 0,0302 b_4 - 0,8203 c_4 = \text{VIII}, \\
 & m - 0,9531 b_1 - 0,2637 c_1 + 0,4915 b_2 - 0,8202 c_2 + 0,6228 b_3 + 0,6539 c_3 - 0,7333 b_4 + 0,3923 c_4 = \text{IX}, \\
 & m - 0,9563 b_1 + 0,2491 c_1 - 0,4650 b_2 - 0,8322 c_2 + 0,6473 b_3 - 0,6206 c_3 + 0,6991 b_4 + 0,4303 c_4 = \text{X}, \\
 & m - 0,7034 b_1 + 0,6951 c_1 - 0,9561 b_2 - 0,0113 c_2 - 0,6271 b_3 - 0,6498 c_3 + 0,0198 b_4 - 0,8314 c_4 = \text{XI}, \\
 & m - 0,2604 b_1 + 0,9533 c_1 - 0,4846 b_2 + 0,8209 c_2 - 0,6432 b_3 + 0,6248 c_3 - 0,7187 b_4 + 0,3966 c_4 = \text{XII}.
 \end{aligned}$$

Telles sont les équations fondamentales qui permettront de calculer la formule qui représente la variation annuelle d'un élément météorologique, étant données les douze moyennes mensuelles de cet élément. Nous avons poussé ces équations jusqu'aux termes du quatrième ordre, ce qui suffit dans tous les cas possibles; le plus souvent même on peut limiter le développement aux termes des trois premiers ordres.

Le calcul de ces équations par la méthode de Cauchy ou par celle des moindres carrés est extrêmement long; on peut arriver beaucoup plus rapidement au résultat par approximations successives, en opérant de la manière suivante.

Si l'on fait la somme des douze équations d'abord telles qu'elles sont données plus haut, puis en changeant les signes de façon que, successivement, les coeffi-

cients de b_1 , de c_1 , de b_2 , ... deviennent tous positifs, on obtient les équations

$$\begin{aligned}
 (5) \quad & \left\{ \begin{aligned}
 12m + 0,0482b_1 + 0,0387c_1 + 0,0400b_2 - 0,0266c_2 + 0,0589b_3 - 0,0560c_3 - 0,0225b_4 - 0,0627c_4 &= (1), \\
 0 + 7,6546b_1 + 0,0999c_1 + 0,0720b_2 - 0,0620c_2 + 2,5561b_3 + 0,0328c_3 + 0,0275b_4 - 0,1235c_4 &= (2), \\
 0 - 0,0834b_1 + 7,6319c_1 + 0,0688b_2 + 0,0536c_2 + 0,1325b_3 - 2,5952c_3 + 0,0309b_4 - 0,1665c_4 &= (3), \\
 0 - 0,0094b_1 - 0,0193c_1 + 7,6596b_2 + 0,1794c_2 + 0,1273b_3 - 0,1016c_3 - 0,0199b_4 - 0,0877c_4 &= (4), \\
 0 + 0,0292b_1 - 0,0409c_1 + 3,6568b_2 + 6,6832c_2 + 0,1233b_3 - 0,0048c_3 - 0,0011b_4 - 0,0503c_4 &= (5), \\
 0 + 0,0178b_1 - 0,0157c_1 - 0,0222b_2 - 0,0648c_2 + 7,6321b_3 + 0,0634c_3 + 0,0899b_4 - 0,1195c_4 &= (6), \\
 0 + 0,0088b_1 - 0,0005c_1 + 0,0626b_2 - 0,0726c_2 - 0,2897b_3 + 7,6308c_3 + 0,1157b_4 + 0,1131c_4 &= (7), \\
 4m + 0,0284b_1 + 0,0035c_1 + 0,0188b_2 - 0,0396c_2 - 0,0751b_3 - 0,0616c_3 + 5,8759b_4 - 3,0397c_4 &= (8), \\
 4m + 0,0256b_1 + 0,0135c_1 + 0,0288b_2 + 0,0060c_2 + 0,1027b_3 - 0,0786c_3 - 0,3233b_4 + 6,5753c_4 &= (9),
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

avec

$$\begin{aligned}
 (1) &= I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX + X + XI + XII, \\
 (2) &= I + II + III + IV + V + VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII, \\
 (3) &= I + II + III - IV - V - VI - VII - VIII - IX + X + XI + XII, \\
 (4) &= I + II + III - IV - V - VI + VII + VIII + IX - X - XI - XII, \\
 (5) &= I + II - III - IV - V + VI + VII + VIII - IX - X - XI + XII, \\
 (6) &= I + II - III - IV + V + VI - VII - VIII + IX + X - XI - XII, \\
 (7) &= I - II - III - IV + V - VI - VII + VIII + IX - X - XI + XII, \\
 (8) &= I + II - III + IV + V - VI + VII + VIII - IX + X + XI - XII, \\
 (9) &= I - II + III + IV - V + VI + VII - VIII + IX + X - XI + XII.
 \end{aligned}$$

Les équations (5) sont faciles à résoudre par approximations successives, car dans chacune d'elles le coefficient d'une des inconnues successivement est grand par rapport aux coefficients des autres inconnues. On mettra alors ces équations sous la forme

$$\begin{aligned}
 (5 \text{ bis}) \quad & \left\{ \begin{aligned}
 12m &= (1) - 0,0482b_1 - 0,0387c_1 - 0,0400b_2 + 0,0266c_2, \\
 &\quad - 0,0589b_3 + 0,0560c_3 + 0,0225b_4 + 0,0627c_4, \\
 7,6546b_1 &= (2) - 0,0999c_1 - 0,0720b_2 + 0,0620c_2, \\
 &\quad - 2,5561b_3 - 0,0328c_3 - 0,0275b_4 + 0,01235c_4, \\
 7,6319c_1 &= (3) + 0,0834b_1 - 0,0688b_2 - 0,0536c_2, \\
 &\quad - 0,1325b_3 + 2,5952c_3 - 0,0309b_4 + 0,1665c_4, \\
 7,6596b_2 &= (4) + 0,0094b_1 + 0,0193c_1 - 0,1794c_2, \\
 &\quad - 0,1273b_3 + 0,1016c_3 + 0,0199b_4 + 0,0877c_4, \\
 6,6832c_2 + 3,6568b_2 &= (5) - 0,0292b_1 + 0,0409c_1, \\
 &\quad - 0,1233b_3 + 0,0048c_3 + 0,0011b_4 + 0,0503c_4, \\
 7,6321b_3 &= (6) - 0,0178b_1 + 0,0157c_1 + 0,0222b_2 + 0,0648c_2, \\
 &\quad - 0,0634c_3 - 0,0899b_4 + 0,1195c_4, \\
 7,6308c_3 &= (7) - 0,0088b_1 + 0,0005c_1 - 0,0626b_2 + 0,0726c_2, \\
 &\quad + 0,2897b_3 - 0,1157b_4 - 0,1131c_4, \\
 5,8759b_4 + 4m - 3,0397c_4 &= (8) - 0,0284b_1 - 0,0035c_1 - 0,0188b_2 + 0,0396c_2, \\
 &\quad + 0,0751b_3 + 0,0616c_3, \\
 6,5753c_4 + 4m &= (9) - 0,0256b_1 - 0,0135c_1 - 0,0288b_2 - 0,0060c_2, \\
 &\quad - 0,1027b_3 + 0,0786c_3 + 0,3233b_4.
 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

En négligeant dans les seconds membres tous les termes à l'exception du premier, qui est connu, les équations (5 bis) donneront immédiatement une première valeur des inconnues; on portera cette valeur dans les seconds membres et l'on résoudra de nouveau les équations, et ainsi de suite; trois approximations au plus suffiront pour donner les valeurs des inconnues avec toute l'exactitude désirable.

Nous donnerons, comme exemple, le calcul de la formule de la variation annuelle de la température à Genève, d'après les observations des cinquante années 1826-1875, en nous arrêtant aux termes du troisième ordre. Les moyennes mensuelles de la température sont les suivantes :

Janvier.....	I = — 0,079	Juillet.....	VII = 18,807
Février.....	II = + 1,598	Août.....	VIII = 17,910
Mars.....	III = 4,597	Septembre.....	IX = 14,659
Avril.....	IV = 8,967	Octobre.....	X = 9,879
Mai.....	V = 13,197	Novembre.....	XI = 4,552
Juin.....	VI = 16,809	Décembre.....	XII = 0,800

De ces nombres on déduit d'abord, comme nous l'avons indiqué plus haut, les valeurs

(1) = + 111,696	(5) = — 0,006
(2) = — 21,518	(6) = + 0,430
(3) = — 69,002	(7) = — 0,788
(4) = + 3,288	

En les portant dans les équations (5 bis), puis résolvant par approximations successives, on obtient pour les inconnues les valeurs suivantes :

	Première approximation.	Deuxième approximation.	Troisième approximation.
m	+ 9,308	+ 9,346	+ 9,346
b_1	— 2,811	— 2,717	— 2,713
c_1	— 9,041	— 9,110	— 9,109
b_2	+ 0,429	+ 0,406	+ 0,407
c_2	— 0,236	— 0,267	— 0,268
b_3	+ 0,056	+ 0,045	+ 0,044
c_3	— 0,103	— 0,104	— 0,105

Les nombres fournis par la première approximation sont évidemment erronés, puisqu'ils ont été obtenus en réduisant simplement les seconds membres des équations (5 bis) à leur premier terme; mais on voit que, dès la seconde approximation, on obtient des nombres exacts, puisque l'on ne peut guère compter sur plus du centième de degré.

Deuxième méthode.

La deuxième méthode consiste à déduire directement, des douze moyennes mensuelles, les valeurs vraies de l'élément considéré à douze époques équidistantes qui correspondent aux valeurs suivantes de x : 15° , 45° , 75° , 105° , 135° , 165° , 195° , 225° , 255° , 285° , 315° et 345° , c'est-à-dire au milieu des douze mois supposés égaux.

Soient A, B, C les valeurs moyennes fournies par l'observation de l'élément considéré pour trois mois consécutifs dont le commencement et la fin correspondent respectivement aux valeurs angulaires x_1 , x_2 , x_3 et x_4 , valeurs que nous avons indiquées précédemment (p. B. 229), pour tous les mois de l'année moyenne. On peut supposer sans erreur notable que, dans cet intervalle de trois mois seulement, la marche annuelle de l'élément considéré est représentée, en fonction de l'époque x , par la formule parabolique

$$y = a + bx + cx^2.$$

Cette hypothèse ne cesserait d'être exacte que si, dans cet intervalle de trois mois, la fonction y présentait plus d'un maximum ou d'un minimum, ce qui ne paraît avoir lieu pour aucun phénomène connu. La formule parabolique donne alors, pour les moyennes A, B, C, les expressions

$$(6) \quad \begin{cases} a + \frac{b}{2}(x_2 + x_1) + \frac{c}{3}(x_2^2 + x_2x_1 + x_1^2) = A, \\ a + \frac{b}{2}(x_3 + x_2) + \frac{c}{3}(x_3^2 + x_3x_2 + x_2^2) = B, \\ a + \frac{b}{2}(x_4 + x_3) + \frac{c}{3}(x_4^2 + x_4x_3 + x_3^2) = C. \end{cases}$$

D'autre part, à une époque donnée X, voisine du milieu du mois intermédiaire, l'élément considéré a pour valeur

$$Y = a + bX + cX^2.$$

On en déduit

$$(7) \quad Y - B = b \left(X - \frac{x_3 + x_2}{2} \right) + c \left(X^2 - \frac{x_3^2 + x_3x_2 + x_2^2}{3} \right),$$

de sorte qu'en ajoutant à la valeur de B, fournie par l'observation, le second membre de l'équation (7), on a la valeur vraie Y que prend l'élément considéré à une époque donnée X.

Les équations (6) permettent de calculer aisément pour chaque mois les

valeurs de b et c , en fonction de A , B et C ; on en déduit en effet

$$\frac{x_4 - x_1}{3} c = \frac{C - B}{x_4 - x_2} - \frac{B - A}{x_3 - x_1},$$

$$\frac{x_4 - x_1}{2} b = (B - A) \frac{x_4 + x_3 + x_2}{x_3 - x_1} - (C - B) \frac{x_3 + x_2 + x_1}{x_4 - x_2}.$$

Il ne reste plus qu'à porter ces valeurs de b et c dans l'équation (7).

Si, comme précédemment, l'on désigne respectivement par I, II, ..., XII les moyennes de l'élément considéré pour janvier, février, ..., décembre, et par Y_{45} , Y_{45} , ..., Y_{345} les valeurs vraies de l'élément aux époques $x = 15^\circ, 45^\circ, \dots, 345^\circ$, on obtient, en effectuant tous les calculs, les équations suivantes :

$$(8) \quad \left\{ \begin{array}{l} \Delta(I) = Y_{15} - I = +0,0385(I - XII) - 0,0498(II - I), \\ \Delta(II) = Y_{45} - II = +0,0462(II - I) - 0,0281(III - II), \\ \Delta(III) = Y_{75} - III = +0,0677(III - II) - 0,0214(IV - III), \\ \Delta(IV) = Y_{105} - IV = +0,0603(IV - III) - 0,0181(V - IV), \\ \Delta(V) = Y_{135} - V = +0,0626(V - IV) - 0,0224(VI - V), \\ \Delta(VI) = Y_{165} - VI = +0,0584(VI - V) - 0,0203(VII - VI), \\ \Delta(VII) = Y_{195} - VII = +0,0604(VII - VI) - 0,0240(VIII - VII), \\ \Delta(VIII) = Y_{225} - VIII = +0,0505(VIII - VII) - 0,0338(IX - VIII), \\ \Delta(IX) = Y_{255} - IX = +0,0477(IX - VIII) - 0,0322(X - IX), \\ \Delta(X) = Y_{285} - X = +0,0499(X - IX) - 0,0365(XI - X), \\ \Delta(XI) = Y_{315} - XI = +0,0457(XI - X) - 0,0344(XII - XI), \\ \Delta(XII) = Y_{345} - XII = +0,0474(XII - XI) - 0,0376(I - XII). \end{array} \right.$$

Ces équations donnent immédiatement la correction Δ qu'il faut faire subir à la moyenne d'un mois quelconque pour en déduire la valeur vraie de l'élément considéré aux époques indiquées.

Appliquons ce calcul aux nombres que nous avons donnés plus haut (p. B.231) pour les températures moyennes de Genève; on a

$$\begin{array}{ll} I - XII = -0,879, & VII - VI = +1,998, \\ II - I = +1,677, & VIII - VII = -0,897, \\ III - II = +2,999, & IX - VIII = -3,251, \\ IV - III = +4,370, & X - IX = -4,780, \\ V - IV = +4,230, & XI - X = -5,327, \\ VI - V = +3,612, & XII - XI = -3,752. \end{array}$$

D'où l'on déduit, au moyen des formules (8),

$$\begin{array}{ll} \Delta(I) = -0,127, & \Delta(VII) = +0,142, \\ \Delta(II) = -0,007, & \Delta(VIII) = +0,065, \\ \Delta(III) = +0,110, & \Delta(IX) = -0,001, \\ \Delta(IV) = +0,187, & \Delta(X) = -0,044, \\ \Delta(V) = +0,184, & \Delta(XI) = -0,114, \\ \Delta(VI) = +0,170, & \Delta(XII) = -0,145 \end{array}$$

et, par suite,

$$\begin{array}{ll} Y_{15} = -0,206, & Y_{195} = 18,949, \\ Y_{45} = +1,591, & Y_{225} = 17,975, \\ Y_{75} = 4,707, & Y_{255} = 14,658, \\ Y_{105} = 9,154, & Y_{285} = 9,835, \\ Y_{135} = 13,381, & Y_{315} = 4,438, \\ Y_{165} = 16,979, & Y_{345} = 0,655. \end{array}$$

Les équations qui donnent les coefficients $b_1, c_1, b_2, c_2, \dots$, sont dans le cas où l'on connaît ainsi douze valeurs de la fonction correspondant à douze époques équidistantes, $15^\circ, 45^\circ, \dots, 345^\circ$,

$$(9) \quad \left\{ \begin{array}{l} m + 0,2588b_1 + 0,9659c_1 + 0,5b_2 + 0,866c_2 + 0,7071b_3 + 0,7071c_3 = Y_{15}, \\ m + 0,7071b_1 + 0,7071c_1 + 1,0b_2 \quad 0 \quad + 0,7071b_3 - 0,7071c_3 = Y_{45}, \\ m + 0,9659b_1 + 0,2588c_1 + 0,5b_2 - 0,866c_2 - 0,7071b_3 - 0,7071c_3 = Y_{75}, \\ m + 0,9659b_1 - 0,2588c_1 - 0,5b_2 - 0,866c_2 - 0,7071b_3 + 0,7071c_3 = Y_{105}, \\ m + 0,7071b_1 - 0,7071c_1 - 1,0b_2 \quad 0 \quad + 0,7071b_3 + 0,7071c_3 = Y_{135}, \\ m + 0,2588b_1 - 0,9659c_1 - 0,5b_2 + 0,866c_2 + 0,7071b_3 - 0,7071c_3 = Y_{165}, \\ m - 0,2588b_1 - 0,9659c_1 + 0,5b_2 + 0,866c_2 - 0,7071b_3 - 0,7071c_3 = Y_{195}, \\ m - 0,7071b_1 - 0,7071c_1 + 1,0b_2 \quad 0 \quad - 0,7071b_3 + 0,7071c_3 = Y_{225}, \\ m - 0,9659b_1 - 0,2588c_1 + 0,5b_2 - 0,866c_2 + 0,7071b_3 + 0,7071c_3 = Y_{255}, \\ m - 0,9659b_1 + 0,2588c_1 - 0,5b_2 - 0,866c_2 + 0,7071b_3 - 0,7071c_3 = Y_{285}, \\ m - 0,7071b_1 + 0,7071c_1 - 1,0b_2 \quad 0 \quad - 0,7071b_3 - 0,7071c_3 = Y_{315}, \\ m - 0,2588b_1 + 0,9659c_1 - 0,5b_2 + 0,866c_2 - 0,7071b_3 + 0,7071c_3 = Y_{345}. \end{array} \right.$$

Les valeurs de $m, b_1, c_1, b_2, c_2, \dots$ se calculent aisément au moyen des formules connues

$$12m = Y_{15} + Y_{45} + Y_{75} + \dots + Y_{345},$$

$$\begin{aligned} 6b_1 &= 0,2588Y_{15} + 0,7071Y_{45} + 0,9659Y_{75} + \dots - 0,2588Y_{345}, \\ 6c_1 &= 0,9659Y_{15} + 0,7071Y_{45} + 0,2588Y_{75} + \dots + 0,9659Y_{345}, \\ 6b_2 &= 0,5000Y_{15} + 1,0000Y_{45} + 0,5000Y_{75} + \dots - 0,5000Y_{345}, \\ 6c_2 &= 0,8660Y_{15} + \quad 0 \quad Y_{45} - 0,8660Y_{75} + \dots + 0,8660Y_{345}, \\ 6b_3 &= 0,7071Y_{15} + 0,7071Y_{45} - 0,7071Y_{75} + \dots - 0,7071Y_{345}, \\ 6c_3 &= 0,7071Y_{15} - 0,7071Y_{45} - 0,7071Y_{75} + \dots + 0,7071Y_{345}, \\ &\dots \dots \dots \end{aligned}$$

dans lesquelles une inconnue quelconque b_n ou c_n s'obtient en divisant par 6 la somme des produits des valeurs successives de Y par le coefficient du terme en b_n ou c_n dans l'équation correspondante.

En appliquant ces formules aux valeurs de Y données ci-dessus pour Genève, on obtient

$$m = 9^\circ,343,$$

$$\begin{array}{ll} b_1 = -2,711, & c_1 = -9,096, \\ b_2 = +0,415, & c_2 = -0,285, \\ b_3 = +0,042, & c_3 = -0,104. \end{array}$$

La différence entre ces valeurs et celles que nous avons trouvées par la première méthode est de quelques millièmes de degré seulement, c'est-à-dire bien inférieure à l'erreur probable de ces coefficients; on pourra donc employer indifféremment l'une ou l'autre des deux méthodes, suivant les commodités du calcul.

Transformation des formules en fonction des coordonnées du Soleil.

Les formules (1) et (2) représentent la marche annuelle des éléments météorologiques en prenant comme variable l'arc x parcouru sur l'écliptique, depuis le 1^{er} janvier à minuit, par un soleil fictif ou soleil moyen, qui se mouvrait sur une circonférence avec une vitesse constante. Dans certains problèmes, il peut être avantageux de prendre comme variable la position réelle du Soleil sur l'écliptique. On peut alors faire le changement de variable de la manière suivante.

Désignons par m l'*anomalie moyenne*, ou arc parcouru à un moment donné par le Soleil moyen à partir du périhélie; par v l'*anomalie vraie*, ou distance angulaire réelle au même moment du Soleil vrai au périhélie, par e l'excentricité de l'orbite terrestre et par E un angle auxiliaire.

Les formules connues du mouvement elliptique sont

$$\operatorname{tang} \frac{1}{2} v = \sqrt{\frac{1+e}{1-e}} \operatorname{tang} \frac{1}{2} E, \quad m = E - e \sin E.$$

On en déduit par un développement en série, en négligeant les puissances de e supérieures à e^4 ,

$$(10) \quad \begin{cases} v = m + (2e - \frac{1}{4}e^3) \sin m + (\frac{3}{4}e^2 - \frac{11}{24}e^4) \sin 2m + \frac{13}{12}e^3 \sin 3m + \frac{193}{96}e^4 \sin 4m, \\ m = v - 2e \sin v + \left(\frac{3}{4}e^2 + \frac{e^4}{8}\right) \sin 2v - \frac{e^3}{3} \sin 3v + \frac{5}{32}e^4 \sin 4v; \end{cases}$$

ce qui donne, en posant $e = 0,01677$,

$$(11) \quad \begin{cases} v = m + 0,0335388 \sin m + 0,0003515 \sin 2m + 0,0000051 \sin 3m, \\ m = v - 0,0335400 \sin v + 0,0002109 \sin 2v - 0,0000016 \sin 3v. \end{cases}$$

Dans ces formules, les arcs sont exprimés en fonction du rayon. Si l'on exprime les angles en degrés et fractions décimales du degré, elles deviennent

$$(11 \text{ bis}) \quad \begin{cases} v = m + 1^{\circ},92163 \sin m + 0^{\circ},02014 \sin 2m + 0^{\circ},00029 \sin 3m, \\ m = v - 1^{\circ},92170 \sin v + 0^{\circ},01208 \sin 2v - 0^{\circ},00009 \sin 3v. \end{cases}$$

De ces formules il est facile de déduire, par de nouveaux développements en séries, les valeurs de $\sin m$, $\cos m$, $\sin 2m$, $\cos 2m$ en fonction des sinus et cosinus

de l'angle ν et de ses multiples. On obtient ainsi

$$(1) \quad \left\{ \begin{array}{l} \sin m = 0,99968 \sin \nu - 0,01677 \sin 2\nu + 0,00025 \sin 3\nu, \\ \cos m = 0,01677 + 0,99975 \cos \nu - 0,01677 \cos 2\nu + 0,00025 \cos 3\nu, \\ \sin 2m = 0,03353 \sin \nu + 0,99887 \sin 2\nu - 0,03351 \sin 3\nu \\ \quad + 0,00078 \sin 4\nu - 0,00002 \sin 5\nu, \\ \cos 2m = 0,00035 + 0,03353 \cos \nu + 0,99887 \cos 2\nu - 0,03351 \cos 3\nu \\ \quad + 0,00078 \cos 4\nu - 0,00002 \cos 5\nu, \\ \sin 3m = 0,00095 \sin \nu + 0,05026 \sin 2\nu + 0,99746 \sin 3\nu \\ \quad - 0,05023 \sin 4\nu + 0,00159 \sin 5\nu - 0,00004 \sin 6\nu, \\ \cos 3m = 0,00001 + 0,00095 \cos \nu + 0,05026 \cos 2\nu + 0,99746 \cos 3\nu \\ \quad - 0,05023 \cos 4\nu + 0,00159 \cos 5\nu - 0,00004 \cos 6\nu. \end{array} \right.$$

L'angle m qui figure dans ces formules est compté à partir du périhélie, tandis que l'argument x de la formule (1) est compté à partir du 1^{er} janvier à minuit. Si μ est l'époque du passage du Soleil au périhélie, on a donc

$$m = x - \mu.$$

En réalité, pour l'époque actuelle, μ est à peu près négligeable; le Soleil passe en effet au périhélie le 31 décembre vers 6^h du soir, ce qui correspond à

$$\mu = -0^{\circ}, 246 = -0^{\circ}, 15'.$$

Le changement de variable de m en x , ou inversement, ne présentera donc aucune difficulté et même, dans la plupart des cas, on pourra poser $m = x$.

Pour exprimer la marche annuelle d'un élément météorologique quelconque en fonction de l'anomalie vraie du Soleil, il suffira donc, une fois l'expression (1) obtenue en fonction du temps moyen, d'y substituer les valeurs de $\sin m$, $\cos m$, $\sin 2m$, ... données par les équations (12).

Si l'on veut enfin passer de l'anomalie vraie ν , comptée à partir du périhélie, à la longitude l du Soleil, comptée à partir de l'équinoxe, il suffira de faire

$$\nu = l - l_0,$$

l_0 étant la longitude du périhélie, dont la valeur actuelle est sensiblement de $280^{\circ}, 20'$.

Telles sont les formules qui permettront de prendre pour variables le temps moyen, l'anomalie moyenne, l'anomalie vraie ou la longitude du Soleil, et de passer à volonté d'un de ces systèmes dans les autres.

ÉTUDE
SUR LA
MARCHE DIURNE DU BAROMÈTRE,

PAR M. ALFRED ANGOT.

I. — Introduction. Méthodes de calcul.

La marche diurne du baromètre a été déjà l'objet de nombreux travaux ; indépendamment des recherches théoriques, sur lesquelles je reviendrai plus tard, je me bornerai à signaler ici, parmi les Mémoires où l'on trouve le plus de documents, celui de M. Rykatchef ⁽¹⁾, qui a donné la marche diurne du baromètre mois par mois pour 22 stations, mais dont plusieurs ne fournissent peut-être pas une période d'observation suffisamment longue. Dans le présent travail, je me suis proposé d'abord de réunir et de publier les documents qui sont parvenus à ma connaissance pour toutes les stations où la période d'observation comprend au moins cinq années. Ces documents ont été ensuite discutés ; j'ai essayé, enfin, d'en déduire quelques indications sur la cause, ou plutôt sur les causes de ce phénomène si remarquable.

J'indiquerai tout d'abord le mode de calcul que j'ai adopté dans la préparation de tous les documents :

Pour une première série de stations, on a publié heure par heure les résultats de l'observation du baromètre. Dans ce cas, les moyennes de chaque mois ont été calculées pour chaque heure, au centième de millimètre, en ayant soin de calculer séparément les deux moyennes du minuit qui commence et du minuit qui finit la journée. Ces 25 moyennes horaires obtenues, on les a groupées mois par mois, et l'on a calculé les moyennes horaires générales des douze mois pour toute la période d'observation, en additionnant les moyennes obtenues à chaque

⁽¹⁾ *La marche diurne du baromètre...* ; par M. Rykatchef (*Repertorium für Meteorologie*, t. VI. Saint-Petersbourg ; 1879).

heure pour ce même mois, dans toutes les années, et divisant par le nombre d'années d'observation, nombre qui est toujours au moins de 5. Ces moyennes horaires générales ont été calculées au millième de millimètre. On a ensuite réparti sur tous ces nombres la différence entre les moyennes des deux minuits qui commencent et finissent la journée, de façon à éliminer l'influence de la variation annuelle.

Par exemple, si au minuit qui finit la journée le baromètre est plus haut de la quantité ε qu'au minuit qui la commence, on a ajouté à la moyenne obtenue directement pour une heure quelconque m comptée de 0 à 24, depuis minuit, la correction

$$\varepsilon \frac{12 - m}{24}.$$

Cette correction est ainsi nulle pour midi ($m = 12$); positive et décroissante dans la première moitié de la journée, depuis minuit jusqu'à midi, et négative dans la deuxième moitié de la journée.

Toutes les valeurs horaires étant ainsi corrigées de la variation non périodique, on a calculé, toujours au millième de millimètre, la moyenne diurne, en divisant par 24 la somme des 24 observations horaires depuis 0^h (minuit) jusqu'à 23^h (11^h du soir). Cette moyenne diurne a été ensuite retranchée de chaque moyenne horaire, ce qui a fourni l'écart de la pression moyenne de chaque heure à la moyenne diurne. Dans l'évaluation de ces écarts, on n'a pas été plus loin que le centième de millimètre; mais, comme les calculs ont été faits avec une décimale de plus, le dernier chiffre conservé est toujours exact à moins d'une demi-unité près, et la somme des écarts positifs est, en valeur absolue, égale à la somme des écarts positifs à 2 ou 3 centièmes de millimètre près, résultat qui n'aurait pas été obtenu si tous les calculs antérieurs n'avaient été poussés qu'au centième de millimètre.

Une série d'autres stations ne fournissent que des observations faites toutes les trois heures; dans ce cas, on a commencé par calculer les moyennes générales horaires pour chaque mois, et on les a corrigées de la variation non périodique, comme il a été expliqué précédemment. Puis, pour obtenir les valeurs pour les heures intermédiaires, au lieu d'opérer directement par la méthode graphique, qui aurait pu donner quelques incertitudes, on a adopté le procédé suivant. On a pris la différence entre la pression moyenne aux diverses heures d'observation de la station donnée et la pression moyenne, aux mêmes heures, d'une autre station où les observations sont faites toutes les heures, et qui se présente, autant que possible, dans des conditions analogues de climat et de latitude. On a interpolé ensuite par une construction graphique les valeurs probables de cette différence pour toutes les heures où les observations font défaut dans la station étudiée. En ajoutant ces différences aux pressions obser-

vées dans la station de comparaison, on a obtenu les valeurs probables de la pression pour toutes les heures dans la station étudiée. On ne s'est pas contenté de cette unique détermination; on l'a toujours contrôlée, en recommençant avec d'autres stations de comparaison et en prenant ensuite la moyenne des résultats, de sorte que les valeurs de la pression pour les heures où les observations font défaut ont toujours été obtenues au moins par comparaison avec trois stations.

Cette méthode d'interpolation par les différences des pressions observées en deux stations présente sur la méthode d'interpolation graphique ordinaire les avantages suivants :

1° L'interpolation graphique ordinaire ne donne aucune vérification, et les lacunes entre les heures d'observation sont comblées par une interpolation unique. Au contraire, la construction de la courbe des différences de pression peut être répétée avec plusieurs stations de comparaison; on a donc ainsi, pour les valeurs probables des observations manquantes, plusieurs nombres qui se contrôlent et dont on prend la moyenne.

2° Les courbes des différences de pression entre deux stations analogues ont une amplitude totale beaucoup moindre que la courbe même de la variation diurne et, par suite, leur construction donne lieu à moins d'incertitude. Le plus souvent, en effet, l'amplitude totale des courbes des différences de pression ne dépasse pas $0^{\text{mm}},2$ ou $0^{\text{mm}},3$, tandis que la courbe de la variation diurne peut, dans certaines stations, avoir une amplitude totale de 2^{mm} ou même de 3^{mm} .

3° Enfin on n'a, *a priori*, aucune idée de la forme des courbes des différences de pression entre deux stations, et, par suite, on n'a à redouter dans leur tracé aucun parti pris. Dans la courbe de la variation diurne elle-même, on pourrait, au contraire, se laisser aller, même involontairement, à placer, par exemple, les maxima et les minima aux heures où on les observe d'ordinaire dans les autres stations.

Un exemple, choisi parmi les plus défavorables, montrera bien toute l'exactitude de cette méthode. Les valeurs de la pression moyenne obtenues à Perpignan pour le mois de juillet, aux huit observations quotidiennes, corrigées de la marche annuelle, sont les suivantes :

^h	^{mm}	^h	^{mm}
0 (minuit).....	761,22	12 (midi).....	761,00
3.....	60,99	15.....	60,39
6.....	61,24	18.....	60,19
9.....	61,35	21.....	61,00

Pour interpoler les valeurs de la pression aux heures intermédiaires, on a choisi à dessein, successivement, trois stations qui présentent avec Perpignan des différences climatologiques notables : Lisbonne, Saint-Maur et Greenwich.

Nous donnons ci-dessous le Tableau des valeurs horaires de la pression à Perpignan, déduites séparément des courbes des différences de pression entre Perpignan et ces trois stations :

Moyennes horaires calculées de la pression à Perpignan (juillet).

(760^{mm} +.)

Stations de comparaison.				Stations de comparaison.			
Heure.	Lisbonne.	Parc St-Maur.	Greenwich.	Heure.	Lisbonne.	Parc St-Maur.	Greenwich.
h	mm	mm	mm	h	mm	mm	mm
0.....	1,22	1,22	1,22	12.....	1,00	1,00	1,00
1.....	1,15	1,12	1,14	13.....	0,77	0,78	0,81
2.....	1,05	1,03	1,05	14.....	0,57	0,59	0,60
3.....	0,99	0,99	0,99	15.....	0,39	0,39	0,39
4.....	1,06	1,02	1,03	16.....	0,25	0,20	0,20
5.....	1,17	1,11	1,12	17.....	0,13	0,11	0,08
6.....	1,24	1,24	1,24	18.....	0,19	0,19	0,19
7.....	1,33	1,35	1,35	19.....	0,36	0,38	0,40
8.....	1,37	1,39	1,39	20.....	0,62	0,66	0,68
9.....	1,35	1,35	1,35	21.....	1,00	1,00	1,00
10.....	1,32	1,28	1,27	22.....	1,16	1,16	1,16
11.....	1,22	1,17	1,25	23.....	1,26	1,22	1,23

Comme on le voit, ces résultats sont absolument satisfaisants, et la moyenne des trois nombres donne la valeur de la pression aux heures où les observations font défaut avec une incertitude de 0^{mm},01 ou 0^{mm},02 au plus. Dans la pratique, les stations de comparaison ont été choisies d'une manière plus favorable que dans l'exemple ci-dessus, de sorte que les pressions moyennes calculées ne comportent guère d'incertitude supérieure à $\pm 0^{\text{mm}},01$.

Dans quelques cas particuliers, on a dû employer des stations qui ne fournissent que six observations par jour; la méthode d'interpolation employée pour combler les lacunes est exactement la même que celle que nous venons d'exposer, seulement les résultats offrent un degré d'exactitude un peu moindre; toutefois, les pressions moyennes calculées pour les heures où les observations font défaut sont encore certainement exactes à $\pm 0^{\text{mm}},02$ ou $\pm 0^{\text{mm}},03$ près.

Enfin, pour quelques stations dont on ne possédait les observations qu'en résumés mensuels, il n'a pas été possible d'éliminer la variation non périodique par la méthode que nous avons indiquée précédemment; on a eu recours alors au procédé suivant. On a construit, au moyen des douze valeurs moyennes de la pression pour chaque mois, la courbe qui représente la variation annuelle de la pression dans la station considérée; puis on a déterminé, sur cette courbe, la quantité ε dont la pression varie en un jour, pour le milieu de chaque mois; on a corrigé ensuite la valeur moyenne de la pression obtenue à une heure quelconque m comptée de 0 à 24 depuis minuit, en lui ajoutant la quantité

$$\varepsilon \frac{12 - m}{24}.$$

Ce mode de correction est évidemment moins exact que si l'on avait pu calculer directement la quantité ϵ par la différence des pressions moyennes au minuit qui commence et au minuit qui finit la journée; mais il est facile de s'assurer que les deux méthodes conduisent au même résultat si les moyennes sont déduites d'un nombre d'années suffisant pour que les perturbations purement accidentelles soient éliminées.

Nous ajouterons, pour terminer, qu'avant d'admettre les résultats comme définitifs, on a toujours tracé la courbe de la variation diurne de la pression pour chaque mois. Quand cette courbe présentait des oscillations irrégulières, on a vérifié de nouveau tous les calculs, ce qui a permis de retrouver un certain nombre d'erreurs.

Dans les calculs considérables qu'a nécessités le présent travail, j'ai été aidé avec beaucoup de zèle et d'intelligence par MM. Trichet et Dufour, aides météorologistes au Bureau central météorologique.

II. — Données numériques sur la variation diurne du baromètre.

Avant de publier tous les Tableaux numériques qui fournissent, mois par mois, la variation diurne du baromètre dans toutes les stations pour lesquelles nous avons pu réunir des observations, nous donnerons d'abord la liste de ces stations avec l'indication des sources auxquelles nous avons puisé, et toutes les particularités relatives à la durée de la série, aux heures d'observation et, quand il y a lieu, aux stations de comparaison qui ont été employées pour les interpolations. Toutes les fois que, dans l'indication de la source, il n'y a pas la mention : *d'après un résumé publié par ...*, les moyennes ont été calculées par nous.

1. SINGAPORE. — *Meteorological observations made at the magnetical observatory at Singapore*, Madras, 1860; cinq ans d'observations (1841-1845) faites toutes les deux heures dans les deux premières années et toutes les heures dans les trois autres; les observations qui faisaient défaut dans les deux premières années ont été interpolées graphiquement.

2. BATAVIA. — *Annals of the Batavia observatory*; dix-sept ans d'observations (1866-1882) faites toutes les heures.

3. MADRAS. — *Observations made at the magnetical and meteorological observatory at Madras*; cinq ans d'observations (1841-1845) faites toutes les heures.

4. SAINTE-HÉLÈNE (observatoire de Longwood). — Sabine, *Observations made at the magnetical and meteorological observatory at St-Helena*, London, 1847; huit ans d'observations (1840-1847) pour les huit derniers mois, sept seulement pour les quatre premiers; observations faites toutes les heures.

5. BOMBAY. — D'après un résumé publié par Chambers, *The Meteorology of Bombay*

I. — *Mémoires de 1887.*

B.31

presidency, London, 1878; vingt-cinq ans d'observations (1844 et 1847-1870) faites toutes les heures.

6. MAURICE (Royal Alfred observatory). — D'après un résumé publié dans les *Mauritius meteorological Records for 1886*; douze ans d'observations (1875-1886) faites toutes les heures; dans le Tableau auquel nous avons emprunté ces résultats, les pressions moyennes sont calculées seulement jusqu'au millième de pouce anglais; les nombres, transformés en millimètres, comportent donc une incertitude de $\pm 0^{\text{mm}},02$.

7. CALCUTTA. — D'après un résumé publié par Blandford, *On the diurnal variation of the barometer at Indian stations* (*Indian meteorological Memoirs*, vol. I); vingt et un ans d'observations (1855-1875) faites toutes les heures.

8. LA HAVANE. — *Memoria de la marcha regular... del barometro*, por el R. P. B. Viñes; dix ans d'observations (1862-1871) faites dix fois par jour toutes les deux heures depuis 4^h; les valeurs pour les heures intermédiaires ont été calculées par comparaison avec Bombay, Calcutta et Lisbonne, d'après la méthode exposée précédemment (p. B. 238).

9. ALLAHABAD. — D'après un résumé publié par Hill, *Some results of the meteorological observations taken at Allahabad* (*Indian meteorological Memoirs*, vol. I); cinq ans d'observations (1874-1879) faites toutes les heures pendant un certain nombre de jours seulement pour chaque mois, et à 4^h, 10^h, 16^h et 22^h pour les autres jours (voir pour les détails le Mémoire original).

10. ZI-KA-WEI. — *Bulletin mensuel de l'observatoire de Zi-Ka-Wei*; quatorze ans d'observations (1874-1887) faites huit fois par jour toutes les quatre heures dans les deux premières années, et toutes les heures dans les douze autres.

11. CORDOBA. — D'après un résumé publié dans les *Anales de la oficina meteorologica Argentina*, Tome V; cinq ans d'observations (1878-1882) faites toutes les heures. Les nombres publiés ont été corrigés de la variation non périodique; on les a, de plus, reculés tous d'une heure. Ainsi, ceux qui sont donnés pour 1^h dans le Tableau original ont été supposés correspondre à minuit, et ainsi de suite. Cette erreur devient manifeste quand on compare les résultats des observations de Cordoba avec ceux de toutes les autres stations sans exception.

12. SAN FERNANDO. — *Anales del Instituto y observatorio de Marina de San Fernando*; seize ans d'observations (1871-1886) faites toutes les heures, sauf dans les quatre premières années où les observations manquent pour 1^h, 5^h, 7^h, 11^h, 13^h, 17^h, 19^h et 23^h, et ont été interpolées graphiquement.

13. MELBOURNE. — D'après un résumé publié par Neumayer dans *Discussion of the meteorological and magnetical observations made at the Flagstaff observatory, Melbourne*; cinq ans d'observations (1858-1863) faites toutes les heures. Dans le résumé duquel nous avons déduit notre Tableau, les pressions moyennes sont calculées seulement jusqu'au millième de pouce anglais; les nombres, transformés en millimètres, comportent donc une incertitude de $\pm 0^{\text{mm}},02$. Nous avons, en outre, corrigé de la variation non périodique les nombres du Tableau original.

14. LISBONNE. — *Annaes do observatorio do Infante D. Luiz*; vingt ans d'observations (1864-1883) faites toutes les heures.

15. WASHINGTON. — *Astronomical and meteorological observations made at the U. S. naval observatory*; dix-neuf ans d'observations (1862-1880) faites huit fois par jour toutes les trois heures, depuis minuit; les valeurs pour les heures intermédiaires ont été calculées par comparaison avec Zi-Ka-Wei, Lisbonne et Pékin, d'après la méthode exposée précédemment (p. B. 238).

16. PÉKIN. — D'après un résumé publié par Rykatchef dans son Mémoire *Sur la marche diurne du baromètre en Russie* (*Repertorium für Meteorologie*, Tome VI, Saint-Pétersbourg; 1879); six ans d'observations (1850-1855) faites toutes les heures.

17. COÏMBRE. — *Observações meteorologicas e magneticas feitas no observatorio da Universidade de Coïmbra*; vingt ans d'observations (1868-1887) faites toutes les heures. On a corrigé un certain nombre de fautes d'impression et rectifié des moyennes inexactes.

18. MADRID. — *Observaciones meteorologicas efectuadas en el Real observatorio*; dix-neuf ans d'observations (1867-1885) faites sept fois par jour toutes les trois heures depuis 6^h. Les valeurs pour les heures intermédiaires ont été calculées par comparaison avec Lisbonne, Parc Saint-Maur et Berne, d'après la méthode exposée précédemment (p. B. 238). Malgré la diversité de conditions que présentent ces trois stations de comparaison, les interpolations faites par chaque station isolément ont donné des résultats très concordants.

19. NAPLES. — *Bullettino meteorologico del R. osservatorio astronomico di Napoli*; dix ans d'observations (1870-1879) faites toutes les heures. On a corrigé seulement un certain nombre de fautes d'impression et rectifié des moyennes inexactes.

20. TIFLIS. — D'après un résumé publié par Rykatchef dans son Mémoire cité plus haut (*voir* Pékin, n° 16); vingt-deux ans d'observations (1844-1847 et 1852-1869) faites toutes les heures.

21. ALBANY. — *Annals of the Dudley observatory*, t. II (Albany, 1871); cinq ans d'observations (1866-1870) faites toutes les heures.

22. PERPIGNAN. — *Bulletins météorologiques des Pyrénées-Orientales et Annales du Bureau central météorologique de France* (depuis 1885); quinze ans d'observations (1872-1886). De 1872 à 1876, les observations ont été faites six fois par jour toutes les trois heures depuis 6^h; à partir de 1876, elles ont été faites huit fois par jour toutes les trois heures depuis minuit. Les valeurs pour les heures intermédiaires ont été calculées par comparaison avec Lisbonne, Parc Saint-Maur et Greenwich, d'après la méthode exposée précédemment (p. B. 238).

23. HOBARTON. — Sabine, *Observations made at the magnetical and meteorological observatory at Hobarton*; sept ans d'observations (1841-1848) faites toutes les heures. On suivait dans cette station le temps moyen de Göttingue, de sorte que la journée d'observation commençait à 21^h du temps du lieu; de plus, les observations étaient interrompues les dimanches et jours de fêtes, à partir de 15^h du temps moyen de Göttingue (minuit du lieu). Il en résulte, dans les moyennes mensuelles publiées, un double saut entre 20^h et 21^h, et entre 23^h et 0^h du temps moyen du lieu. Les observations ayant été publiées intégralement, on a interpolé approximativement les lacunes, puis on a fait disparaître les deux solutions de continuité dans la courbe entre 20^h et 21^h, et entre 23^h et 0^h, en suivant la méthode qui a été indiquée plus haut (p. B. 238) pour l'élimination de la marche annuelle; de plus, quelques erreurs manifestes ont été corrigées. Il résulte

de toutes ces interpolations et corrections, nécessairement un peu arbitraires, que les résultats sont très douteux; nous ne les publions, sous toutes ces réserves, que vu la situation intéressante de la station et la rareté des séries qui existent pour l'hémisphère austral.

24. MARSEILLE. — *Annales du Bureau central météorologique*; dix ans d'observations (1878-1887) faites six fois par jour toutes les trois heures depuis 7^h. Les valeurs pour les heures où l'observation fait défaut ont été calculées par comparaison avec Lisbonne, Parc Saint-Maur et Bruxelles, d'après la méthode exposée précédemment (p. B. 238).

25. SAINT-MARTIN-DE-HINX. — Tableau emprunté à mon Mémoire sur le climat de Saint-Martin-de-Hinx (*Annales du Bureau central météorologique pour 1886*, t. I); vingt ans d'observations (1867-1886) faites à diverses heures (*voir*, pour le détail, le Mémoire original).

26. TOULOUSE. — Trente-huit ans d'observations (1839-1862 et 1874-1887). Les observations de 1839 à 1862 sont extraites de l'*Annuaire de la Société météorologique*; celles de 1874, 1875 et 1876 des *Annales de l'observatoire de Toulouse*. M. Baillaud, directeur de l'observatoire, a bien voulu me communiquer en manuscrit celles de 1877; enfin, depuis 1878, elles sont publiées dans les *Annales du Bureau central météorologique*. Les observations de 1839 à 1862 ont été faites cinq fois par jour toutes les trois heures depuis 9^h; les observations depuis 1874 ont été faites six et sept fois par jour toutes les trois heures, à partir de 7^h jusqu'en 1881 et à partir de 6^h depuis 1882. Les valeurs pour les heures où l'observation fait défaut ont été calculées par comparaison avec Saint-Martin-de-Hinx, Lyon (Parc de la Tête-d'Or) et Parc Saint-Maur, d'après la méthode exposée précédemment (p. B. 238).

27. TORONTO. — Sabine, *Observations made at the magnetical and meteorological observatory at Toronto*; six ans d'observations (1842-1848) faites toutes les heures. Comme à Hobarton (*voir* plus haut, n° 23), les observations étaient faites au temps moyen de Gœttingue et interrompues les dimanches et jours de fête à partir de minuit, temps du lieu. Il en résulte dans la marche diurne du baromètre une double discontinuité qui a été corrigée comme pour les observations de Hobarton. Nous ne donnons donc les observations de Toronto que sous toutes réserves et à cause du petit nombre de séries que l'on possède pour l'Amérique.

28. MONCALIERI. — *Bollettino mensile del R. Collegio Carlo-Alberto in Moncalieri*; vingt ans d'observations (1867-1886) faites six fois par jour toutes les trois heures depuis 6^h. Les valeurs pour les heures où l'observation fait défaut ont été calculées par comparaison avec Berne, Parc Saint-Maur et Munich, d'après la méthode exposée précédemment (p. B. 238).

29. LYON (Saint-Genis-Laval). — Sept ans d'observations (1881-1887) faites toutes les heures; les quatre premières années ont été publiées intégralement dans les *Annales et Travaux de l'observatoire de Lyon*. M. André, directeur de l'observatoire, a bien voulu me communiquer en manuscrit les trois dernières années.

30. LYON (Parc de la Tête-d'Or). — Huit ans d'observations (1879-1884 et 1886-1887, 1885 manque) faites toutes les heures; les six premières années ont été publiées intégralement dans les *Annales et Travaux de l'observatoire de Lyon*. M. André, directeur

de l'observatoire, a bien voulu me communiquer en manuscrit les deux dernières années.

31. PUY-DE-DÔME (sommets). — *Annales du Bureau central météorologique*; dix ans d'observations (1878-1887) faites six fois par jour, toutes les trois heures depuis 6^h, pendant les trois premières années, et huit fois par jour toutes les trois heures depuis minuit pendant les sept dernières. Les valeurs pour les heures où l'observation fait défaut ont été calculées par comparaison avec Berne, le Säntis et l'Obir.

32. CLERMONT-FERRAND (station de la Plaine de l'observatoire du Puy-de-Dôme). — *Annales du Bureau central météorologique*; dix ans d'observations (1878-1887) faites six fois par jour toutes les trois heures depuis 6^h, pendant les trois premières années, et huit fois par jour toutes les trois heures depuis minuit, pendant les sept dernières. Les valeurs pour les heures où l'observation fait défaut ont été calculées par comparaison avec Berne, Munich et le Parc Saint-Maur.

33. GRAND SAINT-BERNARD. — *Résumés météorologiques pour Genève et le Grand Saint-Bernard*; trente-sept ans d'observations (1851-1887) faites neuf fois par jour, toutes les deux heures depuis 6^h, jusqu'en 1883, et huit fois par jour, toutes les trois heures depuis 1^h, à partir de 1884; les valeurs pour les heures où l'observation fait défaut ont été calculées par comparaison avec le Säntis et l'Obir.

34. GENÈVE. — Plantamour, *Nouvelles études sur le climat de Genève*; quarante ans d'observations (1836-1875) faites neuf fois par jour toutes les deux heures depuis 6^h. Les valeurs pour les heures où l'observation fait défaut ont été calculées par comparaison avec Berne, Munich, Parc Saint-Maur et Bruxelles. M. Plantamour a, dans son travail, calculé ces mêmes valeurs par une formule harmonique et obtenu ainsi pour la nuit des nombres qui diffèrent assez notablement des miens. La méthode de M. Plantamour me paraît défectueuse en ce qu'elle tend à donner *a priori* pour la nuit une oscillation presque égale à celle du jour, ce qui n'est pas exact, surtout pour une station continentale et assez élevée.

35. OBIR. — *Jahrbücher der K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus*; huit ans d'observations (1880-1887) faites toutes les heures.

36. KLAGENFURT. — *Jahrbücher der K. K. Central-Anstalt für Meteorologie und Erdmagnetismus*; huit ans d'observations (1880-1887) faites toutes les heures.

37. POITIERS. — Vingt ans d'observations inédites (1868-1887) que leur auteur, M. de Touchimbert, a bien voulu me communiquer en manuscrit; observations faites six fois par jour toutes les trois heures depuis 7^h. Les valeurs pour les autres heures ont été calculées par comparaison avec Saint-Martin-de-Hinx, Parc Saint-Maur et Bruxelles.

38. NANTES. — *Annales du Bureau central météorologique*; sept ans d'observations (1881-1887) faites huit fois par jour toutes les trois heures depuis 1^h. Les valeurs pour les heures intermédiaires ont été calculées par comparaison avec le Parc Saint-Maur, Bruxelles et Greenwich.

39. BERNE. — *Schweizerische meteorologische Beobachtungen*; treize ans d'observations (1875-1887) faites toutes les heures.

40. SÄNTIS. — *Schweizerische meteorologische Beobachtungen*; cinq ans d'observations (1883-1887) faites toutes les heures.

41. MUNICH. — D'après un résumé publié dans les *Beobachtungen der meteorologischen Stationen im Königreich Bayern*, t. IV, 1882, p. 174. Trente-trois ans d'observations (1848-1880) faites toutes les heures. Les nombres du Tableau ont été corrigés de la marche annuelle, et l'on a rectifié de nombreuses erreurs; pour plusieurs mois, par exemple, les sommes des écarts positifs et négatifs à la moyenne diurne différaient de plus de 0^{mm}, 12, ce qui indique une erreur dans le calcul de la moyenne diurne ou dans les nombres individuels.

42. VIENNE. — D'après un Tableau manuscrit qui m'a été obligeamment communiqué par M. le Dr HANN, directeur de l'Institut central météorologique d'Autriche; dix-neuf ans d'observations faites toutes les heures.

43. PARC SAINT-MAUR (près Paris). — Quinze ans d'observations (1873-1887) publiées jusqu'en 1877 dans l'*Annuaire de la Société météorologique*, et depuis 1878 dans les *Annales du Bureau central météorologique*. Les observations sont faites directement toutes les heures, jour et nuit, sauf à 2^h et 3^h. Les valeurs pour ces deux heures ont été déterminées par une interpolation graphique.

44. SAINTE-HONORINE-DU-FAY. — Quinze ans d'observations (1873-1887) publiées jusqu'en 1877 dans l'*Annuaire de la Société météorologique*, et depuis 1878 dans les *Annales du Bureau central météorologique*. Observations faites six fois par jour toutes les trois heures depuis 7^h. Les valeurs pour les heures où l'observation fait défaut ont été calculées par comparaison avec le Parc Saint-Maur, Bruxelles et Greenwich.

45. PRAGUE. — *Magnetische und meteorologische Beobachtungen auf der K. K. Sternwarte zu Prag*; quarante-six ans d'observations (1842-1887) faites toutes les heures jusqu'en 1869 inclus, et toutes les deux heures depuis 1870. Les observations manquant dans les dernières années ont été interpolées graphiquement, ce qui ne présente, dans ce cas particulier, aucune incertitude.

46. FALMOUTH. — *Hourly Readings from the self-recording instruments at the observatories under the meteorological Council*; douze ans d'observations (1874-1885) faites toutes les heures; les moyennes des années 1874 et 1875, calculées par M. Buchan, et celles des années 1876-1880, calculées par MM. Eaton et Bayard, m'ont été obligeamment communiquées par M. Scott, secrétaire du *Meteorological Office*. Les moyennes des cinq dernières années ont été calculées sous ma surveillance.

47. BRUXELLES. — *Annales de l'observatoire de Bruxelles*; treize ans d'observations (1867-1879) faites quinze fois par jour à toutes les heures paires 0^h, 2^h, 4^h, ..., et de plus à 9^h, 15^h et 21^h. Les valeurs pour les heures qui manquent ont été obtenues par une interpolation graphique qui, dans ce cas, n'a présenté aucune incertitude.

48. NERTCHINSK. — D'après un résumé publié par Rykatchef (Mémoire cité plus haut, voir PÉKIN); quinze ans d'observations (1847-1848 et 1850-1862) faites toutes les heures.

49. LEIPZIG. — *Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen in den K. Sächsischen Stationen*; huit ans d'observations (1868-1875) faites toutes les heures.

50. KEW. — Même période d'observations et mêmes sources que pour Falmouth (voir plus haut n° 46).

51. GREENWICH. — *Greenwich meteorological observations*; trente ans d'observations (1856-1885) faites toutes les heures; l'année 1876, qui n'a pas encore été publiée, m'a été obligeamment communiquée en manuscrit par M. Christie, astronome royal.

52. VALENCIA. — Même période d'observations et mêmes sources que pour Falmouth (voir plus haut n° 46).

53. UTRECHT. — Dix-neuf ans d'observations (1850-1868) faites toutes les heures; d'après deux résumés, l'un de neuf ans, l'autre de dix, publiés dans le *Nederlansch meteorologisch Jaarboek* pour 1858 et pour 1868). Ces observations ont été en plus corrigées de la marche annuelle.

54. AMSTERDAM. — Dix ans d'observations (1869-1878) faites toutes les heures; d'après un résumé publié dans le *Nederlansch meteorologisch Jaarboek* pour 1878. Ces observations ont été corrigées en plus de la marche annuelle.

55. GRONINGUE. — D'après un résumé publié par Rykatchef (Mémoire cité plus haut, voir PÉKIN); huit ans d'observations (1851-1858) faites toutes les heures. Elles ont été en plus corrigées de la marche annuelle.

56. BARNAOUL. — D'après un résumé publié par Rykatchef (Mémoire cité plus haut, voir PÉKIN); vingt et un ans d'observations (1841-1862) faites toutes les heures.

57. BIDSTON (près Liverpool). — Vingt et un ans d'observations (1867-1887) faites toutes les heures. Le détail des observations nous a été obligeamment communiqué en manuscrit par M. Hartnup, directeur de l'observatoire de Bidston. Les moyennes ont été calculées sous ma surveillance.

58. HAMBOURG. — *Deutsche Seewarte; meteorologische Beobachtungen in Deutschland*; neuf ans d'observations (1878-1886) faites toutes les heures.

59. STONYHURST. — *Hourly Readings from the self-recording instruments at the observatories under the meteorological Council*; dix ans d'observations (1874-1883) faites toutes les heures. Les moyennes des années 1874 et 1875, calculées par M. Buchan, et celles des années 1876-1880, calculées par MM. Eaton et Bayard, m'ont été obligeamment communiquées par M. Scott, secrétaire du *Meteorological Office*. Les moyennes des trois dernières années ont été calculées sous ma surveillance.

60. SWINEMUNDE. — *Deutsche Seewarte; meteorologische Beobachtungen in Deutschland*; sept ans d'observations (1878-1880 et 1883-1886) faites toutes les heures.

61. — ARMAGH. — Même période d'observations et mêmes sources que pour Stonyhurst (voir plus haut n° 59).

62. KEITUM. — Même période d'observations et mêmes sources que pour Hambourg (voir plus haut n° 58).

63. MOSCOU. — D'après un résumé publié par Rykatchef (Mémoire cité plus haut, voir PÉKIN); cinq ans d'observations (1863-1867) faites toutes les heures.

64. GLASGOW. — Même période d'observations et mêmes sources que pour Stonyhurst (voir plus haut n° 59).

65. CATHERINBOURG. — D'après un résumé publié par Rykatchef (Mémoire cité plus haut, voir PÉKIN); vingt-deux ans d'observations (1841-1862) faites toutes les heures.

66. NOUVELLE-ARKHANGELSK. — D'après un résumé publié par Rykatchef (Mémoire cité plus haut, voir PÉKIN); vingt-trois ans d'observations (1842-1845, 1847-1854 et 1856-1872) faites toutes les heures.

67. ABERDEEN. — Même période d'observations et mêmes sources que pour Falmouth (voir plus haut n° 46).

68. UPSAL. — *Bulletin météorologique de l'observatoire de l'Université d'Upsal*; vingt-deux ans d'observations (1866-1887) faites toutes les heures.

69. SAINT-PÉTERSBOURG. — Quarante ans d'observations (1841-1862 et 1870-1887) faites toutes les heures; les vingt-huit premières années ont été empruntées au résumé publié par Rykatchef (Mémoire cité plus haut, voir PÉKIN), les douze dernières ont été relevées par nous dans les *Annalen der physikalischen Central-Observatoriums; Saint-Petersburg*.

70. HELSINGFORS. — D'après un résumé publié par Rykatchef (Mémoire cité plus haut, voir PÉKIN); dix-neuf ans d'observations (1829-1847) faites toutes les heures.

Les Tableaux suivants donnent, pour ces soixante-dix stations, la marche diurne du baromètre dans chaque mois et l'année moyenne. Les nombres représentent, en centièmes de millimètre, l'écart de la pression de chaque heure à la pression moyenne des vingt-quatre heures du mois ou de l'année. Ainsi, dans le Tableau 1 (Singapore), en janvier, le nombre + 49 à 0^h 16^m signifie qu'à 0^h 16^m la pression dépasse de 0^{mm},49 la moyenne des vingt-quatre heures; de même, le nombre — 141 à 15^h 16^m signifie qu'à 15^h 16^m la pression est inférieure de 1^{mm},41 à la moyenne des vingt-quatre heures. Sauf indication contraire, le temps est toujours exprimé en temps moyen; enfin les heures sont comptées de 0^h à 24^h depuis minuit, ce qui permet, sans aucune crainte de confusion, de supprimer après chaque heure l'indication *matin* ou *soir*.

Longitudes au from Paris,

N. Long. $-2^{\circ} 20'$ | Riden. to Err.
S. Long. $+2. 20$

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.249

1. SINGAPORE.

Unité = 20 m m.

Latitude, $1^{\circ} 17' N.$ — Longitude, $101^{\circ} 31' E.$ — Altitude, (?) quelques mètres.

Heures. _{h m}	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0.16...	+ 49	+ 48	+ 50	+ 54	+ 51	+ 45	+ 39	+ 38	+ 33	+ 37	+ 40	+ 48	+ 44
1.16...	+ 10	+ 10	+ 4	+ 4	+ 6	+ 4	+ 3	+ 4	+ 9	+ 8	+ 4	+ 4	+ 2
2.16...	— 25	— 25	— 31	— 33	— 30	— 28	— 27	— 33	— 38	— 41	— 37	— 35	— 32
3.16...	— 44	— 43	— 48	— 50	— 49	— 47	— 42	— 43	— 49	— 54	— 55	— 62	— 49
4.16...	— 43	— 44	— 42	— 44	— 47	— 45	— 39	— 36	— 39	— 45	— 49	— 60	— 44
5.16...	— 22	— 23	— 21	— 19	— 22	— 22	— 17	— 14	— 15	— 10	— 21	— 31	— 20
6.16...	+ 16	+ 12	+ 17	+ 22	+ 19	+ 16	+ 21	+ 21	+ 30	+ 37	+ 25	+ 16	+ 21
7.16...	+ 71	+ 65	+ 65	+ 73	+ 65	+ 58	+ 64	+ 66	+ 82	+ 90	+ 85	+ 70	+ 71
8.16...	+ 108	+ 114	+ 110	+ 119	+ 107	+ 94	+ 105	+ 108	+ 123	+ 131	+ 124	+ 113	+ 113
9.16...	+ 120	+ 135	+ 137	+ 138	+ 122	+ 109	+ 117	+ 121	+ 138	+ 142	+ 131	+ 127	+ 128
10.16...	+ 104	+ 123	+ 125	+ 124	+ 101	+ 94	+ 100	+ 108	+ 120	+ 116	+ 108	+ 112	+ 111
11.16...	+ 62	+ 83	+ 81	+ 80	+ 57	+ 56	+ 63	+ 68	+ 71	+ 54	+ 52	+ 65	+ 66
12.16...	+ 8	+ 22	+ 20	+ 18	+ 5	+ 10	+ 17	+ 18	+ 10	— 8	— 9	+ 7	+ 10
13.16...	— 51	— 48	— 53	— 58	— 49	— 40	— 33	— 37	— 57	— 74	— 74	— 61	— 53
14.16...	— 110	— 109	— 117	— 118	— 101	— 91	— 84	— 89	— 109	— 126	— 128	— 118	— 108
15.16...	— 141	— 150	— 152	— 149	— 135	— 121	— 116	— 125	— 142	— 156	— 150	— 147	— 140
16.16...	— 142	— 154	— 154	— 155	— 141	— 123	— 120	— 132	— 147	— 153	— 147	— 144	— 143
17.16...	— 111	— 128	— 128	— 135	— 121	— 103	— 111	— 114	— 124	— 119	— 114	— 113	— 118
18.16...	— 70	— 87	— 87	— 93	— 80	— 68	— 84	— 81	— 84	— 71	— 62	— 63	— 77
19.16...	— 21	— 36	— 36	— 40	— 25	— 23	— 44	— 40	— 36	— 16	— 2	— 6	— 27
20.16...	+ 25	+ 14	+ 17	+ 15	+ 28	+ 22	+ 7	+ 9	+ 17	+ 38	+ 52	+ 44	+ 24
21.16...	+ 59	+ 62	+ 61	+ 60	+ 69	+ 58	+ 49	+ 50	+ 64	+ 77	+ 77	+ 75	+ 63
22.16...	+ 74	+ 84	+ 91	+ 92	+ 87	+ 74	+ 67	+ 71	+ 86	+ 87	+ 85	+ 84	+ 82
23.16...	+ 74	+ 74	+ 91	+ 94	+ 84	+ 71	+ 65	+ 70	+ 75	+ 72	+ 73	+ 75	+ 76

2. BATAVIA.

Latitude, $6^{\circ} 11' S.$ — Longitude, $104^{\circ} 30' E.$ — Altitude, 8^m.

Heures. _h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 54	+ 56	+ 62	+ 70	+ 62	+ 65	+ 68	+ 70	+ 61	+ 53	+ 52	+ 55	+ 61
1.....	+ 13	+ 19	+ 26	+ 31	+ 29	+ 32	+ 43	+ 38	+ 26	+ 17	+ 14	+ 14	+ 25
2.....	— 21	— 16	— 9	— 7	— 5	— 3	+ 11	+ 8	— 3	— 14	— 22	— 21	— 8
3.....	— 45	— 40	— 32	— 31	— 31	— 30	— 17	— 17	— 19	— 34	— 43	— 46	— 32
4.....	— 51	— 42	— 37	— 38	— 37	— 37	— 24	— 22	— 19	— 31	— 41	— 49	— 36
5.....	— 30	— 25	— 24	— 28	— 22	— 24	— 13	— 8	0	— 6	— 15	— 26	— 18
6.....	+ 9	+ 4	+ 7	+ 6	+ 10	+ 6	+ 14	+ 21	+ 34	+ 30	+ 24	+ 15	+ 15
7.....	+ 56	+ 48	+ 51	+ 53	+ 53	+ 46	+ 54	+ 64	+ 82	+ 77	+ 74	+ 60	+ 60
8.....	+ 94	+ 94	+ 93	+ 92	+ 93	+ 86	+ 96	+ 104	+ 118	+ 117	+ 109	+ 94	+ 99
9.....	+ 109	+ 115	+ 117	+ 115	+ 111	+ 103	+ 112	+ 121	+ 134	+ 125	+ 117	+ 108	+ 116
10.....	+ 101	+ 108	+ 113	+ 110	+ 101	+ 89	+ 95	+ 104	+ 114	+ 104	+ 98	+ 97	+ 103
11.....	+ 72	+ 81	+ 80	+ 69	+ 62	+ 54	+ 56	+ 58	+ 59	+ 59	+ 57	+ 62	+ 64
12 (midi).	+ 30	+ 34	+ 25	+ 6	+ 3	0	+ 2	— 2	— 6	— 6	0	+ 12	+ 8
13.....	— 26	— 30	— 48	— 59	— 61	— 59	— 56	— 65	— 75	— 77	— 67	— 45	— 56
14.....	— 87	— 92	— 109	— 120	— 118	— 114	— 112	— 124	— 132	— 134	— 124	— 104	— 114
15.....	— 138	— 140	— 150	— 162	— 154	— 144	— 150	— 159	— 170	— 166	— 163	— 148	— 154
16.....	— 153	— 159	— 164	— 162	— 154	— 144	— 155	— 164	— 174	— 170	— 163	— 154	— 160
17.....	— 127	— 139	— 139	— 126	— 124	— 114	— 130	— 139	— 147	— 134	— 124	— 123	— 130
18.....	— 80	— 90	— 90	— 77	— 78	— 73	— 90	— 96	— 96	— 75	— 68	— 72	— 82
19.....	— 30	— 35	— 35	— 25	— 23	— 22	— 39	— 41	— 39	— 18	— 10	— 18	— 28
20.....	+ 19	+ 14	+ 18	+ 29	+ 31	+ 31	+ 13	+ 14	+ 16	+ 30	+ 40	+ 34	+ 24
21.....	+ 61	+ 58	+ 61	+ 71	+ 73	+ 72	+ 59	+ 60	+ 61	+ 71	+ 78	+ 75	+ 67
22.....	+ 85	+ 89	+ 91	+ 91	+ 92	+ 91	+ 81	+ 86	+ 87	+ 96	+ 94	+ 93	+ 88
23.....	+ 85	+ 88	+ 93	+ 92	+ 87	+ 89	+ 82	+ 89	+ 88	+ 86	+ 83	+ 87	+ 87

3. MADRAS.

Latitude, 13° 4' N. — Longitude, 77° 54' E. — Altitude, 7^m.

Heures. h m	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0.41....	— 9	— 1	+ 19	+ 27	+ 12	+ 36	+ 27	+ 25	+ 7	— 8	— 10	— 1	— 10
1.41....	— 50	— 41	— 22	— 24	— 28	0	— 4	— 13	— 23	— 46	— 53	— 39	— 29
2.41....	— 85	— 74	— 59	— 50	— 56	— 23	— 22	— 34	— 39	— 63	— 78	— 72	— 55
3.41....	— 93	— 85	— 78	— 55	— 55	— 26	— 25	— 33	— 40	— 62	— 83	— 86	— 60
4.41....	— 76	— 70	— 56	— 35	— 35	— 11	— 9	— 13	— 19	— 38	— 66	— 64	— 41
5.41....	— 38	— 30	— 6	+ 13	+ 6	+ 23	+ 30	+ 25	+ 18	+ 8	— 16	— 29	0
6.41....	— 17	+ 26	+ 52	+ 68	— 57	+ 69	+ 73	+ 70	— 65	+ 62	+ 40	+ 22	— 52
7.41....	+ 85	+ 90	+ 107	+ 121	+ 105	+ 111	+ 111	+ 116	+ 114	+ 112	+ 97	+ 90	— 105
8.41....	+ 142	+ 141	+ 152	+ 153	+ 142	+ 133	+ 137	+ 148	+ 147	+ 148	+ 142	+ 139	— 144
9.41....	+ 157	+ 164	+ 169	+ 151	+ 151	+ 131	+ 136	+ 145	+ 141	+ 153	+ 146	+ 144	— 149
10.41....	+ 133	+ 139	+ 144	+ 121	+ 116	+ 103	+ 110	+ 113	+ 106	+ 109	+ 112	+ 119	— 119
11.41....	+ 73	+ 81	+ 81	+ 66	+ 58	+ 54	+ 59	+ 58	+ 46	+ 40	+ 47	+ 57	— 60
12.41....	0	+ 9	+ 4	— 10	— 4	— 6	— 5	— 8	— 33	— 35	— 25	— 20	— 11
13.41....	— 70	— 62	— 68	— 88	— 73	— 76	— 74	— 74	— 106	— 99	— 92	— 88	— 81
14.41....	— 114	— 120	— 131	— 147	— 126	— 133	— 134	— 138	— 156	— 142	— 132	— 128	— 133
15.41....	— 124	— 135	— 161	— 180	— 158	— 167	— 178	— 177	— 175	— 152	— 133	— 137	— 156
16.41....	— 109	— 124	— 154	— 180	— 169	— 173	— 188	— 180	— 169	— 136	— 109	— 116	— 151
17.41....	— 73	— 95	— 128	— 148	— 148	— 143	— 153	— 150	— 126	— 96	— 71	— 73	— 117
18.41....	— 30	— 53	— 82	— 86	— 79	— 89	— 94	— 95	— 62	— 46	— 20	— 22	— 63
19.41....	+ 17	— 2	— 24	— 22	— 12	— 33	— 34	— 35	— 1	+ 15	+ 38	+ 28	— 5
20.41....	+ 62	+ 49	+ 38	+ 40	+ 48	+ 20	+ 26	+ 30	+ 60	+ 71	— 77	— 75	+ 50
21.41....	+ 81	+ 80	+ 71	+ 82	+ 87	+ 60	+ 67	+ 72	+ 99	+ 90	+ 88	+ 92	— 81
22.41....	+ 71	+ 74	+ 76	+ 99	+ 95	+ 74	+ 81	+ 83	+ 95	+ 78	+ 68	+ 72	— 80
23.41....	+ 33	+ 39	+ 56	+ 84	+ 66	+ 66	+ 63	+ 65	+ 51	— 37	+ 33	+ 37	— 52

4. SAINTE-HÉLÈNE.

Latitude, 15° 55' S. — Longitude, 8° 3' W. — Altitude, 538^m.

Heures. h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 14	+ 25	+ 31	+ 27	— 21	— 21	+ 29	+ 23	+ 37	+ 24	+ 14	— 15	— 23
1.....	— 27	— 11	— 2	— 6	— 5	+ 2	+ 5	0	— 4	— 18	— 32	— 28	— 11
2.....	— 58	— 45	— 36	— 37	— 33	— 29	— 25	— 31	— 40	— 56	— 64	— 59	— 43
3.....	— 73	— 66	— 62	— 60	— 58	— 55	— 52	— 56	— 65	— 83	— 78	— 76	— 65
4.....	— 68	— 67	— 71	— 70	— 67	— 63	— 63	— 67	— 74	— 83	— 74	— 74	— 70
5.....	— 38	— 46	— 51	— 55	— 55	— 53	— 58	— 60	— 62	— 59	— 52	— 45	— 53
6.....	— 8	— 10	— 16	— 19	— 27	— 30	— 37	— 33	— 30	— 23	— 10	+ 2	— 19
7.....	— 55	+ 32	+ 22	+ 22	+ 13	+ 3	— 4	+ 2	+ 9	+ 23	+ 38	+ 47	— 22
8.....	— 83	— 68	— 64	— 61	— 51	— 45	+ 38	+ 42	+ 45	+ 62	+ 72	+ 74	— 59
9.....	— 99	— 93	— 97	— 89	— 88	— 82	+ 78	+ 78	+ 73	+ 86	+ 92	+ 88	— 87
10.....	— 96	+ 96	+ 103	+ 102	+ 100	— 92	+ 89	+ 91	+ 84	+ 88	+ 91	+ 87	— 93
11.....	+ 72	+ 80	+ 87	+ 91	— 85	+ 72	+ 70	— 74	+ 69	+ 69	+ 77	+ 72	— 77
12 (midi).	— 36	+ 50	+ 48	+ 51	— 47	+ 33	+ 30	+ 33	+ 30	+ 36	+ 43	+ 46	— 40
13.....	0	+ 10	— 2	0	— 5	— 11	— 13	— 7	— 10	— 6	+ 6	+ 11	— 2
14.....	— 36	— 30	— 45	— 44	— 46	— 47	— 50	— 44	— 49	— 42	— 32	— 27	— 41
15.....	— 71	— 64	— 77	— 75	— 69	— 64	— 66	— 68	— 74	— 68	— 64	— 63	— 69
16.....	— 89	— 86	— 95	— 82	— 73	— 63	— 62	— 68	— 74	— 74	— 79	— 88	— 78
17.....	— 83	— 84	— 88	— 73	— 62	— 50	— 46	— 53	— 58	— 62	— 74	— 83	— 68
18.....	— 60	— 64	— 61	— 53	— 41	— 28	— 24	— 31	— 35	— 36	— 51	— 56	— 45
19.....	— 27	— 36	— 28	— 26	— 15	— 5	— 1	— 5	— 2	— 4	— 17	— 23	— 16
20.....	+ 10	0	+ 9	+ 12	— 17	— 18	+ 23	+ 24	+ 30	+ 31	+ 21	— 13	— 17
21.....	+ 42	— 35	+ 46	+ 44	+ 43	— 40	— 44	+ 48	+ 60	+ 60	+ 52	+ 46	+ 47
22.....	+ 63	+ 63	+ 68	+ 55	— 50	+ 50	+ 53	+ 57	+ 74	+ 74	+ 68	+ 66	+ 62
23.....	— 52	+ 58	+ 58	+ 48	— 41	— 40	— 44	— 51	— 66	+ 61	— 54	— 56	+ 52

ÉTUDE SUR LA MARCHE DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.251

5. BOMBAY.

Latitude, 18°54' N. — Longitude, 70°28' E. — Altitude, 11^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^{h m}													
0.8.....	+ 6	+ 12	+ 12	+ 7	+ 2	+ 19	+ 13	+ 13	+ 10	— 3	— 7	+ 1	+ 7
1.8.....	— 19	— 21	— 21	— 23	— 33	— 22	— 25	— 30	— 25	— 36	— 40	— 27	— 27
2.8.....	— 50	— 56	— 54	— 52	— 61	— 57	— 60	— 64	— 59	— 58	— 67	— 54	— 58
3.8.....	— 73	— 78	— 73	— 67	— 70	— 75	— 78	— 81	— 77	— 66	— 80	— 73	— 74
4.8.....	— 73	— 77	— 70	— 59	— 60	— 72	— 78	— 80	— 74	— 60	— 71	— 72	— 70
5.8.....	— 54	— 52	— 40	— 26	— 28	— 47	— 62	— 58	— 47	— 30	— 36	— 47	— 44
6.8.....	— 8	— 4	+ 12	+ 25	+ 22	— 4	— 25	— 17	— 5	+ 25	+ 21	— 1	+ 3
7.8.....	+ 59	+ 62	+ 73	+ 81	+ 76	+ 39	+ 18	+ 26	+ 49	+ 81	+ 82	+ 66	+ 59
8.8.....	+ 125	+ 123	+ 131	+ 135	+ 119	+ 76	+ 58	+ 70	+ 101	+ 130	+ 138	+ 132	+ 112
9.8.....	+ 176	+ 172	+ 167	+ 160	+ 138	+ 98	+ 80	+ 98	+ 127	+ 157	+ 172	+ 172	+ 143
10.8.....	+ 170	+ 178	+ 167	+ 153	+ 133	+ 98	+ 85	+ 104	+ 124	+ 147	+ 159	+ 165	+ 140
11.8.....	+ 125	+ 134	+ 129	+ 120	+ 109	+ 83	+ 76	+ 89	+ 101	+ 94	+ 104	+ 114	+ 107
12.8.....	+ 46	+ 61	+ 63	+ 65	+ 62	+ 55	+ 54	+ 54	+ 50	+ 23	+ 23	+ 36	+ 49
13.8.....	— 36	— 23	— 7	— 1	+ 5	+ 15	+ 22	+ 10	— 12	— 43	— 51	— 46	— 14
14.8.....	— 94	— 88	— 78	— 66	— 49	— 29	— 14	— 32	— 65	— 102	— 103	— 99	— 68
15.8.....	— 125	— 129	— 126	— 115	— 96	— 70	— 49	— 70	— 101	— 130	— 128	— 128	— 106
16.8.....	— 127	— 133	— 136	— 138	— 122	— 95	— 74	— 88	— 111	— 127	— 125	— 128	— 117
17.8.....	— 110	— 117	— 126	— 133	— 117	— 93	— 72	— 78	— 97	— 102	— 99	— 104	— 104
18.8.....	— 77	— 87	— 98	— 102	— 86	— 65	— 46	— 47	— 61	— 63	— 58	— 63	— 71
19.8.....	— 28	— 39	— 55	— 63	— 49	— 29	— 12	— 13	— 18	— 12	— 8	— 17	— 29
20.8.....	+ 21	+ 13	— 4	— 14	— 8	+ 11	+ 22	+ 21	+ 25	+ 35	+ 36	+ 29	+ 16
21.8.....	+ 58	+ 48	+ 40	+ 28	+ 28	+ 45	+ 51	+ 55	+ 60	+ 57	+ 57	+ 55	+ 49
22.8.....	+ 58	+ 58	+ 53	+ 49	+ 49	+ 65	+ 66	+ 68	+ 62	+ 53	+ 54	+ 57	+ 58
23.8.....	+ 30	+ 43	+ 41	+ 36	+ 36	+ 54	+ 50	+ 50	+ 43	+ 30	+ 27	+ 32	+ 39

6. MAURICE.

Mauritius

Latitude, 20°6' S. — Longitude, 55°13' E. — Altitude, 55^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h													
0 (min.).	+ 46	+ 53	+ 46	+ 40	+ 40	+ 41	+ 46	+ 46	+ 48	+ 48	+ 43	+ 38	+ 45
1.....	+ 7	+ 10	+ 15	+ 13	+ 15	+ 16	+ 20	+ 25	+ 23	+ 10	+ 5	0	+ 13
2.....	— 28	— 30	— 20	— 15	— 13	— 10	— 10	— 5	— 5	— 25	— 28	— 30	— 18
3.....	— 48	— 51	— 46	— 38	— 36	— 30	— 31	— 30	— 30	+ 42	— 41	— 46	— 39
4.....	— 51	— 53	— 56	— 51	— 48	— 42	— 41	— 41	— 41	— 42	— 36	— 46	— 46
5.....	— 27	— 41	— 43	— 42	— 43	— 42	— 41	— 33	— 25	— 20	— 17	— 24	— 33
6.....	+ 9	— 15	— 15	— 14	— 15	— 20	— 20	— 5	+ 8	+ 10	+ 15	+ 11	— 4
7.....	+ 36	+ 18	+ 18	+ 23	+ 25	+ 16	+ 15	+ 28	+ 43	+ 46	+ 42	+ 42	+ 29
8.....	+ 51	+ 44	+ 53	+ 58	+ 61	+ 57	+ 53	+ 63	+ 74	+ 71	+ 60	+ 54	+ 58
9.....	+ 53	+ 56	+ 74	+ 78	+ 89	+ 86	+ 86	+ 91	+ 86	+ 74	+ 62	+ 56	+ 74
10.....	+ 46	+ 53	+ 70	+ 75	+ 81	+ 81	+ 85	+ 86	+ 71	+ 56	+ 48	+ 48	+ 67
11.....	+ 28	+ 36	+ 42	+ 40	+ 43	+ 45	+ 47	+ 48	+ 36	+ 20	+ 20	+ 28	+ 36
12 (midi).	— 1	+ 5	+ 3	— 10	— 8	— 4	— 5	— 5	— 15	— 21	— 17	0	— 6
13.....	— 31	— 33	— 40	— 53	— 58	— 55	— 53	— 53	— 64	— 61	— 53	— 33	— 49
14.....	— 64	— 66	— 74	— 86	— 91	— 89	— 86	— 94	— 104	— 97	— 86	— 66	— 84
15.....	— 88	— 88	— 94	— 99	— 98	— 95	— 97	— 107	— 119	— 112	— 107	— 91	— 100
16.....	— 99	— 91	— 93	— 89	— 88	— 84	— 87	— 97	— 112	— 109	— 107	— 99	— 96
17.....	— 81	— 78	— 78	— 64	— 64	— 61	— 64	— 76	— 86	— 84	— 79	— 79	— 74
18.....	— 43	— 40	— 43	— 33	— 30	— 30	— 36	— 43	— 46	— 36	— 36	— 38	— 38
19.....	+ 3	+ 5	+ 3	+ 5	+ 8	+ 3	0	— 5	0	+ 13	+ 10	+ 4	+ 4
20.....	+ 41	+ 47	+ 46	+ 47	+ 43	+ 37	+ 34	+ 33	+ 45	+ 53	+ 53	+ 41	+ 43
21.....	+ 71	+ 80	+ 77	+ 73	+ 63	+ 59	+ 58	+ 56	+ 71	+ 81	+ 81	+ 70	+ 70
22.....	+ 88	+ 93	+ 84	+ 78	+ 66	+ 64	+ 66	+ 62	+ 76	+ 88	+ 89	+ 84	+ 78
23.....	— 82	— 86	+ 71	+ 64	+ 58	+ 57	+ 62	+ 56	+ 66	+ 79	+ 79	+ 76	+ 70

7. CALCUTTA.

Latitude, 22°36' N. — Longitude, 86°6' E. — Altitude, 5^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	+ 4	+ 10	+ 16	+ 20	+ 26	+ 38	+ 44	+ 46	+ 34	+ 16	— 13	0	— 20
1.....	— 14	— 11	— 14	— 7	— 2	+ 11	+ 13	+ 15	+ 4	— 21	— 23	— 17	— 6
2.....	— 35	— 36	— 43	— 37	— 30	— 15	— 12	— 13	— 22	— 42	— 44	— 39	— 31
3.....	— 56	— 61	— 66	— 57	— 46	— 36	— 39	— 39	— 46	— 61	— 61	— 59	— 52
4.....	— 64	— 73	— 73	— 55	— 40	— 43	— 42	— 47	— 54	— 59	— 63	— 64	— 56
5.....	— 45	43	— 37	— 17	— 7	— 20	— 28	— 29	— 32	— 29	— 28	— 36	— 29
6.....	— 5	0	+ 10	+ 29	+ 36	+ 18	+ 9	+ 9	+ 10	+ 18	+ 17	+ 6	+ 13
7.....	+ 49	+ 54	+ 67	+ 83	+ 84	+ 57	+ 46	+ 47	+ 56	+ 68	+ 71	+ 61	— 62
8.....	+ 123	+ 121	+ 140	+ 139	+ 127	+ 88	+ 78	+ 87	+ 106	+ 125	+ 132	+ 131	+ 116
9.....	+ 184	+ 180	+ 184	+ 174	+ 149	+ 107	+ 96	+ 111	+ 135	+ 156	+ 173	+ 183	+ 153
10.....	+ 199	+ 202	+ 193	+ 176	+ 146	+ 105	+ 99	+ 115	+ 136	+ 153	+ 169	+ 186	+ 157
11.....	+ 153	+ 169	+ 165	+ 148	+ 116	+ 86	+ 81	+ 93	+ 108	+ 109	+ 118	+ 138	+ 123
12 (midi).	+ 78	+ 100	+ 102	+ 97	+ 73	+ 50	+ 47	+ 54	+ 56	+ 46	+ 46	+ 58	+ 67
13.....	— 8	+ 16	+ 24	+ 23	+ 14	+ 1	+ 1	+ 2	— 11	— 26	— 35	— 27	— 2
14.....	— 75	— 61	— 56	— 52	— 55	— 51	— 51	— 57	— 78	— 89	— 93	— 89	— 67
15.....	— 119	— 114	— 116	— 120	— 114	— 98	— 97	— 108	— 129	— 126	— 124	— 126	— 116
16.....	— 136	— 139	— 147	— 167	— 162	— 137	— 132	— 149	— 150	— 130	— 131	— 136	— 143
17.....	— 124	— 137	— 154	— 177	— 174	— 139	— 134	— 149	— 142	— 113	— 109	— 118	— 139
18.....	— 102	— 118	— 136	— 149	— 142	— 113	— 107	— 115	— 109	— 91	— 82	— 89	— 113
19.....	— 60	— 82	— 93	— 97	— 86	— 62	— 59	— 69	— 59	— 43	— 35	— 46	— 66
20.....	— 15	— 30	— 38	— 40	— 25	— 8	— 7	— 7	+ 3	— 7	+ 7	— 6	— 13
21.....	+ 17	+ 9	+ 10	+ 16	+ 21	+ 35	+ 42	+ 45	+ 51	+ 39	+ 34	+ 25	— 28
22.....	+ 30	+ 27	+ 35	+ 42	+ 47	+ 67	+ 76	+ 79	+ 74	+ 50	+ 43	+ 39	+ 51
23.....	+ 19	+ 21	+ 29	+ 28	+ 42	+ 64	+ 74	+ 75	+ 62	+ 40	+ 29	+ 25	+ 42

8. LA HAVANE.

Latitude, 23°8' N. — Longitude, 84°43' W. — Altitude, 19^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	— 20	+ 23	+ 26	— 21	+ 12	+ 15	+ 12	+ 9	+ 23	+ 21	— 6	— 9	— 16
1.....	— 5	— 1	+ 3	— 1	— 8	— 7	— 11	— 14	+ 2	— 2	— 12	— 12	— 6
2.....	— 28	— 25	— 20	— 24	— 25	— 24	— 32	— 32	— 21	23	— 31	— 28	— 26
3.....	— 47	— 48	— 37	— 37	— 33	— 39	— 47	— 46	— 34	— 38	— 46	— 40	— 41
4.....	— 61	— 60	— 42	— 37	— 30	— 42	— 48	— 47	— 37	— 40	— 48	— 47	— 45
5.....	— 53	— 47	— 38	— 19	— 15	— 28	— 34	— 30	— 23	— 26	— 33	— 35	— 32
6.....	— 20	— 18	— 2	+ 10	+ 10	— 2	— 6	— 1	— 2	+ 1	— 5	— 7	— 3
7.....	+ 23	+ 24	+ 35	+ 38	+ 36	+ 26	+ 24	+ 27	+ 30	+ 35	+ 33	+ 36	— 31
8.....	+ 72	+ 71	+ 77	+ 68	+ 56	+ 52	+ 48	+ 53	+ 58	+ 72	+ 75	+ 81	+ 65
9.....	+ 114	+ 111	+ 104	+ 91	+ 73	+ 65	+ 66	+ 73	+ 81	+ 95	+ 106	+ 116	+ 91
10.....	+ 121	+ 116	+ 102	+ 90	+ 75	+ 65	+ 71	+ 77	+ 82	+ 92	+ 106	+ 116	+ 93
11.....	— 84	+ 84	+ 69	+ 66	+ 55	+ 50	+ 60	+ 64	+ 59	+ 53	+ 70	+ 77	+ 66
12 (midi).	+ 21	+ 30	+ 21	+ 26	+ 18	+ 22	+ 33	+ 35	+ 19	+ 10	+ 13	+ 16	— 22
13.....	— 34	— 26	— 26	— 16	— 16	— 9	+ 4	0	— 23	— 36	— 39	— 41	— 22
14.....	— 68	— 68	— 65	— 57	— 42	— 36	— 23	— 34	— 60	— 69	— 73	— 75	— 56
15.....	— 85	— 91	— 92	— 85	— 62	— 56	— 46	— 56	— 82	— 86	— 84	— 93	— 77
16.....	— 86	92	— 95	— 91	— 72	— 64	— 60	— 62	— 81	— 86	— 80	— 90	— 80
17.....	— 72	— 75	— 80	— 79	— 69	— 57	— 58	— 57	— 66	— 72	— 64	— 71	— 68
18.....	— 48	— 47	— 51	— 52	— 46	— 37	— 39	— 42	— 47	— 48	— 39	— 42	— 45
19.....	— 14	— 15	— 20	— 25	— 22	— 16	— 18	— 22	— 22	— 13	— 6	— 8	— 17
20.....	+ 20	+ 19	+ 11	+ 4	+ 4	+ 8	+ 3	+ 3	— 9	+ 20	+ 24	+ 22	+ 12
21.....	+ 48	+ 43	+ 37	+ 34	+ 30	+ 33	+ 26	+ 30	+ 38	+ 46	+ 45	+ 41	+ 38
22.....	— 55	— 49	+ 44	+ 43	+ 39	+ 45	+ 41	+ 41	+ 49	+ 51	+ 48	+ 45	+ 46
23.....	+ 42	+ 41	+ 40	+ 33	+ 31	+ 37	+ 34	+ 32	+ 43	+ 41	+ 34	+ 31	+ 37

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.253

9. ALLAHABAD.

Latitude, 25°26' N. — Longitude, 79°32' E. — Altitude, 94^m.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	0	+ 8	+ 5	— 1	— 5	+ 15	+ 10	+ 30	+ 28	+ 3	— 5	— 1	+ 6
1.....	— 13	— 11	— 19	— 25	— 43	0	— 18	+ 5	+ 5	— 22	— 23	— 19	— 14
2.....	— 28	— 31	— 37	— 41	— 53	— 13	— 37	— 20	— 23	— 43	— 41	— 37	— 34
3.....	— 46	— 49	— 54	— 50	— 43	— 20	— 45	— 33	— 46	— 56	— 51	— 50	— 45
4.....	— 53	— 56	— 59	— 38	— 13	— 16	— 37	— 30	— 46	— 56	— 53	— 55	— 43
5.....	— 41	— 33	— 29	— 3	+ 31	+ 13	— 14	— 15	— 18	— 25	— 29	— 35	— 17
6.....	— 3	+ 8	+ 21	+ 42	+ 78	+ 59	+ 22	+ 18	+ 25	+ 20	+ 28	+ 1	+ 27
7.....	+ 46	+ 61	+ 79	+ 94	+ 124	+ 106	+ 58	+ 58	+ 71	+ 76	+ 82	+ 54	+ 76
8.....	+ 102	+ 114	+ 140	+ 150	+ 154	+ 135	+ 91	+ 94	+ 115	+ 127	+ 130	+ 116	+ 122
9.....	+ 160	+ 155	+ 177	+ 178	+ 163	+ 144	+ 108	+ 119	+ 137	+ 155	+ 166	+ 170	+ 153
10.....	+ 175	+ 168	+ 184	+ 173	+ 157	+ 140	+ 108	+ 124	+ 140	+ 152	+ 168	+ 179	+ 156
11.....	+ 130	+ 147	+ 156	+ 142	+ 137	+ 117	+ 95	+ 104	+ 114	+ 117	+ 124	+ 136	+ 127
12 (midi).	+ 61	+ 79	+ 98	+ 82	+ 91	+ 66	+ 67	+ 64	+ 64	+ 51	+ 43	+ 57	+ 69
13.....	— 15	+ 3	+ 17	+ 14	+ 30	+ 8	+ 23	+ 5	— 8	— 23	— 41	— 24	— 1
14.....	— 74	— 61	— 52	— 51	— 38	— 50	— 33	— 53	— 76	— 76	— 97	— 80	— 62
15.....	— 107	— 109	— 108	— 112	— 110	— 108	— 84	— 109	— 129	— 114	— 124	— 106	— 110
16.....	— 110	— 131	— 133	— 150	— 154	— 150	— 119	— 146	— 150	— 124	— 114	— 116	— 133
17.....	— 102	— 126	— 138	— 160	— 165	— 164	— 130	— 156	— 142	— 112	— 94	— 106	— 133
18.....	— 83	— 103	— 125	— 140	— 150	— 147	— 103	— 124	— 112	— 86	— 71	— 77	— 110
19.....	— 46	— 66	— 95	— 99	— 119	— 104	— 61	— 74	— 64	— 45	— 38	— 47	— 72
20.....	— 8	— 23	— 54	— 43	— 76	— 58	— 15	— 19	— 5	+ 5	— 3	— 14	— 26
21.....	+ 17	+ 13	— 13	— 2	— 21	— 12	+ 23	+ 38	+ 33	+ 25	+ 15	+ 13	+ 12
22.....	+ 23	+ 23	+ 17	+ 20	+ 12	+ 17	+ 48	+ 64	+ 45	+ 29	+ 18	+ 24	+ 28
23.....	+ 15	+ 20	+ 22	+ 20	+ 13	+ 22	+ 43	+ 56	+ 42	+ 22	+ 10	+ 17	+ 25

10. ZI-KA-WEI.

Latitude, 31°13' N. — Longitude, 119°6' E. — Altitude, 7^m.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 18	+ 29	+ 31	+ 31	+ 25	+ 24	+ 27	+ 25	+ 23	+ 17	+ 14	+ 16	+ 23
1.....	+ 12	+ 18	+ 16	+ 7	+ 1	— 1	+ 5	+ 5	+ 3	+ 2	+ 3	+ 6	+ 6
2.....	+ 6	+ 5	— 3	— 19	— 20	— 22	— 13	— 15	— 17	— 15	— 8	+ 3	— 10
3.....	— 10	— 19	— 28	— 42	— 34	— 36	— 25	— 29	— 33	— 33	— 20	— 8	— 26
4.....	— 23	— 32	— 42	— 48	— 36	— 36	— 27	— 33	— 38	— 36	— 27	— 23	— 33
5.....	— 28	— 28	— 35	— 36	— 21	— 21	— 14	— 22	— 28	— 21	— 20	— 21	— 25
6.....	— 13	— 9	— 8	— 7	+ 5	+ 3	+ 6	+ 2	— 2	+ 3	+ 3	+ 1	— 1
7.....	+ 17	+ 21	+ 28	+ 30	+ 36	+ 30	+ 32	+ 29	+ 28	+ 35	+ 35	+ 33	+ 29
8.....	+ 50	+ 51	+ 62	+ 61	+ 60	+ 46	+ 49	+ 50	+ 55	+ 66	+ 67	+ 65	+ 57
9.....	+ 84	+ 76	+ 84	+ 80	+ 70	+ 50	+ 55	+ 62	+ 71	+ 83	+ 88	+ 89	+ 74
10.....	+ 96	+ 84	+ 88	+ 82	+ 70	+ 50	+ 55	+ 63	+ 70	+ 78	+ 85	+ 94	+ 76
11.....	+ 56	+ 65	+ 70	+ 65	+ 54	+ 42	+ 46	+ 47	+ 51	+ 46	+ 45	+ 48	+ 53
12 (midi).	— 8	+ 19	+ 32	+ 30	+ 27	+ 23	+ 25	+ 23	+ 17	+ 1	— 9	— 16	+ 14
13.....	— 67	— 43	— 14	— 13	— 7	— 3	— 3	— 7	— 23	— 48	— 62	— 72	— 30
14.....	— 92	— 80	— 60	— 50	— 37	— 27	— 30	— 35	— 52	— 72	— 85	— 95	— 60
15.....	— 91	— 94	— 89	— 78	— 64	— 49	— 52	— 58	— 70	— 79	— 85	— 95	— 75
16.....	— 72	— 86	— 93	— 88	— 79	— 65	— 72	— 69	— 71	— 71	— 72	— 75	— 76
17.....	— 47	— 60	— 79	— 78	— 79	— 69	— 78	— 70	— 60	— 54	— 49	— 50	— 64
18.....	— 20	— 34	— 55	— 58	— 60	— 52	— 63	— 57	— 43	— 31	— 24	— 23	— 43
19.....	+ 5	— 7	— 28	— 28	— 33	— 25	— 34	— 30	— 18	— 4	0	+ 1	— 17
20.....	+ 25	+ 17	+ 7	+ 10	— 1	+ 4	— 4	+ 1	+ 16	+ 22	+ 22	+ 21	+ 12
21.....	+ 36	+ 34	+ 33	+ 43	+ 32	+ 37	+ 29	+ 33	+ 40	+ 40	+ 35	+ 34	+ 35
22.....	+ 37	+ 38	+ 43	+ 55	+ 48	+ 53	+ 44	+ 44	+ 44	+ 41	+ 37	+ 37	+ 43
23.....	+ 29	+ 35	+ 42	+ 51	+ 43	+ 44	+ 42	+ 41	+ 37	+ 30	+ 27	+ 30	+ 38

11. CORDOBA.

Latitude, 31°25' S. — Longitude, 66°31' W. — Altitude, 439^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	— 53	+ 64	+ 58	+ 57	+ 59	+ 57	+ 62	+ 80	+ 76	+ 79	+ 70	+ 59	+ 64
1.....	+ 55	+ 65	+ 60	+ 60	+ 56	+ 55	+ 60	+ 76	+ 73	+ 79	+ 63	+ 56	+ 63
2.....	+ 51	+ 62	+ 59	+ 59	+ 52	+ 51	+ 55	+ 67	+ 64	+ 75	+ 59	+ 51	+ 59
3.....	+ 51	+ 61	+ 57	+ 56	+ 49	+ 45	+ 48	+ 58	+ 56	+ 72	+ 59	+ 51	+ 55
4.....	+ 57	+ 64	+ 57	+ 55	+ 48	+ 39	+ 42	+ 50	+ 56	+ 73	+ 64	+ 61	+ 55
5.....	+ 72	+ 70	+ 60	+ 60	+ 49	+ 36	+ 39	+ 51	+ 63	+ 80	+ 75	+ 77	+ 61
6.....	+ 89	+ 81	+ 64	+ 69	+ 53	+ 36	+ 42	+ 57	+ 81	+ 91	+ 90	+ 99	+ 71
7.....	+ 103	+ 91	+ 70	+ 77	+ 59	+ 41	+ 50	+ 70	+ 99	+ 99	+ 97	+ 111	+ 81
8.....	+ 100	+ 93	+ 74	+ 78	+ 63	+ 51	+ 58	+ 77	+ 99	+ 97	+ 95	+ 108	+ 83
9.....	+ 88	+ 82	+ 65	+ 71	+ 64	+ 56	+ 63	+ 76	+ 89	+ 80	+ 80	+ 95	+ 76
10.....	+ 68	+ 62	+ 43	+ 45	+ 40	+ 28	+ 37	+ 47	+ 55	+ 51	+ 54	+ 75	+ 50
11.....	+ 46	+ 35	+ 14	+ 6	+ 7	+ 14	+ 11	+ 5	+ 12	+ 12	+ 22	+ 46	+ 13
12 (midi).	+ 16	+ 1	+ 18	+ 39	+ 58	+ 58	+ 65	+ 65	+ 50	+ 43	+ 25	+ 8	+ 33
13.....	+ 24	+ 44	+ 60	+ 84	+ 105	+ 100	+ 111	+ 122	+ 112	+ 96	+ 74	+ 37	+ 81
14.....	+ 72	+ 99	+ 106	+ 112	+ 122	+ 113	+ 132	+ 155	+ 151	+ 150	+ 126	+ 105	+ 120
15.....	+ 120	+ 138	+ 132	+ 123	+ 123	+ 108	+ 123	+ 155	+ 159	+ 173	+ 157	+ 150	+ 138
16.....	+ 142	+ 146	+ 129	+ 121	+ 108	+ 92	+ 103	+ 134	+ 155	+ 166	+ 160	+ 163	+ 135
17.....	+ 150	+ 145	+ 118	+ 110	+ 88	+ 73	+ 80	+ 110	+ 136	+ 144	+ 148	+ 162	+ 122
18.....	+ 145	+ 132	+ 96	+ 89	+ 62	+ 50	+ 54	+ 81	+ 108	+ 118	+ 127	+ 150	+ 101
19.....	+ 126	+ 110	+ 70	+ 61	+ 36	+ 23	+ 26	+ 44	+ 71	+ 84	+ 96	+ 121	+ 72
20.....	+ 88	+ 70	+ 37	+ 32	+ 8	+ 3	+ 3	+ 9	+ 28	+ 39	+ 43	+ 71	+ 35
21.....	+ 38	+ 22	+ 2	+ 2	+ 21	+ 27	+ 32	+ 28	+ 16	+ 4	+ 7	+ 19	+ 4
22.....	+ 14	+ 25	+ 33	+ 32	+ 47	+ 50	+ 54	+ 66	+ 59	+ 50	+ 51	+ 29	+ 42
23.....	+ 39	+ 52	+ 52	+ 49	+ 58	+ 58	+ 61	+ 79	+ 74	+ 71	+ 70	+ 53	+ 60

12. SAN FERNANDO.

Latitude, 36°28' N. — Longitude, 8°33' W. — Altitude, 29^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 9	+ 17	+ 24	+ 23	+ 14	+ 4	+ 12	+ 13	+ 12	+ 9	+ 7	+ 10	+ 13
1.....	+ 5	+ 3	+ 6	+ 0	+ 8	+ 14	+ 10	+ 6	+ 5	+ 8	+ 11	+ 5	+ 6
2.....	+ 10	+ 15	+ 15	+ 20	+ 28	+ 32	+ 25	+ 23	+ 22	+ 25	+ 20	+ 10	+ 20
3.....	+ 18	+ 34	+ 36	+ 36	+ 41	+ 40	+ 33	+ 35	+ 36	+ 39	+ 35	+ 19	+ 33
4.....	+ 33	+ 44	+ 49	+ 44	+ 46	+ 40	+ 33	+ 38	+ 41	+ 44	+ 42	+ 34	+ 41
5.....	+ 41	+ 44	+ 45	+ 43	+ 38	+ 29	+ 21	+ 30	+ 37	+ 40	+ 40	+ 39	+ 37
6.....	+ 31	+ 31	+ 32	+ 24	+ 21	+ 11	+ 4	+ 14	+ 21	+ 28	+ 25	+ 27	+ 22
7.....	+ 12	+ 11	+ 11	+ 2	+ 2	+ 9	+ 18	+ 8	+ 2	+ 4	+ 3	+ 8	+ 1
8.....	+ 13	+ 14	+ 12	+ 17	+ 15	+ 29	+ 35	+ 29	+ 27	+ 30	+ 27	+ 19	+ 22
9.....	+ 45	+ 41	+ 38	+ 36	+ 31	+ 42	+ 49	+ 48	+ 52	+ 56	+ 56	+ 51	+ 45
10.....	+ 71	+ 61	+ 49	+ 52	+ 40	+ 50	+ 56	+ 60	+ 61	+ 61	+ 69	+ 75	+ 59
11.....	+ 69	+ 61	+ 46	+ 46	+ 40	+ 51	+ 55	+ 56	+ 54	+ 51	+ 54	+ 53	+ 53
12 (midi).	+ 19	+ 36	+ 31	+ 28	+ 32	+ 44	+ 43	+ 44	+ 37	+ 23	+ 15	+ 13	+ 30
13.....	+ 23	+ 5	+ 0	+ 10	+ 18	+ 26	+ 25	+ 26	+ 12	+ 8	+ 15	+ 28	+ 3
14.....	+ 45	+ 35	+ 24	+ 7	+ 2	+ 6	+ 3	+ 2	+ 13	+ 27	+ 36	+ 48	+ 19
15.....	+ 45	+ 46	+ 40	+ 24	+ 16	+ 13	+ 22	+ 24	+ 32	+ 37	+ 40	+ 45	+ 32
16.....	+ 39	+ 45	+ 44	+ 37	+ 29	+ 30	+ 43	+ 42	+ 44	+ 40	+ 35	+ 37	+ 39
17.....	+ 28	+ 28	+ 36	+ 41	+ 35	+ 43	+ 58	+ 54	+ 47	+ 33	+ 25	+ 24	+ 38
18.....	+ 12	+ 11	+ 18	+ 36	+ 30	+ 43	+ 59	+ 56	+ 41	+ 16	+ 10	+ 8	+ 28
19.....	+ 7	+ 8	+ 2	+ 17	+ 15	+ 29	+ 44	+ 36	+ 17	+ 2	+ 7	+ 8	+ 10
20.....	+ 22	+ 22	+ 22	+ 12	+ 8	+ 9	+ 17	+ 6	+ 14	+ 21	+ 22	+ 20	+ 11
21.....	+ 30	+ 31	+ 39	+ 34	+ 34	+ 19	+ 16	+ 22	+ 29	+ 35	+ 30	+ 27	+ 29
22.....	+ 32	+ 33	+ 43	+ 38	+ 41	+ 29	+ 29	+ 30	+ 31	+ 36	+ 29	+ 30	+ 33
23.....	+ 25	+ 28	+ 38	+ 35	+ 34	+ 24	+ 28	+ 25	+ 25	+ 25	+ 21	+ 26	+ 28

13. MELBOURNE.

Latitude, 37°50' S. — Longitude, 142°39' E. — Altitude, 37^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.) ⁽¹⁾ .	+ 26	+ 20	+ 16	+ 20	+ 13	+ 11	+ 7	+ 5	+ 19	+ 12	+ 15	+ 28	+ 16
1.....	0	0	— 7	0	0	— 4	— 10	— 4	+ 3	— 5	— 16	+ 3	— 3
2.....	— 25	— 20	— 25	— 19	— 10	— 2	— 14	— 15	— 13	— 22	— 35	— 21	— 18
3.....	— 43	— 30	— 36	— 34	— 24	— 15	— 30	— 34	— 26	— 34	— 42	— 31	— 32
4.....	— 31	— 27	— 37	— 37	— 29	— 24	— 36	— 42	— 28	— 35	— 37	— 20	— 32
5.....	— 2	— 5	— 19	— 24	— 25	— 22	— 32	— 31	— 11	— 9	— 12	+ 5	— 16
6.....	+ 29	+ 20	+ 18	— 1	— 9	— 5	— 12	— 4	+ 19	+ 25	+ 20	+ 30	+ 11
7.....	+ 54	+ 46	+ 55	+ 31	+ 16	+ 17	+ 20	+ 30	+ 50	+ 58	+ 52	+ 55	+ 40
8.....	+ 64	+ 63	+ 78	+ 60	+ 46	+ 44	+ 48	+ 58	+ 71	+ 76	+ 71	+ 65	+ 62
9.....	+ 63	+ 70	+ 88	+ 67	+ 64	+ 68	+ 68	+ 74	+ 76	+ 79	+ 68	+ 63	+ 71
10.....	+ 53	+ 63	+ 79	+ 64	+ 60	+ 78	+ 77	+ 74	+ 66	+ 64	+ 47	+ 52	+ 65
11.....	+ 37	+ 43	+ 50	+ 47	+ 35	+ 54	+ 59	+ 52	+ 34	+ 33	+ 20	+ 31	+ 41
12 (midi).	+ 9	+ 12	+ 9	+ 5	— 5	+ 2	+ 4	+ 9	— 6	+ 2	— 7	+ 6	+ 3
13.....	— 18	— 18	— 28	— 42	— 45	— 45	— 40	— 38	— 46	— 28	— 34	— 25	— 34
14.....	— 47	— 49	— 57	— 68	— 70	— 68	— 64	— 69	— 73	— 58	— 61	— 56	— 62
15.....	— 70	— 72	— 79	— 77	— 72	— 74	— 62	— 76	— 88	— 86	— 79	— 83	— 77
16.....	— 92	— 90	— 89	— 77	— 60	— 64	— 54	— 71	— 90	— 94	— 83	— 96	— 80
17.....	— 92	— 87	— 75	— 63	— 37	— 44	— 38	— 52	— 70	— 76	— 71	— 95	— 67
18.....	— 67	— 59	— 47	— 27	— 12	— 22	— 15	— 22	— 36	— 43	— 35	— 55	— 37
19.....	— 23	— 19	— 17	+ 8	+ 14	0	+ 9	+ 7	— 2	— 5	+ 6	— 16	— 3
20.....	+ 17	+ 18	+ 18	+ 31	+ 33	+ 18	+ 25	+ 30	+ 26	+ 33	+ 40	+ 18	+ 26
21.....	+ 50	+ 40	+ 40	+ 46	+ 44	+ 31	+ 32	+ 44	+ 44	+ 44	+ 60	+ 44	+ 43
22.....	+ 58	+ 44	+ 44	+ 50	+ 43	+ 35	+ 32	+ 45	+ 46	+ 40	+ 63	+ 52	+ 46
23.....	+ 50	+ 38	+ 38	+ 40	+ 30	+ 31	+ 26	+ 30	+ 35	+ 29	+ 50	+ 46	+ 37

⁽¹⁾ Les observations ont été faites en réalité 1^m avant l'heure indiquée.

14. LISBONNE.

Latitude, 38°43' N. — Longitude, 11°26' W. — Altitude, 103^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	+ 10	+ 25	+ 24	+ 27	+ 15	+ 17	+ 17	+ 16	+ 12	+ 10	+ 9	+ 14	+ 16
1.....	— 8	+ 2	+ 5	0	— 2	— 8	+ 1	— 4	— 1	+ 1	— 1	— 8	— 2
2.....	— 7	— 11	— 18	— 24	— 18	— 26	— 18	— 22	— 27	— 22	— 10	— 7	— 18
3.....	— 13	— 29	— 40	— 38	— 30	— 37	— 30	— 34	— 35	— 37	— 24	— 14	— 30
4.....	— 29	— 38	— 46	— 47	— 37	— 36	— 30	— 37	— 39	— 37	— 31	— 29	— 36
5.....	— 37	— 34	— 37	— 39	— 26	— 23	— 18	— 26	— 29	— 29	— 27	— 35	— 30
6.....	— 26	— 24	— 20	— 16	— 7	— 7	— 2	— 4	— 8	— 18	— 16	— 23	— 14
7.....	— 2	+ 1	+ 7	+ 5	+ 12	+ 15	+ 21	+ 21	+ 17	+ 8	+ 9	+ 2	+ 10
8.....	+ 26	+ 27	+ 32	+ 22	+ 26	+ 36	+ 36	+ 38	+ 40	+ 43	+ 39	+ 28	+ 33
9.....	+ 66	+ 56	+ 55	+ 42	+ 37	+ 38	+ 44	+ 54	+ 65	+ 64	+ 65	+ 64	+ 54
10.....	+ 85	+ 65	+ 59	+ 48	+ 38	+ 40	+ 45	+ 56	+ 65	+ 60	+ 73	+ 82	+ 60
11.....	+ 68	+ 63	+ 50	+ 37	+ 30	+ 36	+ 40	+ 46	+ 48	+ 49	+ 52	+ 57	+ 48
12 (midi).	+ 15	+ 31	+ 30	+ 18	+ 15	+ 21	+ 22	+ 22	+ 23	+ 13	+ 6	+ 4	+ 18
13.....	— 27	— 14	— 6	+ 1	0	+ 1	+ 2	+ 4	— 4	— 21	— 25	— 36	— 10
14.....	— 51	— 48	— 34	— 23	— 18	— 16	— 15	— 22	— 30	— 41	— 50	— 55	— 34
15.....	— 51	— 57	— 48	— 42	— 35	— 29	— 33	— 37	— 47	— 46	— 51	— 51	— 44
16.....	— 46	— 55	— 53	— 43	— 36	— 35	— 41	— 43	— 49	— 45	— 45	— 43	— 45
17.....	— 36	— 42	— 46	— 35	— 38	— 41	— 49	— 49	— 44	— 35	— 35	— 33	— 40
18.....	— 19	— 21	— 28	— 28	— 29	— 31	— 42	— 46	— 37	— 18	— 15	— 16	— 28
19.....	— 1	— 2	— 9	— 10	— 12	— 17	— 28	— 27	— 17	+ 1	— 1	+ 3	— 10
20.....	+ 10	+ 11	+ 16	+ 21	+ 8	+ 2	— 6	+ 3	+ 13	+ 16	+ 10	+ 13	+ 10
21.....	+ 21	+ 27	+ 34	+ 43	+ 37	+ 33	+ 25	+ 29	+ 29	+ 32	+ 24	+ 23	+ 30
22.....	+ 25	+ 32	+ 37	+ 42	+ 38	+ 36	+ 30	+ 30	+ 29	+ 32	+ 24	+ 29	+ 32
23.....	+ 25	+ 33	+ 35	+ 40	+ 33	+ 33	+ 30	+ 28	+ 24	+ 23	+ 22	+ 30	+ 30

15. WASHINGTON.

Latitude, 38°54' N. — Longitude, 79°23' W. — Altitude, 31^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 13	+ 4	+ 11	+ 4	+ 7	+ 1	- 2	+ 4	+ 7	+ 3	+ 2	- 7	- 2
1.....	- 21	- 5	+ 7	0	- 2	- 8	- 11	- 3	+ 1	- 2	+ 2	- 14	- 5
2.....	- 11	- 1	+ 1	- 3	- 6	- 11	- 17	- 9	- 4	- 7	+ 4	- 5	- 6
3.....	- 10	- 4	- 6	- 3	- 5	- 8	- 17	- 9	- 3	- 10	- 2	- 2	- 7
4.....	- 16	- 6	- 6	+ 3	+ 3	+ 3	- 8	- 3	+ 4	- 5	- 11	- 8	- 4
5.....	- 19	+ 1	+ 8	+ 20	+ 22	+ 22	+ 13	+ 13	+ 20	+ 9	- 13	- 8	+ 7
6.....	- 2	+ 18	+ 32	+ 48	+ 46	+ 42	+ 36	+ 37	+ 41	+ 28	- 2	+ 11	+ 28
7.....	+ 28	+ 44	+ 60	+ 73	+ 69	+ 62	+ 58	+ 60	+ 61	+ 52	+ 28	+ 39	+ 53
8.....	+ 59	+ 73	+ 83	+ 90	+ 84	+ 74	+ 71	+ 76	+ 78	+ 81	+ 67	+ 68	+ 75
9.....	+ 90	+ 92	+ 92	+ 99	+ 85	+ 76	+ 74	+ 85	+ 89	+ 95	+ 94	+ 92	+ 89
10.....	+ 102	+ 88	+ 85	+ 90	+ 73	+ 72	+ 70	+ 83	+ 83	+ 87	+ 93	+ 96	- 85
11.....	+ 72	+ 64	+ 62	+ 59	+ 50	+ 60	+ 59	+ 65	+ 59	+ 57	+ 55	+ 56	- 60
12 (midi).	+ 8	+ 13	+ 27	+ 16	+ 20	+ 36	+ 35	+ 36	+ 24	+ 12	- 5	- 11	- 18
13.....	- 48	- 44	- 22	- 27	- 11	+ 4	+ 5	+ 3	- 17	- 37	- 52	- 62	- 26
14.....	- 74	- 79	- 66	- 67	- 42	- 28	- 25	- 30	- 53	- 70	- 79	- 81	- 58
15.....	- 72	- 85	- 92	- 93	- 67	- 59	- 55	- 59	- 79	- 83	- 79	- 74	- 75
16.....	- 57	- 80	- 99	- 96	- 84	- 80	- 76	- 75	- 89	- 84	- 66	- 57	- 79
17.....	- 37	- 63	- 89	- 84	- 91	- 88	- 84	- 79	- 89	- 72	- 48	- 39	- 72
18.....	- 13	- 42	- 62	- 66	- 87	- 81	- 75	- 75	- 79	- 50	- 27	- 20	- 56
19.....	- 4	- 21	- 37	- 45	- 64	- 63	- 53	- 62	- 55	- 28	- 7	- 5	- 36
20.....	+ 11	- 3	- 14	- 24	- 33	- 36	- 25	- 40	- 23	- 7	+ 7	+ 6	- 15
21.....	+ 12	+ 10	+ 3	- 5	+ 1	- 6	+ 4	- 18	+ 1	+ 9	+ 15	+ 11	- 3
22.....	+ 8	+ 14	+ 10	+ 5	+ 16	+ 8	+ 14	- 4	+ 11	+ 13	+ 15	+ 10	- 10
23.....	- 1	+ 12	+ 12	+ 6	+ 16	+ 8	+ 9	+ 4	+ 12	- 9	+ 9	- 4	- 8

16. PÉKIN.

Latitude, 39°57' N. — Longitude, 114°9' E. — Altitude, 38^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 39	+ 31	+ 38	+ 29	+ 29	+ 25	+ 19	+ 20	+ 17	+ 14	+ 37	+ 30	- 27
1.....	+ 23	+ 31	+ 41	+ 30	+ 29	+ 20	+ 14	+ 15	+ 14	+ 20	+ 28	+ 22	+ 24
2.....	+ 30	+ 32	+ 34	+ 28	+ 16	+ 17	+ 6	+ 8	+ 7	+ 19	+ 27	+ 31	+ 21
3.....	- 25	+ 21	+ 20	+ 26	+ 12	+ 18	- 1	+ 4	+ 3	+ 12	+ 16	+ 26	- 15
4.....	- 10	+ 14	+ 13	+ 30	+ 20	+ 26	- 1	+ 3	+ 5	+ 13	+ 4	+ 10	+ 12
5.....	- 5	+ 15	+ 21	+ 46	+ 39	+ 44	+ 12	+ 11	+ 18	+ 24	0	- 5	+ 18
6.....	- 1	+ 24	+ 42	+ 77	+ 69	+ 61	+ 30	+ 28	+ 38	+ 41	+ 11	+ 3	- 35
7.....	- 26	+ 49	+ 77	+ 107	+ 100	+ 78	+ 49	+ 48	+ 58	+ 64	+ 34	+ 22	+ 59
8.....	- 55	+ 86	+ 112	+ 131	+ 124	+ 92	+ 63	+ 63	+ 78	+ 100	+ 69	+ 54	+ 86
9.....	+ 79	+ 107	+ 130	+ 141	+ 129	+ 94	+ 67	+ 72	+ 96	+ 119	+ 92	+ 86	+ 101
10.....	+ 93	+ 103	+ 124	+ 136	+ 115	+ 86	+ 63	+ 74	+ 94	+ 112	+ 88	+ 99	+ 99
11.....	+ 70	+ 84	+ 88	+ 105	+ 87	+ 70	+ 53	+ 61	+ 71	+ 88	+ 61	+ 70	+ 76
12 (midi).	+ 4	+ 34	+ 37	+ 47	+ 47	+ 35	+ 32	+ 33	+ 35	+ 40	0	+ 3	+ 29
13.....	- 66	- 44	- 26	- 10	- 5	- 8	+ 3	+ 3	- 6	- 23	- 60	- 58	- 25
14.....	- 105	- 104	- 88	- 74	- 53	- 47	- 24	- 30	- 46	- 73	- 98	- 96	- 70
15.....	- 114	- 130	- 125	- 124	- 100	- 87	- 49	- 62	- 76	- 99	- 108	- 109	- 99
16.....	- 108	- 129	- 147	- 156	- 132	- 113	- 69	- 83	- 98	- 117	- 108	- 100	- 113
17.....	- 89	- 113	- 156	- 172	- 151	- 129	- 84	- 92	- 105	- 122	- 91	- 80	- 115
18.....	- 52	- 84	- 130	- 167	- 148	- 124	- 86	- 91	- 97	- 105	- 60	- 51	- 100
19.....	- 23	- 50	- 89	- 133	- 125	- 99	- 72	- 71	- 71	- 77	- 29	- 24	- 72
20.....	- 2	- 22	- 50	- 81	- 84	- 66	- 45	- 37	- 38	- 44	- 4	- 4	- 39
21.....	+ 23	+ 1	- 11	- 32	- 35	- 24	- 10	- 7	- 14	- 18	+ 19	+ 12	- 8
22.....	+ 39	+ 17	+ 15	- 3	- 1	+ 8	- 11	+ 10	+ 3	+ 1	+ 33	+ 26	+ 13
23.....	+ 43	+ 27	+ 30	+ 18	+ 18	+ 23	+ 19	+ 20	+ 14	+ 11	+ 39	+ 33	+ 25

ÉTUDE SUR LA MARCHE DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.257

17. COÏMBRE.

Latitude, 40° 12' N. — Longitude, 10° 44' W. — Altitude, 141^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
h													
0 (min.).	+ 7	+ 18	+ 20	+ 30	+ 23	+ 23	+ 24	+ 23	+ 17	+ 11	+ 10	+ 6	+ 18
1.....	— 6	+ 4	+ 6	+ 6	+ 3	+ 2	+ 6	+ 4	+ 2	— 3	— 1	9	— 1
2.....	— 6	— 9	— 12	— 14	— 16	— 15	— 9	— 10	— 12	— 17	— 12	— 6	— 12
3.....	— 12	— 23	— 29	— 27	— 26	— 26	— 18	— 20	— 25	— 29	— 24	— 12	— 23
4.....	— 27	— 32	— 34	— 34	— 29	— 26	— 19	— 25	— 31	— 32	— 31	— 26	— 29
5.....	— 36	— 30	— 28	— 31	— 19	— 18	— 10	— 17	— 26	— 28	— 31	— 32	— 25
6.....	— 28	— 21	— 13	— 13	— 2	— 2	+ 2	— 2	— 12	— 16	— 21	— 22	— 12
7.....	— 6	— 2	+ 10	+ 7	+ 16	+ 15	+ 17	+ 15	+ 9	+ 6	+ 1	— 1	+ 7
8.....	— 25	+ 28	+ 36	+ 25	+ 30	+ 27	+ 30	+ 31	+ 32	+ 35	+ 29	+ 25	+ 29
9.....	— 60	+ 55	+ 60	+ 38	+ 38	+ 35	+ 38	+ 45	+ 57	+ 59	+ 57	— 60	+ 50
10.....	+ 80	+ 69	+ 66	+ 43	+ 40	+ 37	+ 40	+ 49	+ 63	+ 63	+ 66	+ 79	+ 58
11.....	+ 69	+ 65	+ 55	+ 32	+ 30	+ 30	+ 32	+ 35	+ 44	+ 50	+ 51	— 63	+ 46
12 (midi).	+ 13	+ 30	+ 27	+ 9	+ 3	+ 8	+ 6	+ 4	+ 8	+ 12	+ 6	— 14	+ 12
13.....	— 23	— 14	— 12	— 14	— 20	— 16	— 20	— 21	— 25	— 25	— 26	— 24	— 20
14.....	— 44	— 44	— 42	— 36	— 37	— 32	— 37	— 42	— 47	— 46	— 44	46	— 41
15.....	— 48	— 61	— 61	— 53	— 48	— 44	— 46	— 55	— 60	— 54	— 47	— 47	— 52
16.....	— 44	— 60	— 67	— 54	— 50	— 49	— 51	— 57	— 58	— 54	— 42	— 41	— 52
17.....	— 34	— 47	— 58	— 45	— 45	— 48	— 51	— 53	— 45	— 39	— 29	— 30	— 41
18.....	— 16	— 24	— 31	— 27	— 31	— 34	— 42	— 39	— 27	— 15	— 11	— 16	— 26
19.....	+ 2	— 2	— 5	— 5	7	— 12	— 20	— 14	— 1	6	+ 6	— 2	— 4
20.....	+ 14	+ 14	+ 16	+ 22	+ 18	+ 16	+ 8	+ 18	+ 27	+ 23	+ 18	— 9	+ 17
21.....	21	+ 27	+ 31	+ 44	+ 41	+ 40	+ 37	+ 42	+ 41	+ 34	+ 26	+ 17	+ 33
22.....	+ 22	+ 31	+ 35	+ 51	+ 47	+ 47	+ 45	+ 48	+ 39	+ 35	+ 27	+ 21	+ 37
23.....	+ 17	+ 28	+ 30	+ 46	+ 41	+ 42	+ 38	+ 41	+ 30	+ 24	+ 22	+ 20	+ 32

18. MADRID.

Latitude, 40° 25' N. — Longitude, 6° 1' W. — Altitude, 655^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
h													
0 (min.).	+ 2	+ 13	+ 21	+ 24	+ 20	+ 13	+ 6	+ 6	+ 9	+ 6	+ 8	+ 6	+ 11
1.....	— 9	+ 2	+ 10	+ 11	+ 6	+ 3	— 3	+ 1	0	— 3	— 1	— 5	+ 1
2.....	— 9	— 3	— 3	— 1	0	— 2	— 7	— 3	— 10	— 14	— 7	— 9	— 6
3.....	— 10	— 15	— 15	— 8	— 1	0	— 3	— 1	— 13	— 20	— 18	— 18	— 10
4.....	— 20	— 24	— 19	— 10	+ 3	+ 12	+ 11	+ 8	— 9	— 19	— 23	— 29	— 10
5.....	— 22	— 22	— 10	+ 2	+ 19	+ 32	+ 34	+ 26	+ 6	— 10	— 19	— 30	+ 1
6.....	— 10	— 8	+ 10	+ 24	+ 39	+ 51	+ 56	+ 49	+ 30	+ 6	— 6	— 18	+ 19
7.....	+ 10	+ 17	+ 33	+ 44	+ 55	+ 66	+ 75	+ 71	+ 53	+ 30	+ 17	+ 4	— 40
8.....	+ 36	+ 43	+ 56	+ 59	+ 64	+ 74	+ 85	+ 86	+ 74	+ 56	+ 44	+ 31	+ 59
9.....	+ 65	+ 69	+ 75	+ 66	+ 67	+ 74	+ 85	+ 91	+ 90	+ 74	+ 68	+ 62	+ 71
10.....	+ 82	+ 80	+ 80	+ 63	+ 62	+ 66	+ 77	+ 85	+ 88	+ 74	+ 74	+ 82	+ 76
11.....	+ 66	+ 72	+ 66	+ 42	+ 43	+ 51	+ 59	+ 64	+ 63	+ 56	+ 53	+ 60	— 58
12 (midi).	+ 21	+ 40	+ 33	+ 14	+ 16	+ 26	+ 33	+ 33	+ 30	+ 20	+ 12	+ 15	+ 21
13.....	— 22	— 9	— 10	— 15	— 13	— 7	0	— 1	— 7	— 19	— 23	— 25	— 13
14.....	— 49	— 47	— 47	— 44	— 43	— 38	— 33	— 37	— 43	— 46	— 49	— 47	— 41
15.....	— 55	— 66	— 75	— 72	— 70	— 67	— 64	— 68	— 70	— 61	— 58	— 48	— 66
16.....	— 50	— 69	— 86	— 84	— 87	— 86	— 87	— 90	— 84	— 65	— 55	— 42	— 71
17.....	— 40	— 59	— 80	— 82	— 89	— 97	— 101	— 101	— 85	— 56	— 43	— 33	— 72
18.....	26	— 39	— 58	— 67	— 79	— 90	— 98	— 98	— 74	— 38	— 25	— 19	— 59
19.....	— 9	— 20	— 32	— 42	— 53	— 70	— 80	— 76	— 49	— 18	— 8	— 3	— 38
20.....	+ 5	— 4	— 8	— 7	— 20	— 41	— 49	— 43	— 21	0	+ 6	+ 9	— 11
21.....	+ 14	+ 10	+ 12	+ 19	+ 11	— 4	— 13	— 12	0	+ 14	+ 17	+ 18	+ 7
22.....	+ 17	+ 19	+ 22	+ 31	+ 24	+ 15	+ 6	+ 3	+ 10	+ 18	+ 20	+ 21	+ 17
23.....	+ 13	+ 20	+ 25	+ 33	+ 26	+ 19	+ 10	+ 7	+ 12	+ 15	+ 17	+ 17	+ 18

49. NAPLES.

Latitude, 40°52' N. — Longitude, 11°55' E. — Altitude, 149^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	— 13	+ 23	+ 23	+ 27	+ 17	+ 12	+ 19	+ 18	+ 18	— 20	— 18	+ 17	— 19
1.....	+ 1	+ 14	+ 15	+ 13	+ 1	— 2	+ 6	+ 4	+ 7	+ 11	+ 9	+ 6	— 7
2.....	— 5	+ 3	+ 3	— 6	— 13	— 16	— 10	— 9	— 9	— 1	0	— 7	— 4
3.....	— 3	— 14	— 13	— 24	— 23	— 26	— 22	— 21	— 23	— 15	— 12	0	— 16
4.....	— 18	— 25	— 24	— 34	— 28	— 27	— 24	— 28	— 29	— 26	— 20	— 15	— 25
5.....	— 27	— 28	— 25	— 31	— 24	— 18	— 17	— 24	— 27	— 32	— 25	— 25	— 25
6.....	— 20	— 21	— 17	— 19	— 11	— 5	— 3	— 7	— 15	— 28	— 24	— 21	— 16
7.....	— 4	— 7	0	— 2	— 2	+ 9	— 14	— 11	+ 2	— 11	— 7	— 6	0
8.....	+ 14	+ 10	+ 17	+ 14	+ 14	+ 20	— 26	— 25	+ 20	— 15	— 15	— 14	— 17
9.....	+ 33	+ 26	+ 32	+ 28	— 21	+ 28	+ 32	+ 36	+ 38	— 36	+ 34	— 36	— 32
10.....	+ 44	+ 37	+ 38	+ 37	+ 26	+ 31	+ 33	+ 41	+ 47	+ 42	+ 45	— 50	— 39
11.....	+ 35	+ 36	+ 37	+ 35	+ 26	+ 31	+ 31	+ 35	+ 41	+ 38	+ 36	+ 38	— 35
12 (midi).	+ 6	+ 13	+ 22	+ 20	+ 20	+ 26	+ 22	+ 21	+ 25	— 19	— 10	— 4	— 17
13.....	— 26	— 19	— 5	+ 3	+ 9	+ 13	— 7	+ 6	+ 5	— 7	— 16	— 25	— 5
14.....	— 40	— 40	— 26	— 15	— 5	— 1	— 9	— 10	— 15	— 28	— 34	— 41	— 22
15.....	— 39	— 47	— 42	— 33	— 19	— 14	— 22	— 24	— 32	— 39	— 38	— 42	— 33
16.....	— 32	— 43	— 48	— 40	— 30	— 26	— 33	— 35	— 40	— 42	— 36	— 37	— 37
17.....	— 21	— 29	— 44	— 39	— 32	— 35	— 38	— 41	— 41	— 33	— 28	— 26	— 34
18.....	— 7	— 8	— 28	— 29	— 26	— 33	— 38	— 39	— 35	— 17	— 15	— 14	— 24
19.....	+ 7	+ 10	— 9	— 9	— 13	— 21	— 27	— 25	— 19	— 2	— 1	— 2	— 9
20.....	+ 16	— 22	+ 10	+ 12	+ 6	— 5	— 8	— 1	+ 7	— 15	— 11	+ 10	— 8
21.....	— 21	+ 29	+ 25	+ 28	+ 25	+ 12	+ 14	+ 17	+ 23	— 25	— 23	— 20	— 22
22.....	+ 22	+ 30	+ 30	+ 32	+ 30	+ 24	+ 23	+ 25	+ 27	+ 29	+ 28	+ 25	— 27
23.....	+ 20	+ 28	+ 29	— 32	+ 27	+ 23	+ 24	+ 25	+ 25	— 27	— 27	+ 27	— 26

20. TIFLIS.

Latitude, 41°43' N. — Longitude, 42°27' E. — Altitude, 442^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	— 16	+ 25	+ 29	+ 43	+ 43	+ 44	+ 40	+ 37	+ 39	— 34	+ 24	+ 20	— 33
1.....	— 16	+ 23	+ 33	+ 38	— 38	+ 43	+ 41	+ 36	+ 40	— 38	— 22	+ 17	— 32
2.....	+ 24	+ 22	+ 29	+ 34	+ 35	+ 44	+ 41	+ 37	— 37	+ 34	— 25	+ 24	— 32
3.....	— 23	+ 15	+ 20	+ 31	+ 34	+ 45	+ 44	+ 38	+ 34	— 26	+ 19	+ 23	— 29
4.....	— 10	+ 5	+ 19	+ 28	+ 36	+ 50	+ 51	+ 43	+ 32	— 25	— 14	+ 8	— 27
5.....	— 1	+ 5	+ 22	+ 32	+ 46	+ 59	+ 62	+ 52	+ 38	+ 27	— 13	+ 2	— 30
6.....	— 6	+ 9	+ 30	+ 50	+ 58	+ 68	+ 73	+ 65	+ 50	— 33	+ 17	+ 6	+ 39
7.....	— 21	+ 23	+ 46	+ 63	+ 66	— 73	+ 80	+ 75	+ 61	— 47	— 31	+ 19	— 50
8.....	— 42	+ 43	+ 60	+ 65	+ 68	— 69	+ 79	+ 78	+ 66	— 65	— 51	+ 36	— 60
9.....	— 61	+ 51	+ 64	+ 63	+ 60	— 55	+ 67	+ 71	— 68	— 66	— 59	+ 54	— 62
10.....	— 65	— 51	— 53	+ 52	+ 45	+ 37	— 49	+ 60	+ 55	— 52	— 55	+ 61	— 53
11.....	— 43	+ 34	+ 29	+ 21	+ 20	+ 12	+ 25	+ 31	+ 26	— 27	+ 28	+ 33	+ 27
12 (midi).	— 7	0	— 2	— 11	+ 12	— 19	— 6	— 4	— 8	— 13	— 14	— 15	— 9
13.....	— 50	— 40	— 41	— 43	— 47	— 54	— 41	— 39	— 45	— 57	— 53	— 53	— 47
14.....	— 76	— 68	— 74	— 75	— 77	— 83	— 75	— 75	— 82	— 89	— 77	— 73	— 77
15.....	— 72	— 76	— 89	— 102	— 102	— 105	— 104	— 106	— 107	— 100	— 81	— 69	— 93
16.....	— 64	— 72	— 96	— 112	— 110	— 116	— 123	— 122	— 116	— 103	— 75	— 58	— 97
17.....	— 54	— 61	— 91	— 105	— 110	— 120	— 129	— 127	— 110	— 92	— 61	— 45	— 92
18.....	— 34	— 41	— 68	— 89	— 94	— 98	— 115	— 113	— 94	— 64	— 37	— 29	— 73
19.....	— 13	— 13	— 30	— 53	— 63	— 65	— 83	— 77	— 54	— 31	— 15	— 11	— 42
20.....	0	— 3	— 5	— 12	— 24	— 29	— 39	— 28	— 8	— 5	— 1	+ 2	— 12
21.....	— 10	— 15	— 13	+ 18	+ 17	+ 15	+ 4	+ 7	+ 14	— 17	— 13	+ 10	+ 13
22.....	— 15	+ 22	+ 22	+ 27	+ 32	+ 32	— 24	+ 24	+ 28	+ 29	+ 20	+ 17	+ 24
23.....	— 17	+ 23	— 27	+ 37	+ 41	— 43	+ 35	+ 35	+ 36	— 33	— 23	+ 22	+ 31

ÉTUDE SUR LA MARCHE DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.259

21. ALBANY.

Latitude, 42°39' N. — Longitude, 76°5' W. — Altitude, 46^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
h													
0 (min.).	— 5	0	+ 6	+ 18	+ 22	+ 8	+ 9	+ 4	+ 2	— 3	+ 5	— 20	+ 4
1.....	— 9	— 2	+ 9	+ 11	+ 13	+ 5	+ 9	+ 2	+ 6	0	0	— 21	+ 2
2.....	— 4	+ 1	+ 2	+ 3	+ 3	+ 1	+ 4	— 3	+ 1	— 2	+ 1	— 4	0
3.....	+ 1	— 4	— 7	0	— 2	+ 1	+ 3	— 4	+ 2	— 4	— 7	+ 5	— 1
4.....	— 3	— 1	— 5	+ 4	+ 2	+ 11	+ 12	+ 1	+ 12	+ 2	— 11	— 3	+ 2
5.....	— 4	+ 12	+ 7	+ 20	+ 18	+ 31	+ 30	+ 21	+ 28	+ 14	— 4	— 5	+ 14
6.....	+ 11	+ 29	+ 25	+ 43	+ 38	+ 52	+ 51	+ 44	+ 53	+ 31	+ 8	+ 9	+ 33
7.....	+ 32	+ 49	+ 45	+ 62	+ 54	+ 70	+ 69	+ 62	+ 74	+ 55	+ 26	+ 29	+ 52
8.....	+ 52	+ 67	+ 62	+ 71	+ 58	+ 79	+ 76	+ 72	+ 88	+ 76	+ 43	+ 49	+ 66
9.....	+ 71	+ 74	+ 67	+ 71	+ 54	+ 79	+ 74	+ 75	+ 92	+ 83	+ 53	+ 69	+ 72
10.....	+ 85	+ 72	+ 61	+ 62	+ 41	+ 69	+ 65	+ 70	+ 84	+ 75	+ 55	+ 81	+ 68
11.....	+ 68	+ 56	+ 43	+ 37	+ 24	+ 50	+ 45	+ 51	+ 60	+ 53	+ 33	+ 54	+ 48
12 (midi).	+ 16	+ 22	+ 14	+ 8	+ 3	+ 23	+ 18	+ 26	+ 24	+ 19	— 4	+ 19	+ 17
13.....	— 34	— 30	— 21	— 21	— 20	— 7	— 8	0	— 15	— 18	— 38	— 19	— 19
14.....	— 61	— 66	— 56	— 49	— 42	— 38	— 33	— 26	— 49	— 48	— 55	— 43	— 47
15.....	— 66	— 78	— 77	— 75	— 62	— 62	— 55	— 52	— 75	— 72	— 59	— 48	— 65
16.....	— 60	— 76	— 76	— 91	— 71	— 79	— 74	— 71	— 90	— 81	— 50	— 45	— 72
17.....	— 49	— 62	— 61	— 90	— 71	— 87	— 85	— 80	— 92	— 72	— 34	— 36	— 68
18.....	— 34	— 43	— 42	— 74	— 61	— 83	— 82	— 77	— 82	— 53	— 15	— 26	— 56
19.....	— 16	— 23	— 20	— 48	— 38	— 67	— 67	— 62	— 62	— 35	0	— 16	— 38
20.....	0	— 7	— 2	— 12	— 15	— 42	— 44	— 36	— 37	— 17	+ 10	— 8	— 18
21.....	+ 5	+ 2	+ 8	+ 10	+ 6	— 18	— 20	— 15	— 17	— 5	+ 15	— 4	— 3
22.....	+ 4	+ 5	+ 10	+ 19	+ 21	— 2	— 3	— 4	— 5	+ 1	+ 16	— 5	+ 5
23.....	0	+ 3	+ 8	+ 21	+ 25	+ 6	+ 6	+ 2	— 2	+ 1	+ 12	— 12	+ 6

22. PERPIGNAN.

Latitude, 42°42' N. — Longitude, 0°34' E. — Altitude, 32^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
h													
0 (min.).	+ 19	+ 33	+ 42	+ 36	+ 32	+ 32	+ 30	+ 28	+ 29	+ 32	+ 23	+ 22	+ 30
1.....	— 7	+ 22	+ 31	+ 22	+ 20	+ 20	+ 22	+ 21	+ 18	+ 21	+ 14	+ 8	+ 19
2.....	— 7	+ 10	+ 15	+ 9	+ 8	+ 7	+ 12	+ 12	+ 2	+ 4	+ 4	+ 4	— 8
3.....	+ 2	— 6	— 2	— 1	— 2	— 1	+ 7	+ 6	— 8	— 8	— 9	— 7	— 2
4.....	— 10	— 13	— 11	— 5	— 5	+ 1	+ 11	+ 6	— 12	— 14	— 16	— 19	— 7
5.....	— 19	— 12	— 12	— 1	+ 4	+ 11	+ 21	+ 12	— 8	— 14	— 16	— 30	— 5
6.....	— 15	— 4	— 2	+ 11	+ 18	+ 23	+ 32	+ 25	+ 7	— 8	— 6	— 28	+ 4
7.....	0	+ 11	+ 14	+ 23	+ 30	+ 33	+ 42	+ 37	+ 23	+ 9	+ 12	— 8	+ 19
8.....	+ 19	+ 28	+ 30	+ 32	+ 35	+ 39	+ 46	+ 44	+ 36	+ 29	+ 34	+ 15	+ 32
9.....	+ 45	+ 42	+ 37	+ 35	+ 34	+ 38	+ 43	+ 47	+ 46	+ 41	+ 50	+ 40	+ 42
10.....	— 60	+ 45	+ 35	+ 31	+ 28	+ 31	+ 37	+ 43	+ 40	+ 35	+ 52	+ 52	+ 41
11.....	+ 41	+ 36	+ 22	+ 15	+ 15	+ 20	+ 26	+ 28	+ 21	+ 16	+ 29	+ 31	+ 25
12 (midi).	— 1	+ 10	+ 2	— 5	— 2	+ 4	+ 8	+ 6	— 1	— 11	— 14	— 10	— 1
13.....	— 41	— 31	— 29	— 24	— 19	— 16	— 13	— 16	— 24	— 41	— 49	— 42	— 29
14.....	— 64	— 64	— 58	— 44	— 37	— 37	— 33	— 39	— 46	— 58	— 62	— 57	— 50
15.....	— 65	— 73	— 73	— 60	— 55	— 54	— 53	— 58	— 58	— 63	— 59	— 50	— 60
16.....	— 53	— 65	— 73	— 64	— 63	— 66	— 70	— 70	— 61	— 61	— 49	— 36	— 61
17.....	— 34	— 46	— 61	— 61	— 63	— 69	— 80	— 75	— 56	— 46	— 32	— 20	— 54
18.....	— 13	— 23	— 36	— 46	— 49	— 61	— 73	— 67	— 41	— 24	— 15	— 3	— 38
19.....	— 7	— 4	— 10	— 21	— 28	— 40	— 53	— 44	— 15	+ 2	+ 2	+ 14	— 16
20.....	— 21	+ 11	+ 14	+ 11	0	— 9	— 25	— 13	+ 12	+ 25	+ 17	+ 26	+ 7
21.....	— 29	+ 23	+ 33	+ 30	+ 26	+ 21	+ 6	+ 12	+ 28	+ 44	+ 28	+ 32	+ 26
22.....	+ 31	+ 32	+ 44	+ 39	+ 37	+ 35	+ 25	+ 25	+ 34	+ 49	+ 31	+ 34	+ 35
23.....	— 28	+ 36	+ 46	+ 42	+ 39	+ 38	+ 31	+ 29	+ 34	+ 42	+ 30	+ 32	+ 36

23. HOBARTON.

Latitude, 42° 52' S. — Longitude, 145° 8' E. — Altitude, 32^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 22	+ 30	+ 35	+ 22	+ 23	+ 21	+ 17	+ 20	+ 41	+ 27	+ 36	— 31	— 27
1.....	— 3	+ 14	+ 22	+ 10	+ 5	+ 3	0	+ 6	+ 20	+ 6	+ 18	— 11	+ 9
2.....	— 20	0	+ 9	— 2	— 12	— 13	— 15	— 7	0	— 10	+ 2	7	— 6
3.....	— 33	— 12	— 1	— 12	— 27	— 27	— 27	— 18	18	— 19	— 11	16	— 18
4.....	— 41	— 16	— 6	— 19	— 39	— 33	— 37	— 23	25	— 17	— 13	— 12	— 24
5.....	— 22	— 5	— 2	— 14	— 37	— 30	— 39	— 14	— 16	+ 2	+ 5	— 9	12
6.....	— 18	+ 32	— 27	— 8	— 16	— 15	— 21	+ 9	— 8	— 26	+ 33	— 32	— 12
7.....	— 46	— 57	— 57	— 38	— 11	+ 8	+ 8	+ 32	+ 33	+ 44	+ 50	+ 44	+ 36
8.....	— 55	+ 72	— 70	+ 65	+ 36	+ 31	+ 35	+ 53	— 54	+ 53	+ 50	+ 43	— 51
9.....	— 45	— 63	— 70	— 73	+ 50	+ 47	+ 54	+ 66	— 65	+ 49	+ 31	— 27	— 53
10.....	— 24	+ 37	— 54	— 61	+ 48	+ 52	+ 59	+ 62	+ 35	+ 21	+ 4	— 4	— 38
11.....	— 2	— 8	— 19	— 27	+ 26	+ 29	+ 34	+ 26	— 7	— 14	— 24	19	— 9
12 (midi).	— 19	— 20	— 16	— 14	— 9	— 11	— 8	— 21	— 46	— 45	— 51	— 38	— 25
13.....	— 39	— 47	— 50	— 50	— 43	— 50	— 47	— 62	— 79	— 72	— 72	— 54	— 55
14.....	— 56	— 68	— 82	— 73	— 60	— 64	— 61	— 81	— 91	— 84	— 85	— 66	— 73
15.....	— 66	— 82	— 98	— 82	— 61	— 60	— 58	— 78	— 90	— 87	— 87	— 71	— 77
16.....	— 70	— 86	— 97	— 79	— 48	— 44	— 46	— 64	— 81	— 78	— 80	— 71	— 70
17.....	— 65	— 79	— 84	— 62	— 27	— 22	— 26	— 43	— 56	— 54	— 56	— 57	— 53
18.....	— 30	— 52	— 56	— 32	— 3	0	— 4	— 18	— 20	— 19	— 20	— 26	— 23
19.....	— 18	— 11	— 19	— 2	+ 18	+ 22	+ 20	+ 7	+ 19	+ 26	+ 17	+ 11	— 11
20.....	— 50	— 25	— 18	— 26	+ 35	+ 36	+ 38	+ 30	+ 51	+ 60	+ 54	— 47	— 39
21.....	— 64	+ 42	— 38	— 36	+ 45	+ 42	+ 45	+ 42	+ 69	+ 68	+ 75	+ 64	— 53
22.....	— 67	— 46	— 44	— 38	+ 46	+ 42	+ 44	+ 42	+ 73	+ 67	— 70	— 63	+ 54
23.....	— 53	— 42	— 44	+ 33	+ 39	+ 36	+ 35	+ 34	+ 61	+ 50	+ 54	— 51	+ 44

24. MARSEILLE.

Latitude, 43° 18' N. — Longitude, 3° 3' E. — Altitude, 75^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 7	+ 12	+ 27	— 19	+ 10	+ 5	— 15	0	+ 14	+ 19	+ 9	— 19	+ 14
1.....	+ 2	+ 7	+ 24	+ 14	+ 2	— 5	— 21	— 9	+ 9	+ 15	+ 8	— 11	+ 5
2.....	+ 2	0	+ 18	— 8	— 7	— 14	— 25	17	0	+ 10	+ 7	+ 6	— 1
3.....	— 4	— 7	+ 6	— 1	— 13	— 19	— 25	— 23	— 10	+ 3	+ 1	— 6	— 8
4.....	— 17	— 15	— 3	— 6	— 16	— 18	— 16	— 20	— 17	— 3	— 6	— 23	— 13
5.....	— 27	— 18	— 12	— 3	— 13	— 11	— 5	— 8	— 17	— 8	— 9	— 31	— 13
6.....	— 26	— 13	— 4	— 8	— 3	+ 1	+ 10	— 10	— 7	— 6	— 3	— 30	— 5
7.....	— 12	0	— 9	— 18	— 6	+ 11	+ 23	+ 23	+ 6	— 5	— 12	— 14	+ 7
8.....	— 11	— 17	+ 23	— 25	— 14	+ 20	— 29	— 29	+ 19	+ 19	— 28	+ 10	+ 20
9.....	— 40	— 34	— 33	— 28	— 20	+ 25	+ 34	— 34	+ 32	— 29	— 41	+ 39	+ 32
10.....	— 59	— 45	+ 33	— 29	— 22	— 26	+ 35	+ 35	+ 40	— 26	— 49	+ 58	+ 38
11.....	+ 56	— 49	+ 26	+ 25	+ 21	— 26	+ 34	+ 33	+ 37	+ 15	— 40	+ 49	+ 34
12 (midi).	+ 26	+ 35	+ 18	— 14	+ 18	+ 23	+ 32	+ 30	— 25	+ 5	— 9	+ 14	— 21
13.....	0	— 12	0	— 4	+ 13	— 16	+ 24	+ 19	+ 12	— 6	— 12	— 8	+ 6
14.....	— 12	— 10	— 16	— 7	+ 1	— 4	+ 12	+ 7	— 1	— 17	— 23	— 17	— 7
15.....	— 17	— 20	— 28	— 19	— 12	— 11	— 3	— 6	— 14	— 24	— 26	— 20	— 17
16.....	— 20	— 26	— 37	— 29	— 26	— 22	— 16	— 19	— 27	— 30	— 28	— 21	— 25
17.....	— 23	— 31	— 42	— 37	— 35	— 31	— 27	— 32	— 38	— 33	— 29	— 21	— 32
18.....	— 23	— 30	— 40	— 45	— 30	— 28	— 28	— 40	— 39	— 30	— 28	— 21	— 32
19.....	— 20	— 28	— 38	— 42	— 16	— 20	— 22	— 31	— 30	— 23	— 26	— 19	— 26
20.....	— 15	— 22	— 26	— 22	0	— 9	— 10	— 16	— 15	— 11	— 17	— 13	— 15
21.....	— 6	— 7	— 6	— 5	+ 12	+ 4	— 4	— 4	— 1	+ 5	— 7	+ 2	— 1
22.....	+ 5	+ 4	+ 12	— 7	+ 17	+ 13	— 6	+ 3	+ 9	+ 18	+ 2	+ 15	+ 8
23.....	+ 11	+ 12	+ 23	— 15	— 15	+ 13	— 10	— 4	+ 14	+ 22	— 7	+ 21	+ 12

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.261

25. SAINT-MARTIN-DE-HINX.

Latitude, 43°35' N. — Longitude, 3°36' W. — Altitude, 40^m.

Heures. h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 19	+ 24	+ 28	+ 33	+ 35	+ 34	+ 36	+ 35	+ 29	+ 20	+ 17	+ 17	+ 27
1.....	— 11	+ 13	+ 14	+ 16	+ 18	+ 19	+ 21	+ 18	+ 11	+ 5	+ 6	+ 9	+ 13
2.....	0	0	— 3	— 1	0	+ 5	+ 5	+ 2	— 7	— 11	— 6	— 2	— 2
3.....	— 15	— 20	— 21	— 18	— 12	— 6	— 8	— 14	— 23	— 26	— 19	— 16	— 17
4.....	— 30	— 34	— 37	— 25	— 15	— 12	— 16	— 24	— 36	— 39	— 31	— 29	— 27
5.....	— 35	— 35	31	— 19	— 8	— 5	— 9	— 19	— 30	— 36	— 33	— 34	— 25
6.....	— 24	— 22	— 16	— 6	+ 2	+ 3	+ 1	— 6	— 13	— 16	— 18	— 21	— 11
7.....	— 3	— 4	+ 1	+ 7	+ 11	+ 13	+ 11	+ 7	+ 5	— 3	+ 3	+ 1	— 5
8.....	+ 21	+ 17	+ 17	+ 18	+ 19	+ 19	+ 19	+ 18	+ 21	+ 24	+ 24	+ 22	+ 20
9.....	+ 38	+ 35	+ 33	+ 26	+ 23	+ 21	+ 22	+ 29	+ 39	+ 43	+ 41	+ 40	+ 33
10.....	+ 44	+ 45	+ 41	+ 28	+ 22	+ 18	+ 19	+ 28	+ 42	+ 46	+ 46	+ 45	+ 35
11.....	+ 28	+ 36	+ 32	+ 20	+ 15	+ 11	+ 11	+ 17	+ 26	+ 27	+ 23	+ 26	+ 23
12 (midi).	— 3	+ 13	+ 12	+ 6	+ 2	+ 1	0	+ 4	+ 7	+ 3	— 3	— 2	+ 4
13.....	— 20	— 12	— 9	— 10	— 13	— 12	— 12	— 11	— 12	— 20	— 30	— 28	— 16
14.....	— 38	— 38	31	— 27	— 29	— 27	— 26	— 27	— 31	— 41	— 50	— 43	34
15.....	— 41	— 54	— 52	— 46	— 44	— 40	— 40	— 42	— 47	— 49	— 47	— 41	45
16.....	— 32	— 45	— 54	— 57	— 56	— 53	— 52	— 55	— 52	— 42	— 32	— 30	— 47
17.....	— 18	— 28	— 42	— 53	— 55	— 55	— 54	— 53	— 42	— 25	— 16	— 16	— 38
18.....	— 4	— 11	— 21	— 34	— 40	— 41	— 39	— 34	— 23	— 6	+ 1	0	— 21
19.....	+ 9	+ 4	— 1	— 9	— 17	— 20	— 18	— 12	— 1	+ 10	+ 14	+ 13	— 2
20.....	— 17	+ 18	— 17	+ 13	+ 10	+ 5	+ 4	+ 11	+ 19	+ 24	+ 23	+ 20	+ 15
21.....	+ 22	+ 29	+ 35	+ 36	+ 33	+ 27	+ 28	+ 30	+ 35	+ 35	+ 29	+ 23	+ 30
22.....	+ 24	+ 36	+ 47	+ 53	+ 49	+ 46	+ 48	+ 50	+ 43	— 38	+ 31	— 24	— 41
23.....	+ 23	+ 33	+ 42	+ 49	+ 50	+ 49	+ 49	+ 49	+ 41	+ 33	+ 26	+ 22	+ 39

26. TOULOUSE.

Latitude, 43°37' N. — Longitude, 0°54' W. — Altitude, 194^m.

Heures. h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	— 5	+ 36	+ 20	+ 24	+ 18	+ 16	+ 33	+ 26	— 26	+ 15	+ 18	+ 19	21
1.....	— 1	+ 24	+ 17	+ 17	+ 5	+ 6	+ 24	+ 19	+ 17	+ 8	+ 13	+ 14	+ 14
2.....	— 1	+ 13	+ 12	+ 9	— 7	— 3	+ 15	+ 13	— 7	— 1	+ 9	+ 10	— 6
3.....	— 5	— 5	— 6	+ 3	— 12	— 7	+ 9	+ 9	— 1	— 8	+ 3	0	— 1
4.....	— 12	— 19	+ 2	+ 2	— 10	— 3	— 9	+ 9	— 7	— 13	— 5	— 11	— 5
5.....	— 13	— 21	+ 7	+ 10	+ 2	— 8	— 17	+ 17	— 4	— 11	— 9	— 17	— 1
6.....	— 5	— 10	+ 16	+ 23	+ 18	+ 23	+ 28	+ 29	+ 8	— 1	— 4	— 13	+ 9
7.....	+ 11	+ 7	+ 26	+ 34	+ 33	+ 37	+ 40	+ 41	+ 23	+ 16	+ 8	0	+ 23
8.....	+ 30	+ 23	+ 36	+ 39	+ 41	+ 43	+ 44	+ 47	+ 37	+ 33	+ 24	+ 17	+ 35
9.....	+ 46	+ 35	+ 42	+ 40	+ 43	+ 43	+ 42	+ 47	+ 44	+ 44	+ 36	— 35	+ 41
10.....	— 53	+ 39	+ 40	+ 32	+ 37	+ 37	+ 33	+ 39	+ 41	+ 41	+ 39	+ 44	— 40
11.....	+ 39	+ 31	+ 29	+ 16	+ 24	+ 25	+ 19	+ 22	+ 22	+ 23	+ 20	+ 25	+ 25
12 (midi).	+ 3	+ 5	— 6	— 5	+ 7	— 8	— 1	+ 1	+ 1	— 3	— 9	— 8	+ 1
13.....	— 33	— 26	— 23	— 26	— 14	— 11	— 18	— 20	— 22	— 29	— 35	— 39	— 25
14.....	— 50	— 51	— 47	— 45	— 34	— 30	— 37	— 40	— 43	— 45	— 50	— 50	— 44
15.....	— 46	— 61	— 65	— 61	— 50	— 48	— 54	— 58	— 57	— 51	— 49	— 44	— 54
16.....	— 37	— 58	— 70	— 67	— 62	— 60	— 68	— 71	— 62	— 47	— 38	— 33	— 56
17.....	— 24	— 44	— 59	— 61	— 60	— 62	— 75	— 73	— 55	— 34	— 26	— 21	— 49
18.....	— 10	— 26	— 36	— 44	— 44	— 52	— 68	— 63	— 40	— 17	— 12	— 8	— 35
19.....	+ 2	— 6	— 14	— 20	— 21	— 31	— 48	— 41	— 18	+ 1	0	— 4	— 16
20.....	+ 10	— 11	+ 2	+ 2	+ 4	— 7	— 22	— 15	+ 4	+ 14	+ 10	— 13	— 2
21.....	+ 14	— 26	+ 13	+ 21	+ 23	+ 15	+ 9	+ 20	+ 21	+ 17	+ 19	— 17	— 17
22.....	+ 14	— 37	+ 19	+ 29	+ 31	+ 27	+ 31	+ 24	+ 29	+ 23	+ 20	— 22	— 26
23.....	+ 10	+ 40	+ 21	+ 28	+ 28	+ 26	+ 36	— 29	+ 30	+ 21	+ 20	— 22	+ 26

27. TORONTO.

Latitude, 43°39' N. — Longitude, 81°43' W. — Altitude, 104^m.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 1	- 20	- 2	- 27	- 5	- 18	- 9	- 9	- 15	- 2	- 14	- 9	- 11
1.....	+ 6	- 22	- 3	- 39	- 11	- 23	- 14	- 17	- 18	+ 2	- 14	- 10	- 14
2.....	+ 20	- 18	- 7	- 46	- 17	- 26	- 18	- 24	- 19	- 3	- 5	+ 1	- 14
3.....	+ 15	- 19	- 20	- 45	- 15	- 25	- 20	- 25	- 18	- 9	- 7	+ 2	- 16
4.....	0	- 20	- 22	- 34	- 3	- 11	- 8	- 16	- 6	- 7	- 13	- 12	- 13
5.....	- 9	- 13	- 6	- 12	+ 21	+ 22	+ 18	+ 2	+ 15	+ 5	- 10	- 14	+ 2
6.....	- 8	+ 7	+ 20	+ 19	+ 50	+ 54	+ 42	+ 24	+ 39	+ 23	+ 4	+ 2	+ 23
7.....	- 5	+ 34	+ 46	+ 53	+ 68	+ 72	+ 58	+ 45	+ 57	+ 41	+ 25	+ 26	+ 44
8.....	+ 35	+ 66	+ 62	+ 72	+ 75	+ 78	+ 67	+ 59	+ 69	+ 57	+ 45	+ 50	+ 61
9.....	+ 55	+ 80	- 66	+ 78	+ 75	+ 78	+ 68	+ 65	+ 73	+ 62	+ 59	+ 66	+ 69
10.....	+ 61	+ 82	+ 63	+ 76	+ 68	+ 71	+ 64	+ 65	+ 69	+ 56	+ 63	+ 72	+ 68
11.....	+ 31	+ 66	+ 47	+ 60	+ 59	+ 56	+ 53	+ 55	+ 52	+ 36	+ 40	+ 37	+ 49
12 (midi).	- 23	+ 24	+ 22	+ 36	+ 24	+ 34	+ 34	+ 36	+ 28	- 8	- 2	- 11	+ 18
13.....	- 59	- 20	- 13	+ 12	- 2	+ 10	+ 11	+ 15	+ 2	- 22	- 28	- 42	- 11
14.....	- 65	- 47	- 44	- 12	- 26	- 13	- 12	- 9	- 25	- 44	- 42	- 54	- 33
15.....	- 55	- 56	- 57	- 35	- 47	- 33	- 34	- 32	- 50	- 52	- 39	- 47	- 45
16.....	- 37	- 50	- 57	- 44	- 64	- 51	- 54	- 48	- 59	- 50	- 30	- 34	- 48
17.....	- 19	- 38	- 46	- 42	- 69	- 63	- 64	- 54	- 57	- 40	- 19	- 20	- 44
18.....	- 1	- 22	- 32	- 31	- 66	- 66	- 65	- 52	- 49	- 30	- 9	- 8	- 36
19.....	+ 9	- 6	- 18	- 17	- 55	- 56	- 54	- 40	- 37	- 20	- 2	0	- 25
20.....	+ 13	+ 1	- 6	- 5	- 33	- 39	- 36	- 24	- 23	- 10	+ 1	+ 4	- 13
21.....	+ 13	+ 2	+ 3	0	- 12	- 23	- 17	- 9	- 11	- 2	+ 1	+ 1	- 4
22.....	+ 8	- 1	+ 3	- 3	- 4	- 14	- 6	- 3	- 7	+ 2	- 1	+ 1	- 2
23.....	+ 4	- 10	+ 1	- 14	- 2	- 14	- 4	- 4	- 10	- 1	- 7	- 4	- 5

28. MONCALIERI.

Latitude, 45°0' N. — Longitude, 5°22' E. — Altitude, 260^m.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 22	- 25	+ 29	+ 29	+ 29	+ 24	+ 29	+ 22	+ 26	+ 27	+ 21	+ 23	+ 26
1.....	+ 12	+ 17	+ 19	+ 20	+ 17	+ 16	+ 23	+ 17	+ 17	+ 17	+ 16	+ 15	+ 18
2.....	+ 7	+ 12	+ 8	+ 9	+ 5	+ 7	+ 16	+ 9	+ 8	+ 6	+ 10	+ 10	+ 9
3.....	0	0	5	1	- 2	+ 3	+ 11	+ 4	- 2	- 3	+ 3	- 2	0
4.....	- 13	- 12	- 12	- 4	- 3	+ 7	- 14	+ 4	8	- 8	- 3	- 14	- 4
5.....	- 25	- 14	- 9	+ 3	+ 9	+ 20	+ 27	+ 16	2	6	0	- 21	0
6.....	- 18	- 5	+ 5	+ 21	+ 27	+ 37	+ 44	- 35	+ 19	+ 4	+ 10	- 15	+ 14
7.....	0	+ 10	+ 23	+ 38	+ 42	+ 52	+ 57	+ 53	+ 38	+ 22	+ 25	+ 2	+ 30
8.....	- 21	- 27	+ 40	+ 50	+ 51	+ 60	- 64	+ 64	- 53	+ 40	+ 40	+ 22	+ 44
9.....	- 42	- 43	+ 54	+ 54	+ 54	+ 59	+ 62	- 65	+ 61	+ 50	+ 49	+ 40	+ 53
10.....	- 52	- 54	+ 60	+ 53	+ 51	+ 50	+ 52	- 59	+ 58	+ 47	+ 49	+ 51	+ 53
11.....	+ 40	+ 49	+ 50	+ 40	+ 38	+ 33	+ 36	+ 43	+ 42	+ 31	+ 32	+ 34	+ 39
12 (midi).	+ 6	- 21	+ 23	+ 16	+ 16	+ 11	+ 14	+ 19	+ 17	+ 5	- 1	0	+ 12
13.....	- 30	- 15	- 12	- 11	- 10	- 13	- 13	- 8	- 10	- 23	- 33	- 33	- 18
14.....	- 51	- 45	- 42	- 39	- 37	- 37	- 38	- 35	- 37	- 47	- 55	- 50	- 43
15.....	- 52	- 64	- 65	- 65	- 61	- 59	- 63	- 61	- 62	- 62	- 64	- 50	- 61
16.....	- 47	- 69	- 80	- 83	- 78	- 75	- 85	- 82	- 79	- 69	- 63	- 46	- 71
17.....	- 37	- 60	- 78	- 86	- 84	- 82	- 97	- 91	- 83	- 62	- 53	- 37	- 71
18.....	- 23	- 39	- 58	- 69	- 73	- 75	- 91	- 84	- 70	- 43	- 36	- 23	- 57
19.....	- 5	- 16	- 29	- 41	- 47	- 55	- 68	- 60	- 41	- 19	- 16	- 6	- 34
20.....	+ 12	- 4	- 3	9	- 16	- 28	- 36	- 28	- 12	+ 5	+ 2	+ 11	- 8
21.....	- 26	+ 19	+ 17	+ 16	+ 12	- 1	- 4	0	+ 12	+ 24	+ 17	+ 26	+ 14
22.....	- 32	+ 28	+ 30	+ 28	+ 29	+ 20	+ 18	+ 16	- 25	+ 33	+ 25	+ 32	+ 26
23.....	- 30	+ 30	+ 34	+ 31	+ 33	+ 26	+ 28	+ 22	+ 29	+ 33	+ 25	+ 31	+ 29

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.263

29. LYON (Saint-Genis-Laval).

Latitude, 45°41' N. — Longitude, 2°27' E. — Altitude, 299^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
h													
0 (min.).	+ 13	+ 15	+ 18	+ 22	+ 22	+ 21	+ 21	+ 22	+ 26	+ 17	+ 16	+ 18	+ 19
1.....	+ 2	+ 11	+ 19	+ 18	+ 13	+ 12	+ 14	+ 14	+ 21	+ 13	+ 8	+ 6	+ 13
2.....	— 2	+ 5	+ 10	+ 8	+ 3	+ 2	+ 5	+ 7	+ 11	+ 2	+ 7	+ 4	+ 5
3.....	— 8	— 8	— 7	+ 2	— 5	— 6	+ 3	+ 1	0	+ 12	— 8	0	— 4
4.....	— 22	— 17	— 13	0	— 7	— 6	+ 5	— 3	— 9	— 19	— 17	— 16	— 10
5.....	— 32	— 17	— 12	+ 5	+ 2	+ 4	+ 14	+ 2	— 10	— 21	— 20	— 25	— 9
6.....	— 29	— 11	— 5	+ 20	— 19	+ 18	+ 29	+ 16	0	— 14	— 18	— 25	0
7.....	— 19	+ 2	+ 9	+ 33	+ 32	+ 33	+ 45	+ 32	+ 14	+ 3	— 8	— 17	+ 13
8.....	— 1	+ 22	+ 26	+ 42	+ 40	+ 43	+ 51	+ 43	+ 28	+ 23	+ 11	0	+ 27
9.....	+ 23	+ 39	+ 37	+ 45	+ 41	— 43	+ 49	+ 48	+ 37	+ 36	+ 29	+ 23	+ 38
10.....	+ 45	+ 49	+ 40	+ 42	+ 39	+ 38	+ 41	+ 45	+ 39	+ 37	+ 42	+ 46	+ 42
11.....	+ 48	+ 48	+ 36	+ 29	+ 29	+ 27	+ 28	+ 33	+ 30	+ 23	+ 35	+ 32	— 33
12 (midi).	+ 19	+ 26	+ 20	+ 6	+ 10	+ 10	+ 10	+ 14	+ 9	— 1	+ 7	— 2	— 11
13.....	— 17	— 9	— 11	— 15	— 11	— 11	— 12	— 6	— 14	— 20	— 21	— 30	— 15
14.....	— 38	— 32	— 36	— 35	— 30	— 28	— 31	— 26	— 36	— 36	— 38	— 43	34
15.....	— 33	— 44	— 50	— 55	— 46	— 43	— 47	— 44	— 51	— 44	— 40	— 39	— 45
16.....	— 25	— 46	— 55	— 64	— 56	— 54	— 60	— 57	— 57	— 44	— 35	— 28	— 48
17.....	— 15	— 37	— 50	— 61	— 60	— 60	— 68	— 64	— 55	— 31	— 24	— 14	— 45
18.....	— 2	— 23	— 33	— 52	— 56	— 55	— 68	— 64	— 43	— 13	— 10	0	— 35
19.....	— 10	— 10	— 13	— 33	— 36	— 39	— 50	— 47	— 21	— 4	+ 3	+ 12	— 18
20.....	+ 19	— 1	+ 5	— 5	— 9	— 15	— 23	— 14	+ 5	— 17	+ 14	+ 19	+ 1
21.....	+ 22	+ 8	+ 17	+ 10	+ 15	+ 15	+ 3	+ 9	+ 21	+ 26	+ 21	+ 24	— 16
22.....	+ 22	+ 14	+ 25	+ 17	+ 24	+ 25	+ 18	+ 18	+ 27	+ 28	+ 24	+ 26	+ 22
23.....	+ 20	+ 16	+ 23	+ 21	+ 27	+ 26	+ 23	+ 21	+ 28	+ 24	+ 22	+ 25	— 23

30. LYON (Parc de la Tête-d'Or).

Latitude, 45°46' N. — Longitude, 2°29' E. — Altitude, 175^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
h													
0 (min.).	+ 12	— 21	+ 22	— 23	+ 21	+ 27	+ 22	+ 21	+ 25	+ 20	+ 16	+ 18	— 21
1.....	— 1	— 18	+ 21	+ 19	+ 14	+ 19	+ 14	+ 14	+ 20	+ 11	+ 10	+ 6	— 14
2.....	0	+ 13	+ 14	+ 10	+ 6	+ 8	— 7	+ 6	+ 10	0	+ 1	— 6	+ 7
3.....	— 7	+ 2	+ 2	+ 2	0	+ 1	+ 4	+ 2	+ 1	— 15	— 10	0	— 2
4.....	— 22	— 8	— 3	0	— 3	+ 1	+ 7	+ 1	— 5	— 24	— 19	— 16	— 8
5.....	— 27	— 8	— 1	+ 5	+ 7	+ 8	+ 18	+ 7	— 3	— 24	— 21	— 23	— 5
6.....	— 24	0	— 10	+ 20	+ 23	+ 21	+ 32	+ 22	+ 8	— 14	— 16	— 21	— 5
7.....	— 10	+ 15	+ 28	+ 38	+ 41	+ 38	+ 50	+ 42	+ 26	+ 10	0	— 7	— 23
8.....	— 11	+ 30	— 44	+ 49	+ 49	— 45	+ 58	— 52	+ 42	+ 35	+ 25	+ 13	— 38
9.....	— 33	+ 45	+ 53	+ 52	+ 49	+ 43	+ 54	+ 54	+ 49	+ 49	+ 45	+ 37	— 47
10.....	— 53	— 54	— 53	+ 49	+ 40	+ 36	+ 47	+ 50	+ 46	+ 49	+ 59	+ 56	— 49
11.....	+ 54	+ 53	+ 45	+ 35	— 28	+ 25	+ 33	+ 36	+ 30	+ 40	+ 48	+ 39	— 39
12 (midi).	+ 20	+ 25	+ 22	+ 10	+ 11	+ 8	— 13	+ 14	+ 10	+ 16	+ 12	+ 4	— 14
13.....	— 23	— 16	— 15	— 17	— 10	— 13	— 11	— 8	— 16	— 17	— 24	— 33	— 17
14.....	— 40	— 46	— 43	— 43	— 32	— 33	— 31	— 30	— 41	— 37	— 43	— 46	— 39
15.....	— 39	— 61	— 62	— 62	— 49	— 50	— 48	— 49	— 59	— 46	— 48	— 45	— 52
16.....	— 34	— 64	— 74	— 71	— 61	— 63	— 62	— 62	— 65	— 48	— 46	— 38	— 57
17.....	— 24	— 55	— 70	— 69	— 67	— 68	— 73	— 70	— 60	— 40	— 35	— 25	— 55
18.....	— 10	— 38	— 52	— 56	— 60	— 62	— 71	— 68	— 47	— 24	— 18	— 10	— 43
19.....	+ 4	— 20	— 30	— 35	— 41	— 43	— 58	— 53	— 28	— 8	— 4	+ 4	— 26
20.....	+ 13	— 4	— 9	— 11	— 17	— 17	— 36	— 22	— 3	+ 5	+ 9	+ 13	— 7
21.....	— 19	— 8	+ 7	— 9	— 8	+ 13	— 4	+ 3	+ 13	+ 16	+ 18	+ 20	+ 11
22.....	+ 21	— 16	+ 17	+ 20	+ 20	+ 27	+ 14	— 17	+ 22	+ 22	+ 21	+ 24	— 20
23.....	— 19	+ 20	+ 21	+ 23	+ 23	+ 29	+ 21	+ 21	+ 25	+ 24	+ 20	+ 24	+ 23

31. PUY-DE-DOME.

Latitude, 45°46' N. — Longitude, 0°38' E. — Altitude, 1467^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	11	+ 15	+ 12	+ 9	+ 6	+ 3	+ 6	+ 5	+ 14	+ 7	+ 17	+ 12	+ 10
1.....	5	+ 7	+ 1	2	13	12	9	7	0	3	8	+ 3	2
2.....	2	4	12	14	30	26	25	21	17	14	4	3	14
3.....	10	18	25	26	43	39	40	35	33	26	20	14	27
4.....	18	30	38	35	54	45	48	47	46	37	33	24	38
5.....	24	33	45	38	55	43	46	50	53	42	36	29	41
6.....	24	30	44	34	44	33	34	42	46	40	33	28	36
7.....	16	20	36	25	29	19	19	24	26	24	21	21	23
8.....	4	7	22	12	12	6	5	7	8	5	2	8	8
9.....	10	6	2	+ 2	+ 4	+ 6	+ 7	+ 8	+ 10	+ 11	+ 15	+ 10	7
10.....	23	18	+ 15	+ 15	+ 17	+ 17	+ 16	+ 20	+ 22	+ 22	+ 27	+ 30	20
11.....	25	26	+ 22	+ 22	+ 24	+ 26	+ 23	+ 25	+ 25	+ 27	+ 25	+ 25	25
12 (midi).	8	22	+ 22	+ 23	+ 28	+ 29	+ 27	+ 27	+ 22	18	+ 7	+ 3	20
13.....	11	2	+ 14	+ 19	+ 27	+ 26	+ 25	+ 26	+ 15	+ 7	10	+ 18	10
14.....	17	11	5	+ 10	+ 22	+ 18	+ 20	+ 22	+ 7	1	17	23	3
15.....	12	14	0	1	17	+ 11	13	16	1	2	15	18	0
16.....	6	11	1	7	12	5	6	10	1	2	9	10	1
17.....	1	5	2	7	9	1	1	4	1	0	2	2	0
18.....	4	2	10	1	9	0	1	1	5	6	5	7	3
19.....	8	9	+ 19	+ 9	+ 12	+ 5	+ 3	+ 1	+ 12	+ 13	+ 12	+ 15	+ 10
20.....	+ 11	15	+ 26	+ 19	+ 20	+ 14	+ 14	+ 12	+ 21	+ 20	+ 18	+ 22	+ 18
21.....	13	19	+ 29	+ 27	+ 27	+ 23	+ 24	+ 22	+ 27	+ 24	+ 22	+ 25	+ 23
22.....	14	21	+ 27	+ 27	+ 27	+ 23	+ 25	+ 21	+ 26	+ 23	+ 24	+ 25	+ 24
23.....	+ 14	+ 20	+ 21	+ 20	+ 20	+ 15	+ 17	+ 15	+ 22	+ 17	+ 22	+ 20	+ 19

32. CLERMONT-FERRAND.

Latitude, 45°47' N. — Longitude, 0°45' E. — Altitude, 388^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	13	34	+ 29	+ 30	+ 34	+ 33	+ 31	+ 34	+ 43	+ 21	+ 25	+ 34	+ 30
1.....	12	23	+ 23	+ 25	+ 19	+ 21	+ 20	+ 29	+ 32	+ 10	+ 19	+ 26	+ 22
2.....	12	14	+ 14	+ 18	+ 5	+ 8	+ 8	+ 21	+ 17	3	+ 10	+ 14	+ 11
3.....	13	1	+ 1	+ 11	3	2	0	+ 12	+ 1	15	2	5	+ 1
4.....	3	12	8	5	5	3	1	5	10	22	13	18	6
5.....	8	14	8	5	2	4	10	5	11	22	20	24	7
6.....	10	8	0	+ 15	11	+ 13	+ 22	+ 13	0	13	20	22	0
7.....	2	3	+ 13	+ 23	18	+ 21	+ 33	+ 24	+ 13	5	9	13	+ 11
8.....	+ 12	15	+ 25	+ 29	23	+ 25	+ 36	+ 31	+ 24	+ 23	+ 10	+ 2	+ 21
9.....	+ 27	+ 25	+ 34	+ 31	23	+ 24	+ 33	+ 32	+ 30	+ 33	+ 25	+ 20	+ 28
10.....	38	30	+ 35	+ 26	+ 19	+ 19	+ 25	+ 25	+ 26	+ 32	+ 31	+ 36	+ 28
11.....	30	26	+ 26	+ 13	9	+ 10	+ 13	+ 10	+ 10	+ 20	+ 21	+ 23	+ 18
12 (midi).	2	5	5	8	6	2	2	8	10	1	5	7	3
13.....	35	29	23	30	21	17	17	26	30	23	29	33	26
14.....	50	52	48	48	36	31	32	40	47	37	43	44	42
15.....	43	57	60	58	49	45	45	50	55	42	43	38	49
16.....	32	53	63	62	56	54	54	57	58	39	34	29	49
17.....	20	39	52	58	54	56	60	59	51	24	20	19	43
18.....	8	19	31	43	41	44	54	53	32	7	6	8	29
19.....	1	1	8	19	19	24	36	31	10	7	7	3	11
20.....	8	+ 14	+ 11	+ 7	+ 8	0	11	3	+ 11	+ 18	+ 17	+ 13	+ 8
21.....	+ 12	+ 26	+ 24	+ 25	+ 32	+ 24	+ 15	+ 19	+ 27	+ 25	+ 23	+ 22	+ 23
22.....	+ 14	+ 34	+ 30	+ 31	43	+ 39	+ 32	+ 32	+ 38	+ 28	+ 27	+ 31	+ 32
23.....	+ 14	+ 36	+ 32	+ 32	+ 43	+ 40	+ 35	+ 36	+ 44	+ 27	+ 27	+ 36	+ 33

ÉTUDE SUR LA MARCHE DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.265

33. GRAND-SAINT-BERNARD.

Latitude, 45°52' N. — Longitude, 4°51' E. — Altitude, 2478^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 ^h (min.).	+ 16	+ 17	+ 22	+ 25	+ 21	+ 19	+ 25	+ 23	+ 22	— 20	— 15	+ 18	+ 20
1.....	+ 11	+ 10	+ 13	+ 14	+ 7	+ 8	+ 12	+ 15	+ 10	— 11	+ 12	+ 10	+ 11
2.....	+ 4	+ 2	+ 2	0	— 8	— 5	— 5	+ 4	— 3	0	+ 7	+ 1	0
3.....	— 4	— 8	— 12	— 17	— 21	— 18	— 20	— 10	— 16	— 12	— 1	— 8	— 12
4.....	— 15	— 18	— 25	— 31	— 31	— 28	— 30	— 23	— 29	— 24	— 11	— 17	— 23
5.....	— 25	— 25	— 32	— 40	— 36	— 32	— 34	— 32	— 38	— 33	— 20	— 25	— 31
6.....	— 27	— 25	— 31	— 38	— 34	— 31	— 30	— 32	— 36	— 34	— 22	— 29	— 31
7.....	— 19	— 18	— 23	— 31	— 27	— 25	— 22	— 24	— 26	— 21	— 14	— 27	— 23
8.....	— 4	— 6	— 14	— 21	— 19	— 18	— 15	— 16	— 14	— 6	0	— 17	— 12
9.....	+ 11	+ 4	— 5	— 11	— 10	— 10	— 9	— 9	— 3	+ 5	+ 10	+ 3	— 2
10.....	+ 21	+ 11	+ 3	— 1	— 3	— 3	— 4	— 3	+ 4	+ 11	+ 15	+ 23	+ 6
11.....	+ 16	+ 12	+ 7	+ 5	+ 2	+ 2	— 2	0	+ 6	+ 11	— 12	+ 20	+ 8
12 (midi).	— 4	+ 3	+ 5	+ 6	+ 4	— 4	0	+ 1	— 4	+ 2	0	+ 2	+ 2
13.....	— 19	— 8	— 2	+ 4	+ 5	+ 4	+ 1	0	— 1	— 7	— 12	— 14	— 4
14.....	— 21	— 16	9	0	+ 4	+ 3	+ 1	— 2	— 4	— 12	— 19	— 18	— 8
15.....	— 17	— 18	— 13	— 3	+ 2	+ 2	0	— 4	— 5	— 13	— 18	— 15	— 9
16.....	— 10	— 13	— 12	— 4	+ 1	+ 1	0	— 4	— 4	— 10	— 13	— 10	— 7
17.....	— 3	— 5	— 4	— 1	+ 2	+ 1	+ 1	— 2	— 1	— 4	— 6	— 3	— 2
18.....	+ 4	+ 5	+ 5	+ 6	+ 6	+ 4	+ 5	+ 2	+ 5	+ 4	+ 1	+ 4	+ 4
19.....	+ 10	+ 13	+ 15	+ 15	+ 13	+ 11	+ 12	+ 10	+ 14	+ 13	+ 7	+ 11	+ 12
20.....	+ 16	+ 18	+ 23	+ 24	+ 23	+ 21	+ 20	+ 19	+ 23	+ 20	+ 12	+ 17	+ 20
21.....	+ 20	+ 22	+ 28	+ 32	+ 32	+ 30	+ 30	+ 27	+ 30	+ 26	+ 15	+ 23	+ 26
22.....	+ 21	+ 23	+ 30	+ 35	+ 34	+ 32	+ 33	+ 30	+ 32	+ 27	+ 16	+ 26	+ 28
23.....	+ 20	+ 22	+ 28	+ 32	+ 31	+ 29	+ 32	+ 29	+ 30	+ 25	+ 16	+ 25	+ 27

34. GENÈVE.

Latitude, 46°12' N. — Longitude, 3°49' E. — Altitude, 405^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 ^h (min.).	+ 7	+ 14	+ 13	+ 18	+ 31	+ 32	+ 26	+ 22	+ 17	+ 17	+ 3	+ 14	+ 18
1.....	+ 3	+ 8	+ 9	+ 16	+ 28	+ 25	+ 21	+ 16	+ 8	+ 8	— 3	+ 11	+ 13
2.....	+ 4	— 3	+ 4	+ 10	+ 22	+ 18	+ 14	+ 8	+ 2	— 4	— 9	+ 6	+ 6
3.....	+ 2	— 8	— 1	+ 8	+ 17	+ 10	+ 11	+ 4	— 4	— 14	— 14	— 3	+ 1
4.....	— 4	— 15	— 4	+ 8	+ 12	+ 9	+ 14	+ 4	— 5	— 18	— 16	— 13	— 2
5.....	— 9	— 16	— 2	+ 12	+ 22	+ 18	+ 22	+ 13	+ 2	— 15	— 12	— 18	+ 1
6.....	7	— 5	+ 11	+ 25	+ 35	+ 29	+ 35	+ 26	+ 18	— 2	+ 2	— 16	+ 13
7.....	+ 5	+ 15	+ 26	+ 36	+ 46	+ 39	+ 46	+ 38	+ 34	+ 20	+ 22	— 6	— 27
8.....	+ 22	+ 34	+ 38	+ 43	+ 48	+ 44	+ 49	+ 45	+ 46	+ 39	+ 40	+ 12	+ 38
9.....	+ 40	+ 44	+ 46	+ 49	+ 44	+ 39	+ 47	+ 47	+ 54	+ 50	+ 50	+ 36	+ 45
10.....	+ 52	+ 47	+ 47	+ 46	+ 32	+ 29	+ 35	+ 41	+ 50	+ 46	+ 52	+ 52	+ 44
11.....	+ 40	+ 42	+ 36	+ 30	+ 18	+ 17	+ 21	+ 25	+ 32	+ 30	+ 35	+ 36	+ 30
12 (midi).	+ 6	+ 19	+ 14	+ 5	— 4	— 1	+ 2	+ 2	+ 9	+ 4	+ 2	0	+ 5
13.....	— 27	— 15	— 15	— 19	— 26	— 20	— 17	— 18	— 17	— 22	— 25	— 30	— 21
14.....	— 47	— 42	— 42	43	— 48	— 37	— 38	— 38	— 41	— 44	— 42	— 44	— 42
15.....	— 47	— 55	— 58	— 61	— 63	— 53	— 54	— 55	— 58	— 57	— 46	— 40	— 54
16.....	— 39	— 54	— 67	— 70	— 74	— 65	— 67	— 66	— 67	— 58	— 40	— 32	— 58
17.....	— 28	— 41	— 61	— 70	— 75	— 69	— 73	— 71	— 66	— 42	— 28	— 23	— 54
18.....	— 15	— 24	— 40	— 56	— 67	— 62	— 70	— 64	— 53	— 22	— 12	— 12	— 41
19.....	— 3	— 7	— 16	— 32	— 44	— 44	— 52	— 38	— 27	— 4	+ 1	— 1	— 22
20.....	+ 7	+ 6	+ 6	— 5	— 18	— 20	— 26	— 7	+ 1	+ 11	+ 8	+ 10	— 2
21.....	+ 14	+ 14	+ 18	+ 12	+ 9	+ 5	+ 5	+ 16	+ 18	+ 24	+ 12	+ 18	+ 14
22.....	+ 16	+ 18	+ 20	+ 18	+ 23	+ 24	+ 20	+ 25	+ 24	+ 28	+ 13	+ 22	+ 21
23.....	+ 13	+ 18	+ 17	+ 20	+ 31	+ 33	+ 27	+ 25	+ 23	+ 25	+ 9	+ 21	+ 22

35. OBIR.

Latitude, 46°30' N. — Longitude, 12°9' E. — Altitude, 2041^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 ^h (min.).	+ 13	+ 18	+ 23	+ 21	+ 22	+ 21	+ 12	+ 26	+ 16	+ 11	+ 12	+ 13	+ 17
1.....	+ 8	+ 8	+ 11	+ 8	+ 5	+ 5	+ 1	+ 15	+ 3	+ 4	+ 6	+ 5	+ 7
2.....	+ 5	- 2	- 2	- 8	- 12	- 12	- 12	0	- 10	- 7	+ 1	0	- 5
3.....	+ 3	- 11	- 18	- 25	- 27	- 31	- 26	- 15	- 23	- 18	- 9	- 3	- 17
4.....	- 8	- 24	- 32	- 39	- 42	- 41	- 34	- 28	- 33	- 28	- 17	- 12	- 28
5.....	- 19	- 31	- 37	- 43	- 47	- 41	- 31	- 35	- 40	- 33	- 22	- 18	- 33
6.....	- 23	- 33	- 35	- 42	- 40	- 35	- 22	- 34	- 39	- 34	- 22	- 20	- 32
7.....	- 20	- 28	- 27	- 36	- 30	- 24	- 12	- 25	- 29	- 22	- 14	- 16	- 24
8.....	- 7	- 13	- 13	- 23	- 16	- 12	- 2	- 14	- 12	- 3	+ 1	- 6	- 10
9.....	+ 9	- 1	+ 1	- 9	0	0	+ 8	- 1	+ 3	+ 13	+ 15	+ 9	- 4
10.....	+ 23	+ 14	+ 14	+ 6	+ 14	- 12	+ 18	- 10	+ 18	+ 25	+ 25	- 27	- 17
11.....	+ 27	+ 23	+ 18	+ 18	+ 21	+ 22	+ 25	+ 19	+ 24	+ 31	+ 27	+ 30	- 24
12 (midi).	+ 15	+ 22	+ 17	+ 21	+ 24	+ 23	+ 26	+ 22	+ 25	+ 24	+ 13	+ 15	- 21
13.....	- 6	- 9	+ 9	+ 20	+ 24	+ 18	+ 21	+ 19	+ 21	+ 8	- 4	- 4	- 11
14.....	- 20	- 6	- 3	+ 15	+ 18	+ 12	+ 14	+ 10	+ 12	- 4	- 19	- 20	1
15.....	- 24	- 11	- 10	+ 8	+ 10	+ 6	+ 6	+ 1	+ 4	- 12	- 23	- 25	- 6
16.....	- 20	- 12	- 13	- 1	+ 3	+ 1	- 2	- 8	- 3	- 14	- 20	- 18	9
17.....	- 13	- 9	- 13	- 3	- 4	- 4	- 10	- 16	- 8	- 11	- 12	- 10	- 9
18.....	- 6	- 3	- 7	- 3	- 8	- 7	- 15	- 19	- 8	- 4	- 2	- 3	- 7
19.....	+ 2	- 6	+ 6	+ 3	- 6	- 5	- 13	- 13	0	+ 4	+ 6	- 4	0
20.....	+ 10	+ 16	+ 20	+ 19	+ 7	+ 6	- 2	+ 3	+ 13	+ 12	+ 12	+ 9	+ 10
21.....	+ 16	+ 21	+ 29	+ 30	+ 24	+ 26	+ 13	+ 23	+ 21	+ 19	+ 15	+ 13	+ 21
22.....	+ 18	+ 23	+ 32	+ 32	+ 30	+ 31	+ 19	+ 30	+ 23	+ 21	+ 16	+ 15	+ 24
23.....	+ 17	- 22	+ 30	+ 29	+ 30	+ 29	+ 18	+ 30	+ 22	+ 18	+ 15	+ 15	+ 23

36. KLAGENFURT.

Latitude, 46°37' N. — Longitude, 11°58' E. — Altitude, 448^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 ^h (min.).	+ 23	+ 29	+ 36	+ 37	+ 38	+ 38	+ 42	+ 34	+ 28	+ 23	+ 21	- 22	+ 31
1.....	+ 24	+ 30	+ 41	+ 40	+ 43	+ 43	+ 48	+ 38	+ 31	+ 22	+ 23	+ 17	+ 33
2.....	+ 25	+ 29	+ 40	+ 40	+ 42	+ 44	+ 51	+ 40	+ 30	+ 20	+ 22	+ 13	- 33
3.....	+ 24	+ 26	+ 37	+ 39	+ 41	+ 45	+ 52	+ 40	+ 29	+ 19	+ 22	- 14	- 32
4.....	+ 22	+ 25	+ 38	+ 37	+ 43	+ 48	+ 57	+ 46	+ 30	+ 19	+ 24	+ 12	+ 33
5.....	+ 22	+ 28	+ 41	+ 37	+ 49	+ 54	+ 65	+ 54	+ 33	+ 21	+ 22	+ 11	+ 36
6.....	+ 28	+ 33	+ 49	+ 44	+ 58	+ 61	+ 75	+ 63	+ 41	+ 25	+ 22	+ 14	+ 43
7.....	+ 34	+ 42	+ 59	+ 53	+ 64	+ 64	+ 79	+ 69	+ 49	+ 30	+ 26	+ 22	+ 49
8.....	+ 36	+ 47	+ 62	+ 52	+ 60	+ 58	+ 76	+ 68	+ 52	+ 35	+ 30	+ 27	+ 50
9.....	+ 35	+ 46	+ 58	+ 43	+ 48	+ 44	+ 66	+ 59	+ 50	+ 35	+ 30	+ 30	+ 45
10.....	+ 28	+ 38	+ 46	+ 29	+ 28	+ 26	+ 48	+ 41	+ 40	+ 29	+ 24	+ 30	+ 34
11.....	+ 5	+ 16	+ 23	+ 10	+ 6	- 3	+ 23	+ 16	+ 20	+ 18	+ 8	+ 15	+ 14
12 (midi).	- 24	- 11	- 9	- 16	- 18	- 22	- 9	- 11	- 3	- 2	- 15	- 9	- 12
13.....	- 47	- 40	- 44	- 43	- 42	- 49	- 47	- 40	- 31	- 28	- 38	- 36	- 40
14.....	- 64	- 66	- 74	- 65	- 66	- 72	- 80	- 67	- 57	- 48	- 57	- 55	- 64
15.....	- 65	- 80	- 96	- 80	- 83	- 89	- 105	- 86	- 77	60	- 62	- 57	- 78
16.....	- 59	- 82	- 109	- 86	- 93	- 97	- 124	- 97	- 85	- 65	- 59	- 52	- 84
17.....	- 48	- 72	- 103	- 86	- 96	- 95	- 126	- 100	- 82	- 61	- 48	- 42	- 80
18.....	- 34	- 52	- 83	- 74	- 87	- 83	- 112	- 92	- 69	- 49	- 33	- 27	- 66
19.....	- 18	- 31	- 51	- 49	- 64	- 60	- 86	- 71	- 45	- 29	- 17	- 12	- 44
20.....	- 2	- 10	- 21	- 20	- 29	- 29	- 43	- 40	- 21	- 7	0	+ 4	- 18
21.....	+ 13	+ 9	+ 9	+ 7	+ 7	+ 10	0	- 2	+ 1	+ 12	+ 14	+ 16	+ 8
22.....	+ 20	+ 20	+ 22	+ 21	+ 21	+ 25	+ 18	+ 13	+ 14	+ 19	+ 20	+ 21	+ 19
23.....	+ 22	+ 26	+ 29	+ 30	+ 30	+ 33	+ 32	+ 25	+ 22	+ 22	+ 21	+ 22	+ 26

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.267

37. POITIERS.

Latitude, 46°35' N. — Longitude, 2°0° W. — Altitude, 117^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 9	+ 19	+ 17	+ 13	+ 20	+ 21	+ 14	+ 15	+ 12	+ 8	+ 1	+ 11	+ 13
1.....	+ 3	+ 12	+ 10	+ 6	+ 8	+ 10	+ 6	+ 7	+ 3	+ 3	+ 4	+ 11	+ 6
2.....	0	+ 8	+ 1	+ 3	+ 4	0	+ 1	+ 1	+ 7	+ 14	+ 7	+ 9	+ 2
3.....	+ 6	+ 7	+ 10	+ 11	+ 12	+ 7	+ 6	+ 7	+ 18	+ 23	+ 10	+ 1	+ 10
4.....	+ 14	+ 17	+ 20	+ 14	+ 13	+ 7	+ 6	+ 8	+ 26	+ 28	+ 13	+ 12	+ 15
5.....	+ 18	+ 19	+ 19	+ 7	+ 2	+ 2	+ 3	+ 1	+ 25	+ 28	+ 13	+ 18	+ 12
6.....	+ 14	+ 13	+ 7	+ 8	+ 12	+ 13	+ 15	+ 13	+ 7	+ 17	+ 3	+ 17	+ 1
7.....	+ 1	+ 1	+ 8	+ 21	+ 25	+ 25	+ 27	+ 24	+ 10	0	+ 11	+ 9	+ 12
8.....	+ 16	+ 12	+ 21	+ 31	+ 34	+ 33	+ 35	+ 33	+ 26	+ 19	+ 26	+ 6	+ 24
9.....	+ 32	+ 23	+ 31	+ 36	+ 36	+ 34	+ 37	+ 36	+ 41	+ 35	+ 38	+ 24	+ 31
10.....	+ 42	+ 31	+ 34	+ 36	+ 31	+ 29	+ 34	+ 35	+ 44	+ 38	+ 42	+ 37	+ 36
11.....	+ 27	+ 29	+ 29	+ 26	+ 19	+ 20	+ 26	+ 27	+ 30	+ 24	+ 29	+ 27	+ 26
12 (midi).	+ 3	+ 12	+ 11	+ 10	+ 5	+ 8	+ 14	+ 14	+ 14	+ 6	+ 10	+ 5	+ 9
13.....	+ 20	+ 9	+ 7	+ 8	+ 10	+ 5	0	0	+ 2	+ 11	+ 9	+ 14	+ 8
14.....	+ 36	+ 30	+ 25	+ 26	+ 23	+ 18	+ 14	+ 16	+ 18	+ 26	+ 26	+ 27	+ 24
15.....	+ 35	+ 42	+ 40	+ 43	+ 35	+ 30	+ 28	+ 32	+ 32	+ 34	+ 38	+ 27	+ 35
16.....	+ 28	+ 40	+ 46	+ 53	+ 43	+ 42	+ 41	+ 47	+ 38	+ 33	+ 36	+ 24	+ 39
17.....	+ 19	+ 29	+ 39	+ 50	+ 46	+ 50	+ 49	+ 54	+ 36	+ 20	+ 25	+ 18	+ 36
18.....	+ 8	+ 15	+ 21	+ 34	+ 40	+ 47	+ 47	+ 50	+ 25	+ 4	+ 11	+ 11	+ 26
19.....	+ 4	+ 1	+ 4	+ 10	+ 26	+ 35	+ 36	+ 31	+ 8	+ 11	+ 1	+ 2	+ 11
20.....	+ 14	+ 11	+ 11	+ 11	+ 5	+ 16	+ 19	+ 9	+ 8	+ 23	+ 8	+ 7	+ 4
21.....	+ 18	+ 20	+ 20	+ 21	+ 15	+ 9	+ 1	+ 9	+ 17	+ 29	+ 11	+ 13	+ 15
22.....	+ 18	+ 23	+ 23	+ 22	+ 27	+ 25	+ 16	+ 20	+ 19	+ 28	+ 11	+ 15	+ 21
23.....	+ 14	+ 23	+ 22	+ 18	+ 27	+ 28	+ 19	+ 21	+ 18	+ 20	+ 7	+ 14	+ 19

38. NANTES.

Latitude, 47°13' N. — Longitude, 3°53' W. — Altitude, 41^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 9	+ 10	+ 13	+ 13	+ 7	+ 11	+ 11	+ 6	+ 2	+ 2	+ 6	+ 1	+ 8
1.....	+ 9	+ 4	+ 4	+ 2	+ 11	+ 2	+ 3	+ 2	+ 5	+ 13	+ 8	+ 6	+ 2
2.....	+ 5	+ 18	+ 6	+ 8	+ 21	+ 7	+ 3	+ 3	+ 14	+ 23	+ 18	+ 13	+ 11
3.....	+ 4	+ 26	+ 16	+ 13	+ 24	+ 10	+ 5	+ 7	+ 24	+ 33	+ 27	+ 22	+ 18
4.....	+ 15	+ 30	+ 24	+ 13	+ 21	+ 7	+ 1	+ 6	+ 29	+ 36	+ 33	+ 25	+ 20
5.....	+ 22	+ 28	+ 24	+ 3	+ 10	+ 2	+ 8	+ 6	+ 25	+ 31	+ 34	+ 23	+ 15
6.....	+ 17	+ 18	+ 10	+ 11	+ 5	+ 15	+ 17	+ 19	+ 9	+ 17	+ 25	+ 15	+ 4
7.....	+ 3	+ 1	+ 11	+ 24	+ 18	+ 26	+ 26	+ 29	+ 9	+ 6	+ 8	+ 1	+ 12
8.....	+ 19	+ 16	+ 31	+ 34	+ 27	+ 32	+ 32	+ 36	+ 26	+ 24	+ 14	+ 23	+ 26
9.....	+ 38	+ 29	+ 45	+ 38	+ 31	+ 33	+ 32	+ 38	+ 40	+ 37	+ 32	+ 44	+ 37
10.....	+ 49	+ 37	+ 50	+ 37	+ 29	+ 29	+ 28	+ 35	+ 42	+ 38	+ 44	+ 55	+ 39
11.....	+ 44	+ 36	+ 43	+ 26	+ 23	+ 20	+ 19	+ 23	+ 34	+ 31	+ 36	+ 41	+ 31
12 (midi).	+ 16	+ 22	+ 22	+ 9	+ 13	+ 7	+ 7	+ 9	+ 19	+ 19	+ 8	+ 9	+ 13
13.....	+ 14	+ 1	+ 4	+ 9	+ 2	+ 7	+ 6	+ 5	+ 4	+ 1	+ 17	+ 19	+ 6
14.....	+ 34	+ 26	+ 29	+ 25	+ 9	+ 20	+ 17	+ 18	+ 10	+ 15	+ 30	+ 38	+ 23
15.....	+ 36	+ 40	+ 44	+ 39	+ 21	+ 31	+ 28	+ 30	+ 21	+ 24	+ 29	+ 39	+ 32
16.....	+ 32	+ 40	+ 50	+ 48	+ 31	+ 39	+ 37	+ 39	+ 27	+ 28	+ 19	+ 33	+ 35
17.....	+ 24	+ 29	+ 45	+ 49	+ 36	+ 42	+ 42	+ 44	+ 26	+ 18	+ 7	+ 21	+ 32
18.....	+ 15	+ 10	+ 28	+ 39	+ 30	+ 38	+ 39	+ 40	+ 16	+ 2	+ 4	+ 7	+ 22
19.....	+ 6	+ 8	+ 8	+ 19	+ 14	+ 26	+ 29	+ 25	+ 4	+ 12	+ 15	+ 9	+ 7
20.....	+ 1	+ 22	+ 10	+ 4	+ 6	+ 8	+ 11	+ 7	+ 6	+ 21	+ 23	+ 19	+ 7
21.....	+ 7	+ 32	+ 18	+ 20	+ 22	+ 11	+ 6	+ 5	+ 10	+ 23	+ 27	+ 23	+ 17
22.....	+ 11	+ 34	+ 21	+ 25	+ 26	+ 23	+ 13	+ 9	+ 10	+ 19	+ 27	+ 21	+ 20
23.....	+ 12	+ 25	+ 19	+ 22	+ 21	+ 23	+ 14	+ 9	+ 7	+ 9	+ 19	+ 14	+ 16

39. BERNE.

Latitude, 46°57' N. — Longitude, 5°6' E. — Altitude, 573^m.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 12	+ 15	+ 29	+ 28	+ 32	+ 37	+ 34	+ 30	+ 29	+ 25	+ 19	+ 18	+ 26
1.....	+ 10	+ 14	+ 25	+ 23	+ 23	+ 29	+ 29	+ 27	+ 23	+ 19	+ 17	+ 13	+ 21
2.....	+ 11	+ 14	+ 18	+ 15	+ 14	+ 20	+ 20	+ 21	+ 15	+ 10	+ 12	+ 11	+ 15
3.....	+ 7	+ 6	+ 5	+ 8	+ 6	+ 11	+ 10	+ 13	+ 7	+ 0	+ 1	+ 4	+ 7
4.....	+ 4	+ 2	+ 4	+ 2	+ 1	+ 8	+ 6	+ 6	+ 0	+ 7	+ 8	+ 8	+ 1
5.....	+ 13	+ 4	+ 4	+ 2	+ 5	+ 12	+ 8	+ 5	+ 2	+ 9	+ 11	+ 18	+ 2
6.....	+ 16	+ 2	+ 0	+ 11	+ 15	+ 19	+ 16	+ 12	+ 5	+ 5	+ 11	+ 20	+ 2
7.....	+ 12	+ 3	+ 7	+ 20	+ 22	+ 25	+ 24	+ 21	+ 14	+ 4	+ 5	+ 16	+ 9
8.....	+ 0	+ 12	+ 16	+ 27	+ 23	+ 26	+ 26	+ 23	+ 21	+ 14	+ 5	+ 5	+ 16
9.....	+ 16	+ 21	+ 24	+ 30	+ 21	+ 22	+ 22	+ 22	+ 24	+ 21	+ 17	+ 12	+ 21
10.....	+ 32	+ 30	+ 29	+ 27	+ 15	+ 13	+ 13	+ 17	+ 22	+ 24	+ 28	+ 31	+ 23
11.....	+ 32	+ 30	+ 23	+ 17	+ 6	+ 1	+ 1	+ 8	+ 11	+ 19	+ 23	+ 25	+ 16
12 (midi).	+ 5	+ 18	+ 1	+ 0	+ 8	+ 13	+ 12	+ 5	+ 5	+ 1	+ 1	+ 2	+ 2
13.....	+ 24	+ 19	+ 23	+ 18	+ 23	+ 27	+ 23	+ 20	+ 22	+ 27	+ 27	+ 30	+ 24
14.....	+ 37	+ 36	+ 39	+ 36	+ 36	+ 40	+ 34	+ 33	+ 37	+ 42	+ 39	+ 39	+ 37
15.....	+ 32	+ 39	+ 47	+ 50	+ 45	+ 49	+ 42	+ 43	+ 47	+ 46	+ 36	+ 30	+ 42
16.....	+ 23	+ 35	+ 49	+ 55	+ 49	+ 52	+ 46	+ 49	+ 52	+ 43	+ 28	+ 20	+ 42
17.....	+ 14	+ 29	+ 44	+ 53	+ 49	+ 54	+ 48	+ 51	+ 48	+ 32	+ 18	+ 10	+ 38
18.....	+ 5	+ 21	+ 31	+ 43	+ 40	+ 45	+ 44	+ 45	+ 35	+ 17	+ 8	+ 1	+ 28
19.....	+ 3	+ 12	+ 13	+ 25	+ 22	+ 27	+ 31	+ 30	+ 15	+ 2	+ 1	+ 8	+ 14
20.....	+ 9	+ 3	+ 4	+ 0	+ 0	+ 6	+ 9	+ 5	+ 7	+ 12	+ 10	+ 15	+ 3
21.....	+ 13	+ 5	+ 19	+ 17	+ 23	+ 16	+ 16	+ 18	+ 22	+ 23	+ 17	+ 20	+ 17
22.....	+ 16	+ 13	+ 26	+ 25	+ 33	+ 34	+ 29	+ 28	+ 30	+ 28	+ 21	+ 23	+ 26
23.....	+ 16	+ 17	+ 29	+ 28	+ 35	+ 39	+ 34	+ 31	+ 32	+ 28	+ 21	+ 23	+ 28

40. SANTIS.

Latitude, 47°15' N. — Longitude, 7°0' E. — Altitude, 2467^m.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 16	+ 11	+ 18	+ 9	+ 10	+ 12	+ 8	+ 8	+ 7	+ 10	+ 11	+ 11	+ 11
1.....	+ 5	+ 6	+ 9	+ 2	+ 7	+ 4	+ 8	+ 6	+ 5	+ 3	+ 5	+ 0	+ 0
2.....	+ 1	+ 1	+ 3	+ 15	+ 22	+ 22	+ 25	+ 19	+ 17	+ 9	+ 2	+ 4	+ 11
3.....	+ 5	+ 13	+ 18	+ 28	+ 34	+ 38	+ 38	+ 32	+ 30	+ 23	+ 6	+ 9	+ 23
4.....	+ 15	+ 21	+ 31	+ 38	+ 43	+ 48	+ 46	+ 43	+ 39	+ 32	+ 15	+ 18	+ 32
5.....	+ 24	+ 25	+ 36	+ 42	+ 43	+ 49	+ 46	+ 45	+ 43	+ 37	+ 22	+ 25	+ 36
6.....	+ 26	+ 25	+ 33	+ 37	+ 36	+ 41	+ 37	+ 39	+ 34	+ 37	+ 24	+ 23	+ 33
7.....	+ 22	+ 17	+ 25	+ 28	+ 25	+ 29	+ 27	+ 28	+ 20	+ 22	+ 16	+ 17	+ 23
8.....	+ 11	+ 7	+ 15	+ 18	+ 16	+ 18	+ 15	+ 17	+ 6	+ 8	+ 2	+ 6	+ 12
9.....	+ 2	+ 3	+ 5	+ 8	+ 8	+ 7	+ 6	+ 7	+ 6	+ 5	+ 11	+ 9	+ 0
10.....	+ 15	+ 13	+ 4	+ 2	+ 0	+ 4	+ 3	+ 4	+ 15	+ 13	+ 21	+ 27	+ 10
11.....	+ 16	+ 18	+ 8	+ 8	+ 5	+ 12	+ 10	+ 11	+ 19	+ 16	+ 20	+ 20	+ 14
12 (midi).	+ 0	+ 11	+ 8	+ 12	+ 10	+ 18	+ 16	+ 15	+ 16	+ 9	+ 5	+ 1	+ 10
13.....	+ 16	+ 1	+ 1	+ 14	+ 15	+ 20	+ 18	+ 18	+ 12	+ 2	+ 8	+ 21	+ 4
14.....	+ 21	+ 8	+ 5	+ 13	+ 15	+ 20	+ 18	+ 17	+ 7	+ 6	+ 14	+ 21	+ 1
15.....	+ 17	+ 11	+ 8	+ 10	+ 14	+ 16	+ 17	+ 16	+ 2	+ 7	+ 13	+ 16	+ 0
16.....	+ 9	+ 11	+ 7	+ 6	+ 13	+ 12	+ 14	+ 13	+ 0	+ 6	+ 10	+ 7	+ 1
17.....	+ 1	+ 6	+ 2	+ 7	+ 12	+ 8	+ 11	+ 9	+ 0	+ 1	+ 5	+ 1	+ 3
18.....	+ 7	+ 3	+ 8	+ 12	+ 13	+ 9	+ 11	+ 8	+ 5	+ 10	+ 0	+ 7	+ 8
19.....	+ 15	+ 11	+ 20	+ 19	+ 17	+ 13	+ 15	+ 14	+ 14	+ 19	+ 6	+ 15	+ 15
20.....	+ 21	+ 16	+ 27	+ 27	+ 25	+ 20	+ 25	+ 26	+ 23	+ 26	+ 11	+ 19	+ 22
21.....	+ 24	+ 19	+ 30	+ 31	+ 33	+ 33	+ 33	+ 31	+ 26	+ 30	+ 14	+ 22	+ 27
22.....	+ 24	+ 19	+ 30	+ 27	+ 30	+ 34	+ 29	+ 27	+ 25	+ 30	+ 15	+ 21	+ 26
23.....	+ 23	+ 16	+ 25	+ 19	+ 22	+ 25	+ 20	+ 19	+ 17	+ 19	+ 14	+ 18	+ 20

41. MUNICH.

Latitude, 48° 9' N. — Longitude, 9° 16' E. — Altitude, 529^m.

Heures. _h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 6	+ 10	+ 14	+ 16	+ 15	+ 21	+ 21	+ 16	+ 13	+ 9	+ 7	+ 6	+ 13
1.....	0	+ 7	+ 6	+ 6	+ 6	+ 13	+ 13	+ 10	+ 4	0	+ 2	— 3	+ 6
2.....	+ 4	+ 1	— 4	— 3	— 3	+ 4	+ 5	+ 2	— 4	— 10	— 3	— 2	— 1
3.....	0	— 9	— 15	— 10	— 9	— 3	— 3	— 7	— 12	— 18	— 10	5	— 8
4.....	— 10	— 16	— 22	— 13	— 10	— 2	— 4	— 10	— 17	— 22	— 15	— 14	— 13
5.....	— 17	— 18	— 22	— 8	— 2	+ 5	0	— 6	— 15	— 21	— 16	— 18	— 12
6.....	— 16	— 14	— 12	+ 5	+ 13	+ 15	+ 10	+ 5	— 2	— 12	— 13	— 17	— 3
7.....	— 5	— 3	+ 2	+ 19	+ 26	+ 24	+ 21	+ 18	+ 11	+ 5	— 3	— 8	+ 9
8.....	+ 8	+ 10	+ 15	+ 31	+ 36	+ 33	+ 30	+ 28	+ 24	+ 22	+ 14	+ 6	+ 21
9.....	+ 20	+ 22	+ 26	+ 38	+ 39	+ 35	+ 31	+ 32	+ 34	+ 36	+ 26	+ 23	+ 30
10.....	+ 31	+ 32	+ 30	+ 38	+ 37	+ 31	+ 29	+ 32	+ 37	+ 38	+ 30	+ 36	+ 33
11.....	+ 28	+ 33	+ 27	+ 29	+ 27	+ 21	+ 22	+ 26	+ 30	+ 26	+ 25	+ 28	+ 27
12 (midi).	+ 4	+ 20	+ 16	+ 12	+ 12	+ 7	+ 10	+ 14	+ 16	— 10	+ 5	+ 5	+ 11
13.....	— 20	— 4	— 2	— 4	— 3	— 8	— 5	— 2	— 1	— 5	— 14	— 17	— 7
14.....	— 32	— 20	— 18	— 20	— 18	— 22	— 20	— 19	— 18	— 20	— 27	— 26	— 22
15.....	— 26	— 27	— 30	— 35	— 33	— 36	— 33	— 31	— 31	— 30	— 28	— 23	— 30
16.....	— 18	— 27	— 36	— 46	— 45	— 47	— 43	— 40	— 39	— 32	— 23	— 16	— 34
17.....	— 10	— 21	— 32	— 48	— 50	— 53	— 49	— 44	— 39	— 24	— 13	— 9	— 33
18.....	— 2	— 12	— 18	— 37	— 45	— 47	— 45	— 40	— 30	— 12	— 3	— 1	— 24
19.....	+ 6	— 2	— 1	— 19	— 30	— 30	— 30	— 25	— 14	0	+ 6	+ 5	— 11
20.....	+ 11	+ 6	+ 14	— 1	— 10	— 11	— 12	— 5	+ 3	+ 10	+ 12	+ 10	+ 2
21.....	+ 13	+ 10	+ 21	+ 13	+ 8	+ 7	+ 9	+ 9	+ 15	+ 16	+ 15	+ 13	+ 12
22.....	+ 13	+ 11	+ 22	+ 18	+ 19	+ 20	+ 20	+ 17	+ 19	+ 19	+ 14	+ 15	+ 17
23.....	+ 12	+ 11	+ 19	+ 19	+ 20	+ 23	+ 23	+ 19	+ 18	+ 16	+ 11	+ 13	+ 17

42. VIENNE.

Latitude, 48° 15' N. — Longitude, 14° 1' E. — Altitude, 203^m.

Heures. _h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 11	+ 26	+ 24	+ 28	+ 15	+ 21	+ 17	+ 15	+ 11	+ 6	+ 20	+ 13	+ 17
1.....	+ 9	+ 17	+ 18	+ 20	+ 10	+ 16	+ 16	+ 10	+ 7	+ 2	+ 7	— 3	+ 11
2.....	+ 7	+ 9	+ 7	+ 8	+ 4	+ 10	+ 10	0	— 1	— 5	+ 1	— 10	+ 3
3.....	+ 2	— 5	— 9	+ 1	0	+ 3	+ 3	— 2	— 4	— 15	— 8	— 13	— 4
4.....	— 10	— 18	— 17	— 6	— 1	+ 3	+ 4	— 5	— 6	— 19	— 22	— 27	— 10
5.....	— 20	— 23	— 20	— 3	+ 8	+ 13	+ 13	+ 1	— 4	— 19	— 23	— 35	— 9
6.....	— 26	— 27	— 14	+ 11	+ 25	+ 25	+ 25	+ 16	+ 9	— 17	— 26	— 38	— 3
7.....	— 13	— 12	+ 8	+ 28	+ 40	+ 42	+ 40	+ 28	+ 26	+ 11	— 9	— 25	+ 14
8.....	+ 14	+ 16	+ 27	+ 37	+ 52	+ 50	+ 50	+ 40	+ 41	+ 37	+ 22	+ 7	+ 33
9.....	+ 26	+ 27	+ 36	+ 46	+ 55	+ 49	+ 50	+ 46	+ 56	+ 50	+ 34	+ 28	+ 42
10.....	+ 41	+ 32	+ 40	+ 50	+ 53	+ 45	+ 47	+ 48	+ 58	+ 56	+ 43	+ 45	+ 46
11.....	+ 32	+ 31	+ 30	+ 35	+ 41	+ 35	+ 34	+ 37	+ 44	+ 46	+ 32	+ 34	+ 36
12 (midi).	+ 9	+ 21	+ 17	+ 13	+ 23	+ 19	+ 17	+ 21	+ 26	+ 25	+ 8	+ 1	+ 17
13.....	— 20	— 10	— 9	— 8	+ 1	— 4	— 6	+ 1	+ 1	— 5	— 16	— 13	— 7
14.....	— 35	— 32	— 30	— 31	— 20	— 26	— 25	— 20	— 25	— 26	— 32	— 27	— 27
15.....	— 34	— 39	— 41	— 50	— 40	— 41	— 39	— 36	— 41	— 35	— 34	— 24	— 38
16.....	— 30	— 39	— 50	— 63	— 55	— 55	— 51	— 48	— 51	— 42	— 31	— 18	— 45
17.....	— 25	— 34	— 49	— 66	— 66	— 77	— 62	— 56	— 57	— 41	— 24	— 12	— 47
18.....	— 15	— 19	— 35	— 62	— 69	— 68	— 64	— 60	— 57	— 29	— 13	— 6	— 41
19.....	— 2	— 2	— 14	— 42	— 55	— 55	— 55	— 46	— 41	— 15	— 1	+ 5	— 27
20.....	+ 10	+ 8	+ 6	— 12	— 36	— 36	— 37	— 23	— 17	— 4	+ 8	+ 18	— 10
21.....	+ 18	+ 21	+ 20	+ 11	— 8	— 6	— 10	0	— 1	+ 9	+ 18	+ 29	+ 8
22.....	+ 27	+ 29	+ 30	+ 24	+ 7	+ 11	+ 7	+ 15	+ 12	+ 18	+ 25	+ 37	+ 20
23.....	+ 24	+ 25	+ 26	+ 29	+ 15	+ 20	+ 17	+ 19	+ 12	+ 13	+ 19	+ 36	+ 21

43. PARC SAINT-MAUR.

Latitude, 48° 49' N. — Longitude, 0° 9' E. — Altitude, 49^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	+ 3	+ 16	+ 16	+ 18	+ 19	+ 18	+ 19	+ 20	+ 13	+ 14	+ 5	+ 11	+ 14
1.....	- 6	+ 8	+ 6	+ 13	+ 5	+ 8	+ 7	+ 9	+ 3	+ 3	- 1	- 7	- 5
2.....	- 11	+ 5	- 4	+ 5	- 6	- 2	- 1	- 1	- 7	- 8	- 7	- 1	- 3
3.....	- 12	- 5	- 13	- 3	- 9	- 7	- 3	- 10	- 17	- 17	- 13	- 14	- 10
4.....	- 21	- 17	- 19	- 7	- 6	- 3	+ 1	- 10	- 21	- 22	- 18	- 24	- 14
5.....	- 26	- 21	- 15	+ 1	+ 8	+ 8	+ 11	- 1	- 16	- 21	- 20	- 31	- 10
6.....	- 22	- 15	- 2	+ 21	+ 24	+ 20	+ 26	+ 14	+ 1	- 13	- 15	- 27	+ 1
7.....	- 7	- 1	- 15	+ 37	+ 35	+ 32	+ 39	+ 29	+ 17	+ 8	- 1	- 14	+ 16
8.....	+ 13	+ 14	+ 32	+ 46	+ 41	+ 39	+ 45	+ 39	+ 31	+ 29	+ 20	+ 6	+ 30
9.....	+ 36	+ 27	+ 42	+ 49	+ 41	+ 38	+ 43	+ 43	+ 42	+ 41	+ 36	+ 28	+ 39
10.....	+ 53	+ 36	+ 44	+ 45	+ 36	+ 33	+ 38	+ 40	+ 42	+ 41	+ 41	+ 47	+ 41
11.....	+ 46	+ 35	- 37	+ 30	+ 23	+ 24	+ 28	+ 27	+ 28	+ 28	+ 30	+ 33	- 31
12 (midi).	+ 16	+ 15	+ 19	+ 9	+ 8	+ 11	+ 13	+ 11	+ 11	+ 5	+ 4	+ 2	- 10
13.....	- 15	- 15	- 9	- 12	- 8	- 6	- 3	- 4	- 8	- 19	- 19	- 24	- 12
14.....	- 32	- 38	- 34	- 34	- 24	- 22	- 20	- 20	- 26	- 35	- 34	- 36	- 30
15.....	- 30	- 47	- 52	- 56	- 39	- 37	- 37	- 36	- 39	- 45	- 36	- 29	- 40
16.....	- 23	- 45	- 58	- 66	- 52	- 51	- 54	- 51	- 46	- 45	- 28	- 18	- 45
17.....	- 14	- 30	- 49	- 65	- 59	- 58	- 66	- 59	- 44	- 32	- 14	- 8	- 42
18.....	- 4	- 10	- 27	- 54	- 54	- 52	- 62	- 56	- 33	- 13	+ 1	+ 2	- 30
19.....	+ 6	+ 7	- 6	- 30	- 36	- 38	- 47	- 35	- 8	+ 5	+ 10	+ 12	- 13
20.....	+ 13	+ 16	+ 10	- 2	- 9	- 15	- 24	- 9	+ 11	+ 19	+ 15	+ 19	+ 4
21.....	+ 16	+ 21	+ 21	+ 14	+ 13	+ 12	+ 6	+ 13	+ 22	+ 27	+ 17	+ 22	+ 17
22.....	+ 15	+ 23	+ 24	+ 19	+ 23	+ 25	+ 19	+ 22	+ 24	+ 28	+ 15	+ 20	+ 21
23.....	+ 10	+ 21	+ 23	+ 20	+ 24	+ 26	+ 22	+ 24	+ 20	+ 23	- 11	- 16	+ 20

44. SAINTE-HONORINE-DU-FAY.

Latitude, 49° 5' N. — Longitude, 2° 50' W. — Altitude, 118^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	+ 2	+ 15	+ 15	+ 20	+ 22	+ 23	+ 17	+ 15	+ 13	+ 18	+ 7	- 15	- 15
1.....	- 4	+ 8	+ 8	+ 13	+ 12	+ 9	+ 6	+ 6	+ 4	+ 9	+ 2	+ 14	+ 7
2.....	- 4	+ 2	- 2	+ 3	+ 2	- 7	- 4	- 5	- 7	- 2	- 4	+ 12	- 1
3.....	- 7	- 10	- 15	- 7	- 7	- 18	- 11	- 15	- 19	- 12	- 12	- 3	- 11
4.....	- 11	- 17	- 25	- 13	- 13	- 19	- 12	- 20	- 28	- 21	- 19	- 8	- 17
5.....	- 15	- 21	- 27	- 10	- 10	- 15	- 9	- 16	- 28	- 27	- 24	- 18	- 18
6.....	- 14	- 17	- 16	- 0	- 5	- 3	- 1	- 7	- 17	- 25	- 23	- 22	- 12
7.....	- 6	- 8	- 3	+ 8	+ 1	+ 9	+ 7	+ 2	- 5	- 12	- 12	- 20	- 3
8.....	+ 11	+ 3	+ 10	+ 15	+ 7	+ 21	+ 14	+ 9	+ 8	+ 4	+ 5	- 7	+ 8
9.....	+ 28	+ 13	+ 22	+ 18	+ 11	+ 25	+ 15	+ 15	+ 21	+ 17	+ 22	+ 14	+ 18
10.....	+ 40	+ 22	+ 30	+ 18	+ 11	+ 22	+ 13	+ 18	+ 27	+ 22	+ 34	+ 30	+ 24
11.....	+ 37	+ 25	+ 29	+ 15	+ 9	+ 13	+ 9	+ 15	+ 22	+ 18	+ 30	+ 25	+ 21
12 (midi).	+ 15	+ 15	+ 20	+ 9	+ 6	+ 2	+ 3	+ 8	+ 13	+ 5	+ 10	+ 4	+ 9
13.....	- 10	- 3	+ 2	- 2	- 0	- 10	- 3	+ 1	+ 3	- 10	- 9	- 15	- 5
14.....	- 27	- 20	- 16	- 16	- 8	- 23	- 9	- 6	- 8	- 21	- 20	- 27	- 17
15.....	- 28	- 30	- 31	- 30	- 20	- 34	- 14	- 13	- 18	- 28	- 20	- 28	- 24
16.....	- 25	- 30	- 40	- 37	- 30	- 42	- 19	- 20	- 24	- 29	- 13	- 24	- 28
17.....	- 18	- 21	- 33	- 38	- 35	- 44	- 24	- 24	- 24	- 19	- 6	- 16	- 25
18.....	- 9	- 7	- 15	- 31	- 28	- 29	- 24	- 23	- 15	- 3	+ 1	- 6	- 16
19.....	+ 1	+ 6	+ 3	- 12	- 12	- 1	- 17	- 10	+ 2	+ 11	+ 6	+ 4	- 2
20.....	+ 10	+ 15	+ 17	+ 10	+ 7	+ 20	- 1	+ 8	+ 17	+ 23	+ 10	+ 13	+ 12
21.....	+ 14	+ 20	+ 23	+ 20	+ 23	+ 32	+ 16	+ 19	+ 22	+ 29	+ 12	+ 18	+ 21
22.....	+ 12	+ 21	+ 23	+ 23	+ 28	+ 37	+ 24	+ 22	+ 22	+ 29	+ 12	+ 20	+ 23
23.....	+ 8	+ 19	+ 20	+ 24	+ 28	+ 33	+ 23	+ 21	+ 19	+ 24	+ 10	+ 19	+ 21

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.271

45. PRAGUE.

Latitude, 50°5' N. — Longitude, 12°5' E. — Altitude, 201^m.

Heures. h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 8	+ 10	+ 13	+ 16	+ 14	+ 15	+ 23	+ 11	+ 13	+ 11	+ 8	+ 9	+ 13
1.....	+ 6	+ 8	+ 12	+ 13	+ 14	+ 15	+ 24	+ 12	+ 11	+ 8	+ 8	+ 2	+ 11
2.....	+ 6	+ 5	+ 8	+ 7	+ 10	+ 12	+ 20	+ 11	+ 8	+ 4	+ 4	+ 2	+ 8
3.....	+ 5	+ 5	+ 1	+ 3	+ 7	+ 8	+ 15	+ 8	+ 6	+ 1	+ 4	+ 1	+ 4
4.....	+ 2	+ 12	+ 6	+ 3	+ 8	+ 12	+ 17	+ 14	+ 6	+ 6	+ 10	+ 8	+ 1
5.....	+ 9	+ 14	+ 6	+ 10	+ 20	+ 23	+ 25	+ 24	+ 9	+ 9	+ 12	+ 13	+ 4
6.....	+ 10	+ 11	+ 0	+ 21	+ 35	+ 35	+ 35	+ 33	+ 18	+ 2	+ 5	+ 13	+ 11
7.....	+ 2	+ 1	+ 11	+ 33	+ 45	+ 44	+ 43	+ 40	+ 31	+ 14	+ 10	+ 6	+ 22
8.....	+ 13	+ 12	+ 23	+ 40	+ 49	+ 47	+ 46	+ 44	+ 44	+ 33	+ 28	+ 9	+ 33
9.....	+ 27	+ 23	+ 30	+ 42	+ 47	+ 46	+ 43	+ 45	+ 49	+ 42	+ 40	+ 24	+ 38
10.....	+ 36	+ 30	+ 33	+ 40	+ 41	+ 39	+ 35	+ 40	+ 45	+ 44	+ 43	+ 35	+ 38
11.....	+ 35	+ 30	+ 30	+ 30	+ 30	+ 28	+ 24	+ 30	+ 32	+ 37	+ 35	+ 35	+ 31
12 (midi).	+ 8	+ 17	+ 17	+ 11	+ 11	+ 13	+ 8	+ 14	+ 14	+ 14	+ 13	+ 6	+ 12
13.....	+ 18	+ 5	+ 4	+ 10	+ 8	+ 4	+ 10	+ 5	+ 9	+ 10	+ 9	+ 17	+ 9
14.....	+ 32	+ 25	+ 26	+ 30	+ 28	+ 21	+ 27	+ 23	+ 30	+ 31	+ 27	+ 29	+ 27
15.....	+ 33	+ 34	+ 41	+ 46	+ 44	+ 38	+ 42	+ 40	+ 46	+ 42	+ 39	+ 27	+ 39
16.....	+ 28	+ 32	+ 45	+ 56	+ 55	+ 51	+ 55	+ 51	+ 55	+ 44	+ 43	+ 20	+ 45
17.....	+ 20	+ 23	+ 42	+ 58	+ 61	+ 60	+ 64	+ 57	+ 56	+ 39	+ 36	+ 14	+ 44
18.....	+ 11	+ 12	+ 27	+ 51	+ 59	+ 60	+ 64	+ 57	+ 49	+ 28	+ 24	+ 8	+ 38
19.....	+ 4	+ 2	+ 12	+ 32	+ 48	+ 52	+ 55	+ 47	+ 34	+ 16	+ 12	+ 2	+ 26
20.....	+ 2	+ 5	+ 0	+ 13	+ 31	+ 37	+ 38	+ 31	+ 18	+ 5	+ 1	+ 3	+ 14
21.....	+ 6	+ 11	+ 7	+ 2	+ 11	+ 20	+ 18	+ 16	+ 5	+ 5	+ 8	+ 8	+ 2
22.....	+ 8	+ 13	+ 11	+ 10	+ 3	+ 3	+ 0	+ 4	+ 5	+ 10	+ 13	+ 12	+ 7
23.....	+ 9	+ 12	+ 13	+ 15	+ 11	+ 9	+ 15	+ 5	+ 11	+ 11	+ 12	+ 13	+ 11

46. FALMOUTH.

Latitude, 50°9' N. — Longitude, 7°24' W. — Altitude, 60^m (1).

Heures (2).	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 14	+ 14	+ 13	+ 17	+ 12	+ 14	+ 15	+ 11	+ 7	+ 12	+ 6	+ 9	+ 12
1.....	+ 2	+ 4	+ 5	+ 4	+ 5	+ 3	+ 1	+ 3	+ 5	+ 1	+ 9	+ 8	+ 2
2.....	+ 3	+ 10	+ 9	+ 14	+ 22	+ 21	+ 20	+ 19	+ 18	+ 16	+ 18	+ 14	+ 15
3.....	+ 7	+ 19	+ 29	+ 27	+ 35	+ 37	+ 37	+ 35	+ 36	+ 36	+ 28	+ 15	+ 28
4.....	+ 22	+ 34	+ 40	+ 38	+ 45	+ 43	+ 43	+ 45	+ 47	+ 46	+ 38	+ 27	+ 39
5.....	+ 33	+ 37	+ 39	+ 39	+ 39	+ 38	+ 39	+ 43	+ 49	+ 48	+ 37	+ 34	+ 40
6.....	+ 37	+ 35	+ 32	+ 26	+ 24	+ 27	+ 27	+ 27	+ 35	+ 44	+ 34	+ 32	+ 32
7.....	+ 28	+ 27	+ 18	+ 12	+ 11	+ 14	+ 13	+ 12	+ 17	+ 28	+ 22	+ 22	+ 19
8.....	+ 10	+ 5	+ 2	+ 1	+ 4	+ 2	+ 0	+ 4	+ 3	+ 4	+ 6	+ 1	+ 0
9.....	+ 10	+ 10	+ 15	+ 8	+ 9	+ 5	+ 6	+ 12	+ 17	+ 10	+ 24	+ 18	+ 12
10.....	+ 27	+ 23	+ 26	+ 17	+ 17	+ 9	+ 12	+ 19	+ 27	+ 22	+ 37	+ 41	+ 23
11.....	+ 43	+ 43	+ 39	+ 24	+ 26	+ 18	+ 20	+ 25	+ 30	+ 29	+ 47	+ 48	+ 33
12 (midi).	+ 19	+ 34	+ 33	+ 15	+ 23	+ 17	+ 19	+ 22	+ 27	+ 19	+ 23	+ 20	+ 23
13.....	+ 7	+ 14	+ 18	+ 12	+ 20	+ 16	+ 17	+ 20	+ 20	+ 6	+ 6	+ 8	+ 11
14.....	+ 26	+ 9	+ 4	+ 4	+ 15	+ 13	+ 13	+ 16	+ 9	+ 4	+ 10	+ 27	+ 1
15.....	+ 25	+ 22	+ 17	+ 9	+ 4	+ 9	+ 8	+ 5	+ 2	+ 11	+ 15	+ 25	+ 8
16.....	+ 19	+ 23	+ 22	+ 14	+ 4	+ 2	+ 0	+ 3	+ 9	+ 11	+ 11	+ 17	+ 11
17.....	+ 9	+ 15	+ 22	+ 13	+ 10	+ 3	+ 6	+ 9	+ 9	+ 2	+ 3	+ 8	+ 9
18.....	+ 5	+ 1	+ 8	+ 8	+ 11	+ 3	+ 7	+ 11	+ 5	+ 13	+ 7	+ 3	+ 2
19.....	+ 14	+ 14	+ 5	+ 1	+ 6	+ 2	+ 1	+ 5	+ 5	+ 23	+ 11	+ 13	+ 6
20.....	+ 21	+ 19	+ 17	+ 19	+ 7	+ 9	+ 8	+ 12	+ 22	+ 28	+ 14	+ 21	+ 16
21.....	+ 24	+ 22	+ 23	+ 29	+ 27	+ 26	+ 24	+ 22	+ 24	+ 32	+ 17	+ 23	+ 24
22.....	+ 25	+ 21	+ 24	+ 28	+ 27	+ 32	+ 28	+ 25	+ 24	+ 33	+ 17	+ 23	+ 26
23.....	+ 22	+ 17	+ 19	+ 23	+ 21	+ 23	+ 24	+ 19	+ 17	+ 22	+ 10	+ 19	+ 20

(1) Altitude : 64^m jusqu'en mai 1885, et 56^m depuis cette époque.

(2) Les observations sont faites au temps moyen de Greenwich, qui avance de 20^m16^s sur l'heure locale.

47. BRUXELLES.

Latitude, 50°52' N. — Longitude, 2°1' E. — Altitude, 57^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	0	+ 11	+ 14	+ 15	+ 13	+ 12	+ 15	+ 16	+ 13	+ 3	+ 8	- 5	+ 10
1.....	- 5	+ 3	+ 7	+ 6	+ 8	+ 1	+ 3	+ 7	+ 4	- 5	- 2	- 7	+ 2
2.....	- 10	- 7	- 3	- 7	+ 1	- 13	- 9	- 4	- 5	- 11	- 12	- 8	- 7
3.....	- 15	- 19	- 16	- 15	- 8	- 21	- 18	- 13	- 17	- 20	- 22	- 15	- 17
4.....	- 19	- 28	- 26	20	- 18	- 21	- 19	- 20	- 25	- 26	- 32	- 19	- 23
5.....	- 22	- 31	- 32	- 16	- 9	- 13	- 14	- 14	- 23	- 29	- 38	- 22	- 22
6.....	- 26	- 24	- 17	- 1	+ 8	0	0	- 3	- 12	- 23	- 31	- 22	- 13
7.....	- 21	- 10	- 1	+ 12	+ 22	+ 16	+ 13	+ 8	+ 3	- 7	- 15	- 18	0
8.....	+ 2	+ 6	+ 15	+ 25	+ 31	+ 26	+ 24	+ 19	+ 18	+ 10	- 2	- 1	+ 15
9.....	+ 22	+ 20	+ 27	+ 34	+ 33	+ 33	+ 27	+ 28	+ 32	+ 28	+ 16	+ 29	+ 29
10.....	+ 32	+ 32	+ 33	+ 36	+ 30	+ 29	+ 27	+ 29	+ 35	+ 30	+ 26	+ 47	+ 32
11.....	+ 26	+ 31	+ 30	+ 28	+ 23	+ 22	+ 19	+ 23	+ 28	+ 19	+ 23	+ 39	+ 26
12 (midi).	+ 10	+ 15	+ 21	+ 13	+ 11	+ 14	+ 12	+ 9	+ 14	+ 6	+ 5	+ 17	+ 12
13.....	- 9	- 3	+ 3	0	- 2	+ 2	0	- 2	+ 1	- 8	- 8	- 6	- 3
14.....	- 23	- 20	- 15	- 13	- 14	- 13	- 10	- 12	- 13	- 18	- 17	- 13	- 15
15.....	17	- 24	- 27	- 33	- 29	- 22	- 19	22	- 25	- 24	- 17	- 12	- 23
16.....	- 10	- 21	- 37	- 39	- 42	- 31	- 28	- 29	- 32	- 23	- 11	- 9	- 26
17.....	- 3	- 13	- 33	- 40	- 45	- 36	- 33	- 34	- 31	- 11	0	- 5	- 24
18.....	+ 5	- 2	- 17	- 31	- 34	- 27	- 28	- 32	- 20	+ 3	+ 13	+ 1	- 14
19.....	+ 14	+ 8	0	- 11	- 19	- 15	- 19	- 15	- 4	+ 14	+ 20	+ 4	- 2
20.....	+ 21	+ 16	+ 15	+ 9	- 4	- 4	- 1	+ 4	+ 10	+ 23	+ 24	+ 10	+ 10
21.....	- 24	+ 22	+ 19	+ 14	+ 13	+ 16	+ 15	+ 16	+ 15	+ 30	+ 27	+ 9	+ 18
22.....	+ 18	+ 22	+ 21	+ 16	+ 17	+ 23	+ 23	+ 22	+ 17	+ 25	+ 24	+ 5	+ 19
23.....	+ 8	+ 18	+ 18	+ 16	+ 16	+ 20	+ 20	+ 22	+ 16	+ 14	+ 17	- 3	+ 15

48. NERTCHINSK.

Latitude, 51°19' N. — Longitude, 117°17' E. — Altitude, 660^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	+ 3	+ 10	+ 9	+ 19	+ 22	+ 15	+ 10	+ 8	+ 10	+ 8	+ 7	+ 9	+ 11
1.....	0	+ 6	+ 9	+ 18	+ 21	+ 16	+ 9	+ 8	+ 11	+ 6	+ 3	+ 3	+ 9
2.....	+ 1	+ 4	+ 6	+ 17	+ 22	+ 19	+ 9	+ 8	+ 11	+ 3	+ 3	+ 2	+ 9
3.....	+ 2	0	+ 2	+ 17	+ 23	+ 24	+ 12	+ 11	+ 12	- 2	- 1	0	+ 8
4.....	- 3	- 4	+ 3	+ 17	+ 28	+ 32	+ 18	+ 17	+ 15	- 4	- 6	- 7	+ 9
5.....	- 9	- 6	+ 8	+ 21	+ 38	+ 41	+ 28	+ 26	+ 22	0	- 11	- 15	+ 12
6.....	- 10	- 5	+ 17	+ 35	+ 51	+ 54	+ 41	+ 40	+ 36	+ 6	- 10	- 16	+ 20
7.....	- 3	+ 4	+ 35	+ 53	+ 62	+ 63	+ 50	+ 52	+ 49	+ 19	- 4	- 13	+ 31
8.....	+ 9	+ 19	+ 50	+ 58	+ 64	+ 66	+ 51	+ 56	+ 54	+ 37	+ 15	- 2	+ 40
9.....	+ 24	+ 30	+ 57	+ 56	+ 53	+ 58	+ 46	+ 51	+ 55	+ 47	+ 26	+ 14	+ 43
10.....	+ 30	+ 32	+ 52	+ 48	+ 37	+ 41	+ 36	+ 44	+ 48	+ 43	+ 31	+ 23	+ 39
11.....	+ 21	+ 22	+ 36	+ 28	+ 16	+ 26	+ 22	+ 28	+ 29	+ 29	+ 22	+ 15	+ 25
12 (midi).	- 3	+ 2	+ 11	+ 2	- 5	+ 3	+ 2	+ 4	+ 4	+ 3	- 2	- 10	+ 1
13.....	- 29	- 26	- 15	- 24	- 29	- 26	- 16	- 17	- 21	- 24	- 23	- 28	- 23
14.....	- 40	- 42	- 40	- 49	- 54	- 51	- 34	- 40	- 47	- 44	- 35	- 35	- 43
15.....	- 36	- 45	- 57	- 70	- 72	- 69	- 51	- 57	- 64	- 52	- 37	- 27	- 53
16.....	- 27	- 43	- 66	- 82	- 84	- 81	- 60	- 65	- 71	- 48	- 29	- 13	- 56
17.....	14	- 31	- 65	- 79	- 84	- 85	- 64	- 65	- 69	40	- 17	- 2	- 51
18.....	- 1	- 10	- 50	- 67	- 71	- 74	- 57	- 60	- 56	- 23	- 3	+ 8	- 39
19.....	+ 12	+ 8	- 24	- 45	- 52	- 57	- 42	- 45	- 34	- 5	+ 8	+ 18	- 22
20.....	+ 19	+ 18	- 5	- 13	- 23	- 33	- 24	- 20	- 11	+ 4	+ 15	+ 23	- 4
21.....	+ 21	+ 22	+ 7	+ 7	+ 2	- 7	- 2	- 3	+ 1	+ 10	+ 18	+ 22	+ 8
22.....	+ 19	+ 21	+ 10	+ 14	+ 16	+ 6	+ 8	+ 7	+ 7	+ 14	+ 17	+ 18	+ 13
23.....	+ 12	+ 15	+ 10	+ 16	+ 21	+ 13	+ 11	+ 9	+ 10	+ 11	+ 13	+ 14	+ 13

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.273

49. LEIPZIG.

Latitude, 51°20' N. — Longitude, 10°3' E. — Altitude, 119^m.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	— 2	+ 9	+ 16	+ 11	+ 1	+ 2	+ 10	— 9	+ 7	0	+ 20	+ 15	+ 8
1.....	— 9	+ 6	+ 14	+ 6	— 3	— 2	+ 7	+ 3	+ 5	0	+ 13	+ 3	+ 4
2.....	— 8	— 1	+ 8	— 1	— 8	— 7	0	— 4	— 1	— 5	+ 12	— 1	— 1
3.....	— 6	— 11	— 3	— 6	— 11	— 11	— 7	— 9	— 6	— 13	0	— 5	— 7
4.....	— 13	— 18	— 11	— 10	— 10	— 10	— 7	— 11	— 10	— 19	— 8	— 19	— 12
5.....	— 18	— 21	— 13	— 8	— 2	+ 3	+ 2	— 5	— 11	— 22	— 13	— 28	— 12
6.....	— 21	— 21	— 10	+ 3	+ 13	+ 15	+ 14	— 7	0	— 19	— 16	— 31	— 6
7.....	— 14	— 12	— 1	+ 18	+ 27	+ 27	+ 26	+ 18	+ 13	— 4	— 8	— 25	+ 6
8.....	+ 2	— 2	+ 14	+ 31	+ 39	+ 36	+ 33	+ 29	+ 29	+ 14	+ 7	— 11	+ 19
9.....	+ 19	+ 13	+ 23	+ 40	+ 43	+ 40	+ 37	+ 35	+ 42	+ 26	+ 17	+ 5	+ 28
10.....	+ 33	+ 24	+ 27	+ 45	+ 44	+ 40	+ 37	+ 37	+ 47	+ 33	+ 23	+ 18	+ 34
11.....	+ 38	+ 28	+ 25	+ 40	+ 40	+ 37	+ 33	+ 32	+ 41	+ 31	+ 19	+ 15	+ 32
12 (midi).	+ 23	+ 22	+ 18	+ 26	+ 30	+ 28	+ 24	+ 22	+ 29	+ 19	+ 1	+ 3	+ 20
13.....	+ 3	+ 8	— 2	+ 8	— 14	+ 14	+ 11	+ 8	+ 10	+ 3	— 15	— 7	— 5
14.....	— 12	— 10	— 21	— 12	— 3	— 3	— 4	— 8	— 11	— 11	— 28	— 15	— 12
15.....	— 13	— 20	— 34	— 28	— 18	— 18	— 18	— 22	— 28	— 21	— 32	— 13	— 22
16.....	— 10	— 22	— 39	— 42	— 33	— 30	— 32	— 32	— 39	— 23	— 29	— 4	— 28
17.....	— 7	— 16	— 37	— 47	— 43	— 41	— 44	— 39	— 45	— 20	— 20	+ 2	— 30
18.....	— 3	— 6	— 23	— 45	— 46	— 44	— 48	— 42	— 42	— 8	— 11	— 5	— 26
19.....	+ 2	+ 3	— 7	— 34	— 39	— 40	— 44	— 31	— 28	+ 3	— 2	+ 11	— 17
20.....	+ 4	+ 9	+ 6	— 14	— 26	— 29	— 31	— 13	— 11	+ 9	+ 7	+ 18	— 6
21.....	+ 5	+ 11	+ 14	0	+ 10	— 10	— 11	— 1	— 1	+ 11	+ 17	+ 21	+ 4
22.....	— 4	+ 12	+ 17	+ 8	— 1	0	— 3	+ 7	+ 4	+ 11	+ 23	+ 22	+ 9
23.....	+ 3	+ 11	+ 17	+ 11	+ 2	+ 3	+ 9	+ 10	+ 6	+ 6	+ 23	+ 21	+ 10

50. KEW.

Latitude, 51°28' N. — Longitude, 2°39' W. — Altitude, 10^m.

Heures (1). ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 9	+ 19	+ 17	+ 26	+ 29	+ 25	+ 23	+ 21	+ 13	+ 20	+ 9	+ 11	+ 19
1.....	+ 1	+ 10	+ 10	+ 14	+ 16	+ 13	+ 13	+ 9	+ 4	— 11	— 7	— 3	+ 8
2.....	+ 2	+ 3	— 1	+ 4	+ 5	+ 1	+ 3	— 1	— 6	— 3	— 13	— 5	1
3.....	— 4	— 13	— 16	— 6	— 5	— 6	— 6	— 10	— 20	— 18	— 24	— 10	— 12
4.....	— 16	— 23	— 22	— 13	— 9	— 6	— 7	— 15	— 29	— 23	— 32	— 22	— 18
5.....	— 24	— 24	— 22	— 10	— 2	— 1	0	— 12	— 28	— 23	— 33	— 30	— 17
6.....	— 22	— 23	— 13	+ 5	+ 11	+ 11	+ 12	0	— 12	— 17	— 29	— 25	— 9
7.....	— 12	— 15	— 3	+ 18	+ 21	+ 21	+ 22	+ 12	— 4	— 1	— 16	— 17	+ 3
8.....	+ 9	+ 5	+ 20	+ 25	+ 26	— 28	+ 27	+ 23	+ 19	+ 16	+ 5	+ 3	— 17
9.....	+ 25	— 16	— 32	+ 28	+ 24	+ 26	+ 25	— 26	+ 28	+ 22	+ 18	+ 20	+ 24
10.....	+ 40	+ 27	+ 35	+ 27	+ 19	+ 21	+ 20	+ 24	+ 27	+ 21	+ 31	+ 38	+ 27
11.....	+ 40	+ 34	+ 32	+ 19	+ 11	+ 16	+ 14	+ 18	+ 22	+ 16	+ 28	+ 31	+ 23
12 (midi).	+ 14	+ 20	+ 20	+ 4	— 1	+ 4	+ 7	+ 7	+ 11	— 2	+ 9	+ 7	— 8
13.....	— 13	+ 1	— 3	— 10	— 13	— 9	— 7	— 4	— 11	— 18	— 7	— 10	— 8
14.....	— 31	— 21	— 26	— 27	— 25	— 20	— 18	— 15	— 16	— 29	— 21	— 29	— 23
15.....	— 31	— 31	— 38	— 43	— 37	— 30	— 28	— 26	— 28	— 35	— 21	— 26	— 31
16.....	— 26	— 31	— 45	— 51	— 46	— 41	— 38	— 36	— 33	— 33	— 12	— 17	— 34
17.....	— 19	— 23	— 39	— 49	— 48	— 46	— 43	— 40	— 29	— 21	— 1	— 10	— 30
18.....	— 7	— 5	— 20	— 37	— 41	— 41	— 41	— 36	— 17	+ 2	+ 11	0	— 19
19.....	+ 4	+ 6	— 1	— 16	— 25	— 29	— 28	— 20	— 2	+ 13	+ 18	+ 10	— 6
20.....	+ 12	+ 13	+ 13	+ 11	+ 1	— 9	— 8	+ 2	+ 19	+ 22	+ 23	+ 17	+ 10
21.....	+ 16	+ 18	+ 20	+ 23	+ 22	+ 15	+ 12	+ 19	+ 24	+ 28	+ 25	+ 22	+ 20
22.....	+ 17	+ 19	+ 22	+ 28	+ 33	+ 27	+ 24	+ 27	+ 26	+ 28	+ 23	+ 24	+ 25
23.....	+ 16	+ 19	+ 21	+ 29	+ 34	+ 28	+ 26	+ 27	+ 21	+ 24	+ 17	+ 21	+ 24

(1) Les observations sont faites au temps moyen de Greenwich, qui avance de 1^m16^s sur l'heure de Kew.

51. GREENWICH.

Latitude, 51°29' N. — Longitude, 2°20' W. — Altitude, 48^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	+ 8	+ 14	+ 17	+ 19	+ 25	+ 17	+ 19	+ 20	+ 14	+ 21	+ 11	+ 10	— 16
1.....	— 4	+ 6	+ 11	+ 10	+ 15	+ 9	+ 9	+ 10	+ 4	+ 14	+ 5	+ 2	— 8
2.....	— 5	0	+ 1	0	+ 5	— 2	— 1	— 1	— 8	+ 1	0	+ 2	— 1
3.....	— 10	— 14	— 15	— 8	— 4	— 10	— 9	— 11	— 20	— 13	— 11	— 2	— 11
4.....	— 19	— 21	22	— 15	— 8	— 9	— 10	— 18	— 29	— 20	— 19	— 11	— 17
5.....	— 28	— 26	22	— 13	— 3	— 3	— 7	— 14	— 30	— 22	— 23	— 19	— 17
6.....	— 28	— 21	— 14	— 1	+ 6	+ 6	+ 1	— 3	— 17	— 18	— 19	— 18	— 10
7.....	— 19	— 12	0	+ 11	+ 13	+ 16	+ 13	+ 9	— 2	— 3	— 6	— 11	+ 1
8.....	— 2	+ 7	— 13	+ 20	+ 19	+ 22	+ 20	+ 20	+ 13	+ 13	+ 8	+ 6	— 13
9.....	+ 16	+ 21	+ 25	+ 29	+ 21	+ 23	+ 22	+ 26	+ 27	+ 24	+ 21	+ 25	+ 23
10.....	+ 30	+ 33	+ 31	+ 30	+ 18	+ 21	+ 20	+ 26	+ 29	+ 26	+ 31	+ 41	+ 28
11.....	+ 31	+ 34	+ 30	+ 23	+ 12	+ 15	+ 16	+ 20	+ 22	+ 21	+ 28	+ 33	+ 24
12 (midi).	+ 9	+ 22	+ 21	+ 12	+ 3	+ 5	+ 9	+ 9	+ 12	+ 4	+ 8	+ 7	+ 10
13.....	— 14	— 3	+ 3	— 1	— 8	— 5	0	— 2	+ 1	16	— 12	— 18	6
14.....	— 25	— 20	— 16	— 16	— 17	— 15	— 9	— 12	10	— 29	— 25	29	— 19
15.....	— 18	— 29	— 30	— 32	— 29	— 25	— 19	— 22	— 20	— 34	— 26	— 25	— 26
16.....	— 10	— 29	— 37	— 39	— 35	— 33	— 27	— 30	— 26	— 33	— 21	— 19	— 28
17.....	— 2	— 22	— 34	— 39	— 39	— 36	— 35	— 35	— 26	— 22	— 11	— 13	— 26
18.....	+ 6	— 6	— 20	— 34	— 35	— 32	— 34	— 34	— 17	— 7	— 2	— 6	— 18
19.....	+ 14	+ 5	— 6	— 18	— 24	— 21	— 25	— 21	+ 1	+ 7	+ 6	+ 1	— 7
20.....	+ 18	+ 13	— 7	+ 3	— 4	— 3	— 9	+ 1	+ 15	+ 18	— 12	+ 6	— 6
21.....	+ 19	+ 15	+ 17	+ 16	+ 16	+ 16	+ 12	+ 16	+ 23	+ 24	+ 15	+ 10	— 16
22.....	+ 18	+ 17	+ 20	+ 20	+ 25	+ 22	+ 21	+ 23	+ 24	+ 26	+ 15	+ 13	+ 20
23.....	+ 15	+ 16	+ 20	+ 23	+ 28	+ 22	+ 23	+ 24	+ 21	+ 24	+ 14	+ 13	— 20

52. VALENCIA.

Latitude, 51°55' N. — Longitude, 12°38' W. — Altitude, 6^m.

Heures (1).	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juill.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	+ 15	+ 9	+ 24	+ 14	+ 20	+ 14	+ 16	+ 15	+ 12	+ 4	— 12	+ 12	— 14
1.....	— 4	+ 1	— 16	— 4	+ 6	— 2	+ 3	+ 2	0	— 8	+ 4	— 2	— 3
2.....	— 5	— 12	+ 3	— 10	— 9	— 18	— 14	— 13	— 15	— 20	— 5	— 7	— 10
3.....	— 9	— 23	— 12	— 24	— 24	— 34	— 30	— 28	— 30	— 32	— 14	— 9	— 22
4.....	— 21	— 36	— 27	— 33	— 37	— 44	— 39	— 42	— 42	— 39	— 21	— 18	— 33
5.....	— 33	— 38	— 31	— 35	— 38	— 44	— 38	— 45	— 45	— 39	— 24	— 29	— 37
6.....	— 38	— 32	— 26	— 25	— 29	— 34	— 30	— 36	— 35	— 32	— 22	— 32	— 31
7.....	— 34	— 19	— 17	— 13	— 19	— 23	— 19	— 24	— 18	— 19	— 13	— 26	— 20
8.....	— 17	— 2	— 6	— 3	— 9	— 12	— 9	— 11	— 2	0	+ 3	— 12	— 7
9.....	— 3	+ 15	+ 5	+ 6	0	2	0	— 1	+ 11	+ 16	+ 22	+ 6	+ 7
10.....	+ 23	+ 30	+ 17	+ 14	+ 7	+ 6	+ 8	+ 8	+ 20	+ 28	+ 38	+ 26	+ 19
11.....	+ 36	+ 41	+ 22	+ 19	+ 12	+ 13	+ 14	+ 14	+ 23	+ 31	+ 40	+ 35	+ 25
12 (midi).	+ 29	+ 41	+ 20	+ 19	+ 14	+ 17	+ 17	+ 17	+ 21	+ 27	+ 23	+ 21	+ 22
13.....	+ 4	+ 22	+ 8	+ 16	+ 13	+ 18	+ 16	+ 17	+ 16	+ 15	+ 3	— 1	+ 12
14.....	— 13	0	— 6	+ 8	+ 9	— 16	+ 13	+ 15	+ 9	+ 2	— 16	— 19	+ 1
15.....	— 18	— 15	— 21	— 2	+ 2	+ 12	+ 8	+ 9	0	— 8	— 31	— 22	— 7
16.....	— 14	— 21	— 28	— 11	— 5	+ 7	+ 2	+ 2	— 9	12	— 30	— 13	— 11
17.....	— 7	— 19	— 26	— 13	— 8	+ 3	— 3	— 2	— 10	— 9	— 20	— 3	— 10
18.....	+ 2	— 4	— 14	— 10	7	+ 3	— 4	— 1	— 3	+ 3	— 9	+ 5	— 3
19.....	+ 10	+ 7	0	— 1	— 1	+ 7	+ 1	+ 5	+ 8	+ 14	+ 1	+ 11	+ 5
20.....	+ 18	+ 13	+ 14	+ 13	+ 11	+ 14	+ 11	+ 17	+ 20	+ 21	+ 10	+ 16	+ 15
21.....	+ 21	+ 15	+ 25	+ 23	+ 26	+ 25	+ 21	+ 27	+ 25	+ 23	+ 15	+ 19	+ 22
22.....	+ 22	+ 15	+ 30	+ 24	+ 35	+ 32	+ 29	+ 30	+ 24	+ 20	+ 17	+ 20	+ 25
23.....	+ 21	+ 13	+ 29	+ 20	+ 31	+ 27	+ 26	+ 25	+ 20	+ 13	+ 16	+ 18	+ 22

(1) Les observations sont faites au temps moyen de Greenwich, qui avance de 41^m 12^s sur l'heure de Valencia.

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.275

53. UTRECHT.

Latitude, 52°5' N. — Longitude, 2°48' E. — Altitude, 13^m.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 8	+ 9	+ 12	+ 17	+ 16	+ 18	+ 19	+ 16	+ 17	+ 9	+ 4	+ 5	+ 13
1.....	+ 9	+ 3	+ 6	+ 7	+ 9	+ 10	+ 6	+ 4	+ 7	0	+ 3	+ 2	+ 5
2.....	+ 3	— 13	— 3	— 6	+ 1	— 1	— 11	— 10	— 5	— 10	— 4	— 3	— 5
3.....	— 6	— 24	— 18	— 20	— 8	— 14	— 25	— 22	— 17	— 21	— 13	— 13	— 17
4.....	— 14	— 28	— 28	— 26	— 15	— 20	— 30	— 30	— 29	— 30	— 20	— 22	— 24
5.....	— 20	— 28	— 28	— 24	— 11	— 16	— 26	— 28	— 30	30	— 20	— 27	— 24
6.....	— 21	— 22	— 19	— 13	+ 1	— 8	— 16	— 17	— 20	— 18	— 12	— 21	— 16
7.....	— 9	— 7	— 3	+ 1	+ 12	0	— 5	— 5	— 5	+ 1	+ 4	— 5	— 2
8.....	+ 6	+ 8	+ 13	+ 15	+ 20	+ 8	+ 5	+ 7	+ 10	+ 19	+ 21	+ 13	+ 12
9.....	+ 17	+ 21	+ 24	+ 21	+ 24	+ 14	+ 12	+ 18	+ 21	+ 32	+ 33	+ 26	+ 22
10.....	+ 23	+ 28	+ 28	+ 22	+ 23	+ 16	+ 15	+ 22	+ 25	+ 35	+ 37	+ 31	+ 25
11.....	+ 21	+ 29	+ 27	+ 20	+ 19	+ 15	+ 14	+ 20	+ 21	+ 32	+ 30	+ 29	+ 23
12 (midi).	+ 7	+ 24	+ 20	+ 12	— 10	+ 11	+ 11	+ 15	+ 12	+ 20	— 14	+ 15	+ 14
13.....	— 9	+ 6	+ 5	+ 2	— 1	+ 4	+ 6	+ 9	+ 2	+ 4	— 5	— 2	+ 2
14.....	— 20	— 11	— 10	— 8	— 12	— 3	+ 1	— 1	— 7	— 10	— 19	— 16	— 10
15.....	— 21	— 19	— 20	— 17	— 21	— 10	— 4	— 6	— 16	— 20	— 25	— 19	— 17
16.....	— 17	— 21	— 24	— 23	— 28	— 17	— 9	— 12	— 23	— 25	— 24	— 15	— 20
17.....	— 11	— 17	— 23	— 23	— 31	— 22	— 13	— 15	— 22	— 22	— 20	— 10	— 19
18.....	— 4	— 6	— 13	— 17	— 28	— 20	— 12	— 15	— 16	— 12	— 11	— 4	— 13
19.....	+ 3	+ 4	— 1	— 5	— 18	— 13	— 6	— 8	— 4	— 2	— 2	+ 1	— 4
20.....	+ 9	+ 12	+ 9	+ 8	— 5	— 2	+ 5	+ 3	+ 10	+ 7	+ 5	+ 6	+ 6
21.....	+ 14	+ 17	+ 14	+ 18	+ 8	+ 10	+ 16	+ 13	+ 21	+ 13	+ 9	+ 10	+ 14
22.....	+ 17	+ 19	+ 16	+ 21	+ 17	+ 18	+ 24	+ 19	+ 25	+ 15	+ 9	+ 11	+ 18
23.....	+ 15	+ 16	+ 15	+ 21	+ 19	+ 21	+ 25	+ 20	+ 24	+ 13	— 6	+ 9	+ 17

54. AMSTERDAM.

Latitude, 52°23' N. — Longitude, 2°33' E. — Altitude (?), quelques mètres.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 18	+ 20	+ 29	+ 15	+ 8	+ 21	+ 14	+ 15	+ 14	+ 10	+ 19	+ 6	+ 16
1.....	+ 10	+ 12	+ 22	+ 7	— 3	+ 9	+ 1	+ 2	+ 2	— 3	+ 4	— 4	+ 5
2.....	+ 9	+ 2	+ 3	— 9	— 16	— 9	— 13	— 12	— 8	— 11	— 7	— 8	— 7
3.....	0	— 7	— 17	— 22	— 25	— 23	— 26	— 27	— 19	— 23	— 21	— 10	— 18
4.....	— 12	— 18	— 26	— 30	— 29	— 29	— 30	— 36	— 30	— 29	— 37	— 18	— 27
5.....	— 24	— 25	— 32	— 32	— 25	— 28	— 32	— 35	— 34	— 30	— 45	— 29	— 31
6.....	— 30	— 25	— 30	— 23	— 14	— 24	— 25	— 28	— 26	— 26	— 52	— 29	— 28
7.....	— 25	— 14	— 17	— 5	— 4	— 15	— 16	— 18	— 15	— 8	— 43	— 20	— 17
8.....	— 9	— 2	— 2	+ 9	+ 10	— 5	— 7	— 9	+ 1	+ 14	— 26	+ 3	— 2
9.....	+ 7	+ 10	+ 12	+ 18	+ 18	+ 4	0	+ 2	+ 10	+ 29	— 5	+ 18	+ 10
10.....	+ 21	+ 21	+ 21	+ 26	+ 20	+ 11	+ 6	+ 14	+ 15	+ 31	+ 8	+ 33	+ 19
11.....	+ 24	+ 23	+ 23	+ 27	+ 21	+ 15	+ 14	+ 17	+ 17	+ 24	+ 10	+ 33	+ 21
12 (midi).	+ 3	+ 16	+ 13	+ 21	+ 18	+ 15	+ 16	+ 16	+ 15	+ 11	+ 7	+ 20	+ 14
13.....	— 16	0	+ 1	+ 9	+ 17	+ 13	+ 15	+ 13	+ 11	— 2	0	0	+ 5
14.....	— 23	— 16	— 12	— 1	+ 10	+ 9	+ 10	+ 10	+ 2	— 11	— 9	— 9	— 3
15.....	— 22	— 25	— 23	— 10	— 2	+ 4	+ 6	+ 5	— 4	— 17	— 6	— 11	— 9
16.....	— 17	— 24	— 27	— 18	— 10	— 4	+ 1	+ 1	— 9	— 20	+ 1	— 11	— 11
17.....	— 10	— 16	— 23	— 21	— 21	— 12	— 1	— 4	— 11	— 15	+ 12	— 7	— 11
18.....	— 1	— 6	— 13	— 18	— 18	— 11	— 2	— 6	— 5	0	+ 22	— 3	— 5
19.....	+ 8	+ 3	+ 3	— 4	— 9	— 6	+ 1	0	+ 5	+ 8	+ 31	+ 4	+ 4
20.....	+ 17	+ 11	+ 15	+ 8	+ 2	+ 1	+ 4	+ 12	+ 14	+ 13	+ 34	+ 8	+ 12
21.....	+ 23	+ 17	+ 22	+ 18	+ 14	+ 16	+ 16	+ 22	+ 18	+ 17	+ 38	+ 11	+ 19
22.....	+ 24	+ 21	+ 28	+ 18	+ 20	+ 22	+ 24	+ 24	+ 19	+ 17	+ 37	+ 11	+ 22
23.....	+ 23	+ 22	+ 30	+ 18	+ 19	+ 26	+ 24	+ 22	+ 18	+ 15	+ 29	+ 12	+ 22

55. GRONINGUE.

Latitude, 53°13' N. — Longitude, 4°14' E. — Altitude, 15^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 12	+ 7	+ 14	+ 17	+ 18	+ 15	+ 11	+ 7	+ 7	+ 13	+ 4	+ 2	+ 11
1.....	+ 4	— 7	+ 2	+ 5	+ 10	— 1	0	— 6	— 3	+ 2	— 5	— 6	0
2.....	+ 3	— 18	— 11	— 7	— 3	— 17	— 12	— 18	— 14	— 10	— 10	— 7	— 10
3.....	— 2	— 27	— 24	— 15	— 15	— 29	— 23	— 29	— 24	— 23	— 19	— 10	— 20
4.....	— 15	— 33	— 32	— 20	— 22	— 31	— 29	— 36	— 33	— 32	— 26	— 17	— 27
5.....	— 27	— 33	— 35	— 22	— 15	— 26	— 29	— 36	— 34	— 32	— 27	— 24	— 28
6.....	— 32	— 29	— 27	— 15	— 3	— 17	— 20	— 27	— 25	— 26	— 22	— 24	— 22
7.....	— 21	— 19	— 16	— 6	+ 10	— 7	— 9	— 16	— 12	— 12	— 9	— 16	— 11
8.....	— 6	— 1	— 5	+ 2	+ 18	+ 2	0	— 3	+ 2	+ 2	+ 10	— 1	— 2
9.....	— 11	+ 16	— 4	+ 8	+ 21	— 8	+ 5	+ 7	+ 17	+ 14	+ 26	— 19	+ 13
10.....	— 25	+ 30	— 13	+ 13	+ 21	+ 10	+ 9	+ 13	+ 23	+ 24	+ 34	— 32	— 21
11.....	+ 27	— 31	+ 17	+ 13	— 18	+ 9	+ 10	+ 17	+ 23	+ 28	+ 32	— 31	— 21
12 (midi).	— 9	+ 20	+ 15	+ 7	— 12	+ 5	+ 9	— 18	+ 18	— 19	— 18	— 13	— 14
13.....	— 9	— 4	+ 2	— 3	+ 3	+ 1	+ 5	+ 16	+ 10	— 1	— 1	— 4	— 2
14.....	— 19	— 9	— 12	— 12	— 8	— 4	+ 1	+ 11	0	— 13	— 14	— 14	— 8
15.....	— 16	— 14	— 16	— 19	— 17	— 8	2	+ 6	— 8	— 18	— 20	— 14	— 12
16.....	— 10	— 13	— 17	— 24	— 24	— 11	— 5	+ 1	— 16	— 18	— 18	— 11	— 14
17.....	— 5	— 7	— 13	— 20	— 29	— 11	— 7	— 2	— 19	— 10	— 10	— 5	— 12
18.....	+ 1	— 4	— 3	— 11	— 27	— 8	— 6	— 2	— 6	— 4	— 2	— 1	— 4
19.....	+ 8	+ 15	+ 19	+ 2	— 16	+ 1	+ 3	+ 4	+ 8	— 13	+ 6	— 7	— 6
20.....	+ 13	+ 21	+ 31	+ 21	— 2	— 15	+ 14	+ 12	+ 20	+ 18	+ 12	— 12	— 16
21.....	+ 16	+ 23	+ 34	+ 29	+ 10	+ 32	+ 25	+ 20	+ 25	+ 20	+ 14	+ 14	— 22
22.....	+ 17	— 22	+ 31	+ 30	+ 19	+ 39	+ 28	+ 24	+ 24	+ 20	+ 14	— 12	+ 23
23.....	+ 16	— 17	+ 23	+ 27	+ 21	+ 33	+ 22	+ 19	+ 17	— 18	— 11	— 8	+ 19

56. BARNAOUL.

Latitude, 53°20' N. — Longitude, 81°27' E. — Altitude, 140^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	— 9	— 9	— 8	— 10	— 12	— 1	— 2	— 4	— 8	5	+ 3	— 11	— 6
1.....	— 11	— 12	— 10	— 15	— 13	— 1	— 4	— 9	11	— 9	— 1	13	— 9
2.....	— 12	14	— 14	— 17	— 16	— 4	— 8	— 13	— 15	— 14	— 6	13	— 12
3.....	— 13	— 18	— 14	— 17	— 15	— 2	— 9	— 14	— 12	— 17	11	12	— 13
4.....	— 17	— 14	— 11	— 15	— 8	+ 1	— 8	— 14	— 11	— 13	— 17	— 11	— 12
5.....	— 18	— 9	— 5	— 8	— 1	+ 6	— 1	— 7	— 3	— 9	— 17	— 8	— 7
6.....	— 17	— 3	0	+ 1	— 12	+ 12	+ 6	— 2	+ 6	— 3	— 16	— 3	— 1
7.....	— 13	+ 1	— 9	+ 7	+ 20	+ 16	— 11	+ 6	— 15	+ 1	— 12	— 2	— 5
8.....	— 5	+ 7	+ 17	+ 13	— 27	+ 20	+ 15	+ 14	— 23	+ 13	6	+ 7	— 12
9.....	+ 4	+ 17	— 23	+ 18	+ 32	+ 21	+ 18	+ 22	— 36	— 23	+ 2	+ 15	— 19
10.....	+ 12	+ 20	+ 25	— 24	+ 35	+ 24	— 20	+ 25	+ 41	— 31	+ 9	+ 24	— 24
11.....	+ 12	+ 15	+ 24	— 23	+ 32	+ 20	+ 20	+ 23	+ 36	— 29	+ 7	— 19	+ 22
12 (midi).	+ 5	+ 9	+ 16	+ 16	— 24	+ 11	+ 14	+ 14	+ 20	— 18	+ 1	10	+ 13
13.....	— 1	— 2	+ 4	+ 8	+ 15	0	+ 7	+ 6	+ 7	+ 5	— 9	+ 1	— 4
14.....	— 3	— 4	— 3	— 3	+ 4	— 9	— 2	— 4	— 6	— 8	— 11	— 3	— 4
15.....	+ 2	— 6	— 8	— 2	— 7	— 15	— 9	— 9	— 15	— 15	— 9	0	— 8
16.....	+ 9	— 3	— 10	— 4	— 16	— 21	— 12	— 10	— 19	— 15	— 3	— 1	— 9
17.....	+ 17	+ 1	— 9	— 4	— 20	— 22	— 15	— 9	— 20	— 13	+ 9	+ 5	— 7
18.....	— 19	+ 5	— 6	— 5	— 23	— 21	— 15	— 8	— 18	— 8	+ 17	— 5	— 5
19.....	+ 17	+ 6	— 4	— 5	— 20	— 20	— 11	— 7	— 13	— 1	+ 18	+ 5	— 3
20.....	+ 14	+ 5	— 3	— 2	— 16	— 14	— 7	3	— 8	— 3	+ 17	0	— 1
21.....	+ 9	+ 2	— 2	— 1	— 12	— 9	— 4	+ 1	— 5	+ 4	— 17	— 4	0
22.....	+ 4	0	— 4	— 4	— 10	— 4	— 2	+ 3	5	+ 4	+ 14	— 7	— 1
23.....	— 3	— 3	— 6	— 9	— 8	0	— 1	0	— 6	— 1	+ 10	— 9	— 3

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.277

57. BIDSTON (près Liverpool).

Latitude, 53°24' N. — Longitude, 5°25' W. — Altitude, 0^m.

Heures (1). h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 14	+ 14	+ 18	+ 23	+ 20	+ 15	+ 14	+ 18	+ 13	+ 12	+ 9	+ 9	+ 15
1.....	+ 4	+ 7	+ 14	+ 15	+ 13	+ 8	+ 6	+ 10	+ 5	+ 6	— 1	+ 1	+ 7
2.....	— 4	— 1	+ 3	+ 3	+ 5	— 1	— 5	+ 1	— 7	— 7	— 5	— 3	— 2
3.....	— 6	— 11	— 9	— 7	— 3	— 10	— 15	— 10	— 19	— 22	— 13	— 6	— 11
4.....	— 14	— 21	— 19	— 14	— 10	— 15	— 20	— 19	— 29	— 30	— 19	— 14	— 19
5.....	— 24	— 22	— 19	— 14	— 9	— 13	— 18	— 20	— 33	— 32	— 21	— 22	— 21
6.....	— 28	— 20	— 14	— 6	0	— 5	— 12	— 15	— 26	— 27	— 20	— 21	— 16
7.....	— 22	— 13	— 1	+ 6	+ 9	+ 6	— 2	— 4	— 11	— 13	— 11	— 13	— 6
8.....	— 5	+ 5	+ 13	+ 18	+ 18	+ 17	+ 9	+ 9	+ 6	+ 7	+ 9	+ 3	+ 9
9.....	+ 18	+ 18	+ 24	+ 26	+ 21	+ 21	+ 15	+ 18	+ 19	+ 20	+ 22	+ 22	+ 20
10.....	+ 25	+ 23	+ 23	+ 24	+ 17	+ 19	+ 14	+ 17	+ 22	+ 22	+ 27	+ 28	+ 22
11.....	+ 28	+ 25	+ 22	+ 18	+ 12	+ 15	+ 14	+ 14	+ 20	+ 20	+ 27	+ 28	— 20
12 (midi).	+ 11	+ 20	+ 16	+ 9	+ 5	+ 10	+ 13	+ 10	+ 16	+ 11	+ 12	+ 13	+ 12
13.....	— 8	+ 4	+ 2	— 2	— 3	+ 3	+ 9	+ 5	+ 8	— 1	— 4	— 5	+ 1
14.....	— 21	— 12	— 15	— 15	— 12	— 5	+ 4	— 2	— 2	— 12	— 15	— 18	— 10
15.....	— 23	— 24	— 31	— 31	— 23	— 14	— 3	— 12	— 12	— 20	— 21	— 22	— 20
16.....	— 17	— 24	— 37	— 37	— 29	— 20	— 10	— 19	— 19	— 19	— 19	— 15	— 22
17.....	— 8	— 17	— 34	— 36	— 31	— 24	— 17	— 22	— 17	— 10	— 10	— 8	— 19
18.....	+ 1	— 1	— 18	— 29	— 30	— 23	— 17	— 21	— 10	— 3	— 1	— 2	— 12
19.....	+ 9	+ 6	— 3	— 17	— 19	— 18	— 14	— 13	+ 2	+ 13	+ 6	+ 3	— 4
20.....	+ 16	+ 9	+ 9	+ 3	— 5	— 8	— 5	+ 1	+ 14	+ 19	+ 10	+ 7	+ 6
21.....	+ 20	+ 12	+ 16	+ 17	+ 12	+ 8	+ 8	+ 13	+ 20	+ 21	+ 13	+ 11	— 14
22.....	+ 18	+ 12	+ 20	+ 22	+ 20	+ 17	+ 16	+ 20	+ 21	+ 21	+ 13	+ 13	+ 18
23.....	+ 18	+ 12	+ 20	+ 25	+ 22	+ 18	+ 17	+ 21	+ 19	+ 18	+ 12	+ 12	— 18

58. HAMBOURG.

Latitude, 53°33' N. — Longitude, 7°38' E. — Altitude, 23^m (2).

Heures. h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 8	+ 12	+ 17	+ 20	+ 20	+ 15	+ 18	+ 14	+ 10	+ 6	+ 10	+ 10	+ 13
1.....	— 2	+ 9	+ 10	+ 10	+ 12	+ 9	+ 8	+ 5	+ 4	0	+ 1	+ 1	+ 6
2.....	— 7	+ 5	— 1	0	+ 4	— 1	— 2	— 5	— 4	— 10	3	0	— 2
3.....	— 13	— 7	— 15	— 10	— 5	— 9	— 12	— 14	— 13	— 20	13	— 3	— 11
4.....	— 24	— 16	— 26	— 18	— 10	— 9	— 14	— 19	— 19	24	— 20	— 13	— 18
5.....	— 32	— 21	— 29	— 17	— 5	— 3	— 12	— 18	— 18	— 26	23	— 21	— 19
6.....	— 33	— 20	— 23	— 7	+ 5	+ 4	— 5	— 10	— 7	— 23	— 22	— 23	— 14
7.....	— 27	— 12	— 11	+ 6	+ 15	+ 12	— 5	0	— 6	— 8	— 13	— 18	— 4
8.....	— 11	+ 2	+ 1	+ 17	+ 23	+ 20	+ 14	+ 10	+ 18	+ 9	+ 6	— 4	— 9
9.....	+ 10	+ 12	+ 13	+ 23	— 25	+ 22	+ 17	— 18	+ 28	+ 22	+ 20	+ 14	— 19
10.....	+ 23	+ 18	+ 21	+ 23	+ 21	+ 20	+ 16	+ 22	+ 31	+ 28	— 27	+ 25	+ 23
11.....	+ 26	+ 20	+ 21	+ 17	+ 13	+ 15	+ 13	+ 18	+ 24	+ 27	— 25	+ 20	+ 20
12 (midi).	+ 14	+ 12	+ 14	+ 7	+ 4	+ 9	+ 7	+ 10	+ 14	+ 14	+ 10	— 5	+ 10
13.....	— 1	— 5	+ 1	— 5	— 6	+ 1	— 1	+ 2	— 2	— 1	4	— 7	— 2
14.....	— 11	— 19	— 13	— 17	— 17	— 7	— 8	— 5	— 11	— 12	— 17	— 15	— 13
15.....	— 8	— 23	— 22	— 29	— 27	— 16	— 14	— 12	— 22	— 19	— 20	— 14	— 19
16.....	— 1	— 22	— 27	— 36	— 37	— 25	— 19	— 18	— 29	— 21	— 17	— 10	— 22
17.....	+ 4	— 14	— 22	— 35	— 40	— 31	— 23	— 23	— 29	— 15	— 10	— 6	— 20
18.....	+ 8	— 2	— 9	— 26	— 34	— 30	— 22	— 25	— 22	— 2	— 1	— 1	— 14
19.....	+ 12	+ 8	+ 9	— 9	— 21	— 25	— 15	— 13	— 7	— 9	— 7	— 4	— 3
20.....	+ 16	+ 13	+ 20	+ 12	— 1	— 12	— 3	+ 7	+ 6	+ 16	— 12	+ 10	— 8
21.....	+ 17	+ 17	+ 24	+ 23	+ 16	+ 7	+ 11	+ 17	+ 12	+ 20	+ 15	+ 14	+ 16
22.....	+ 17	+ 17	+ 25	+ 26	+ 22	+ 16	+ 19	+ 20	+ 13	+ 19	+ 16	+ 16	+ 19
23.....	+ 14	+ 16	+ 22	+ 25	+ 24	+ 18	+ 21	+ 19	+ 13	+ 11	+ 14	+ 15	— 18

(1) Les observations sont faites au temps moyen de Greenwich, qui avance de 12^m 17^s sur l'heure de Bidston.

(2) Altitude : 20^m jusqu'en juillet 1881; 26^m depuis cette époque.

59. STONYHURST.

Latitude, 53°51' N. — Longitude, 4°48' W. — Altitude, 110^m.

Heures (').	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 8	+ 14	+ 20	+ 23	+ 26	+ 18	+ 16	+ 22	+ 11	+ 17	+ 5	+ 4	+ 15
1.....	— 6	+ 5	+ 12	+ 15	+ 17	+ 8	+ 4	+ 10	— 1	+ 7	— 6	— 6	+ 5
2.....	— 5	— 4	+ 1	+ 4	+ 5	— 2	— 8	— 3	— 15	— 5	— 12	— 5	— 4
3.....	— 9	— 19	— 15	— 9	— 6	— 10	— 21	— 16	— 28	— 20	— 21	— 8	— 15
4.....	— 18	— 26	— 23	— 16	— 11	— 12	— 24	— 25	— 36	— 30	— 28	— 17	— 22
5.....	— 28	— 28	— 23	— 12	— 7	— 5	— 19	— 25	— 35	— 32	— 30	— 21	— 22
6.....	— 29	— 24	— 14	+ 1	+ 2	+ 2	— 10	— 18	— 21	— 26	— 25	— 19	— 15
7.....	— 19	— 14	— 3	+ 13	+ 11	+ 10	— 2	— 8	— 7	— 12	— 11	— 9	— 4
8.....	+ 1	0	+ 9	+ 21	+ 15	+ 16	+ 4	+ 1	+ 5	+ 4	+ 5	+ 5	+ 7
9.....	+ 20	+ 13	+ 18	+ 23	+ 15	+ 19	+ 8	+ 7	+ 14	+ 15	+ 19	+ 23	+ 16
10.....	+ 37	+ 24	+ 23	+ 21	+ 11	+ 18	+ 10	+ 10	+ 20	+ 19	+ 31	+ 38	+ 22
11.....	+ 39	+ 29	+ 24	+ 15	+ 5	+ 14	+ 10	+ 10	+ 20	+ 16	+ 28	+ 32	+ 20
12 (midi).	+ 18	+ 19	+ 17	+ 5	— 2	+ 7	+ 9	+ 8	+ 14	+ 5	+ 12	— 10	+ 10
13.....	— 8	— 3	+ 1	— 8	— 11	— 2	+ 6	+ 2	+ 5	— 9	— 4	— 9	— 3
14.....	— 20	— 18	— 16	— 21	— 20	— 12	0	— 5	— 5	— 19	— 15	— 20	— 14
15.....	— 23	— 25	— 30	— 34	— 28	— 21	— 7	— 12	— 15	— 24	— 17	— 21	— 21
16.....	— 17	— 23	— 36	— 43	— 34	— 29	— 14	— 19	— 21	— 23	— 11	— 16	— 24
17.....	— 9	— 12	— 31	— 43	— 37	— 33	— 19	— 24	— 18	— 12	— 2	— 9	— 21
18.....	0	+ 2	— 15	— 31	— 31	— 30	— 16	— 20	— 3	+ 5	+ 6	— 1	— 11
19.....	+ 8	+ 12	0	— 10	— 15	— 19	— 6	— 4	+ 13	+ 19	+ 12	— 5	+ 1
20.....	+ 14	+ 18	+ 13	+ 10	+ 6	— 2	+ 7	+ 17	+ 26	+ 25	+ 17	+ 10	+ 13
21.....	+ 16	+ 21	+ 21	+ 22	+ 25	+ 16	+ 21	+ 30	+ 30	+ 28	+ 18	+ 12	+ 22
22.....	+ 16	+ 21	+ 24	+ 27	+ 32	+ 25	+ 27	+ 33	+ 27	+ 28	+ 16	+ 12	+ 24
23.....	+ 14	+ 18	+ 23	+ 27	+ 31	+ 24	+ 24	+ 30	+ 20	+ 24	+ 12	+ 10	+ 21

60. SWINEMUNDE.

Latitude, 53°56' N. — Longitude, 11°57' E. — Altitude, 9^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 17	+ 19	+ 17	+ 16	+ 6	— 1	+ 4	+ 12	+ 4	+ 10	+ 5	+ 7	+ 10
1.....	+ 8	+ 17	+ 11	+ 6	— 2	— 6	— 4	+ 6	— 2	0	— 5	0	+ 2
2.....	+ 3	+ 13	— 2	— 7	— 10	— 15	— 13	— 2	— 10	— 11	— 10	+ 1	— 5
3.....	— 7	+ 1	— 21	— 17	— 16	— 22	— 21	— 10	— 17	— 21	— 20	— 2	— 14
4.....	— 16	— 9	— 31	— 25	— 20	— 22	— 22	— 17	— 23	— 30	— 28	— 12	— 21
5.....	— 26	— 15	— 33	— 27	— 14	— 14	— 17	— 18	— 22	— 36	— 32	— 19	— 23
6.....	— 33	— 16	— 31	— 17	— 4	— 5	— 9	— 13	— 13	— 35	— 31	— 22	— 19
7.....	— 30	— 12	— 22	— 3	+ 7	+ 6	+ 3	— 4	0	— 20	— 20	— 17	— 9
8.....	— 16	— 1	— 9	+ 8	+ 17	+ 16	+ 13	+ 7	+ 16	— 3	— 3	— 2	+ 4
9.....	— 3	+ 10	+ 3	+ 16	+ 22	+ 24	+ 21	+ 18	+ 28	+ 11	+ 14	+ 17	+ 15
10.....	+ 9	+ 18	+ 12	+ 20	+ 25	+ 31	+ 26	+ 23	+ 34	+ 20	+ 24	+ 30	+ 23
11.....	+ 17	+ 19	+ 18	+ 21	+ 25	+ 33	+ 29	+ 21	+ 32	+ 22	+ 25	+ 25	+ 24
12 (midi).	+ 4	+ 12	+ 18	+ 16	+ 19	+ 31	+ 26	+ 16	+ 24	+ 17	+ 14	+ 9	+ 17
13.....	— 10	— 4	— 8	+ 8	+ 12	+ 22	+ 18	+ 9	+ 12	+ 7	+ 3	— 6	+ 7
14.....	— 17	— 20	— 3	— 2	+ 4	+ 12	+ 9	0	— 3	— 4	— 5	— 16	— 4
15.....	— 13	— 28	— 10	— 15	— 5	+ 1	0	— 8	— 15	— 11	— 7	— 14	— 10
16.....	— 4	— 29	— 14	— 22	— 13	— 9	— 9	— 15	— 22	— 10	— 2	— 5	— 13
17.....	+ 3	— 23	— 13	— 23	— 21	— 18	— 16	— 20	— 25	— 3	+ 4	— 2	— 13
18.....	+ 10	— 10	— 2	— 19	— 23	— 22	— 20	— 23	— 20	+ 5	+ 10	— 1	— 10
19.....	+ 16	+ 1	+ 14	— 6	— 19	— 22	— 18	— 16	— 7	+ 12	+ 12	0	— 3
20.....	+ 20	+ 8	+ 21	+ 12	— 9	— 16	— 10	— 2	+ 4	+ 18	+ 13	+ 3	+ 5
21.....	+ 23	+ 13	+ 24	+ 19	+ 1	— 5	— 1	+ 9	+ 8	+ 22	+ 14	+ 7	+ 11
22.....	+ 24	+ 17	+ 24	+ 21	+ 8	0	+ 5	+ 13	+ 9	+ 22	+ 14	+ 9	+ 14
23.....	+ 21	+ 19	+ 21	+ 20	+ 10	+ 1	+ 6	+ 14	+ 8	+ 18	+ 11	+ 10	+ 13

(1) Les observations sont faites au temps moyen de Greenwich, qui avance de 9^m52^s sur l'heure de Stonyhurst.

61. ARMAGH.

Latitude, 54°21' N. — Longitude, 8°59' W. — Altitude, 63^m.

Heures (¹). h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 7	+ 13	+ 17	+ 22	+ 25	+ 24	+ 26	+ 20	+ 10	+ 11	+ 17	+ 13	+ 17
1.....	— 1	+ 4	+ 12	+ 15	+ 17	+ 15	+ 16	+ 6	0	0	+ 6	+ 3	+ 8
2.....	— 4	— 6	+ 3	+ 3	+ 5	+ 3	+ 1	— 9	— 12	— 16	— 1	— 2	— 3
3.....	— 4	— 21	— 13	— 9	— 5	— 9	— 15	— 21	— 27	— 32	— 9	— 2	— 14
4.....	— 11	— 30	— 25	— 19	— 14	— 14	— 22	— 31	— 36	— 39	— 18	— 11	— 23
5.....	— 18	— 31	— 25	— 19	— 11	— 13	— 21	— 32	— 35	— 38	— 20	— 19	— 24
6.....	— 20	— 29	— 17	— 7	— 1	— 5	— 13	— 22	— 23	— 32	— 19	— 19	— 17
7.....	— 11	— 23	— 7	+ 7	+ 8	+ 2	— 4	— 9	— 7	— 18	— 11	— 12	— 7
8.....	+ 4	— 6	+ 4	+ 18	+ 15	+ 9	+ 4	+ 1	+ 8	+ 2	+ 5	+ 2	+ 7
9.....	+ 20	+ 9	+ 15	+ 21	+ 16	+ 10	+ 8	+ 7	+ 18	+ 16	+ 19	+ 19	+ 15
10.....	+ 34	+ 23	+ 23	+ 21	+ 13	+ 9	+ 8	+ 10	+ 21	+ 24	+ 30	+ 32	+ 21
11.....	+ 40	+ 35	+ 25	+ 19	+ 8	+ 5	+ 6	+ 11	+ 20	+ 26	+ 34	+ 35	+ 22
12 (midi).	+ 21	+ 30	+ 18	+ 11	+ 2	0	+ 3	+ 9	+ 16	+ 18	+ 19	+ 12	+ 13
13.....	— 2	+ 11	+ 4	0	— 5	— 5	— 1	+ 5	+ 9	+ 4	— 4	— 10	+ 1
14.....	— 21	— 6	— 13	— 12	— 14	— 12	— 6	0	— 1	— 8	— 21	— 26	— 12
15.....	— 24	— 15	— 26	— 25	— 22	— 18	— 11	— 6	— 10	— 16	— 27	— 27	— 19
16.....	— 20	— 19	— 32	— 35	— 30	— 23	— 16	— 12	— 18	— 17	— 22	— 21	— 22
17.....	— 13	— 14	— 28	— 36	— 33	— 26	— 21	— 15	— 18	— 8	— 13	— 12	— 20
18.....	— 6	+ 1	— 13	— 29	— 30	— 22	— 19	— 13	— 8	+ 6	— 5	— 3	— 12
19.....	0	+ 10	+ 3	— 15	— 19	— 11	— 8	— 1	+ 6	+ 19	+ 1	+ 4	— 1
20.....	+ 4	+ 14	+ 14	+ 5	— 2	+ 3	+ 7	+ 15	+ 20	+ 27	+ 6	+ 8	+ 10
21.....	+ 7	+ 17	+ 19	+ 17	+ 20	+ 19	+ 20	+ 27	+ 25	+ 29	+ 9	+ 10	+ 18
22.....	+ 9	+ 17	+ 21	+ 23	+ 28	+ 29	+ 28	+ 31	+ 24	+ 25	+ 10	+ 11	+ 21
23.....	+ 9	+ 16	+ 21	+ 24	+ 29	+ 30	+ 30	+ 29	+ 18	+ 17	+ 14	+ 15	+ 21

62. KEITUM.

Latitude, 54°54' N. — Longitude, 6°2' E. — Altitude, 9^m.

Heures. h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 7	+ 17	+ 14	+ 22	+ 14	+ 15	+ 20	+ 16	+ 10	+ 10	+ 14	+ 10	+ 14
1.....	— 3	+ 12	+ 6	+ 12	+ 2	+ 4	+ 10	+ 4	+ 4	+ 2	+ 7	+ 3	+ 5
2.....	— 11	+ 7	— 5	— 2	— 12	— 10	— 4	— 10	— 7	— 8	+ 2	+ 1	— 5
3.....	— 16	— 3	— 18	— 14	— 26	— 23	— 20	— 24	— 19	— 22	— 6	— 1	— 16
4.....	— 24	— 15	— 29	— 24	— 37	— 31	— 31	— 34	— 29	— 32	— 14	— 9	— 26
5.....	— 32	— 22	— 34	— 29	— 38	— 33	— 37	— 40	— 33	— 35	— 19	— 17	— 31
6.....	— 36	— 26	— 32	— 25	— 32	— 30	— 36	— 38	— 30	— 31	— 19	— 20	— 30
7.....	— 30	— 25	— 22	— 16	— 23	— 24	— 30	— 30	— 19	— 22	— 13	— 16	— 23
8.....	— 14	— 14	— 11	— 5	— 13	— 17	— 21	— 21	— 6	— 8	0	— 7	— 11
9.....	+ 4	— 4	+ 1	+ 3	— 4	— 9	— 13	— 13	+ 5	+ 6	+ 12	+ 7	0
10.....	+ 19	+ 4	+ 11	+ 8	+ 3	— 2	— 6	— 5	+ 11	+ 14	+ 19	+ 18	+ 8
11.....	+ 28	+ 10	+ 18	+ 9	+ 9	+ 5	0	+ 2	+ 14	+ 17	+ 19	+ 20	+ 13
12 (midi).	+ 20	+ 10	+ 21	+ 8	+ 12	+ 11	+ 5	+ 9	+ 13	+ 15	+ 7	+ 9	+ 12
13.....	+ 5	+ 3	+ 16	+ 6	+ 14	+ 14	+ 10	+ 15	+ 10	+ 9	— 5	— 4	+ 8
14.....	— 6	— 9	+ 6	+ 2	+ 14	+ 15	+ 13	+ 18	+ 7	+ 4	— 15	— 14	+ 3
15.....	— 11	— 13	— 2	— 4	+ 13	+ 15	+ 15	+ 17	+ 3	— 2	— 20	— 15	0
16.....	— 5	— 12	— 12	— 10	+ 10	+ 12	+ 13	+ 14	— 1	— 6	— 19	— 11	— 2
17.....	+ 2	— 7	— 14	— 14	+ 3	+ 6	+ 10	+ 10	— 3	— 4	— 13	— 6	— 3
18.....	+ 9	+ 2	— 3	— 13	+ 1	+ 3	+ 6	+ 8	— 1	+ 4	— 4	— 1	+ 1
19.....	+ 16	+ 11	+ 11	— 2	+ 6	+ 3	+ 6	+ 10	+ 6	+ 13	+ 4	+ 4	+ 7
20.....	+ 21	+ 16	+ 18	+ 13	+ 14	+ 10	+ 12	+ 19	+ 14	+ 19	+ 11	+ 9	+ 15
21.....	+ 22	+ 19	+ 20	+ 23	+ 22	+ 19	+ 24	+ 25	+ 18	+ 21	+ 16	+ 13	+ 20
22.....	+ 20	+ 20	+ 21	+ 26	+ 25	+ 24	+ 28	+ 26	+ 18	+ 20	+ 19	+ 14	+ 22
23.....	+ 15	+ 19	+ 19	+ 26	+ 23	+ 23	+ 26	+ 23	+ 15	+ 16	+ 18	+ 13	+ 20

(¹) Les observations sont faites au temps moyen de Greenwich, qui avance de 26^m 36^s sur l'heure d'Armagh.

63. MOSCOU.

Latitude, 55°45' N. — Longitude, 35°14' E. — Altitude, 156^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	+ 12	— 4	+ 8	+ 3	— 14	+ 1	— 1	+ 7	+ 5	+ 12	+ 7	— 7	— 5
1.....	+ 8	+ 4	— 5	+ 4	+ 11	+ 3	— 1	+ 8	— 1	+ 9	+ 3	— 14	— 3
2.....	8	— 2	— 3	+ 5	+ 6	+ 4	— 1	+ 8	— 3	+ 7	— 1	— 11	— 2
3.....	— 5	1	— 5	+ 6	— 3	+ 4	— 1	+ 7	— 5	+ 3	— 2	— 9	0
4.....	— 3	— 4	— 13	+ 4	— 1	+ 5	+ 1	+ 5	— 6	— 2	— 8	— 8	— 2
5.....	— 8	— 7	— 21	+ 3	— 3	+ 6	+ 7	+ 1	— 9	— 1	— 10	— 3	— 1
6.....	— 12	— 13	— 24	+ 4	— 7	+ 5	+ 11	— 2	— 9	— 1	— 8	— 2	— 5
7.....	— 8	12	— 27	+ 3	— 4	+ 9	+ 16	+ 2	— 6	— 4	— 6	+ 3	— 3
8.....	— 2	— 9	— 22	+ 10	— 1	+ 15	+ 22	+ 7	— 2	— 2	0	+ 5	+ 2
9.....	— 1	— 2	— 8	+ 13	— 9	+ 20	+ 25	+ 12	+ 3	— 1	+ 3	— 8	+ 7
10.....	+ 4	— 4	0	+ 17	— 9	+ 18	+ 24	+ 10	+ 8	+ 3	+ 6	+ 21	— 10
11.....	— 6	+ 6	— 5	+ 17	+ 10	+ 17	+ 19	+ 9	+ 10	— 3	+ 6	+ 17	— 10
12 (midi).	— 1	+ 7	+ 5	+ 13	— 9	+ 15	+ 14	+ 8	+ 11	— 3	— 2	+ 7	— 7
13.....	— 7	+ 3	2	+ 8	— 8	+ 10	+ 10	+ 3	+ 12	— 3	— 13	+ 5	+ 3
14.....	— 16	— 1	0	+ 1	+ 3	+ 1	+ 3	— 5	+ 8	— 9	— 15	— 5	— 3
15.....	— 15	— 9	0	— 8	— 6	— 6	— 1	— 8	+ 3	— 12	— 13	— 8	— 7
16.....	— 12	— 7	— 1	— 17	— 14	— 18	— 12	— 11	— 7	— 16	— 11	— 1	— 11
17.....	— 4	— 1	— 1	— 27	— 18	— 25	— 24	— 17	— 11	— 17	+ 3	+ 9	— 11
18.....	0	+ 3	+ 1	— 30	— 26	— 27	— 27	— 21	— 13	— 8	+ 11	+ 5	— 11
19.....	+ 2	+ 5	— 12	— 23	— 27	— 26	— 26	— 18	— 4	+ 1	+ 12	+ 3	— 7
20.....	+ 1	+ 8	+ 24	— 11	— 5	— 20	— 24	— 8	+ 6	+ 6	+ 9	— 3	— 1
21.....	+ 10	+ 9	+ 26	— 2	+ 4	— 11	— 17	+ 1	+ 4	+ 8	+ 11	— 5	— 3
22.....	+ 13	+ 6	+ 23	0	+ 10	— 4	— 9	+ 6	+ 2	+ 12	+ 8	— 6	+ 5
23.....	+ 14	+ 6	+ 18	— 2	+ 14	— 1	— 5	+ 4	+ 2	+ 12	+ 8	— 3	— 6

64. GLASGOW.

Latitude, 55°53' N. — Longitude, 6°38' W. — Altitude, 56^m.

Heures (1).	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
^h 0 (min.).	0	+ 16	+ 28	+ 21	+ 25	+ 24	+ 22	+ 22	+ 14	+ 12	+ 5	+ 11	— 17
1.....	— 6	+ 9	+ 20	+ 12	+ 18	+ 16	+ 13	+ 11	+ 3	+ 2	— 3	+ 4	+ 8
2.....	— 9	0	+ 6	+ 3	+ 9	+ 8	+ 2	— 1	— 8	— 11	— 8	+ 7	0
3.....	— 10	— 14	— 13	— 7	— 1	— 2	— 10	— 13	— 20	— 25	— 16	+ 3	— 11
4.....	— 19	— 23	— 24	— 14	— 6	— 4	— 16	— 25	— 30	— 34	— 22	— 7	— 19
5.....	— 25	— 26	— 28	— 12	— 1	0	— 13	— 24	— 33	— 38	— 24	— 17	— 20
6.....	— 26	26	— 25	+ 2	+ 9	+ 8	— 5	— 15	— 21	— 33	— 20	— 21	— 14
7.....	— 18	— 20	14	+ 14	+ 17	+ 15	+ 2	6	— 7	— 19	— 11	— 18	— 5
8.....	0	— 7	— 3	+ 22	+ 21	+ 20	+ 8	+ 3	+ 6	— 2	+ 3	— 6	— 5
9.....	+ 19	— 5	+ 5	+ 24	+ 20	+ 16	+ 8	+ 7	+ 14	+ 11	+ 17	+ 11	+ 13
10.....	+ 36	+ 17	+ 9	+ 22	+ 15	+ 10	+ 7	+ 7	+ 17	+ 21	+ 30	+ 27	+ 18
11.....	+ 42	+ 25	+ 10	+ 17	+ 8	+ 4	+ 5	+ 6	+ 15	+ 24	+ 35	+ 27	+ 18
12 (midi).	— 28	— 18	+ 5	+ 6	0	— 2	+ 2	+ 2	+ 10	+ 17	+ 24	— 9	+ 10
13.....	— 5	+ 2	— 6	— 6	— 10	— 10	— 3	— 3	+ 2	+ 5	+ 6	— 9	— 2
14.....	— 11	— 12	— 19	— 18	— 20	— 17	— 8	— 8	— 7	— 6	— 8	— 21	— 13
15.....	— 16	— 23	— 27	— 30	— 30	— 25	— 14	— 13	— 17	— 15	— 16	— 26	— 21
16.....	— 13	— 22	— 28	— 39	— 38	— 33	— 20	— 18	— 23	— 16	— 16	— 21	— 24
17.....	— 9	— 12	— 21	— 38	— 41	— 37	— 23	— 21	— 20	— 8	— 10	— 12	— 21
18.....	3	0	— 3	— 29	— 36	— 33	— 19	— 16	— 7	+ 8	— 3	— 3	— 12
19.....	+ 2	+ 11	+ 12	— 14	— 23	— 21	— 9	— 2	+ 8	+ 18	+ 3	+ 5	— 1
20.....	+ 7	+ 18	+ 23	+ 5	— 2	— 4	+ 4	+ 17	+ 24	+ 23	+ 7	+ 11	— 11
21.....	+ 10	+ 21	+ 30	+ 16	+ 15	+ 13	+ 16	+ 29	+ 29	+ 24	+ 9	+ 15	+ 19
22.....	+ 10	+ 22	+ 32	+ 21	+ 25	+ 26	+ 25	+ 32	+ 28	+ 23	+ 9	+ 16	+ 22
23.....	+ 6	+ 21	+ 31	+ 22	+ 26	+ 28	+ 26	+ 29	+ 23	+ 19	+ 8	+ 15	+ 21

(1) Les observations sont faites au temps moyen de Greenwich, qui avance de 17^m 12^s sur l'heure de Glasgow.

ÉTUDE SUR LA MARCHE DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.281

65. CATHERINBOURG.

Latitude, 56°49' N. — Longitude, 58°15' E. — Altitude, 272^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 2	+ 8	+ 13	+ 15	+ 11	+ 18	+ 9	+ 13	+ 9	+ 8	+ 10	+ 4	+ 10
1.....	+ 1	+ 4	+ 9	+ 13	+ 9	+ 18	+ 8	+ 8	+ 5	+ 4	+ 6	+ 1	+ 7
2.....	+ 1	+ 2	+ 6	+ 11	+ 8	+ 16	+ 6	+ 4	+ 3	— 1	+ 1	+ 1	+ 5
3.....	+ 1	— 1	+ 3	+ 10	+ 8	+ 13	+ 6	+ 1	+ 1	— 6	— 3	+ 1	+ 3
4.....	— 3	— 2	+ 1	+ 9	+ 10	+ 12	+ 7	+ 1	— 1	— 9	— 7	— 2	+ 2
5.....	— 8	— 4	— 1	+ 9	+ 11	+ 12	+ 9	0	— 3	— 11	— 10	— 7	0
6.....	— 11	— 5	— 1	+ 9	+ 16	+ 15	+ 12	+ 2	— 2	— 13	— 13	— 9	0
7.....	— 10	— 4	+ 1	+ 11	+ 20	+ 17	+ 17	+ 4	+ 2	— 11	— 12	— 9	+ 2
8.....	— 7	— 1	+ 3	+ 12	+ 23	+ 17	+ 18	+ 8	+ 6	— 5	— 8	— 6	+ 5
9.....	— 2	+ 1	+ 7	+ 12	+ 23	+ 13	+ 16	+ 9	+ 9	0	— 7	— 3	+ 7
10.....	+ 1	+ 1	+ 7	+ 10	+ 19	+ 8	+ 12	+ 6	+ 7	+ 1	— 6	0	+ 6
11.....	+ 1	+ 1	+ 4	+ 5	+ 8	+ 1	+ 8	+ 1	+ 2	0	— 6	— 2	+ 2
12 (midi).	— 3	— 3	— 3	— 4	+ 2	— 4	+ 3	— 4	— 4	— 4	— 9	— 7	— 3
13.....	— 11	— 12	— 12	— 11	— 8	— 10	— 3	— 8	— 7	— 8	— 12	— 13	— 10
14.....	— 12	— 18	— 17	— 18	— 15	— 15	— 9	— 12	— 11	— 11	— 13	— 16	— 14
15.....	— 9	— 20	— 21	— 24	— 23	— 24	— 16	— 16	— 15	— 14	— 9	— 10	— 17
16.....	— 1	— 16	— 24	— 29	— 31	— 29	— 24	— 19	— 20	— 12	+ 1	0	— 17
17.....	+ 9	— 7	— 22	— 32	— 36	— 33	— 29	— 22	— 18	— 3	+ 9	+ 9	— 15
18.....	+ 13	+ 7	— 14	— 30	— 36	— 33	— 29	— 19	— 13	+ 9	+ 15	+ 14	— 10
19.....	+ 13	+ 12	+ 1	— 19	— 31	— 27	— 24	— 10	— 2	+ 16	+ 17	+ 13	— 3
20.....	+ 12	+ 14	+ 10	— 2	— 15	— 16	— 15	+ 2	+ 9	+ 19	+ 16	+ 12	+ 4
21.....	+ 11	+ 15	+ 15	+ 9	+ 1	— 1	— 1	+ 15	+ 15	+ 20	+ 14	+ 9	+ 10
22.....	+ 8	+ 15	+ 18	+ 15	+ 10	+ 13	+ 8	+ 19	+ 16	+ 18	+ 13	+ 10	+ 14
23.....	+ 5	+ 13	+ 16	+ 16	+ 13	+ 18	+ 11	+ 17	+ 13	+ 13	+ 12	+ 8	+ 13

66. NOUVELLE-ARKHANGELSK.

Latitude, 57°3' N. — Longitude, 137°38' W. — Altitude, 9^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 5	+ 1	+ 16	+ 12	+ 10	+ 6	+ 5	— 1	+ 1	+ 4	+ 12	+ 6	+ 6
1.....	+ 8	+ 5	+ 12	+ 4	+ 8	+ 2	2	— 1	— 2	+ 4	+ 10	+ 6	+ 5
2.....	+ 10	+ 7	+ 9	— 7	+ 2	— 2	— 6	— 4	— 3	— 3	+ 2	+ 4	+ 1
3.....	+ 8	+ 1	+ 3	— 15	— 5	— 5	— 10	— 8	— 8	— 7	— 5	— 3	— 5
4.....	+ 1	— 3	— 5	— 21	— 11	— 13	— 11	— 16	— 13	— 9	— 8	— 13	— 10
5.....	— 2	— 5	— 10	— 22	— 14	— 16	— 12	— 17	— 15	— 11	— 9	— 16	— 12
6.....	— 6	— 8	— 16	— 18	— 14	— 16	— 12	— 15	— 15	— 12	— 10	— 18	— 13
7.....	— 7	— 9	— 20	— 15	— 13	— 17	— 12	— 14	— 12	— 9	— 9	— 19	— 13
8.....	— 6	— 8	— 20	— 13	— 11	— 16	— 10	— 11	— 7	— 4	— 3	— 14	— 10
9.....	+ 1	+ 1	— 14	— 7	— 8	— 14	— 8	— 6	— 2	+ 2	+ 3	+ 1	— 4
10.....	+ 14	+ 12	— 3	+ 1	— 4	— 9	— 6	— 2	+ 5	+ 8	+ 10	+ 14	+ 3
11.....	+ 18	+ 20	+ 4	+ 9	+ 2	— 3	+ 1	+ 5	+ 11	+ 14	+ 13	+ 20	+ 10
12 (midi).	+ 17	+ 22	+ 8	+ 14	+ 9	+ 7	+ 6	+ 10	+ 17	+ 17	+ 10	+ 12	+ 13
13.....	+ 9	+ 15	+ 7	+ 19	+ 11	+ 12	+ 10	+ 16	+ 21	+ 14	+ 4	+ 12	+ 13
14.....	0	+ 8	+ 4	+ 20	+ 13	+ 15	+ 14	+ 18	+ 18	+ 11	— 3	+ 4	+ 10
15.....	— 6	0	0	+ 15	+ 11	+ 16	+ 15	+ 17	+ 13	+ 5	— 9	+ 2	+ 7
16.....	— 8	— 5	— 5	+ 7	+ 8	+ 15	+ 13	+ 10	+ 6	— 3	— 12	— 1	+ 2
17.....	— 11	— 11	— 8	+ 2	+ 4	+ 11	+ 8	+ 5	— 2	— 11	— 13	— 1	— 2
18.....	— 15	— 12	— 9	— 3	— 2	+ 7	+ 3	— 1	— 7	— 9	— 10	— 3	— 5
19.....	— 15	— 13	— 3	— 2	— 6	+ 3	0	— 3	— 5	— 7	— 5	— 3	— 5
20.....	— 12	— 9	+ 3	+ 2	— 4	+ 3	0	— 1	— 2	— 4	0	— 3	— 2
21.....	— 6	— 4	+ 8	+ 8	+ 3	+ 7	+ 3	+ 3	+ 1	0	+ 5	— 2	+ 2
22.....	— 2	— 1	+ 13	+ 10	+ 6	+ 8	+ 6	+ 3	+ 3	+ 5	+ 10	+ 1	+ 5
23.....	+ 3	— 1	+ 16	+ 10	+ 6	+ 9	+ 5	+ 1	+ 3	+ 6	+ 12	+ 3	+ 6

67. ABERDEEN.

Latitude, 57° 10' N. — Longitude, 4° 26' W. — Altitude, 27^m.

Heures (1).	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 6	+ 20	+ 24	+ 11	+ 13	+ 17	+ 20	+ 18	+ 15	+ 8	+ 3	+ 11	+ 14
1.....	+ 1	+ 14	+ 17	0	+ 3	+ 7	+ 9	+ 6	+ 6	— 1	— 4	+ 4	+ 5
2.....	— 3	+ 8	+ 6	— 11	— 8	— 5	— 4	— 6	— 5	— 12	— 11	+ 4	— 4
3.....	— 9	— 7	— 11	— 22	— 17	— 15	— 17	— 17	— 18	— 25	— 19	— 1	— 15
4.....	— 16	— 18	— 22	— 30	— 21	— 18	— 19	— 23	— 30	— 35	— 25	— 10	— 22
5.....	— 23	— 26	— 25	— 28	— 17	— 15	— 16	— 24	— 33	— 37	— 27	— 19	— 24
6.....	— 24	— 29	— 23	— 15	— 8	— 8	— 10	— 18	— 23	— 33	— 23	— 23	— 20
7.....	— 18	— 20	— 17	— 4	0	— 1	— 3	— 10	— 12	— 21	— 12	— 19	— 11
8.....	— 3	— 8	— 9	+ 6	+ 6	+ 5	+ 2	— 1	— 3	— 7	0	— 8	— 2
9.....	+ 17	+ 2	— 2	+ 12	+ 10	+ 7	+ 4	+ 5	+ 4	+ 4	+ 12	+ 5	+ 7
10.....	+ 30	+ 11	+ 4	+ 15	+ 12	+ 7	+ 4	+ 7	+ 7	+ 13	+ 22	+ 19	+ 13
11.....	+ 33	+ 17	+ 7	+ 15	+ 12	+ 5	+ 3	+ 6	+ 7	+ 19	+ 26	+ 17	+ 14
12 (midi).	+ 17	+ 12	+ 4	+ 13	+ 10	+ 3	+ 2	+ 4	+ 5	+ 16	+ 17	+ 1	+ 9
13.....	— 2	— 4	— 7	+ 7	+ 5	0	— 1	0	— 1	+ 7	+ 3	— 13	0
14.....	— 12	— 16	— 16	— 3	— 1	— 4	— 5	— 4	— 8	— 2	— 8	— 16	— 8
15.....	— 16	— 23	— 23	— 12	— 9	— 9	— 9	— 9	— 14	— 7	— 11	— 13	— 13
16.....	— 13	— 21	— 23	— 18	— 16	— 14	— 15	— 13	— 16	— 6	— 5	— 8	— 14
17.....	— 8	— 11	— 15	— 17	— 19	— 17	— 18	— 15	— 10	+ 3	+ 1	— 2	— 11
18.....	— 2	+ 3	+ 2	— 9	— 17	— 14	— 13	— 10	+ 3	+ 14	+ 7	+ 3	— 3
19.....	+ 4	+ 13	+ 17	+ 5	— 6	— 6	— 3	+ 3	+ 18	+ 21	+ 11	+ 8	+ 7
20.....	+ 10	+ 18	+ 26	+ 20	+ 8	+ 7	+ 11	+ 19	+ 29	+ 23	+ 12	+ 13	+ 16
21.....	+ 11	+ 21	+ 29	+ 24	+ 18	+ 20	+ 23	+ 27	+ 30	+ 23	+ 12	+ 16	+ 21
22.....	+ 11	+ 22	+ 29	+ 23	+ 22	+ 25	+ 28	+ 29	+ 27	+ 20	+ 11	+ 16	+ 22
23.....	+ 9	+ 22	+ 28	+ 18	+ 20	+ 23	+ 27	+ 26	+ 22	+ 15	+ 8	+ 15	+ 19

68. UPSAL.

Latitude, 59° 52' N. — Longitude, 15° 18' E. — Altitude, 24^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 11	+ 13	+ 12	+ 9	+ 11	+ 7	+ 14	+ 14	+ 10	+ 8	+ 7	+ 13	+ 11
1.....	+ 7	+ 12	+ 11	+ 6	+ 7	+ 4	+ 11	+ 9	+ 5	+ 3	+ 2	+ 10	+ 7
2.....	+ 6	+ 8	+ 7	+ 3	+ 3	0	+ 7	+ 4	— 1	— 3	— 3	+ 7	+ 3
3.....	+ 3	+ 1	0	0	0	— 3	+ 3	— 1	— 8	— 9	— 10	+ 3	— 2
4.....	— 4	— 6	— 5	— 3	— 1	0	+ 4	— 4	— 14	— 15	— 17	— 5	— 6
5.....	— 12	— 12	— 7	— 1	+ 2	+ 5	+ 6	— 3	— 15	— 18	— 22	— 15	— 8
6.....	— 19	— 15	— 6	+ 4	+ 7	+ 10	+ 9	+ 1	— 10	— 18	— 25	— 21	— 7
7.....	— 22	— 14	— 2	+ 11	+ 12	+ 15	+ 12	+ 5	— 2	— 10	— 21	— 22	— 3
8.....	— 13	— 7	+ 7	+ 17	+ 16	+ 20	+ 15	+ 9	+ 7	+ 2	— 7	— 13	+ 4
9.....	+ 1	+ 3	+ 13	+ 20	+ 18	+ 23	+ 16	+ 13	+ 15	+ 12	+ 4	+ 2	+ 12
10.....	+ 13	+ 10	+ 16	+ 21	+ 17	+ 23	+ 15	+ 17	+ 19	+ 18	+ 15	+ 12	+ 16
11.....	+ 13	+ 12	+ 15	+ 17	+ 13	+ 20	+ 12	+ 14	+ 16	+ 18	+ 15	+ 11	+ 15
12 (midi).	+ 2	+ 9	+ 8	+ 10	+ 5	+ 12	+ 4	+ 6	+ 9	+ 11	+ 7	+ 3	+ 7
13.....	— 6	0	— 2	+ 1	— 3	+ 3	— 4	— 2	+ 2	+ 2	0	— 6	— 1
14.....	— 8	— 11	— 12	— 10	— 10	— 6	— 11	— 10	— 7	— 7	— 3	— 10	— 9
15.....	— 7	— 15	— 22	— 21	— 17	— 14	— 18	— 18	— 16	— 12	— 4	— 9	— 14
16.....	— 2	— 13	— 26	— 29	— 24	— 22	— 25	— 24	— 20	— 13	0	— 3	— 17
17.....	+ 1	— 7	— 24	— 32	— 29	— 30	— 31	— 26	— 20	— 9	+ 4	0	— 17
18.....	+ 2	0	— 13	— 28	— 28	— 32	— 31	— 24	— 14	— 1	+ 7	+ 1	— 13
19.....	+ 2	+ 3	— 2	— 15	— 21	— 27	— 25	— 15	— 2	+ 2	+ 9	+ 2	— 7
20.....	+ 3	+ 4	+ 5	+ 1	— 6	— 16	— 12	— 1	+ 9	+ 7	+ 10	+ 4	+ 1
21.....	+ 6	+ 5	+ 7	+ 5	— 5	— 2	+ 4	+ 8	+ 12	+ 10	+ 11	+ 9	+ 7
22.....	+ 10	+ 9	+ 9	+ 6	+ 10	+ 4	+ 11	+ 13	+ 12	+ 11	+ 11	+ 13	+ 10
23.....	+ 12	+ 12	+ 14	+ 8	+ 12	+ 7	+ 14	+ 15	+ 13	+ 11	+ 10	+ 14	+ 12

(1) Les observations sont faites au temps moyen de Greenwich, qui avance de 8^h 24^s sur l'heure d'Aberdeen.

69. SAINT-PÉTERSBOURG.

Latitude, 59°56' N. — Longitude, 27°56' E. — Altitude, 5^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 5	+ 6	+ 4	+ 2	+ 2	0	+ 3	+ 3	+ 4	+ 3	+ 10	+ 7	+ 4
1.....	+ 4	+ 6	+ 2	0	- 1	0	+ 2	+ 3	+ 2	- 1	+ 7	+ 5	+ 2
2.....	+ 3	+ 3	- 1	- 3	- 4	- 1	0	+ 2	- 2	- 6	+ 3	+ 4	0
3.....	0	- 3	- 6	- 7	- 6	- 2	- 2	- 1	- 7	- 11	- 2*	+ 1	- 4
4.....	- 5	- 8	- 11	- 10	- 7	- 1	- 3	- 3	- 10	- 16	- 7	- 5	- 7
5.....	- 9	- 11	- 12	- 11	- 6	+ 1	- 2	- 2	- 11	- 19	- 12	- 10	- 9
6.....	- 12	- 14	- 12	- 8	- 3	+ 4	0	0	- 9	- 21	- 15	- 14	- 9
7.....	- 14	- 14	- 9	- 4	+ 2	+ 7	+ 2	+ 2	- 6	- 17	- 15	- 17	- 7
8.....	- 12	- 11	- 3	0	+ 6	+ 10	+ 4	+ 5	- 1	- 9	- 11	- 17	- 3
9.....	- 5	- 5	+ 2	+ 5	+ 10	+ 12	+ 7	+ 7	+ 5	0	- 4	- 6	+ 2
10.....	+ 8	+ 4	+ 8	+ 10	+ 12	+ 15	+ 10	+ 10	+ 10	+ 9	+ 4	+ 5	+ 9
11.....	+ 12	+ 11	+ 12	+ 11	+ 13	+ 16	+ 11	+ 11	+ 12	+ 15	+ 9	+ 9	+ 12
12 (midi).	+ 8	+ 11	+ 12	+ 11	+ 12	+ 14	+ 10	+ 11	+ 12	+ 15	+ 6	+ 6	+ 11
13.....	+ 1	+ 7	+ 10	+ 9	+ 9	+ 8	+ 6	+ 7	+ 9	+ 12	+ 2	+ 1	+ 7
14.....	- 1	+ 2	+ 6	+ 5	+ 4	+ 3	+ 1	+ 2	+ 5	+ 8	- 1	- 1	+ 3
15.....	0	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 4	- 4	- 1	+ 4	- 2	+ 2	- 1
16.....	+ 2	- 1	- 5	- 5	- 6	- 7	- 8	- 9	- 6	+ 1	- 1	+ 5	- 3
17.....	+ 4	0	- 6	- 8	- 10	- 13	- 10	- 13	- 9	+ 2	0	+ 4	- 5
18.....	+ 3	+ 3	- 4	- 9	- 13	- 17	- 11	- 14	- 7	+ 5	+ 1	+ 2	- 5
19.....	- 1	+ 2	- 1	- 5	- 11	- 18	- 10	- 11	- 2	+ 4	+ 2	+ 1	- 4
20.....	- 1	+ 1	+ 2	+ 2	- 6	- 15	- 7	- 6	+ 2	+ 5	+ 3	+ 1	- 2
21.....	+ 1	+ 2	+ 5	+ 6	- 1	- 9	- 3	- 2	+ 3	+ 6	+ 5	+ 3	+ 1
22.....	+ 3	+ 4	+ 4	+ 6	+ 2	- 4	+ 1	0	+ 3	+ 6	+ 8	+ 6	+ 3
23.....	+ 6	+ 6	+ 4	+ 4	+ 3	- 1	+ 3	+ 2	+ 4	+ 5	+ 10	+ 8	+ 5

70. HELSINGFORS.

Latitude, 60°10' N. — Longitude, 22°37' E. — Altitude, 12^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 5	+ 9	+ 19	+ 8	+ 2	+ 3	+ 7	+ 4	+ 8	+ 3	+ 6	+ 6	+ 7
1.....	+ 6	+ 7	+ 17	+ 1	+ 1	+ 3	+ 7	+ 1	+ 6	+ 3	+ 3	+ 3	+ 5
2.....	- 1	0	+ 9	- 4	- 7	- 2	+ 2	- 2	- 1	- 6	- 1	+ 1	- 1
3.....	- 1	- 10	- 3	- 12	- 9	- 6	- 5	- 7	- 10	- 12	- 8	- 8	- 8
4.....	- 4	- 16	- 16	- 14	- 13	- 7	- 8	- 10	- 14	- 18	- 14	- 15	- 13
5.....	- 13	- 20	- 24	- 15	- 8	- 3	- 13	- 10	- 20	- 22	- 18	- 24	- 16
6.....	- 16	- 28	- 23	- 12	- 4	+ 1	- 15	- 5	- 19	- 25	- 18	- 29	- 16
7.....	- 22	- 26	- 26	- 11	0	+ 1	- 9	- 4	- 11	- 24	- 23	- 31	- 16
8.....	- 7	- 11	- 19	- 2	+ 6	+ 8	- 5	0	- 1	- 13	- 11	- 16	- 6
9.....	+ 5	- 2	- 9	+ 6	+ 13	+ 11	+ 1	+ 5	+ 4	- 3	0	+ 1	+ 3
10.....	+ 14	+ 8	- 3	+ 12	+ 18	+ 17	+ 7	+ 11	+ 11	+ 6	+ 9	+ 12	+ 10
11.....	+ 16	+ 14	+ 3	+ 19	+ 22	+ 17	+ 9	+ 16	+ 15	+ 12	+ 14	+ 14	+ 14
12 (midi).	+ 7	+ 13	+ 4	+ 19	+ 20	+ 16	+ 11	+ 15	+ 12	+ 12	+ 12	+ 9	+ 12
13.....	0	+ 7	+ 2	+ 16	+ 14	+ 12	+ 10	+ 11	+ 10	+ 9	+ 7	+ 3	+ 8
14.....	- 3	+ 3	- 1	+ 11	+ 9	+ 5	+ 7	+ 6	+ 5	+ 5	+ 2	+ 4	+ 4
15.....	- 3	+ 1	- 7	- 4	+ 2	- 3	+ 4	0	- 2	+ 1	+ 1	+ 3	- 1
16.....	- 1	+ 2	- 8	- 8	- 6	- 9	0	- 8	- 7	- 1	+ 1	+ 6	- 3
17.....	0	+ 3	- 6	- 14	- 12	- 15	- 5	- 10	- 9	+ 4	+ 3	+ 9	- 4
18.....	- 2	+ 7	- 2	- 11	- 16	- 16	- 8	- 13	- 8	+ 8	+ 5	+ 8	- 4
19.....	- 3	+ 9	+ 9	- 5	- 15	- 14	- 6	- 9	- 2	+ 10	+ 5	+ 8	- 1
20.....	+ 1	+ 8	+ 15	+ 2	- 10	- 11	- 2	0	+ 5	+ 13	+ 6	+ 8	+ 3
21.....	+ 3	+ 9	+ 19	+ 6	- 5	- 6	+ 2	+ 3	+ 9	+ 15	+ 9	+ 9	+ 6
22.....	+ 5	+ 9	+ 22	+ 6	- 2	0	+ 6	+ 7	+ 11	+ 13	+ 10	+ 11	+ 8
23.....	+ 6	+ 12	+ 20	+ 5	- 1	+ 2	+ 6	+ 7	+ 11	+ 10	+ 9	+ 13	+ 8

Pendant que les Tableaux qui précèdent étaient en cours d'impression, j'ai pu me procurer les observations détaillées de deux nouvelles stations, *Le Cap de Bonne-Espérance* et *Tokio*; de plus, M. Hann a bien voulu m'adresser un travail très important qu'il vient de publier sur la variation diurne du baromètre (*Untersuchungen über die tägliche Oscillation des Barometers*, von J. Hann; Vienne, 1889). Dans ce Mémoire capital, sur lequel nous reviendrons par la suite, l'auteur donne les Tableaux de la variation diurne pour 26 stations, qui sont le plus souvent comprises dans celles que j'ai étudiées précédemment; toutefois, les périodes d'observation qui ont servi à M. Hann sont généralement plus courtes que les miennes. Pour compléter mon travail, j'ai emprunté à celui de M. Hann les Tableaux relatifs à *Mexico*, *Lesina* et *Pola*; enfin, M. Hann a bien voulu me communiquer en manuscrit les moyennes horaires de *Trieste*; j'ajouterai donc aux 70 stations dont les observations sont résumées précédemment les 6 suivantes :

71. MEXICO. — D'après le Tableau publié par M. Hann (*Untersuchungen über die tägliche Oscillation des Barometers*); trois ans d'observations (1881, 1882 et 1884), faites toutes les heures; malgré la courte durée de la série, nous donnons cette station à cause de son altitude, qui la rend particulièrement intéressante.

72. LE CAP DE BONNE-ESPÉRANCE. — Sabine, *Observations made at the magnetical and meteorological observatory at the Cape of Good Hope*, vol. II; cinq ans d'observations (1841-1846), faites toutes les heures. Ces observations présentent les irrégularités que nous avons signalées précédemment pour Toronto (voir p. B.244), mais à un moindre degré; on a interpolé quelques lacunes et calculé à nouveau les moyennes qui semblaient douteuses.

73. TOKIO. — *Report of the meteorological observations for the ten years 1876-1885; Annual meteorological Report for the year 1886*; neuf ans d'observations (1878-1886), faites toutes les trois heures depuis minuit jusqu'en 1885, et toutes les heures en 1886; les observations pour les heures intermédiaires dans les huit premières années ont été calculées par comparaison avec Zi-Ka-Wei, San Fernando et Lisbonne.

74. LESINA. — D'après le Tableau publié par M. Hann (Mémoire cité plus haut); huit ans d'observations (1870-1877), faites toutes les heures.

75. POLA. — D'après le Tableau publié par M. Hann (Mémoire cité plus haut); dix ans d'observations (1877-1886), faites toutes les heures.

76. TRIESTE. — D'après un Tableau qui nous a été obligeamment communiqué en manuscrit par M. Hann; huit ans d'observations (1868-1870 et 1883-1887), faites toutes les heures; on a de plus corrigé les nombres de la variation non périodique.

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.285

71. MEXICO.

Latitude, 19°26' N. — Longitude, 101°30' W. — Altitude, 2282^m.

Heures. _h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
0 (min.).	+ 29	+ 43	+ 50	+ 52	+ 57	+ 50	+ 46	+ 41	+ 37	+ 33	+ 35	+ 33	+ 42
1.....	+ 18	+ 29	+ 32	+ 32	+ 29	+ 28	+ 26	+ 21	+ 19	+ 17	+ 23	+ 19	+ 24
2.....	+ 3	+ 13	+ 12	+ 11	+ 7	+ 10	+ 5	+ 3	+ 1	+ 1	+ 6	+ 3	+ 6
3.....	— 5	— 10	— 2	— 2	— 1	+ 1	— 9	— 10	— 3	— 8	— 5	— 8	— 5
4.....	— 2	+ 1	— 2	+ 3	+ 2	+ 3	— 9	— 6	— 2	— 7	— 4	— 5	— 2
5.....	+ 10	+ 15	+ 22	+ 25	+ 17	+ 18	+ 13	+ 12	+ 16	+ 10	+ 12	+ 7	+ 15
6.....	+ 33	+ 45	+ 52	+ 59	+ 48	+ 44	+ 44	+ 41	+ 44	+ 41	+ 47	+ 32	+ 44
7.....	+ 56	+ 55	+ 91	+ 95	+ 55	+ 52	+ 53	+ 66	+ 70	+ 72	+ 79	+ 74	+ 77
8.....	+ 110	+ 113	+ 113	+ 119	+ 89	+ 86	+ 89	+ 86	+ 96	+ 100	+ 109	+ 112	+ 102
9.....	+ 138	+ 137	+ 125	+ 121	+ 92	+ 89	+ 92	+ 95	+ 106	+ 111	+ 126	+ 132	+ 114
10.....	+ 126	+ 134	+ 110	+ 100	+ 75	+ 73	+ 80	+ 85	+ 95	+ 102	+ 106	+ 115	+ 100
11.....	+ 84	+ 96	+ 70	+ 61	+ 46	+ 48	+ 54	+ 63	+ 65	+ 61	+ 64	+ 76	+ 66
12 (midi).	+ 22	+ 32	+ 15	+ 8	+ 5	+ 13	+ 20	+ 28	+ 19	+ 4	— 1	+ 11	+ 15
13.....	51	— 40	— 47	— 49	— 43	— 33	— 25	— 21	— 34	— 52	— 65	— 64	— 44
14.....	— 108	— 108	— 110	— 107	— 93	— 81	— 73	— 80	— 103	— 113	— 121	— 117	— 101
15.....	— 141	— 149	— 156	— 151	— 130	98	— 115	— 124	— 145	— 143	— 151	— 145	— 137
16.....	— 146	— 171	— 174	— 171	— 151	— 151	— 141	— 141	— 156	— 146	— 149	— 146	— 154
17.....	— 131	— 158	— 157	— 160	— 145	— 138	— 130	— 128	— 138	— 122	— 127	— 123	— 138
18.....	— 104	— 124	— 118	— 121	— 105	— 109	— 100	— 97	— 97	— 90	— 95	— 92	— 104
19.....	62	— 78	— 73	— 77	— 59	— 62	— 61	— 58	— 50	— 39	— 41	— 44	— 59
20.....	— 12	— 19	— 14	— 16	0	— 15	— 15	— 15	+ 1	+ 15	+ 12	0	— 7
21.....	+ 27	+ 24	+ 39	+ 38	+ 43	+ 29	+ 25	+ 28	+ 46	+ 49	+ 41	+ 39	+ 36
22.....	+ 42	+ 47	+ 59	+ 69	+ 73	+ 61	— 55	+ 55	+ 63	+ 56	+ 53	+ 53	— 57
23.....	+ 42	+ 51	+ 63	+ 69	+ 77	+ 66	+ 58	+ 55	+ 54	+ 46	+ 48	+ 46	— 56

72. LE CAP DE BONNE-ESPÉRANCE.

Latitude, 33°56' S. — Longitude, 16°7' E. — Altitude, environ 10^m.

Heures. _{h m}	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0.34....	+ 4	+ 8	+ 4	+ 2	+ 3	— 1	0	+ 1	— 6	+ 1	— 4	+ 2	— 1
1.34....	— 28	— 18	— 17	— 10	— 5	— 13	— 7	— 12	— 29	— 28	29	— 27	— 19
2.34....	— 55	— 43	— 37	— 27	— 13	— 18	— 17	— 26	— 53	— 47	— 44	— 47	— 36
3.34....	— 63	— 56	— 49	— 44	— 30	— 32	— 29	— 38	— 60	— 49	— 52	— 52	— 40
4.34....	— 46	— 50	— 43	— 43	— 32	— 40	— 35	— 40	— 45	— 36	— 36	— 35	— 40
5.34....	— 19	— 23	— 21	— 24	— 22	— 30	— 20	— 21	— 17	— 5	— 6	— 9	— 18
6.34....	+ 12	+ 12	— 8	0	— 1	— 4	+ 7	+ 9	+ 15	+ 25	+ 19	+ 15	+ 10
7.34....	+ 29	+ 35	+ 36	+ 33	+ 30	+ 25	+ 33	+ 41	+ 42	+ 45	+ 36	+ 34	— 35
8.34....	+ 34	+ 46	+ 56	+ 62	+ 61	+ 52	+ 58	— 65	+ 60	+ 67	— 44	+ 42	+ 53
9.34....	+ 36	+ 49	+ 63	+ 72	+ 75	+ 73	+ 82	— 77	+ 64	+ 59	+ 45	+ 43	+ 62
10.34....	— 25	+ 47	+ 55	+ 62	+ 67	+ 70	+ 80	+ 71	+ 56	+ 47	+ 38	+ 38	+ 56
11.34....	+ 28	+ 31	+ 33	+ 36	+ 34	+ 31	+ 42	+ 37	— 32	+ 22	+ 20	+ 26	+ 31
12.34....	+ 13	+ 10	+ 6	— 1	— 18	— 19	— 11	— 10	0	— 8	3	+ 8	— 3
13.34....	— 4	— 11	— 21	— 36	— 50	— 50	— 47	— 46	— 33	— 36	— 25	— 14	— 31
14.34....	— 23	— 33	— 47	— 49	— 64	— 60	— 62	— 63	— 51	— 56	44	— 35	— 49
15.34....	— 43	— 49	— 53	— 47	— 58	— 53	— 62	— 67	— 53	— 64	— 54	— 53	— 55
16.34....	— 56	— 55	— 50	— 40	— 42	— 38	— 51	— 53	— 44	— 56	— 52	— 62	— 50
17.34....	— 41	— 47	— 37	— 28	— 25	— 20	— 33	— 30	— 25	— 35	— 35	— 46	— 34
18.34....	— 8	— 20	— 18	— 11	— 5	— 1	— 12	— 5	— 4	— 6	— 5	— 17	— 9
19.34....	+ 19	+ 10	+ 9	+ 6	+ 12	+ 17	+ 5	+ 15	+ 20	+ 21	+ 22	+ 10	+ 14
20.34....	+ 40	+ 35	+ 32	+ 20	+ 23	+ 28	+ 18	+ 28	+ 40	+ 40	+ 43	+ 37	+ 32
21.34....	+ 52	+ 47	+ 38	+ 26	+ 26	+ 32	+ 24	+ 30	+ 44	+ 45	+ 50	+ 53	+ 39
22.34....	+ 50	+ 44	+ 33	+ 15	+ 21	+ 31	+ 23	+ 24	+ 33	+ 40	+ 47	+ 54	+ 37
23.34....	+ 34	+ 31	+ 20	+ 16	— 13	+ 20	+ 14	+ 13	+ 14	+ 24	+ 25	+ 35	+ 22

73. TOKIO.

Latitude, 35°41' N. — Longitude, 137°25' E. — Altitude, 21^m.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 20	+ 26	+ 37	+ 31	+ 26	+ 23	+ 24	+ 27	+ 24	+ 20	+ 22	+ 12	+ 24
1.....	+ 8	+ 8	+ 22	+ 9	+ 7	0	+ 5	+ 7	+ 6	+ 11	+ 11	— 2	+ 8
2.....	+ 7	— 4	+ 5	— 10	— 8	— 15	— 9	— 8	— 14	+ 2	+ 3	+ 2	— 4
3.....	— 5	— 19	— 12	— 20	— 13	— 16	— 14	— 14	— 22	— 7	— 4	+ 2	— 12
4.....	— 14	— 22	— 13	— 16	— 7	— 3	— 6	— 14	— 19	— 5	— 6	— 2	— 11
5.....	— 7	— 8	+ 8	+ 4	+ 14	+ 15	+ 11	+ 5	— 6	+ 6	+ 2	+ 8	+ 4
6.....	+ 16	+ 15	+ 38	+ 34	+ 40	+ 31	+ 28	+ 30	+ 18	+ 21	+ 25	+ 33	+ 27
7.....	+ 46	+ 44	+ 69	+ 61	+ 58	+ 46	+ 42	+ 51	+ 40	+ 45	+ 53	+ 62	+ 51
8.....	+ 73	+ 70	+ 88	+ 75	+ 65	+ 52	+ 50	+ 60	+ 57	+ 71	+ 75	+ 90	+ 69
9.....	+ 94	+ 85	+ 90	+ 76	+ 64	+ 51	+ 50	+ 61	+ 64	+ 79	+ 83	+ 103	+ 75
10.....	+ 88	+ 78	+ 74	+ 71	+ 56	+ 45	+ 44	+ 52	+ 58	+ 64	+ 72	+ 95	+ 66
11.....	+ 44	+ 41	+ 40	+ 49	+ 36	+ 28	+ 30	+ 30	+ 31	+ 31	+ 30	+ 37	+ 36
12 (midi).	— 32	— 6	— 6	+ 8	+ 6	+ 6	+ 5	0	— 3	— 20	— 38	— 38	— 10
13.....	— 95	— 64	— 59	— 30	— 26	— 21	— 20	— 31	— 42	— 69	— 87	— 99	— 54
14.....	— 122	— 101	— 100	— 68	— 58	— 45	— 46	— 61	— 73	— 95	— 113	— 124	— 84
15.....	— 113	— 104	— 121	— 96	— 89	— 65	— 65	— 79	— 87	— 96	— 105	— 111	— 94
16.....	— 88	— 91	— 116	— 102	— 99	— 79	— 76	— 83	— 83	— 84	— 82	— 86	— 89
17.....	— 56	— 61	— 93	— 97	— 93	— 80	— 80	— 79	— 63	— 62	— 52	— 58	— 73
18.....	— 21	— 28	— 62	— 68	— 71	— 63	— 61	— 62	— 39	— 34	— 21	— 27	— 46
19.....	+ 9	0	— 28	— 37	— 38	— 35	— 33	— 32	— 8	— 5	+ 4	— 1	— 17
20.....	+ 28	+ 24	+ 9	+ 4	— 2	— 1	0	+ 8	+ 28	+ 20	+ 22	+ 17	+ 13
21.....	+ 41	+ 39	+ 37	+ 35	+ 37	+ 35	+ 33	+ 41	+ 47	+ 38	+ 36	+ 28	+ 37
22.....	+ 43	+ 42	+ 47	+ 44	+ 50	+ 48	+ 46	+ 48	+ 47	+ 39	+ 38	+ 31	+ 44
23.....	+ 36	+ 36	+ 46	+ 43	+ 45	+ 43	+ 42	+ 43	+ 39	+ 30	+ 32	+ 28	+ 39

74. LESINA.

Latitude, 43°5' N. — Longitude, 13°54' E. — Altitude, 20^m.

Heures. ^h	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 11	+ 25	+ 13	+ 11	+ 1	— 6	+ 4	+ 5	+ 4	+ 13	+ 12	+ 17	+ 9
1.....	+ 5	+ 16	+ 9	— 1	— 12	— 14	— 2	— 4	— 4	+ 9	+ 3	+ 8	— 1
2.....	+ 6	+ 6	— 3	— 17	— 21	— 26	— 12	— 14	— 13	— 4	— 5	+ 6	— 8
3.....	0	— 11	— 22	— 28	— 30	— 35	— 21	— 23	— 24	— 21	— 18	— 3	— 20
4.....	— 15	— 24	— 32	— 36	— 35	— 33	— 20	— 29	— 30	— 29	— 26	— 16	— 27
5.....	— 26	— 27	— 31	— 31	— 25	— 20	— 10	— 22	— 27	— 30	— 26	— 28	— 25
6.....	— 22	— 25	— 23	— 15	— 6	— 2	— 3	— 8	— 15	— 26	— 22	— 26	— 16
7.....	— 5	— 11	— 6	+ 2	+ 10	+ 17	+ 22	+ 18	+ 4	— 11	— 1	— 14	+ 2
8.....	+ 15	+ 9	+ 13	+ 16	+ 26	+ 35	+ 36	+ 27	+ 22	+ 15	+ 23	+ 4	+ 20
9.....	+ 31	+ 21	+ 31	+ 34	+ 37	+ 46	+ 44	+ 42	+ 46	+ 32	+ 38	+ 24	+ 36
10.....	+ 40	+ 31	+ 43	+ 47	+ 48	+ 55	+ 52	+ 54	+ 57	+ 43	+ 48	+ 46	+ 47
11.....	+ 36	+ 35	+ 47	+ 48	+ 49	+ 60	+ 53	+ 55	+ 56	+ 43	+ 41	+ 40	+ 47
12 (midi).	+ 8	+ 20	+ 41	+ 38	+ 41	+ 54	+ 44	+ 46	+ 45	+ 26	+ 14	+ 14	+ 33
13.....	— 20	— 5	+ 19	+ 26	+ 29	+ 38	+ 31	+ 30	+ 27	+ 2	— 6	— 14	+ 13
14.....	— 33	— 29	— 3	+ 5	+ 12	+ 18	+ 13	+ 11	+ 5	— 17	— 26	— 30	— 6
15.....	— 31	— 38	— 22	— 16	— 9	— 4	— 4	— 8	— 18	— 28	— 30	— 32	— 20
16.....	— 28	— 38	— 34	— 29	— 20	— 22	— 24	— 25	— 32	— 32	— 33	— 28	— 29
17.....	— 21	— 34	— 37	— 35	— 38	— 41	— 47	— 41	— 40	— 31	— 28	— 22	— 35
18.....	— 10	— 15	— 29	— 39	— 41	— 48	— 55	— 50	— 45	— 16	— 15	— 12	— 31
19.....	+ 2	+ 1	— 16	— 25	— 34	— 46	— 54	— 43	— 29	— 2	— 3	— 1	— 21
20.....	+ 11	+ 10	+ 1	0	— 16	— 32	— 37	— 22	— 10	+ 5	+ 5	+ 9	— 6
21.....	+ 14	+ 23	+ 16	+ 12	+ 7	— 9	— 13	— 7	+ 3	+ 18	+ 14	+ 14	+ 8
22.....	+ 18	+ 25	+ 18	+ 12	+ 9	+ 3	0	+ 2	+ 8	+ 24	+ 16	+ 19	+ 13
23.....	+ 18	+ 29	+ 17	+ 12	+ 8	0	+ 5	+ 6	+ 9	+ 20	+ 16	+ 19	+ 13

ÉTUDE SUR LA MARCHÉ DIURNE DU BAROMÈTRE.

B.287

75. POLA.

Latitude, 44°52' N. — Longitude, 11°31' E. — Altitude, 32^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 20	+ 14	+ 19	+ 18	+ 4	+ 8	+ 9	+ 6	+ 10	+ 17	+ 11	+ 11	+ 12
1.....	+ 18	+ 16	+ 13	+ 8	+ 2	— 1	+ 2	— 1	+ 5	+ 6	+ 12	+ 8	+ 7
2.....	+ 16	+ 11	+ 3	— 10	— 4	— 16	— 12	— 13	— 5	— 5	+ 11	+ 8	— 1
3.....	+ 9	— 4	— 14	— 22	— 18	— 28	— 20	— 25	— 18	— 23	— 3	+ 4	— 14
4.....	— 4	— 19	— 23	— 33	— 25	— 28	— 19	— 28	— 26	— 29	— 12	— 8	— 21
5.....	— 15	— 29	— 23	— 35	— 20	— 21	— 12	— 23	— 29	— 32	— 15	— 20	— 23
6.....	— 24	— 21	— 17	— 23	— 8	— 10	0	— 11	— 18	— 30	— 13	— 19	— 16
7.....	— 9	— 13	— 4	— 7	+ 10	+ 4	+ 15	0	— 10	— 12	— 2	— 7	— 3
8.....	+ 6	+ 6	+ 11	+ 4	+ 20	+ 22	+ 25	+ 16	+ 6	+ 11	+ 22	+ 6	+ 13
9.....	+ 23	+ 17	+ 28	+ 20	+ 27	+ 27	+ 32	+ 31	+ 27	+ 27	+ 30	+ 25	+ 26
10.....	+ 36	+ 30	+ 40	+ 33	+ 35	+ 38	+ 39	+ 43	+ 39	+ 36	+ 40	+ 43	+ 38
11.....	+ 39	+ 37	+ 42	+ 36	+ 38	+ 40	+ 43	+ 50	+ 38	+ 39	+ 36	+ 42	+ 40
12 (midi).	+ 17	+ 29	+ 40	+ 31	+ 37	+ 41	+ 40	+ 40	+ 34	+ 25	+ 14	+ 16	+ 30
13.....	— 14	+ 2	+ 15	+ 22	+ 25	+ 28	+ 29	+ 30	+ 27	+ 2	— 10	— 12	+ 12
14.....	— 34	— 23	— 12	+ 6	+ 11	+ 15	+ 11	+ 16	0	— 18	— 35	— 32	— 8
15.....	— 43	— 25	— 32	— 15	— 6	— 1	— 3	— 3	— 15	— 25	— 36	— 29	— 19
16.....	— 36	— 35	— 46	— 28	— 19	— 17	— 25	— 18	— 25	— 30	— 35	— 27	— 28
17.....	— 32	— 33	— 45	— 32	— 34	— 33	— 42	— 33	— 29	— 27	— 29	— 27	— 33
18.....	— 20	— 17	— 32	— 31	— 39	— 38	— 49	— 42	— 30	— 14	— 18	— 15	— 29
19.....	— 7	— 3	— 13	— 19	— 31	— 34	— 43	— 36	— 16	— 2	— 9	— 6	— 18
20.....	+ 2	+ 4	+ 4	+ 5	— 17	— 25	— 31	— 13	+ 5	+ 10	— 3	+ 4	— 5
21.....	+ 12	+ 13	+ 15	+ 20	+ 3	0	— 11	0	+ 12	+ 19	+ 7	+ 8	+ 8
22.....	+ 18	+ 16	+ 20	+ 21	+ 8	+ 7	+ 3	+ 5	+ 13	+ 27	+ 12	+ 12	+ 14
23.....	+ 21	+ 16	+ 21	+ 21	+ 9	+ 12	+ 9	+ 8	+ 14	+ 22	+ 17	+ 19	+ 16

76. TRIESTE.

Latitude, 45°39' N. — Longitude, 11°26' E. — Altitude, 26^m.

Heures.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
0 (min.).	+ 29	+ 23	+ 34	+ 34	+ 20	+ 24	+ 27	+ 29	+ 23	+ 27	+ 26	+ 22	+ 27
1.....	+ 24	+ 22	+ 28	+ 27	+ 10	+ 15	+ 20	+ 29	+ 17	+ 16	+ 20	+ 18	+ 20
2.....	+ 20	+ 17	+ 16	+ 16	— 2	+ 2	+ 8	+ 10	+ 4	+ 3	+ 12	+ 16	+ 10
3.....	+ 16	+ 2	+ 1	— 1	— 15	— 13	— 2	— 2	— 10	— 11	+ 1	+ 11	— 19
4.....	+ 6	— 15	— 14	— 16	— 26	— 20	— 8	— 14	— 20	— 21	— 15	— 1	— 14
5.....	— 8	— 19	— 20	— 21	— 26	— 20	— 9	— 21	— 24	— 26	— 24	— 10	— 19
6.....	— 15	— 14	— 19	— 14	— 15	— 14	— 6	— 17	— 17	— 26	— 26	— 13	— 16
7.....	— 9	— 4	— 9	+ 1	— 3	— 2	+ 5	— 5	+ 2	— 15	— 20	— 8	— 6
8.....	+ 9	+ 8	+ 8	+ 15	+ 13	+ 13	+ 16	+ 10	+ 21	+ 7	+ 3	+ 13	+ 11
9.....	+ 24	+ 19	+ 23	+ 28	+ 26	+ 25	+ 25	+ 22	+ 35	+ 22	+ 21	+ 34	+ 25
10.....	+ 30	+ 23	+ 26	+ 33	+ 30	+ 27	+ 25	+ 24	+ 38	+ 25	+ 27	+ 44	+ 29
11.....	+ 26	+ 22	+ 21	+ 29	+ 27	+ 24	+ 20	+ 20	+ 28	+ 22	+ 23	+ 40	+ 25
12 (midi).	+ 3	+ 10	+ 6	+ 10	+ 19	+ 16	+ 11	+ 12	+ 13	+ 11	+ 5	+ 11	+ 11
13.....	— 25	— 6	— 11	— 10	+ 7	+ 5	— 1	+ 1	— 4	— 9	— 14	— 21	— 7
14.....	— 48	— 30	— 29	— 27	— 5	— 7	— 15	— 11	— 21	— 24	— 35	— 50	— 25
15.....	— 51	— 42	— 43	— 40	— 16	— 19	— 27	— 22	— 34	— 32	— 40	— 49	— 35
16.....	— 47	— 43	— 50	— 47	— 26	— 30	— 36	— 29	— 39	— 34	— 36	— 45	— 39
17.....	— 39	— 36	— 48	— 47	— 34	— 39	— 40	— 33	— 39	— 28	— 26	— 37	— 37
18.....	— 26	— 21	— 32	— 41	— 32	— 37	— 38	— 32	— 32	— 14	— 11	— 26	— 29
19.....	— 9	— 3	— 8	— 24	— 21	— 24	— 29	— 25	— 17	+ 1	+ 5	— 12	— 14
20.....	+ 8	+ 11	+ 14	+ 2	0	— 5	— 13	— 10	+ 4	+ 15	+ 18	+ 2	+ 38
21.....	+ 23	+ 22	+ 31	+ 24	+ 19	+ 18	+ 12	+ 11	+ 20	+ 27	+ 27	+ 15	+ 21
22.....	+ 30	+ 26	+ 37	+ 34	+ 25	+ 30	+ 26	+ 27	+ 26	+ 32	+ 30	+ 23	+ 29
23.....	+ 32	+ 25	+ 37	+ 36	+ 24	+ 31	+ 29	+ 31	+ 26	+ 32	+ 29	+ 24	+ 30

En plus des 76 stations dont les observations sont publiées dans les Tableaux qui précèdent, j'en ai ajouté pour la discussion 15 autres, dont la période d'observations ne comprend pas généralement cinq années, ou dont je n'ai pu me procurer les observations en détail. Voici la liste de ces stations, avec leur position géographique et l'indication de la source où j'ai puisé les renseignements qui les concernent :

Numéros d'ordre.	Station.	Latitude.	Longitude.	Altitude.	Durée des observations.
1.....	Atlantique Nord.	2° 30' N	27° 20' W	0 ^m	2 ^{ans} ₂
2.....	Golfe du Bengale.	5. 0 N	82.40 E	0	2
3.....	Atlantique Nord.	7.30 N	27.20 W	0	2 ¹ ₂
4.....	Ascension.	7.55 S	16.45 W	(?)	2
5.....	Hong-Kong.	22.15 N	111.52 E	(?)	3 ¹ ₂
6.....	Hazaribagh.	24. 0 N	83. 4 E	612	»
7.....	Patna.	25.37 N	82.48 E	55	»
8.....	Goalpara.	26.11 N	88.20 E	120	»
9.....	Simla.	31. 6 N	74.51 E	2282	3
10.....	Philadelphie.	39.38 N	77.31 W	34	3
11.....	Bukarest.	44.26 N	23.46 E	93	3
12.....	Milan.	45.28 N	6.51 E	147	25
13.....	Kremsmunster.	48. 4 N	11 48 E	390	10
14.....	Oxford.	51.46 N	3.36 W	(?)	16
15.....	Magdebourg.	52. 9 N	9.18 E	54	4

Les nombres qui concernent les stations 1 et 3 sont pris dans : *Remarks to accompany the monthly charts for Square n° 3*, London, 1874, et ceux qui concernent la station 2 dans : DALLAS, *The meteorological features of the southern part of the Bay of Bengal* (*Indian meteorological Memoirs*, vol. IV, Part 1). Ces trois séries proviennent d'observations faites en mer.

Les nombres des stations 6, 7, 8 et 9 sont empruntés à différents Mémoires publiés par M. Blanford (*Indian meteorological Memoirs*, vol. I, Parts 3, 6 et 11).

Enfin les nombres relatifs aux huit autres stations ont été relevés dans le Mémoire déjà cité de M. Hann (*Untersuchungen über die tägliche Oscillation des Barometers*, Wien, 1889).

III. — Étude analytique de la variation diurne du baromètre.

Comme toutes les oscillations périodiques complexes, la variation diurne du baromètre peut être décomposée en une série d'oscillations simples harmoniques ayant respectivement pour périodes un jour, un demi-jour, un tiers de jour, etc. Si h est l'écart, à la moyenne des vingt-quatre heures, de la pression observée à une certaine heure m , comptée en angles de 0° à 360° depuis minuit, on a donc

$$(1) \quad h = b_1 \sin m + c_1 \cos m + b_2 \sin 2m + c_2 \cos 2m + b_3 \sin 3m + c_3 \cos 3m + \dots,$$

équation qui peut encore se mettre sous la forme

$$(1 \text{ bis}) \quad h = a_1 \cos(m + \varphi_1) + a_2 \cos(2m + \varphi_2) + a_3 \cos(3m + \varphi_3) + \dots$$

Dans une même station, on aura pour chaque mois une équation de cette sorte; en comparant alors les valeurs des paramètres $a_1, a_2, a_3, \dots; \varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots$ qui correspondent aux différents mois et aux différents pays, on pourra établir des relations entre ces paramètres et, par suite, déterminer les lois générales de la variation diurne du baromètre.

Le calcul de l'équation (1), qui représente la marche diurne du baromètre pour une station et un mois donnés, se fait aisément au moyen des écarts publiés dans les Tableaux qui précèdent, pour chacune des vingt-quatre heures.

Désignons par $\Sigma h \sin m$ la somme des vingt-quatre produits de chaque écart par le sinus de l'angle horaire correspondant (0° pour minuit, 15° pour 1^h , et ainsi de suite); par $\Sigma h \sin 2m$ la somme des vingt-quatre produits de chaque écart par le sinus du double de l'angle horaire correspondant, et ainsi de suite.

Les paramètres $b_1, c_1, b_2, c_2, b_3, c_3, \dots$ de la formule (1) seront donnés par les relations

$$\begin{aligned} 12 b_1 &= \Sigma h \sin m, & 12 c_1 &= \Sigma h \cos m, \\ 12 b_2 &= \Sigma h \sin 2m, & 12 c_2 &= \Sigma h \cos 2m, \\ 12 b_3 &= \Sigma h \sin 3m, & 12 c_3 &= \Sigma h \cos 3m, \\ &\dots\dots\dots, & &\dots\dots\dots, \end{aligned}$$

et l'on aura ensuite

$$\begin{aligned} a_1 &= \sqrt{b_1^2 + c_1^2}, & \tan \varphi_1 &= -\frac{b_1}{c_1}, \\ a_2 &= \sqrt{b_2^2 + c_2^2}, & \tan \varphi_2 &= -\frac{b_2}{c_2}, \\ &\dots\dots\dots, & &\dots\dots\dots \end{aligned}$$

Dans tous les Tableaux que nous avons publiés précédemment, les observations sont rapportées au temps moyen; il y a un grand avantage à les rapporter au temps vrai pour que, dans tous les mois, l'heure de midi corresponde exactement au passage du Soleil au méridien. Le changement se fera très aisément; soit, en effet, ε l'équation du temps moyenne pour un mois donné, c'est-à-dire la différence moyenne entre le midi vrai et le midi moyen, exprimée en degrés (1° pour 4 minutes de temps) et comptée positivement quand le temps vrai est en retard sur le temps moyen. Si l'on néglige la petite inégalité dans la durée des jours, on peut poser, en appelant m' le temps vrai,

$$m = m' + \varepsilon,$$

ce qui donne, en portant cette valeur dans l'équation (1 bis),

$$h = a_1 \cos(m' + \varepsilon + \varphi_1) + a_2(\cos 2m' + 2\varepsilon + \varphi_2) + \dots;$$

en posant

$$\psi_1 = \varphi_1 + \varepsilon, \quad \psi_2 = \varphi_2 + 2\varepsilon, \quad \psi_3 = \varphi_3 + 3\varepsilon, \quad \dots,$$

on aura donc, en fonction du temps vrai, l'équation

$$(2) \quad h = a_1 \cos(m' + \psi_1) + a_2 \cos(2m' + \psi_2) + a_3 \cos(3m' + \psi_3),$$

Les paramètres $a_1, a_2, a_3, \dots$ sont ceux qui ont été déterminés précédemment, et les paramètres $\psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots$ se déduisent directement des paramètres $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \dots$, en leur ajoutant respectivement $\varepsilon, 2\varepsilon, 3\varepsilon, \dots$. Nous donnerons plus loin les valeurs moyennes de ε pour chaque mois.

Une fois les paramètres $a_1, a_2, a_3, \dots, \psi_1, \psi_2, \psi_3, \dots$ obtenus, il y aura lieu d'en comparer la variation annuelle avec la position du Soleil sur son orbite; il est donc nécessaire de connaître pour chaque mois les valeurs moyennes de la longitude et de la déclinaison du Soleil. Nous avons calculé ces valeurs moyennes en partant des développements en série connus qui donnent la longitude du Soleil et sa déclinaison en fonction du temps moyen, et en tenant compte de la durée inégale des mois. On trouvera dans un travail antérieur (¹) les formules [formules (4), p. B.229] qui permettent de calculer ainsi pour chaque mois les valeurs moyennes d'un élément quelconque.

Nous avons adopté dans nos calculs les valeurs suivantes pour les différents éléments de l'orbite terrestre :

Eccentricité.....	0,01677
Obliquité de l'écliptique.....	23° 27' 20"
Longitude du périhélie.....	280° 20'

(¹) Sur le calcul de la variation annuelle des éléments météorologiques, même Volume, page B.227.

Enfin nous avons supposé, ce qui est actuellement très voisin de la vérité, que le Soleil passe au périhélie à minuit dans la nuit du 31 décembre au 1^{er} janvier, c'est-à-dire au commencement même de l'année.

Nous donnons, dans le Tableau ci-dessous, pour les différents mois, comptés chacun avec sa longueur exacte, les valeurs moyennes de l'équation du temps ϵ , de la déclinaison du Soleil δ , de sa longitude l et du carré de l'inverse de sa distance r à la Terre. Nous y avons ajouté les valeurs correspondantes de $\sin l$, $\cos l$ et $\frac{\cos^2 \delta}{r^2}$, dont nous aurons à faire usage. Les angles sont évalués, comme dans tout ce travail, en degrés et fractions décimales de degré.

Valeurs moyennes mensuelles des divers éléments.

	ϵ .	δ .	l .	$\frac{1}{r^2}$.	$\sin l$.	$\cos l$.	$\frac{\cos^2 \delta}{r^2}$.
Janvier.....	+ 2,40	— 20,68	296,12	1,0327	— 0,8979	+ 0,4402	0,9033
Février.....	+ 3,51	— 12,68	326,16	1,0238	— 0,5569	+ 0,8306	0,9722
Mars.....	+ 2,16	— 1,62	355,83	1,0089	— 0,0727	+ 0,9973	1,0043
Avril.....	+ 0,02	+ 9,92	25,90	0,9917	+ 0,4368	+ 0,8996	0,9597
Mai.....	— 0,88	+ 18,93	55,48	0,9772	+ 0,8239	+ 0,5667	0,8734
Juin.....	+ 0,07	+ 23,07	84,71	0,9688	+ 0,9957	+ 0,0922	0,8197
Juillet.....	+ 1,34	+ 21,11	113,80	0,9685	+ 0,9150	— 0,4035	0,8424
Août.....	+ 0,92	+ 13,57	143,49	0,9765	+ 0,5949	— 0,8038	0,9208
Septembre..	— 1,27	+ 2,75	173,05	0,9907	+ 0,1210	— 0,9927	0,9852
Octobre....	— 3,50	— 8,87	203,08	1,0079	— 0,3920	— 0,9199	0,9806
Novembre..	— 3,65	— 18,49	233,62	1,0234	— 0,8051	— 0,5931	0,9193
Décembre ..	— 0,97	— 22,73	264,55	1,0327	— 0,9955	— 0,0950	0,8746

Nous étudierons maintenant successivement chacune des ondes simples dans lesquelles on peut décomposer la variation diurne du baromètre; on verra, par les nombres que nous donnons plus loin, qu'il faut tenir compte au moins des trois premières ondes harmoniques; les amplitudes de la quatrième onde (quart diurne), bien que très petites, varient cependant encore d'une manière assez régulière pour qu'il soit intéressant de considérer même cette quatrième onde.

Nous ferons encore remarquer, pour terminer ces préliminaires, que nous n'avons pas cru devoir étudier la variation moyenne annuelle, mais seulement les variations de chacun des douze mois; la moyenne annuelle, en effet, ne représente rien de précis. En prenant la moyenne arithmétique de douze ondes, dont les amplitudes et les phases sont différentes, on obtient un résultat qui n'a aucune signification, car l'amplitude et la phase moyennes sont loin d'être égales aux moyennes des amplitudes ou des phases. Supposons, en effet, que,

les amplitudes des douze ondes mensuelles étant égales, les phases aient une certaine valeur constante pendant six mois et la même valeur augmentée de 180° pendant les six autres mois, la moyenne arithmétique serait rigoureusement nulle; on pourrait imaginer un grand nombre de conditions qui conduiraient à des résultats aussi manifestement erronés. En considérant séparément les douze ondes mensuelles, on a, au contraire, les propriétés caractéristiques de ces ondes pour douze positions bien déterminées du Soleil sur son orbite, et il devient possible d'en déduire les lois de variation de ces ondes en fonction des coordonnées du Soleil.

1^o *Onde diurne.*

Nous considérerons d'abord l'onde diurne qui est représentée par la formule

$$a_1 \cos(m + \psi_1).$$

Comme nous l'avons indiqué plus haut, le temps est toujours compté en temps vrai, de sorte que le Soleil passe au méridien quand $m = 180^\circ$. Nous donnons dans les deux Tableaux suivants (Tableaux I et II) les valeurs mensuelles des amplitudes a_1 en millièmes de millimètre, et des phases ψ_1 en degrés et dixièmes de degré pour quatre-vingt-onze stations. Dans cette onde diurne, une heure de temps correspond à un angle de 15° ; une incertitude de 1° sur la valeur de ψ_1 correspond donc seulement à une incertitude de quatre minutes de temps sur l'heure du maximum ou du minimum de l'onde.

TABLEAU I. — ONDE DIURNE : $a_1 \cos(m + \psi_1)$.Valeurs de a_1 .

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1. Singapore.....	0,525	0,585	0,586	0,616	0,529	0,441	0,519	0,533	0,592	0,591	0,524	0,409
2. Atlantique (2°30' N.)..	170	201	160	175	142	089	234	254	198	132	158	178
3. Golfe du Bengale.....	307	345	300	363	348	295	252	338	348	323	274	267
4. Batavia.....	521	571	623	602	606	585	675	736	776	689	593	517
5. Atlantique (7°30' N.)..	241	145	264	168	117	094	064	150	127	132	122	259
6. Ascension.....	401	379	410	401	284	238	167	152	230	188	303	314
7. Madras.....	333	443	649	776	655	810	848	827	713	540	337	334
8. Sainte-Hélène.....	307	279	246	230	182	115	062	085	044	096	224	258
9. Bombay.....	518	584	660	711	615	297	206	241	343	511	541	511
10. Mexico.....	768	887	893	905	750	719	683	673	730	693	769	736
11. Maurice.....	277	245	246	266	266	252	276	345	425	388	365	271
12. Hong-Kong.....	494	632	463	438	441	368	231	273	336	368	533	612
13. Calcutta.....	729	812	872	917	827	554	489	555	589	595	634	686
14. La Havane.....	252	272	333	344	280	184	197	229	277	292	263	314
15. Hazaribagh.....	438	531	610	702	697	449	337	473	546	407	361	443
16. Allahabad.....	614	722	919	983	1,138	987	567	646	691	645	673	661
17. Patna.....	626	713	983	1,063	1,049	837	646	674	828	716	764	800
18. Goalpara.....	683	827	1,067	1,116	1,127	730	687	727	900	826	785	884
19. Simla.....	465	511	0,505	0,587	0,714	617	432	411	574	465	467	480
20. Zi-ka-Wei.....	277	290	317	263	293	196	278	251	224	254	291	333
21. Cordoba.....	1,117	1,110	941	943	849	746	828	1,039	1,149	1,238	1,152	1,197
22. Le Cap.....	0,027	0,075	119	136	155	093	201	0,169	0,097	0,123	0,063	0,078
23. Tokio.....	441	381	579	482	476	379	367	400	321	426	449	514
24. San Fernando.....	036	042	029	058	092	200	243	202	131	069	068	036
25. Melbourne.....	338	312	290	290	206	203	104	287	396	272	348	338
26. Lisbonne.....	128	103	086	020	062	092	165	169	157	096	135	113
27. Washington.....	291	441	552	624	595	571	500	578	586	485	341	346
28. Philadelphie.....	465	351	338	490	389	465	597	381	419	389	505	607
29. Pékin.....	541	733	943	1,182	1,046	858	523	556	668	811	563	521
30. Coïmbre.....	111	128	160	0,115	0,137	132	190	181	132	096	075	125
31. Madrid.....	214	284	390	420	513	618	683	683	523	301	214	144
32. Naples.....	073	096	112	046	031	108	133	123	097	050	073	108
33. Tiflis.....	382	385	566	702	757	839	890	843	735	625	445	358
34. Albany.....	353	446	396	535	438	630	613	562	677	503	226	326
35. Perpignan.....	187	254	316	313	319	363	452	415	264	260	210	137
36. Hobarton.....	240	420	491	323	135	133	104	269	413	392	457	376
37. Lesina.....	065	073	102	162	235	344	331	280	228	043	076	033
38. Marseille.....	146	196	224	223	085	133	254	228	166	159	209	084
39. Saint-Martin-de-Hinx..	055	078	109	173	218	230	220	181	107	066	079	063
40. Toulouse.....	239	221	327	342	268	313	438	424	282	176	188	153
41. Toronto.....	210	329	328	408	534	568	500	411	470	329	210	220
42. Bukarest.....	095	086	259	439	527	479	427	382	444	293	229	168
43. Pola.....	135	050	100	064	179	201	248	208	094	017	130	087
44. Moncalieri.....	172	254	336	417	430	496	588	558	408	295	313	179
45. Milan.....	141	258	332	365	397	450	503	449	335	219	111	098

TABLEAU I (suite). — ONDE DIURNE.

Valeurs de a_1 .

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
46. Trieste.....	0,245	0,139	0,162	0,168	0,037	0,086	0,170	0,102	0,103	0,094	0,139	0,163
47. Lyon (Saint-Genis)....	032	154	196	343	304	307	413	345	246	117	087	097
48. Lyon (Parc).....	052	279	346	392	370	362	466	409	317	146	136	111
49. Puy-de-Dôme.....	067	108	236	175	308	235	236	249	221	180	116	114
50. Clermont-Ferrand.....	163	222	258	341	274	277	329	350	292	104	149	165
51. Grand Saint-Bernard...	106	120	179	231	226	206	211	192	199	147	082	132
52. Genève.....	162	190	287	394	483	428	464	387	333	190	165	112
53. Obir.....	053	116	146	223	195	178	118	105	162	094	031	030
54. Klagenfurt.....	421	522	711	633	718	743	921	761	577	432	386	311
55. Poitiers.....	072	102	101	188	211	242	259	245	105	014	116	066
56. Nantes.....	109	003	144	202	104	208	232	244	117	088	061	055
57. Berne.....	094	169	238	294	292	353	320	307	264	191	134	122
58. Säntis.....	136	098	198	256	279	289	289	273	197	183	056	100
59. Kremsmunster.....	131	108	214	399	483	517	508	363	311	298	027	043
60. Munich.....	044	080	053	194	240	265	237	195	134	059	034	014
61. Vienne.....	088	099	165	319	421	426	406	308	327	171	042	075
62. Paris (Saint-Maur)....	051	101	174	341	296	300	355	273	148	095	039	049
63. Sainte-Honorine-du-Fay.	057	049	033	126	101	124	075	033	018	091	021	100
64. Prague.....	114	081	185	337	426	436	460	418	353	209	171	064
65. Falmouth.....	100	112	101	115	154	176	164	162	181	212	144	082
66. Bruxelles.....	075	044	033	126	146	112	100	097	062	057	130	097
67. Nertchinsk.....	123	185	461	646	749	776	563	591	579	291	118	135
68. Leipzig.....	081	021	116	243	298	290	282	214	231	057	109	128
69. Kew.....	031	029	089	199	226	214	206	196	028	095	096	052
70. Greenwich.....	076	006	107	139	176	148	132	113	004	087	019	040
71. Oxford.....	236	074	094	170	252	249	183	152	013	117	061	074
72. Valencia.....	119	122	078	108	151	227	164	205	165	166	022	094
73. Utrecht.....	035	053	029	012	117	031	055	046	016	066	078	040
74. Amsterdam.....	112	056	088	042	080	093	142	150	100	049	298	071
75. Magdebourg.....	042	100	127	261	337	264	297	243	142	173	034	123
76. Groningue.....	071	126	145	078	080	099	108	165	098	086	061	058
77. Barnaoul.....	138	087	126	137	235	173	119	104	196	102	112	080
78. Liverpool (Bidston)....	063	012	072	125	130	078	029	027	056	078	021	011
79. Hambourg.....	132	050	062	099	166	134	064	029	072	045	030	047
80. Stonyhurst.....	044	063	052	151	164	115	038	082	096	109	087	025
81. Swinemunde.....	162	088	130	012	113	182	135	047	099	133	133	023
82. Armagh.....	047	096	033	101	132	103	076	094	085	141	015	023
83. Keitum.....	156	124	132	098	201	197	230	252	136	152	053	047
84. Moscou.....	074	049	158	136	070	171	204	094	035	080	065	084
85. Glasgow.....	085	086	147	122	201	184	079	096	076	135	071	051
86. Catherinbourg.....	086	093	116	190	230	230	178	110	083	109	134	092
87. Nouvelle-Arkhangelsk.	062	059	084	126	076	135	105	114	098	053	018	066
88. Aberdeen.....	044	115	162	062	012	049	077	098	140	178	102	082
89. Upsal.....	063	049	078	139	143	178	169	111	027	028	101	076
90. Saint-Petersbourg.....	044	054	043	036	064	116	057	063	035	107	073	065
91. Helsingfors.....	036	117	148	057	108	093	036	041	048	134	094	132

TABLEAU II. — ONDE DIURNE : $\alpha_1 \cos(m + \psi_1)$.Valeurs de ψ_1 (temps vrai).

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1. Singapore	286,3	281,3	282,1	279,3	284,1	282,6	274,0	275,3	274,3	279,7	284,6	288,3
2. Atlantique (2°30'N.)..	304,9	280,9	264,4	251,1	258,6	226,1	258,5	268,1	270,1	282,0	283,9	295,7
3. Golfe du Bengale	273,2	269,3	246,9	240,0	231,5	274,9	291,7	272,9	260,9	267,0	278,0	260,9
4. Batavia	289,2	289,4	293,3	298,8	298,9	302,9	298,5	297,4	292,2	293,1	294,3	295,6
5. Atlantique (7°30'N.)..	298,3	304,9	278,6	226,6	216,1	224,7	259,1	258,3	241,3	260,4	275,8	270,3
6. Ascension	295,5	300,5	309,6	294,2	294,8	287,7	255,8	247,5	279,8	288,7	280,4	285,1
7. Madras	244,5	253,0	263,2	274,7	271,0	276,3	276,7	274,8	280,6	269,4	260,4	264,9
8. Sainte-Hélène	241,6	241,0	250,5	236,8	228,7	229,5	236,7	228,8	263,6	213,0	217,4	229,4
9. Bombay	244,8	246,6	246,3	245,1	239,0	229,7	200,2	212,7	235,6	248,3	244,4	245,5
10. Mexico	277,4	279,3	285,8	284,7	290,8	286,3	283,2	281,3	283,1	282,1	281,8	280,2
11. Maurice	326,5	341,7	326,3	323,1	314,0	316,4	314,8	305,6	311,1	319,4	321,4	317,8
12. Hong-Kong	273,9	264,7	263,1	243,0	247,9	261,8	278,3	278,6	268,4	264,1	272,8	278,6
13. Calcutta	242,7	240,7	241,5	246,9	253,9	257,6	273,4	270,9	263,4	249,7	244,1	244,4
14. La Havane	258,2	260,1	268,7	263,5	259,9	257,1	233,6	238,6	271,6	271,8	255,9	258,3
15. Hazaribagh	247,5	262,4	249,1	256,0	255,8	275,3	284,3	267,5	263,3	270,0	256,7	243,2
16. Allahabad	243,6	245,1	241,2	244,7	244,1	253,7	250,0	264,0	257,4	242,8	242,3	240,9
17. Patna	251,6	253,3	248,9	249,8	246,5	261,9	264,5	265,6	261,6	250,2	249,4	255,1
18. Goalpara	260,8	262,8	254,4	243,7	241,5	260,1	275,2	271,1	266,8	253,5	254,0	258,7
19. Simla	181,5	178,5	168,3	175,0	185,2	187,6	213,8	205,0	190,3	180,9	188,5	180,9
20. Zi-ka-Wei	298,7	291,6	274,2	270,0	264,7	270,9	272,5	270,8	273,6	278,3	283,1	291,5
21. Cordoba	281,1	290,2	298,3	297,9	307,8	315,4	315,6	311,2	300,2	295,7	291,3	282,3
22. Le Cap	169,8	245,6	244,4	238,8	264,8	268,7	257,7	257,6	220,6	267,4	276,6	270,2
23. Tokio	303,5	298,2	293,1	281,4	284,2	285,3	288,0	290,3	296,0	293,4	297,5	290,1
24. San Fernando	227,0	170,6	91,0	193,5	163,0	202,6	228,8	220,5	213,1	185,8	189,7	203,7
25. Melbourne	285,2	280,4	369,3	278,4	301,7	284,9	269,4	278,9	288,5	274,5	290,8	288,8
26. Lisbonne	254,8	267,0	254,8	272,4	262,9	238,2	252,9	244,5	242,5	245,8	256,4	270,4
27. Washington	254,6	271,3	268,1	264,2	261,7	255,1	253,6	252,3	262,2	262,1	264,3	265,6
28. Philadelphie	279,7	278,6	302,8	258,1	255,4	254,8	280,7	257,6	254,1	259,4	274,5	271,8
29. Pékin	296,5	281,0	273,6	264,7	261,5	266,7	262,0	263,7	260,3	260,6	285,8	286,9
30. Coïmbre	248,2	268,1	271,6	323,8	306,0	304,8	298,1	301,3	290,2	268,4	259,6	246,5
31. Madrid	253,2	258,5	266,8	275,9	271,2	264,6	259,6	259,1	255,9	254,1	257,7	246,3
32. Naples	318,7	344,9	301,1	300,1	240,1	224,9	252,1	249,4	249,3	311,4	309,1	308,2
33. Tiflis	292,6	298,3	292,6	292,4	291,4	294,4	288,1	286,8	290,3	292,2	291,9	295,9
34. Albany	261,5	268,8	274,0	274,5	278,0	261,1	263,1	256,7	259,3	257,1	277,9	246,9
35. Perpignan	315,8	310,4	317,4	307,3	298,5	294,0	283,2	284,7	297,8	323,9	308,2	345,9
36. Hobarton	331,3	304,4	300,9	297,4	341,0	346,2	345,1	308,4	333,1	329,2	331,7	330,9
37. Lesina	303,0	335,3	212,7	203,5	204,9	208,9	226,1	217,3	211,9	215,6	235,1	282,5
38. Marseille	226,9	238,4	277,5	263,8	242,7	224,6	209,8	222,8	233,0	284,0	253,4	237,0
39. Saint-Martin-de-Hinx ..	340,0	336,9	331,0	324,4	317,8	315,9	319,8	322,6	322,0	340,8	343,3	340,7
40. Toulouse	279,8	319,5	291,9	294,2	282,5	278,2	289,0	286,2	293,0	294,2	306,1	318,2
41. Toronto	300,0	239,6	253,8	216,9	248,9	238,4	243,4	234,9	242,3	256,4	241,7	257,9
42. Bukarest	285,2	326,5	272,0	265,9	245,9	257,4	260,4	266,5	253,3	263,2	267,3	296,4
43. Pola	307,1	291,3	256,0	183,9	215,3	206,6	224,7	205,9	196,9	161,8	273,6	281,0
44. Moncalieri	312,0	291,4	282,2	279,8	276,8	274,3	276,5	271,1	273,9	289,1	287,9	308,7
45. Milan	282,2	279,1	276,6	271,5	267,8	264,9	264,2	262,7	259,2	256,3	260,7	277,8

TABLEAU II (suite). — ONDE DIURNE.

Valeurs de ψ_1 (temps vrai).

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
46. Trieste.....	321,2 ⁰	330,6 ⁰	343,7 ⁰	314,7 ⁰	236,8 ⁰	290,2 ⁰	294,1 ⁰	311,0 ⁰	291,4 ⁰	352,8 ⁰	348,0 ⁰	311,7 ⁰
47. Lyon (Saint-Genis)...	406,0	269,7	287,8	280,3	276,7	277,3	275,6	272,3	292,5	313,2	315,5	358,2
48. Lyon (Parc).....	282,3	281,7	279,6	279,5	275,8	282,9	272,4	271,5	282,9	272,9	277,4	312,7
49. Puy-de-Dôme.....	79,3	89,6	95,4	102,2	113,0	122,2	120,9	121,6	117,2	117,1	73,0	62,4
50. Clermont-Ferrand....	312,4	327,6	309,0	306,5	313,5	306,9	294,3	304,1	319,5	325,8	339,7	350,4
51. Grand Saint-Bernard..	41,2	50,4	57,1	65,0	70,3	69,1	64,8	57,0	64,1	53,6	20,1	49,9
52. Genève.....	286,1	280,1	282,3	282,2	289,0	290,5	283,4	284,6	277,5	285,7	261,4	306,1
53. Obir.....	14,5	80,6	72,3	88,6	101,2	100,2	137,7	81,0	104,4	104,1	41,1	27,5
54. Klagenfurt.....	305,4	298,5	293,6	295,4	292,0	296,0	289,3	287,7	287,3	288,5	299,7	302,5
55. Poitiers.....	303,4	316,6	297,5	280,5	280,1	277,4	266,2	270,9	253,6	341,6	253,2	307,4
56. Nantes.....	265,9	298,2	263,7	275,7	246,1	274,2	271,3	277,3	327,9	93,2	117,8	246,3
57. Berne.....	330,8	295,8	311,7	298,9	309,2	309,2	308,1	305,7	310,2	319,6	327,5	350,5
58. Sântis.....	50,6	76,2	70,5	88,2	93,7	98,7	101,8	99,7	102,2	78,0	56,4	57,3
59. Kremsmunster.....	285,8	374,4	274,5	272,1	273,4	281,2	280,4	269,9	265,3	260,6	375,3	247,0
60. Munich.....	324,1	322,1	289,3	269,1	267,2	279,9	280,8	273,3	224,4	249,4	296,4	317,8
61. Vienne.....	318,2	323,2	293,7	275,2	259,9	267,5	265,3	266,0	256,6	245,0	257,9	421,7
62. Paris (Saint-Maur)...	209,5	315,3	280,8	277,6	273,1	257,4	269,9	272,9	272,1	296,1	275,6	405,5
63. Sainte-Honorine-du-Fay.	250,5	361,1	310,3	303,8	323,9	322,4	302,5	304,2	263,0	329,5	314,4	332,4
64. Prague.....	284,5	285,5	280,0	274,1	267,9	266,4	275,3	266,9	267,9	264,8	264,9	282,8
65. Falmouth.....	76,6	118,2	127,3	101,7	128,2	113,6	118,6	130,2	126,1	98,7	133,4	108,5
66. Bruxelles.....	100,1	94,8	263,6	264,0	269,1	255,6	264,4	275,6	248,8	80,5	82,9	163,3
67. Nertchinsk.....	331,9	314,0	274,4	280,9	283,4	277,9	276,3	274,0	275,3	277,2	315,3	376,8
68. Leipzig.....	175,8	148,3	294,0	252,0	237,9	240,6	250,7	249,9	245,1	197,1	327,5	62,5
69. Kew.....	296,5	13,3	287,6	300,6	301,8	289,7	289,3	291,0	304,1	361,0	90,3	61,9
70. Greenwich.....	82,8	64,4	279,8	281,5	297,6	285,9	280,2	286,0	119,9	343,6	352,8	289,8
71. Oxford.....	91,1	341,4	326,0	292,8	300,9	286,1	291,5	311,8	347,4	33,6	31,4	316,9
72. Valencia.....	96,6	150,7	51,7	114,4	94,0	110,1	111,4	108,0	117,8	128,3	210,8	91,5
73. Utrecht.....	21,2	142,6	196,5	272,4	273,7	282,7	100,2	142,2	61,1	192,5	232,2	178,0
74. Amsterdam.....	32,2	30,3	38,6	139,2	157,2	97,9	103,2	102,7	100,0	122,2	70,8	43,2
75. Magdebourg.....	90,9	262,1	274,2	268,0	272,0	272,9	267,2	264,4	260,5	314,3	155,9	20,4
76. Groningue.....	64,9	114,1	75,2	29,7	269,0	69,4	88,7	113,6	110,8	92,7	148,5	127,4
77. Barnaoul.....	249,3	195,7	207,9	189,3	218,6	249,8	228,2	205,4	220,7	199,6	282,7	176,8
78. Liverpool (Bidston)...	60,8	110,5	304,7	298,8	295,4	270,0	198,4	304,9	108,8	83,4	132,0	125,5
79. Hambourg.....	98,2	26,2	47,1	308,2	290,7	271,0	289,4	270,8	249,4	117,0	83,9	59,4
80. Stonyhurst.....	119,8	79,5	332,3	308,0	321,6	293,8	66,3	37,1	93,9	53,1	112,8	172,2
81. Swinemunde.....	60,3	341,5	79,7	120,5	213,3	199,3	195,4	225,7	203,9	94,1	107,9	119,3
82. Armagh.....	235,6	119,1	361,4	303,2	318,4	342,2	19,1	77,6	115,3	101,5	266,0	318,0
83. Keitum.....	97,4	54,1	94,0	60,9	94,3	91,5	81,3	88,9	97,7	92,5	18,2	46,9
84. Moscou.....	11,6	66,5	68,1	258,5	283,3	248,2	239,2	275,8	61,8	337,3	31,7	178,9
85. Glasgow.....	164,9	69,3	33,0	302,4	303,6	309,4	345,0	31,5	69,7	93,6	158,6	7,0
86. Catherinbourg.....	54,0	11,7	332,7	301,5	279,6	295,2	279,6	319,2	326,6	37,9	42,2	40,3
87. Nouvelle-Arkhangelsk.	252,0	207,8	43,3	109,5	96,1	91,3	107,3	120,9	136,7	155,0	339,0	132,7
88. Aberdeen.....	132,6	46,5	39,3	95,2	128,2	20,2	29,4	54,8	63,3	94,1	118,6	47,6
89. Upsal.....	50,8	20,1	302,6	271,4	276,7	282,7	284,4	288,4	285,0	101,1	88,6	41,2
90. Saint-Petersbourg....	93,0	96,0	134,2	199,4	211,4	232,4	233,7	242,2	162,8	112,9	66,6	74,2
91. Helsingfors.....	103,0	95,2	51,2	156,8	201,0	224,1	125,3	187,2	109,2	92,6	93,3	91,3

Les valeurs de a_1 présentent une relation remarquable avec l'amplitude de la variation diurne de la température; pour la même latitude, a_1 est beaucoup plus grand dans les stations continentales que dans les stations maritimes (exemples : Calcutta et la Havane; Madrid et Naples; Pola et Moncalieri; Catherinbourg et Nouvelle-Arkhangelsk, etc.); a_1 est de même beaucoup plus grand pour les stations situées dans le fond des vallées que pour celles qui sont en plaine (exemples : Lyon-Parc et Lyon-Saint-Genis, Klagenfurt et Poitiers, Nertchinsk et Leipzig, etc.). Cette relation se maintient dans tous les détails; ainsi, dans les stations de l'Inde (Bombay, Calcutta, Hazaribagh, etc.), le régime est très continental pendant la saison froide et la variation diurne de la température est grande; elle devient beaucoup plus petite en été pendant la mousson de Sud-Ouest; de même, les valeurs de a_1 , qui sont très grandes pendant tout l'hiver, diminuent brusquement au moment où commence la saison pluvieuse de la mousson de Sud-Ouest.

On peut donc conclure de l'examen des valeurs de a_1 que, dans la variation diurne de la pression, le premier terme, celui de l'onde diurne, est produit, au moins en partie, par un phénomène relativement local, la variation diurne de la température; on comprend ainsi que ce terme puisse différer notablement dans des stations même rapprochées, pourvu que leur régime climatologique ne soit pas le même.

Pour le plus grand nombre des stations, les valeurs de a_1 et de ψ_1 présentent une variation annuelle bien nette et passent, dans le cours de l'année, par un seul maximum et un seul minimum. Il est donc légitime de les représenter, en fonction de la longitude l du Soleil, par une formule telle que

$$(a_1 \text{ ou } \psi_1) = m + p \sin l + q \cos l.$$

Nous donnons ci-dessous (Tableau III) les valeurs de m , p et q pour chaque station; mais, comme les valeurs de a_1 décroissent manifestement avec la pression moyenne, nous les avons ramenées à la pression uniforme de 760^{mm}, en multipliant les valeurs calculées par le rapport $\frac{760}{h}$, où h est la valeur moyenne de la pression dans la station. Cette réduction se justifie encore si l'on considère que, l'onde diurne étant produite par la variation de la température, son amplitude doit être sensiblement proportionnelle à la masse de l'air, ou à la pression. Nous avons du reste ajouté, à côté de chaque station, la valeur de la pression moyenne h et celle du rapport $\frac{760}{h}$, de sorte qu'il serait toujours aisé, s'il en était besoin, de retrouver les vraies valeurs de m , p et q .

Pour certaines stations, celles des Indes notamment, la marche annuelle de a_1 présente, comme nous l'avons déjà signalé, une discontinuité remarquable,

tenant à l'existence d'une saison sèche et d'une saison humide bien tranchées. Dans ce cas, les valeurs de m , p et q ont été calculées seulement au moyen des six mois de novembre à avril, qui correspondent à la saison sèche, au régime continental; ces nombres sont désignés dans le Tableau par des caractères spéciaux. De même, pour les stations des latitudes élevées, les valeurs de ψ , présentent fréquemment, dans le courant de l'année, un saut brusque; dans ce cas, nous n'avons pas, bien entendu, calculé la formule qui représente la variation annuelle de ψ , et nous avons seulement indiqué, par des caractères spéciaux, la valeur moyenne de ψ , qui correspond à la saison chaude, aux mois où cette valeur se rapproche de celle qui a été trouvée pour les stations où ψ varie d'une manière régulière; nous reviendrons du reste plus loin sur ces irrégularités.

Enfin, dans les stations qui sont les plus voisines de l'équateur, les valeurs de a , présentent, en plus de la variation annuelle simple qui leur est commune avec toutes les autres stations, une double variation annuelle, qui paraît correspondre aux deux passages du Soleil au zénith de la station. La marche annuelle de a , devrait donc être représentée, aux environs de l'équateur, par une formule telle que

$$a_1 = m + p \sin l + q \cos l + p' \sin 2l + q' \cos 2l,$$

dans laquelle p' et q' iraient rapidement en décroissant à mesure qu'on s'éloignerait de l'équateur. Mais les stations qui sont dans ce cas sont encore trop peu nombreuses pour que les valeurs de p' et q' , toujours très petites, puissent être déterminées exactement. Nous nous bornerons donc à signaler cette double variation, sans y insister davantage pour le moment.

TABLEAU III. — VARIATION ANNUELLE DE L'ONDE DIURNE : $(a_1 \text{ ou } \psi_1) = m + p \sin l + q \cos l$.

Station.	Pression		a_1 Valeurs ramenées à la pression de 760 ^{mm} .			ψ_1		
	moyenne	760	m .	p .	q .	m .	p .	q .
	h .	$\frac{760}{h}$.						
	mm		mm	mm	mm	°	°	°
1. Singapore.....	759,0	1,001	0,538	+0,0038	+0,0143	281,0	— 3,75	+ 3,19
2. Atlantique (2°30'N.)....	761,1	0,999	0,174	+0,0072	—0,0296	270,7	—24,49	— 5,33
3. Golfe du Bengale.....	758,9	1,001	0,313	+0,0198	+0,0171	264,0	— 5,07	—11,67
4. Batavia.....	758,7	1,002	0,625	+0,0497	—0,0710	295,2	+ 4,35	— 0,55
5. Atlantique (7°30'N.)....	761,0	0,999	0,157	—0,0527	+0,0319	260,0	—33,86	+ 3,63
6. Ascension.....	761,4	0,998	0,288	—0,0507	+0,1078	284,1	— 9,62	+20,62
7. Madras (1).....	758,0	1,003	0,637	+0,3481	+0,0163	267,3	+11,65	— 7,75
8. Sainte-Hélène.....	718,3	1,060	0,189	—0,0801	+0,0638	234,7	+ 4,84	+ 4,32
9. Bombay (1).....	757,1	1,004	0,653	+0,1397	+0,0106	244,6	— 0,64	+ 1,26
10. Mexico (1).....	586,8	1,295	1,061	+0,0673	+0,0922	283,0	+ 3,19	+ 1,11
11. Maurice.....	764,1	0,995	0,300	—0,0064	—0,0664	319,9	— 7,44	+ 8,84
12. Hong-Kong.....	760,2	1,000	0,434	—0,1192	+0,0834	266,4	— 6,89	—10,15
13. Calcutta (1).....	756,5	1,005	0,791	+0,1048	+0,0944	247,8	+ 5,04	— 4,71
14. La Havane.....	761,4	0,998	0,269	—0,0254	+0,0072	258,2	— 5,40	+ 5,85
15. Hazaribagh (1).....	705,8	1,077	0,623	+0,1873	+0,0531	251,4	— 1,03	+ 1,42
16. Allahabad (1).....	748,8	1,015	0,914	+0,2947	—0,0071	242,2	— 0,75	+ 0,91
17. Patna (1).....	752,3	1,010	1,073	+0,3967	—0,1182	250,3	— 2,64	— 0,46
18. Goalpara (1).....	747,6	1,017	1,115	+0,3626	—0,0739	243,6	—17,41	+ 9,11
19. Simla (1).....	588,9	1,291	0,710	+0,1047	—0,0249	180,2	— 4,15	— 8,17
20. Zi-Ka-Wei.....	763,0	0,996	0,272	—0,0326	+0,0052	278,5	—12,12	+ 2,09
21. Cordoba.....	723,7	1,050	1,074	—0,1818	—0,0927	298,7	+13,83	— 3,07
22. Le Cap.....	763,2	0,996	0,111	+0,0438	—0,0180	248,5	+ 1,80	—15,76
23. Tokio.....	761,1	0,999	0,435	—0,0410	+0,0253	291,9	— 6,68	— 0,13
24. San Fernando.....	761,4	0,998	0,106	+0,0760	—0,0511	190,6	+15,42	—28,00
25. Melbourne.....	759,3	1,001	0,281	—0,0551	—0,0046	291,0	— 8,77	+15,76
26. Lisbonne.....	754,6	1,007	0,112	—0,0070	—0,0442	255,3	— 3,78	+ 5,56
27. Washington (1).....	761,0	0,999	0,341	+0,2298	+0,0032	261,3	— 4,39	+ 2,69
28. Philadelphie.....	760,3	1,000	0,450	+0,0023	—0,0528	269,1	—12,88	+ 6,28
29. Pékin (1).....	759,0	1,001	0,967	+0,4648	+0,0132	272,1	—12,94	+ 5,42
30. Coïmbre.....	750,8	1,012	0,133	+0,0245	—0,0062	281,7	+34,72	+ 1,74
31. Madrid.....	706,7	1,075	0,450	+0,2574	—0,0549	260,1	+ 7,61	+ 6,25
32. Naples.....	748,1	1,016	0,089	+0,0007	—0,0158	284,8	—47,15	+14,56
33. Tiflis.....	724,7	1,049	0,655	+0,2627	—0,0808	292,3	— 2,21	+ 2,54
34. Albany.....	757,1	1,004	0,480	+0,1522	—0,0401	264,9	+ 2,07	+ 7,10
35. Perpignan.....	760,3	1,000	0,289	+0,0977	—0,0145	307,5	—19,96	+ 3,33
36. Hobarton.....	756,4	1,005	0,313	—0,1342	—0,0127	324,9	+ 4,22	— 8,21
37. Lesina.....	759,3	1,001	0,166	+0,1518	—0,0270	238,6	—38,08	+16,95
38. Marseille.....	754,6	1,007	0,177	+0,0071	—0,0134	243,0	—14,62	+ 6,97
39. Saint-Martin-de-Hinx.....	760,0	1,000	0,130	+0,0900	+0,0040	329,8	—14,59	— 0,55
40. Toulouse.....	745,7	1,019	0,285	+0,1005	—0,0105	294,6	—11,95	— 3,28
41. Toronto.....	752,4	1,010	0,411	+0,1836	+0,0032	248,1	—15,47	+ 5,39
42. Bukarest.....	754,1	1,008	0,325	+0,2006	—0,0416	271,9	—19,60	+ 9,34
43. Pola.....	758,2	1,002	0,130	+0,0596	—0,0173	234,2	—40,60	+22,16
44. Moncalieri.....	738,5	1,027	0,378	+0,1717	—0,0607	285,5	—14,99	+ 3,78
45. Milan.....	748,5	1,015	0,307	+0,1789	+0,0001	268,6	— 4,09	+ 8,71

(1) Les nombres en chiffres gras se rapportent seulement à la saison froide (de novembre à avril).

TABLEAU III (suite). — VARIATION ANNUELLE DE L'ONDE DIURNE.

	Pression moyenne h .	$\frac{760}{h}$.	a_1 . Valeurs ramenées à la pression 760 ^{mm} .			ψ_1 .		
			m .	p .	q .	m .	p .	q .
	mm		mm	mm	°	mm	°	°
46. Trieste.....	759,1	1,001	0,135	—0,0339	+0,0144	312,7	—36,05	— 3,26
47. Lyon (Saint-Genis).....	736,1	1,032	0,225	+0,1687	—0,0243	302,6	—35,88	+ 2,26
48. Lyon (Parc).....	747,3	1,017	0,285	+0,1667	+0,0006	281,1	— 6,49	— 0,12
49. Puy-de-Dôme.....	637,9	1,191	0,222	+0,0922	+0,0135	100,8	+22,81	— 5,23
50. Clermont-Ferrand ..	728,0	1,044	0,253	+0,1104	+0,0013	317,7	—16,57	— 4,74
51. Grand Saint-Bernard.....	564,0	1,348	0,227	+0,0891	+0,0035	55,0	+16,03	+ 3,00
52. Genève.....	726,8	1,046	0,311	+0,1915	+0,0077	284,1	+ 0,95	+ 1,35
53. Obir.....	594,2	1,279	0,153	+0,0939	+0,0463	79,0	+34,05	—10,79
54. Klagenfurt.....	722,3	1,052	0,623	+0,2192	+0,0125	294,7	— 4,61	+ 4,17
55. Poitiers.....	751,6	1,011	0,144	+0,1031	—0,0027	287,7	—23,05	+12,09
56. Nantes.....	760,3	1,000	0,130	+0,0821	—0,0174	307,3	—51,88	—47,55
57. Berne.....	712,3	1,067	0,245	+0,1226	—0,0065	315,0	—13,53	— 6,36
58. Sântis.....	564,0	1,348	0,263	+0,1444	+0,0035	80,8	+24,58	— 6,45
59. Kremsmunster.....	728,1	1,044	0,293	+0,2417	+0,0004	288,6	—21,03	+11,79
60. Munich.....	715,8	1,062	0,135	+0,1379	+0,0049	283,1	—23,73	+18,37
61. Vienne.....	744,1	1,021	0,240	+0,2087	—0,0099	288,1	—33,85	+ 9,02
62. Paris (Saint-Maur).....	757,8	1,003	0,184	+0,1610	+0,0127	284,2	—24,31	—19,26
63. Sainte-Honorine-du-Fay..	751,6	1,011	0,070	+0,0196	+0,0168	309,9	— 9,45	+ 5,00
64. Prague.....	744,0	1,021	0,274	+0,2074	—0,0479	273,4	— 4,84	+ 5,51
65. Falmouth.....	755,4	1,006	0,142	+0,0217	—0,0262	115,0	+ 6,03	— 7,56
66. Bruxelles.....	756,4	1,005	0,090	+0,0263	—0,0054	(¹)263,0	»	»
67. Nertchinsk.....	705,2	1,078	0,464	+0,3726	+0,0306	297,0	—36,05	+ 0,67
68. Leipzig.....	751,2	1,012	0,173	+0,1359	—0,0192	(¹)255,0	»	»
69. Kew.....	759,9	1,000	0,121	+0,0890	0,0000	(¹)303,1	»	»
70. Greenwich.....	756,3	1,005	0,087	+0,0541	+0,0411	(¹)281,7	»	»
71. Oxford.....	754,9	1,007	0,140	+0,0572	+0,0530	(¹)312,2	»	»
72. Valencia.....	758,9	1,001	0,135	+0,0534	—0,0105	115,6	—12,68	—17,54
73. Utrecht.....	760,2	1,000	0,048	—0,0036	—0,0036	(¹)273,3	»	»
74. Amsterdam.....	760,0	1,000	0,107	—0,0032	—0,0439	85,8	+47,22	—13,78
75. Magdebourg.....	756,3	1,005	0,178	+0,1239	+0,0358	(¹)272,8	»	»
76. Groningue.....	759,2	1,001	0,098	+0,0109	+0,0047	108,6	+ 8,73	— 8,82
77. Barnaoul.....	749,3	1,014	0,136	+0,0454	+0,0306	218,7	— 0,06	— 0,36
78. Liverpool (Bidston).....	759,7	1,000	0,058	+0,0297	+0,0369	(¹)278,5	»	»
79. Hambourg.....	758,7	1,002	0,077	+0,0331	+0,0496	(¹)279,9	»	»
80. Stonyhurst.....	749,5	1,014	0,086	+0,0378	+0,0255	(¹)313,9	»	»
81. Swinemunde.....	760,0	1,000	0,097	—0,0228	+0,0061	(¹)207,5	»	»
82. Armagh.....	753,4	1,009	0,078	+0,0322	+0,0151	(¹)321,3	»	»
83. Keitum.....	759,2	1,001	0,147	+0,0584	+0,0146	76,3	+15,70	+ 6,09
84. Moscou.....	746,9	1,018	0,103	+0,0282	+0,0168	(¹)261,0	»	»
85. Glasgow.....	753,1	1,009	0,196	+0,0306	+0,0447	315,1	»	»
86. Catherinbourg.....	735,6	1,033	0,142	+0,0570	+0,0402	(¹)304,9	»	»
87. Nouvelle-Arkhangelsk....	755,3	1,006	0,082	+0,0420	+0,0181	150,1	—55,63	—14,28
88. Aberdeen.....	755,6	1,006	0,095	— 0,0366	—0,0245	72,6	—12,36	+ 8,79
89. Upsal.....	757,1	1,004	0,096	+0,0486	—0,0032	(¹)284,5	»	»
90. Saint-Péterbourg.....	758,7	1,002	0,063	—0,0029	—0,0052	154,1	+89,23	— 6,55
91. Helsingfors.....	757,6	1,003	0,087	—0,0340	+0,0154	126,6	+63,85	+ 6,55

(1) Valeurs moyennes pour les mois de la saison chaude où la valeur de ψ_1 paraît régulière.

Malgré leur apparente variabilité, les nombres du Tableau précédent peuvent cependant, par leur comparaison, conduire à des lois assez simples pour la variation annuelle de l'onde diurne.

La formule qui représente cette variation,

$$(a_1 \text{ ou } \psi_1) = m + p \sin l + q \cos l,$$

peut être mise sous la forme, plus commode pour la discussion,

$$(a_1 \text{ ou } \psi_1) = m + r \cos(l + \xi),$$

en posant

$$r = \sqrt{p^2 + q^2}, \quad \tan \xi = \frac{-p}{q};$$

r est alors l'amplitude de la variation annuelle de a_1 ou de ψ_1 , et ξ la phase de cette variation, de manière que a_1 ou ψ_1 seront maxima pour $l = 360^\circ - \xi$.

Pour calculer r et ξ , il est bon de grouper d'abord les stations en réunissant celles qui sont à peu près à la même latitude et dans les mêmes conditions géographiques; pour chacun de ces groupes, on calculera les valeurs moyennes de m , p et q , et l'on en déduira ensuite les valeurs de r et ξ débarrassées, autant que possible, des perturbations. Nous avons formé ainsi les groupes suivants pour étudier la variation annuelle de l'amplitude a_1 :

Stations continentales.

- I. Madras, Bombay, Mexico, Calcutta, Hazaribagh.
- II. Allahabad, Patna, Goalpara, Simla, Cordoba.
- III. Washington, Pékin, Madrid, Tiflis, Albany.
- IV. Toronto, Bukarest, Moncalieri, Milan.
- V. Lyon (Saint-Genis et Parc), Clermont-Ferrand, Genève, Berne.
- VI. Kremsmunster, Munich, Vienne, Prague, Leipzig.
- VII. Leipzig, Magdebourg, Barnaoul, Moscou, Catherinbourg.

Stations de montagne.

- VIII. Puy-de-Dôme, Saint-Bernard, Sântis, Obir.

Stations maritimes.

- IX. Ascension, Sainte-Hélène, Maurice.
- X. San Fernando, Melbourne, Lisbonne, Coïmbre, Saint-Martin-de-Hinx.
- XI. Naples, Lesina, Marseille, Pola, Trieste.
- XII. Nantes, Falmouth, Valencia.

Au moyen des nombres donnés dans le Tableau III pour a_1 , nous avons calculé pour chacun de ces groupes les valeurs moyennes de m , p et q , et enfin celles de

r et ξ : pour les stations de l'hémisphère Sud, on a, bien entendu, changé les signes de p et de q avant de les faire entrer dans les moyennes. Nous avons ainsi obtenu les valeurs suivantes :

Groupes.	Latitude moyenne.	m .	p .	q .	r .	ξ .
<i>Stations continentales.</i>						
I.....	19,6	0,754	+0,1678	+0,0533	0,176	288
II.....	27,9	0,977	+0,2681	-0,0263	0,269	264
III.....	40,7	0,619	+0,2734	-0,0315	0,275	263
IV.....	44,6	0,355	+0,1837	-0,0247	0,185	262
V.....	46,1	0,264	+0,1520	-0,0042	0,152	268
VI.....	49,2	0,223	+0,1863	-0,0143	0,187	266
VII.....	53,9	0,146	+0,0781	+0,0208	0,081	285
<i>Stations de montagne.</i>						
VIII.....	46,4	0,216	+0,1049	+0,0099	0,105	275
<i>Stations maritimes.</i>						
IX.....	14,6	0,259	+0,0457	-0,0351	0,058	233
X.....	39,4	0,152	+0,0477	-0,0186	0,051	249
XI.....	43,6	0,139	+0,0371	-0,0118	0,039	252
XII.....	49,8	0,136	+0,0524	-0,0180	0,055	251

La considération de ces nombres conduit aux lois suivantes :

Les valeurs de m décroissent régulièrement de l'équateur vers les latitudes élevées, aussi bien dans les stations continentales que dans les stations maritimes. L'exception présentée par le groupe I s'explique facilement par ce fait que dans ce groupe figurent des stations trop voisines de la mer pour que, même en hiver, elles puissent être considérées comme vraiment continentales. De plus, à latitude égale, les valeurs de m sont beaucoup plus faibles dans les stations maritimes que dans les stations continentales.

La valeur de r , dans les stations continentales, augmente d'abord depuis l'équateur jusque vers la latitude de 35°, puis décroît ensuite; dans les stations maritimes, cette valeur est trop petite et trop peu certaine pour qu'on puisse assurer que la même loi existe; on peut seulement la considérer comme probable par analogie. A latitude égale, les valeurs de r sont beaucoup plus faibles dans les stations maritimes que dans les stations continentales.

La valeur de ξ , dans les stations continentales, paraît constante; il faut, en effet, comme nous venons de le dire, excepter le groupe I, et, si l'on se reporte aux nombres du Tableau I, on verra que la marche annuelle de a , dans les stations qui composent le groupe VII est très irrégulière, ce qui explique la divergence de la valeur de ξ qui correspond à ce groupe. On peut donc admettre que

la valeur de ξ est constante pour les stations continentales et égale à 265° . Pour les stations maritimes, ξ paraît aussi constant; en effet, les seules stations réellement maritimes sont celles du groupe IX; celles des trois autres groupes sont des stations côtières et qui doivent donner, par suite, des nombres intermédiaires entre ceux des stations maritimes et ceux des stations continentales, ce que l'on vérifie en effet. On doit donc admettre encore que ξ est constant pour toutes les stations maritimes, et que sa valeur est voisine de 235° . Le maximum de l'amplitude de l'onde diurne, qui se produit à l'époque pour laquelle on a $l + \xi = 360^\circ$, a donc lieu pour $l = 95^\circ$ dans les stations continentales, et pour $l = 125^\circ$ dans les stations maritimes; ces nombres correspondent respectivement comme dates au 26 juin pour les stations continentales, et au 28 juillet pour les stations maritimes de l'hémisphère Nord; pour l'hémisphère Sud, les phases sont inverses et c'est le minimum d'amplitude de l'onde diurne qui se produit vers le 26 juin ou le 28 juillet respectivement pour les stations continentales ou maritimes de cet hémisphère.

Passons maintenant aux valeurs de ψ_1 , c'est-à-dire aux phases de l'onde diurne et à leur variation annuelle. Pour les étudier, nous avons, comme nous avons fait précédemment pour les amplitudes α_1 , réuni les stations en groupes, qui sont les suivants :

Stations continentales.

- I. Bombay, Calcutta, Hazaribagh, Allahabad, Patna, Goalpara.
- II. Zi-Ka-Wei, Cordoba, Washington, Philadelphie, Pékin, Madrid.
- III. Tiflis, Albany, Perpignan, Toulouse, Toronto, Bukarest.
- IV. Moncalieri, Milan, Lyon (Saint-Genis et Parc), Clermont-Ferrand, Genève.
- V. Klagenfurt, Poitiers, Kremsmunster, Munich, Vienne, Paris.

Stations de montagne.

- VI. Puy-de-Dôme, Grand Saint-Bernard, Obir, Säntis.

Stations maritimes.

- VII. Singapore, Atlantique ($2^\circ 30'$ et $7^\circ 30'$ N.), Golfe du Bengale, Batavia.
- VIII. Ascension, Sainte-Hélène, Maurice, Hong-Kong, La Havane.
- IX. Le Cap, Tokio, Lisbonne, Coïmbre, Naples.
- X. Hobarton, Lesina, Marseille, Saint-Martin-de-Hinx, Pola, Trieste.
- XI. Falmouth, Valencia, Amsterdam, Groningue, Armagh, Nouvelle-Arkhangelsk, Aberdeen.

Comme la différence entre les stations maritimes et continentales est ici beaucoup moins tranchée que pour les amplitudes, nous avons pu utiliser un plus grand nombre de stations. Au moyen des nombres donnés dans le Tableau III,

nous avons calculé pour chacun de ces groupes les valeurs moyennes de m , p et q , et enfin celles de r et ξ , et nous avons obtenu ainsi les valeurs suivantes :

Groupes.	Latitude moyenne.	m .	p .	q .	r .	ξ .
<i>Stations continentales.</i>						
I.....	23,8	246,7	— 2,91	+1,26	3,16	67°
II.....	36,9	273,3	— 8,09	+4,30	9,16	62
III.....	43,1	279,9	—11,19	+4,07	11,90	70
IV.....	45,7	289,9	—12,85	+1,87	12,98	82
V.....	47,8	287,7	—21,76	+6,03	22,58	75
<i>Stations de montagne.</i>						
VI.....	46,4	78,9	+24,37	—4,87	24,85	259
<i>Stations maritimes.</i>						
VII.....	4,5	274,2	—14,30	—1,92	14,43	98
VIII.....	17,9	272,7	— 0,01	—7,62	7,62	180
IX.....	38,1	272,4	— 4,94	+7,50	8,98	33
X.....	43,9	280,5	—24,69	+8,41	26,09	71
XI.....	53,8	103,4	— 0,43	—6,73	6,74	176

Dans la discussion de ces nombres, il sera utile de se rappeler qu'une variation de 15° dans les valeurs de m et de r ne correspond qu'à une heure de temps, et que, par conséquent, on ne peut espérer, même dans les cas les plus favorables, que ces valeurs puissent être déterminées à plus de 2° ou 3° près.

Considérons d'abord seulement les stations continentales; pour toutes ces stations, la valeur de m paraît sensiblement constante. En effet, le nombre qui correspond au premier groupe, obtenu seulement par les observations faites en hiver et dans des points qui sont voisins de la mer, est certainement trop faible; on peut donc admettre que, dans les stations continentales jusque vers la latitude 45°, la valeur de m est constante et voisine de 280°. Cela signifie que le maximum de l'onde diurne se produit en moyenne à 360° — 280° = 80°, ou 5^h 20^m du matin.

La valeur de r augmente régulièrement à partir de l'équateur, où elle paraît nulle. Quant à la phase ξ , on peut admettre qu'elle est constante et voisine de 73°. La phase de l'onde diurne, pour une station continentale quelconque comprise entre l'équateur et 45° ou 50° de latitude, peut donc être représentée par l'expression

$$\psi_1 = 280^\circ + r \cos(l + 73^\circ),$$

dans laquelle r est une fonction qui est nulle à l'équateur et croît avec la latitude. Cette fonction paraît être, au moins approximativement, de la forme

$$r = K \tan \lambda,$$

λ étant la latitude; la valeur de K , déterminée par les groupes II, III et IV, qui sont bien concordants, serait

$$K = 12^{\circ}, 6.$$

Il est bien entendu que toutes ces valeurs ne sont que des moyennes et que, dans chaque station en particulier, la phase et l'amplitude de l'onde peuvent être influencées dans une grande mesure, aussi bien dans leur valeur absolue que dans leur variation annuelle, par les causes locales dont nous avons déjà parlé.

Pour les stations de montagne, ce qui frappe surtout, c'est la grande différence de la phase de l'onde diurne par rapport à la phase des stations continentales. Tandis que, dans ces dernières, la phase moyenne est de 280° , ce qui place le maximum de l'onde diurne à $5^{\text{h}}20^{\text{m}}$ du matin, dans les stations de montagne la phase est de 79° ; le maximum se produit donc à 281° ou $18^{\text{h}}44^{\text{m}}$ et le minimum à $6^{\text{h}}44^{\text{m}}$ du matin; il y a donc inversion presque complète entre les phases de l'onde diurne dans les régions basses et au sommet des montagnes. Ce phénomène est bien connu et s'explique aisément : pendant la nuit, l'air, en se refroidissant, se condense dans les régions inférieures, tandis qu'il se dilate pendant la journée; la masse d'air comprise entre les plans de la région inférieure et du sommet est donc plus grande pendant la nuit et plus petite pendant le jour; par suite, celle qui reste au-dessus de la montagne et qui y produit la pression est la plus petite vers le moment du minimum de la température et la plus grande vers le moment du maximum.

Quant aux stations maritimes, nous considérerons d'abord celles dont la latitude ne dépasse pas 45° ou 50° (groupes VII, VIII, IX et X). Pour ces stations, la valeur de m paraît sensiblement constante et égale à 275° , peu différente, par conséquent, de la valeur correspondante pour les stations continentales. Les quantités r et ξ varient tellement qu'il est impossible de les déterminer exactement; la valeur moyenne de ξ n'est peut-être pas très éloignée de 90° .

Au-dessus de 50° , se produit une inversion tout à fait analogue à celle que nous avons indiquée pour les stations de montagne : de 275° en moyenne pour les quatre premiers groupes de stations maritimes, la phase devient 103° pour le dernier groupe. L'échauffement diurne, considérable dans les régions équatoriales et moyennes, y produit une sorte de gonflement, d'intumescence dans l'atmosphère, et l'air se déverse alors sur les latitudes élevées, produisant un courant descendant et une augmentation de pression. Dans les latitudes supérieures à 50° , aussi bien dans les stations maritimes que continentales, l'onde diurne est donc en réalité le résultat de l'interférence de deux ondes distinctes : l'onde normale produite par la variation diurne de la température, et qui a son maximum vers l'heure du lever du Soleil, et une onde accessoire dont la phase est presque exactement opposée et qui est produite par le déversement de l'air

provenant des latitudes plus basses. Dans les régions continentales et en été, la première onde paraît conserver la prédominance jusque vers la latitude de 60° ; c'est la seconde, au contraire, qui est la plus grande en toute saison à partir de 50° dans les stations maritimes, où la variation diurne de la température et l'onde résultante sont faibles. On conçoit, du reste, que l'interférence de ces deux ondes, dont les phases sont presque opposées, produise une onde résultante dont la phase puisse varier beaucoup, comme on le remarque dans les nombres du Tableau II.

Si maintenant on se reporte aux nombres de la page B. 302, qui donnent les valeurs moyennes m de l'amplitude de l'onde diurne, on voit que, par suite de l'interférence des deux ondes dont nous venons de parler, les valeurs de m doivent décroître avec la latitude beaucoup plus vite qu'il ne conviendrait si l'on n'avait qu'une seule onde produite par l'échauffement diurne. En tenant compte de ce fait, on remarque que les valeurs de m qui correspondent à la première onde, celle qui est produite par la variation diurne de la température, semblent varier très sensiblement comme le carré du cosinus de la latitude, de sorte que l'on peut poser

$$m = m_0 \cos^2 \lambda.$$

La valeur de m_0 déduite des quatre premiers groupes de stations continentales serait $1^{\text{mm}}, 047$; les trois premiers groupes de stations maritimes donnent de même pour m_0 la valeur $0^\circ, 267$.

Il resterait à reprendre l'étude de toutes les stations en particulier, pour y chercher l'influence des situations géographiques spéciales sur l'onde diurne; nous nous bornerons, pour le moment, aux généralités qui précèdent; les études détaillées de tous les cas, qui entraîneraient ici beaucoup trop loin, pourront faire l'objet de travaux spéciaux.

2° Onde semi-diurne.

Nous avons étudié l'onde semi-diurne $a_2 \cos(2m + \psi_2)$ au moyen des mêmes stations que l'onde diurne; on trouvera dans les Tableaux suivants (Tableaux IV et V) les valeurs des amplitudes a_2 et des phases ψ_2 rapportées au temps vrai pour toutes ces stations et chacun des douze mois :

TABLEAU IV. — ONDE SEMI-DIURNE $a_2(\cos 2m + \psi_2)$.Valeurs de a_2 .

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1. Singapore.....	0,945	1,026	1,053	1,067	0,972	0,866	0,845	0,891	1,014	1,071	1,057	1,051
2. Atlantique (2°30' N.)..	897	0,848	0,871	0,897	853	734	706	759	0,793	0,772	0,876	0,864
3. Golfe du Bengale.....	1,057	968	983	924	897	886	757	879	836	900	996	965
4. Batavia.....	0,962	978	995	1,002	957	902	891	944	1,009	1,041	1,019	985
5. Atlantique (7°30' N.)..	930	810	820	0,902	843	752	716	686	0,777	0,762	0,889	866
6. Ascension.....	660	724	797	787	738	668	663	699	719	769	686	648
7. Madras.....	1,134	1,142	1,177	1,196	1,139	976	1,023	1,068	1,138	1,140	1,138	1,135
8. Sainte-Hélène.....	0,795	0,761	0,818	0,770	0,721	658	0,660	0,697	0,760	0,798	0,786	0,769
9. Bombay.....	1,090	1,118	1,069	986	892	813	737	828	958	1,031	1,085	1,090
10. Mexico.....	0,811	0,877	0,856	838	746	671	687	708	791	0,796	0,819	0,830
11. Maurice.....	706	747	766	744	740	702	711	731	781	798	743	700
12. Hong-Kong.....	876	864	912	892	762	665	698	726	777	871	899	874
13. Calcutta.....	1,044	1,075	1,109	1,078	978	854	856	944	1,016	999	1,014	1,013
14. La Havane.....	0,795	0,785	0,716	0,645	533	529	533	559	0,619	681	0,724	0,754
15. Hazaribagh.....	935	995	1,022	837	900	736	757	824	969	796	819	894
16. Allahabad.....	895	932	0,969	958	815	784	775	893	956	925	919	916
17. Patna.....	1,017	984	1,060	983	948	881	853	938	974	919	961	954
18. Goalpara.....	1,074	1,140	1,176	1,071	990	889	879	975	1,046	1,027	1,085	1,089
19. Simla.....	1,077	1,120	1,115	1,146	1,044	1,003	1,034	1,052	1,024	1,074	1,067	1,110
20. Zi-Ka-Wei.....	0,577	0,600	0,657	0,680	0,574	0,502	0,494	0,520	0,573	0,591	0,582	0,591
21. Cordoba.....	429	437	378	362	397	361	421	516	552	492	506	518
22. Le Cap.....	494	514	506	474	470	487	497	534	551	548	503	506
23. Tokio.....	654	625	654	599	528	443	436	505	552	545	585	639
24. San Fernando.....	431	454	460	432	391	383	418	440	453	455	436	420
25. Melbourne.....	577	579	640	546	500	503	533	538	546	597	612	574
26. Lisbonne.....	444	487	496	452	373	371	377	429	464	457	434	448
27. Washington.....	498	500	527	481	429	389	411	389	454	503	487	478
28. Philadelphie.....	457	478	544	518	511	414	368	427	490	546	434	401
29. Pékin.....	576	612	694	663	584	463	374	423	464	554	569	529
30. Coïmbre.....	424	481	505	457	417	404	390	444	476	465	416	404
31. Madrid.....	428	479	514	462	418	388	396	425	475	446	421	420
32. Naples.....	289	339	357	365	289	277	294	328	365	350	321	308
33. Tiflis.....	343	356	394	412	386	350	367	414	423	413	352	318
34. Albany.....	396	410	395	417	337	381	306	331	394	395	347	364
35. Perpignan.....	383	396	413	353	329	318	307	334	376	406	381	358
36. Hobarton.....	555	507	534	520	476	459	490	520	597	564	513	449
37. Lesina.....	255	315	341	332	302	308	286	311	343	324	306	270
38. Marseille.....	268	264	254	203	212	199	161	181	259	202	209	293
39. Saint-Martin-de-Hinx..	322	388	418	387	348	314	324	371	411	403	357	324
40. Toulouse.....	303	379	314	313	349	315	292	307	342	322	260	273
41. Toronto.....	288	412	373	403	326	294	290	313	322	301	284	320
42. Bukarest.....	266	291	328	355	368	330	271	327	330	312	279	283
43. Pola.....	260	269	341	318	282	270	265	286	290	318	258	239
44. Moncalieri.....	363	403	453	420	400	341	344	382	423	392	347	349
45. Milan.....	298	347	378	358	303	286	294	309	323	324	305	289

TABLEAU IV (suite). — ONDE SEMI-DIURNE.

Valeurs de a_2 .

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
46. Trieste.....	0,274	0,259	0,326	0,322	0,284	0,286	0,254	0,266	0,310	0,286	0,277	0,265
47. Lyon (Saint-Genis).....	291	315	341	309	318	310	285	318	336	315	287	272
48. Lyon (Pare).....	323	325	372	350	314	316	295	327	347	344	359	316
49. Puy-de-Dôme.....	158	213	216	220	227	213	220	220	254	218	223	209
50. Clermont-Ferrand.....	209	325	339	289	305	284	276	276	329	307	264	273
51. Grand Saint-Bernard.....	167	167	181	192	167	155	160	156	186	189	143	181
52. Genève.....	278	343	347	318	290	273	277	321	367	378	320	283
53. Obir.....	186	213	248	237	259	245	214	262	238	237	200	184
54. Klagenfurt.....	227	288	347	258	256	251	336	269	274	242	211	240
55. Poitiers.....	253	274	301	309	277	257	240	277	313	315	254	208
56. Nantes.....	269	355	366	306	271	243	199	219	268	307	313	338
57. Berne.....	186	205	267	267	240	228	208	225	260	257	206	196
58. Sântis.....	161	163	183	158	154	197	170	167	202	201	154	175
59. Kremsmunster.....	268	248	305	293	275	253	250	264	264	300	289	280
60. Munich.....	207	227	280	292	275	259	249	255	283	270	212	211
61. Vienne.....	268	312	345	357	297	290	262	295	325	337	295	309
62. Paris (Saint-Maur).....	280	304	363	338	292	262	280	309	331	346	266	265
63. Sainte-Honorine-du-Fay....	224	229	291	236	214	308	147	203	254	252	196	196
64. Prague.....	191	219	242	260	224	192	197	187	253	267	267	191
65. Falmouth.....	250	277	301	252	246	213	224	243	274	276	260	277
66. Bruxelles.....	203	256	295	282	255	261	241	251	269	257	232	188
67. Nertchinsk.....	270	329	407	403	350	322	276	318	363	363	275	214
68. Leipzig.....	161	199	244	273	223	206	213	228	267	216	205	160
69. Kew.....	251	259	317	299	266	241	224	259	287	270	246	247
70. Greenwich.....	200	256	280	271	226	215	210	244	271	265	215	204
71. Oxford.....	170	277	292	287	249	244	218	274	277	256	236	218
72. Valencia.....	233	276	270	220	222	199	203	213	247	249	265	209
73. Utrecht.....	180	249	247	237	208	188	203	215	247	264	225	204
74. Amsterdam.....	193	221	276	250	212	201	171	218	198	244	200	196
75. Magdebourg.....	200	255	298	285	251	215	214	242	277	236	217	142
76. Groningue.....	178	244	240	222	219	223	180	215	241	237	230	180
77. Barnaoul.....	066	080	111	095	118	096	096	126	161	158	101	069
78. Liverpool (Bidston).....	204	206	255	253	197	184	169	202	236	233	200	186
79. Hambourg.....	171	187	248	260	225	180	181	207	231	230	202	158
80. Stonyhurst.....	228	234	268	267	223	209	190	231	258	251	214	198
81. Swinemunde.....	148	192	218	235	174	171	173	190	228	212	171	143
82. Armagh.....	198	238	253	253	215	192	200	221	248	264	213	199
83. Keitum.....	185	147	205	197	163	141	144	142	164	184	179	137
84. Moscou.....	082	064	109	109	138	097	078	087	085	076	082	057
85. Glasgow.....	204	217	239	253	209	184	173	210	246	236	197	175
86. Catherinbourg.....	044	094	131	105	124	101	097	112	108	099	048	049
87. Nouvelle-Arkhangelsk.....	109	114	121	117	091	071	051	077	099	108	119	120
88. Aberdeen.....	183	192	197	216	180	163	171	188	199	185	163	130
89. Upsal.....	126	109	145	155	136	134	130	137	167	146	110	101
90. Saint-Petersbourg.....	062	076	088	088	082	069	066	073	089	094	077	067
91. Helsingfors.....	088	111	135	135	085	098	097	105	133	104	097	105

TABLEAU V. — ONDE SEMI-DIURNE : $\alpha_2 \cos(2m + \psi_2)$.*Valeurs de ψ_2 (temps vrai).*

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1. Singapore	71,3	69,0	66,8	62,6	62,9	64,6	64,8	65,4	65,4	66,8	66,3	66,9
2. Atlantique (2°30' N.)....	73,2	74,9	68,8	68,2	63,9	60,2	61,9	65,7	68,2	71,5	67,7	70,7
3. Golfe du Bengale.....	73,2	74,0	71,0	70,5	73,2	68,1	68,3	69,1	73,2	71,5	71,9	76,3
4. Batavia	69,1	69,6	68,7	68,0	67,5	68,3	68,5	69,8	70,4	69,5	69,3	69,0
5. Atlantique (7°30' N.)....	76,0	77,6	73,9	64,6	63,0	64,1	61,6	69,0	65,8	71,1	69,9	75,2
6. Ascension	72,5	68,7	73,3	67,6	65,6	65,3	63,1	64,8	69,5	70,3	68,6	71,0
7. Madras	74,9	72,6	67,2	64,6	62,9	62,2	64,9	65,4	69,8	70,2	70,2	71,2
8. Sainte-Hélène	75,7	67,3	65,1	61,6	61,2	64,5	65,8	64,9	62,1	61,9	61,6	65,7
9. Bombay	73,4	71,6	67,7	62,9	61,5	59,2	59,7	63,4	64,6	70,5	71,2	70,3
10. Mexico	73,6	69,9	70,9	67,2	63,7	61,4	65,1	64,5	66,2	67,3	68,1	71,1
11. Maurice	76,7	75,2	73,6	74,2	72,2	72,6	72,9	73,5	74,0	73,5	72,6	73,0
12. Hong-Kong	67,4	66,6	61,7	56,1	52,4	52,2	53,9	54,7	60,4	63,9	67,2	69,0
13. Calcutta	67,4	63,7	60,9	56,6	56,5	56,6	57,2	56,3	58,7	64,0	67,3	67,2
14. La Havane	73,1	74,0	72,5	68,2	67,6	66,9	65,1	67,0	65,5	66,3	68,1	73,0
15. Hazaribagh	59,4	57,7	64,2	56,3	50,9	54,9	56,7	54,2	55,7	54,0	49,2	56,0
16. Allahabad	69,0	67,6	61,7	62,5	59,2	55,9	60,7	55,8	60,0	64,9	69,8	66,2
17. Patna	68,7	67,6	67,5	61,4	58,8	62,4	56,8	58,1	59,7	66,1	65,7	67,9
18. Goalpara	67,1	71,6	65,3	60,6	52,3	53,6	58,5	56,2	51,9	57,7	58,0	58,1
19. Simla	50,3	50,3	47,3	45,1	43,3	43,3	46,8	49,5	49,3	49,0	47,7	50,4
20. Zi-Ka-Wei	82,5	75,1	64,6	61,9	59,7	61,0	59,6	61,8	65,9	72,0	75,6	80,8
21. Cordoba	47,2	56,1	66,5	74,5	83,8	85,3	89,3	81,4	73,5	63,9	57,8	52,9
22. Le Cap	71,2	71,0	72,6	69,4	72,2	73,8	73,1	76,6	75,7	72,4	69,8	66,0
23. Tokio	94,6	90,1	82,2	71,1	68,9	69,9	70,6	74,6	77,0	80,1	86,2	94,1
24. San Fernando	67,8	66,2	59,2	49,5	48,2	47,9	47,7	46,7	51,2	57,9	61,7	65,7
25. Melbourne	76,7	79,2	82,6	72,4	79,7	77,0	82,0	78,4	76,2	75,1	77,4	73,9
26. Lisbonne	72,0	67,6	64,5	60,3	59,7	60,5	58,9	61,1	62,3	63,9	64,1	67,6
27. Washington	90,3	85,7	75,6	77,2	67,3	64,3	65,6	61,2	65,4	72,2	73,8	88,7
28. Philadelphie	92,9	75,4	86,5	77,3	75,8	69,8	50,7	65,7	67,8	78,1	77,7	81,2
29. Pékin	70,7	69,0	58,3	50,8	47,2	48,6	47,2	48,2	50,7	51,2	60,0	63,5
30. Coïmbre	69,2	67,6	67,0	63,4	66,4	64,9	66,2	67,7	68,1	64,9	63,3	64,0
31. Madrid	72,6	65,8	64,0	62,6	60,9	59,7	62,1	60,9	61,6	63,7	66,1	65,8
32. Naples	69,2	64,8	53,5	49,4	48,7	47,1	49,3	50,1	48,9	50,4	54,7	59,6
33. Tiflis	77,9	75,4	71,8	65,5	63,3	66,7	62,3	63,0	62,7	65,3	70,7	74,0
34. Albany	82,0	85,9	80,3	69,3	67,4	66,2	63,3	62,1	66,3	67,7	77,6	78,6
35. Perpignan	76,3	72,2	65,1	62,5	59,0	55,0	53,1	57,2	63,9	64,6	70,1	70,5
36. Hobarton	89,9	89,5	82,0	81,1	77,5	82,5	82,5	88,4	85,2	89,7	89,5	91,8
37. Lesina	65,0	55,7	43,6	40,8	38,8	36,1	32,0	35,1	36,8	42,5	51,3	48,4
38. Marseille	40,8	39,0	32,3	30,4	41,3	44,2	61,6	55,3	30,8	34,3	43,1	36,5
39. Saint-Martin-de-Hinx	71,4	67,5	62,5	55,9	53,5	52,5	54,6	56,0	59,0	64,0	69,0	71,1
40. Toulouse	83,8	66,3	71,5	70,3	66,5	64,5	53,1	61,5	61,8	69,6	70,2	70,0
41. Toronto	95,1	88,6	80,1	80,7	69,2	73,0	65,1	64,0	73,8	73,9	81,9	89,3
42. Bukarest	62,4	59,2	57,5	40,8	48,4	45,5	49,0	50,0	45,4	41,2	50,2	58,7
43. Pola	48,7	46,5	44,5	35,6	33,9	28,9	28,4	30,5	33,4	40,6	45,3	46,5
44. Moncalieri	66,6	61,8	58,2	55,3	53,3	57,4	51,9	55,6	52,9	56,1	62,4	61,1
45. Milan	64,5	69,7	61,8	55,7	51,7	52,5	54,5	52,2	46,6	42,5	45,2	55,7

TABLEAU V (suite). — ONDE SEMI-DIURNE.

Valeurs de ψ_2 (temps vrai).

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
46. Trieste	57,0	53,7	47,7	42,2	35,2	37,5	40,1	32,7	44,5	43,5	44,2	48,5
47. Lyon (Saint-Genis).....	62,7	60,5	58,1	60,2	55,3	57,0	60,9	52,4	52,0	60,4	54,5	62,5
48. Lyon (Pare).....	65,0	70,6	59,7	60,3	55,6	54,5	55,8	54,7	56,3	52,3	55,7	62,9
49. Puy-de-Dôme.....	57,7	51,2	42,0	38,7	38,1	41,1	42,3	34,3	40,1	41,3	47,2	59,9
50. Clermont-Ferrand	75,3	67,9	65,4	63,5	59,1	56,3	59,4	56,3	57,4	64,2	57,0	54,3
51. Grand Saint-Bernard	61,3	59,8	47,5	33,0	35,4	35,2	41,4	32,9	39,2	42,1	45,2	45,1
52. Genève.....	75,6	71,4	70,3	63,7	57,5	53,8	58,2	63,3	63,4	64,8	74,4	62,7
53. Obir	46,8	40,1	40,5	22,8	20,6	28,5	30,0	19,9	24,5	34,2	45,0	45,4
54. Klagenfurt.....	89,9	77,8	68,3	62,5	60,3	67,1	60,8	63,7	59,6	57,0	71,1	74,3
55. Poitiers.....	75,1	63,2	63,8	65,7	58,9	51,3	52,8	52,8	57,0	65,2	66,5	52,3
56. Nantes	61,4	71,8	64,5	65,5	63,9	62,5	63,4	67,1	60,4	66,3	65,7	72,7
57. Berne	62,7	58,5	58,4	55,7	57,3	56,8	55,4	51,6	55,9	57,0	54,6	58,3
58. Sântis	62,8	54,3	50,6	40,9	43,8	35,9	45,9	39,4	47,0	48,4	42,8	65,0
59. Kremsmunster.....	66,0	65,9	56,1	61,3	51,8	47,6	40,8	55,9	41,9	57,8	55,4	66,7
60. Munich.....	75,9	59,8	62,2	58,5	54,6	51,4	52,3	53,5	54,2	58,6	63,3	66,9
61. Vienne	60,4	56,0	58,7	49,4	44,9	45,0	48,8	48,6	47,7	50,3	51,3	56,5
62. Paris (Saint-Maur).....	71,6	69,8	68,0	62,8	59,6	62,5	55,4	56,4	62,8	64,4	69,0	65,0
63. Sainte-Honorine-du-Fay ...	68,8	60,9	58,2	51,9	42,8	63,7	50,8	51,5	50,6	52,7	52,5	47,2
64. Prague	65,7	62,6	58,4	58,0	52,9	45,7	43,4	52,0	54,4	52,5	52,2	58,6
65. Falmouth.....	65,1	60,8	58,3	56,1	50,7	51,8	53,0	52,9	54,5	57,3	58,9	67,4
66. Bruxelles.....	74,0	65,4	57,7	57,9	55,2	58,9	58,0	54,6	53,4	64,8	60,7	57,7
67. Nertchinsk	87,8	82,6	71,4	66,6	68,9	68,5	72,2	72,5	70,3	68,9	68,9	81,8
68. Leipzig.....	54,7	51,3	53,2	44,3	43,3	43,4	38,2	47,5	42,0	49,9	46,1	46,9
69. Kew	63,7	57,1	62,1	59,3	55,2	53,5	55,6	56,9	59,8	64,4	61,8	60,3
70. Greenwich.....	67,8	59,6	53,8	50,3	48,5	55,6	47,7	49,9	53,5	56,3	54,9	57,2
71. Oxford	64,4	82,7	69,5	64,8	61,4	68,1	63,5	64,3	64,2	65,1	71,5	69,9
72. Valencia.....	62,7	68,0	61,8	58,7	52,4	55,9	56,0	55,7	61,9	66,6	63,2	65,7
73. Utrecht.....	60,2	61,0	54,8	52,3	47,4	39,1	46,9	44,7	48,5	49,1	55,5	54,9
74. Amsterdam.....	52,0	50,7	45,2	43,9	41,0	27,7	34,2	43,5	40,1	53,3	40,8	45,0
75. Magdebourg.....	69,0	63,5	60,0	55,7	47,7	49,1	50,3	48,2	51,6	57,7	52,1	60,4
76. Groningue.....	51,8	65,2	62,4	56,0	45,5	57,3	53,2	52,1	50,0	49,8	52,8	56,0
77. Barnaoul.....	102,9	94,5	77,8	73,8	60,4	56,9	59,2	66,7	63,1	59,3	73,2	92,4
78. Liverpool (Bidston)	64,3	62,0	60,0	54,8	50,1	49,3	43,2	46,1	50,8	58,0	57,7	58,4
79. Hambourg	52,8	59,7	55,1	55,5	51,4	44,3	49,0	48,7	52,6	54,0	50,5	48,3
80. Stonyhurst.....	65,3	69,0	60,3	61,8	57,2	55,5	52,8	51,6	62,5	62,2	62,9	65,9
81. Swinemunde	50,1	48,2	45,4	45,9	39,3	33,6	38,0	36,3	46,8	42,7	46,1	45,0
82. Armagh	68,7	62,1	65,2	60,3	57,3	59,8	57,0	60,3	65,1	65,8	56,1	66,5
83. Keitum.....	51,3	38,9	37,6	33,6	27,1	17,7	15,9	20,2	33,6	36,6	43,1	43,1
84. Moscou.....	50,2	40,7	37,1	17,0	8,6	14,1	24,5	18,9	16,8	35,3	76,7	93,2
85. Glasgow.....	60,6	61,7	63,3	66,1	58,1	58,9	56,6	59,5	63,1	55,8	50,8	55,6
86. Catherinbourg.....	107,4	90,2	53,0	61,7	45,8	33,6	43,2	56,0	60,0	68,1	90,7	111,2
87. Nouvelle-Arkhangelsk.....	- 2,3	- 0,9	- 3,5	0,6	- 24,7	- 37,4	- 29,2	- 20,9	- 10,4	0,0	19,4	- 0,5
88. Aberdeen	+ 56,8	+ 55,3	+ 59,7	60,4	+ 51,0	+ 53,5	+ 55,8	+ 56,2	+ 61,0	51,6	54,7	+ 53,4
89. Upsal.....	25,4	36,9	51,2	49,9	45,3	41,0	37,7	50,4	47,8	41,1	34,7	21,7
90. Saint-Pétersbourg.....	4,5	7,3	26,1	30,8	26,8	15,1	25,3	21,3	24,2	14,0	4,0	- 10,8
91. Helsingfors.....	23,1	26,3	24,2	24,2	14,3	21,0	7,0	24,4	25,6	23,6	15,2	+ 15,6

L'examen des nombres du Tableau IV montre que l'onde semi-diurne est une onde complexe, résultant de l'interférence de deux ondes distinctes. L'une, que nous appellerons *onde semi-diurne secondaire*, présente un seul maximum et un seul minimum dans le cours de l'année comme l'onde diurne et est, comme elle aussi, influencée par les conditions locales; c'est elle, par exemple, qui, beaucoup plus faible dans les Indes pendant la saison pluvieuse que pendant la saison sèche, y produit cette diminution remarquable des valeurs de a_2 que l'on remarque dans les six mois de mai à octobre; cette onde secondaire est donc due certainement, comme l'onde diurne, à la variation diurne de la température dans les couches inférieures de l'atmosphère.

La deuxième onde, que nous appellerons *onde semi-diurne principale*, présente des caractères tout différents; son amplitude éprouve une double variation dans l'année: elle est maximum aux deux équinoxes et minimum aux solstices; c'est elle qui produit les maxima de a_2 que l'on remarque dans le Tableau IV aux environs des équinoxes pour toutes les stations sans exception. On peut déjà préjuger que la phase de cette deuxième onde est, pour une même station, constante pendant toute l'année et que la faible variation annuelle de ψ_2 doit être attribuée uniquement à l'onde semi-diurne secondaire.

La séparation de deux ondes d'amplitudes et de phases différentes, quand on ne connaît que l'onde résultante, ne saurait être faite *a priori*, le problème étant indéterminé. On peut toutefois, dans le cas particulier qui nous occupe, arriver à une solution de la manière suivante:

Soient a_2 et ψ_2 l'amplitude et la phase de l'onde résultante (quantités données dans les Tableaux IV et V); a'_2 et ψ'_2 l'amplitude et la phase de l'onde semi-diurne principale; a''_2 et ψ''_2 celles de l'onde semi-diurne secondaire. Les expressions analytiques de ces trois ondes peuvent se mettre sous la forme

$$\begin{aligned} -a_2 \sin \psi_2 \sin 2m + a_2 \cos \psi_2 \cos 2m &= b_2 \sin 2m + c_2 \cos 2m, \\ -a'_2 \sin \psi'_2 \sin 2m + a'_2 \cos \psi'_2 \cos 2m &= b'_2 \sin 2m + c'_2 \cos 2m, \\ -a''_2 \sin \psi''_2 \sin 2m + a''_2 \cos \psi''_2 \cos 2m &= b''_2 \sin 2m + c''_2 \cos 2m, \end{aligned}$$

et l'on a alors, entre les paramètres de l'onde résultante et ceux des ondes composantes, les relations

$$b_2 = b'_2 + b''_2, \quad c_2 = c'_2 + c''_2.$$

Pour l'onde semi-diurne secondaire, a''_2 et ψ''_2 sont tous deux de la forme $m + p \sin l + q \cos l$; nous admettrons qu'il en est de même de b''_2 et c''_2 . Cela n'est pas rigoureusement vrai, car on verrait aisément que b''_2 et c''_2 doivent contenir des termes en $\sin 2l$ et $\cos 2l$; mais les coefficients de ces termes sont très petits par rapport à ceux de $\sin l$ et $\cos l$; nous les négligerons donc comme première approximation.

Quant à l'onde semi-diurne principale, nous savons déjà que sa phase doit être très sensiblement constante pendant toute l'année et que son amplitude α'_2 doit être maximum vers les équinoxes et minimum vers les solstices; par une série d'essais préliminaires nous avons reconnu qu'elle devait avoir la forme

$$\alpha'_2 = \frac{A \cos^2 \delta}{r^2},$$

A étant un coefficient propre à chaque station. L'introduction du facteur $\frac{1}{r^2}$ est nécessitée par ce fait que, dans l'hémisphère Nord aussi bien que dans l'hémisphère Sud, la valeur de α_2 est plus grande quand le Soleil est le plus près de la Terre (décembre et janvier) que lorsqu'il en est le plus éloigné (juin et juillet). On le vérifiera aisément en se reportant aux nombres du Tableau IV et en comparant les stations des deux hémisphères dont le régime climatologique est le plus différent (exemples : Singapore, Batavia, Sainte-Hélène, Mexico, Calcutta, Zi-Ka-Wei, Cordoba, LeCap, Lisbonne, Madrid, Hobarton, Genève, Vienne, Paris, etc.). Il est possible que l'expression de α'_2 soit en réalité plus compliquée que celle qui vient d'être indiquée; mais certainement le terme principal est de cette forme.

Si l'on développe l'expression $\frac{\cos^2 \delta}{r^2}$ en fonction de la longitude du Soleil, on obtient

$$\begin{aligned} \frac{\cos^2 \delta}{r^2} = & 0,92142 - 0,02909 \sin l + 0,00578 \cos l - 0,00005 \sin 2l \\ & + 0,07915 \cos 2l - 0,00131 \sin 3l + 0,00024 \cos 3l - \dots \end{aligned}$$

Comme ψ'_2 est indépendant de l , les paramètres

$$b'_2 = \frac{A \cos^2 \delta}{r^2} \sin \psi'_2, \quad c'_2 = \frac{A \cos^2 \delta}{r^2} \cos \psi'_2$$

contiendront donc non seulement des termes en $\sin l$ et $\cos l$, comme b''_2 et c''_2 , mais un terme important en $\cos 2l$, ce qui n'a pas lieu pour b''_2 et c''_2 . Les paramètres b_2 et c_2 de l'onde résultante pourront donc être mis tous deux sous la forme

$$(3) \quad (b_2 \text{ ou } c_2) = m + p_1 \sin l + q_1 \cos l + p_2 \sin 2l + q_2 \cos 2l + \dots$$

et, dans ce développement, le terme $q_2 \cos 2l$ proviendra exclusivement (du moins d'une manière très approchée) de l'onde principale semi-diurne. On aura ainsi, en appelant q'_2 le coefficient de $\cos 2l$ dans le développement de b_2 et q''_2 le coefficient analogue dans le développement de c_2 ,

$$q'_2 = -0,07915 A \sin \psi'_2, \quad q''_2 = 0,07915 A \cos \psi'_2,$$

d'où l'on tirera

$$(4) \quad A = 12,63 \sqrt{q'_2{}^2 + q''_2{}^2}, \quad \text{tang } \psi_2 = -\frac{q'_2}{q''_2}.$$

Pour déterminer les paramètres A et ψ'_2 qui caractérisent l'onde semi-diurne principale, il faudra donc calculer d'abord pour toutes les stations et tous les mois, au moyen des nombres des Tableaux IV et V, les quantités

$$b_2 = -a_2 \sin \psi_2, \quad c_2 = a_2 \cos \psi_2,$$

puis on représentera la marche annuelle de ces quantités en fonction de la longitude du Soleil par le développement (3); et, une fois les coefficients q_2 de $\cos 2l$ obtenus, on en déduira A et ψ'_2 par les formules (4). Enfin, on calculera b'_2 et c'_2 et, en les retranchant de b_2 et c_2 , on obtiendra les paramètres b''_2 et c''_2 de l'onde semi-diurne secondaire et enfin a''_2 et ψ''_2 .

Ce calcul a été fait pour toutes les stations comprises entre l'équateur et la latitude 45° . On a jugé inutile d'aller plus loin, car le coefficient A devient alors trop petit pour pouvoir être déterminé convenablement par cette méthode. Les résultats obtenus sont les suivants :

La valeur de ψ'_2 paraît être sensiblement la même pour toutes les stations; les nombres que l'on obtient pour chaque station en particulier diffèrent seulement de quelques degrés, mais ne présentent aucune variation systématique, ni en latitude ni suivant les conditions climatologiques. Ainsi la valeur obtenue pour ψ'_2 dans différentes stations, dont les conditions sont les plus différentes, est la suivante :

Singapore.....	64°	Tiflis.....	55°	Greenwich.....	50°
Batavia.....	84	Perpignan.....	63	Barnaoul.....	67
Bombay.....	74	Genève.....	77	Liverpool.....	62
Calcutta.....	35	Berne.....	50	Hambourg.....	75
Patna.....	62	Vienne.....	58	Catherinbourg.....	72
Melbourne.....	72	Paris.....	66	Aberdeen.....	74
Lisbonne.....	59	Nertchinsk.....	64	Saint-Petersbourg...	57

Si l'on songe qu'une variation de 30° ne correspond qu'à une différence d'une heure pour le moment du maximum ou du minimum de l'onde et que $\tan \psi'_2$ est donnée par le rapport de deux quantités q'_2 et q''_2 dont chacune ne dépasse pas 2 ou 3 centièmes de millimètre, on ne peut qu'être frappé de la concordance de ces nombres. Nous admettrons donc, au moins comme première approximation, que la phase ψ'_2 de l'onde semi-diurne principale est la même pour toute l'année et pour toutes les stations. La valeur moyenne, déterminée par l'ensemble des quatre-vingt-onze stations est

$$\psi'_2 = 64^\circ.$$

Les maxima de l'onde semi-diurne principale se produisent donc à $9^h 52^m$ et $21^h 52^m$ temps vrai, et les minima à $3^h 52^m$ et $15^h 52^m$.

Quant à la valeur de A, elle décroît très vite à mesure que la latitude augmente, est proportionnelle à la hauteur moyenne du baromètre dans la station et paraît

indépendante des conditions climatologiques particulières. L'ensemble des quarante stations situées au-dessous de la latitude 45° a conduit ainsi à l'expression

$$A = 0^{\text{mm}},926 \frac{h}{760} \cos^2 \lambda,$$

dans laquelle λ est la latitude de la station et h la pression moyenne. On ne peut employer pour le calcul de A les stations de latitude élevée; car, pour ces stations, la valeur de A devient beaucoup trop petite, et inférieure à son erreur probable.

Le coefficient $0^{\text{mm}},926$ n'est donné ici que d'une manière provisoire; il est probable que le nombre vrai n'en diffère que peu, mais il ne pourra être connu que lorsqu'on aura réuni un plus grand nombre de séries dans les régions intertropicales; en particulier, il serait très désirable que des observations régulières fussent faites pendant plusieurs années dans les petites îles de l'océan Atlantique et du Pacifique, comme l'Ascension, les îles du cap Vert, les Seychelles, les Nouvelles-Hébrides, les Fidji, Taïti, les Marquises et Hawaï. Les stations situées le long des côtes des grands continents sont soumises à trop d'influences perturbatrices locales pour qu'on puisse espérer en déduire exactement des termes aussi petits que ceux qui permettent de calculer la valeur de A . Il est possible, de même, que la valeur de ψ'_2 ne soit pas rigoureusement constante pendant toute l'année; mais sa variation est, en tout cas, très petite, et les observations que l'on possède actuellement ne sont pas assez nombreuses pour mettre en évidence cette petite variation.

En résumé, l'onde semi-diurne principale peut être représentée approximativement pour tous les pays et toutes les saisons par l'expression

$$0^{\text{mm}},926 \frac{h \cos^2 \delta}{760 r^2} \cos^2 \lambda \cos(2m + 64^\circ).$$

Une fois cette onde déterminée, il est facile, comme nous l'avons dit plus haut, de calculer pour chaque station l'amplitude et la phase de l'onde semi-diurne secondaire. Ces quantités sont données dans les Tableaux suivants (Tableaux VI et VII).

TABLEAU VI. — COMPOSANTE SECONDAIRE DE L'ONDE SEMI-DIURNE.

Amplitudes.

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1. Singapore.....	0,157	0,151	0,132	0,180	0,164	0,108	0,066	0,043	0,104	0,170	0,210	0,246
2. Atlantique (2°30' N.)..	152	173	095	066	044	062	078	097	134	175	061	112
3. Golfe du Bengale.....	278	181	123	113	169	150	058	085	152	138	202	251
4. Batavia.....	168	135	118	150	176	173	146	143	159	180	207	210
5. Atlantique (7°30' N.)..	218	207	168	043	063	019	049	154	108	154	110	180
6. Ascension.....	181	158	169	086	048	065	090	125	179	140	148	160
7. Madras.....	422	364	347	398	414	296	323	304	334	342	387	424
8. Sainte-Hélène.....	191	054	069	061	076	016	036	013	034	070	103	117
9. Bombay.....	446	417	332	277	250	216	125	147	230	322	420	453
10. Mexico.....	319	335	300	298	253	209	211	187	234	244	303	341
11. Maurice.....	159	147	130	136	145	146	144	131	147	152	131	124
12. Hong-Kong.....	268	207	232	262	218	167	168	149	118	205	278	287
13. Calcutta.....	442	424	440	448	406	318	304	343	364	343	401	460
14. La Havane.....	225	187	114	047	058	030	029	061	039	041	123	202
15. Hazaribagh.....	401	424	424	280	410	265	267	297	396	243	321	384
16. Allahabad.....	352	345	360	376	290	300	266	349	362	330	367	385
17. Patna.....	475	399	453	403	424	386	353	387	381	326	405	427
18. Goalpara.....	584	576	583	506	495	422	386	441	492	455	548	578
19. Simla.....	743	761	751	805	738	717	730	713	663	716	733	786
20. Zi-Ka-Wei.....	208	157	157	204	146	098	083	064	085	128	163	215
21. Cordoba.....	124	064	093	113	139	139	181	166	123	034	092	140
22. Le Cap.....	126	119	108	081	117	159	157	176	167	152	124	138
23. Tokio.....	387	323	297	220	181	119	106	156	188	198	280	377
24. San Fernando.....	085	078	079	118	114	118	139	045	116	097	081	082
25. Melbourne.....	270	257	318	208	214	225	262	231	211	259	299	268
26. Lisbonne.....	146	157	154	128	079	094	095	117	129	123	120	151
27. Washington.....	262	229	205	180	135	112	125	078	121	180	188	238
28. Philadelphie.....	245	179	272	225	239	151	119	127	171	248	160	154
29. Pékin.....	291	303	375	371	327	221	139	161	173	257	276	248
30. Coïmbre.....	147	180	194	159	146	149	128	159	172	160	131	131
31. Madrid.....	175	199	224	185	166	153	152	160	191	165	156	168
32. Naples.....	032	050	083	115	079	084	082	090	113	095	068	053
33. Tiflis.....	117	108	126	149	146	124	136	161	152	144	105	092
34. Albany.....	181	194	155	174	103	161	078	084	129	132	121	096
35. Perpignan.....	154	141	142	094	096	105	093	092	110	141	137	125
36. Hobarton.....	355	296	293	286	257	262	288	315	366	349	312	267
37. Lesina.....	018	072	131	141	135	156	153	153	163	127	088	078
38. Marseille.....	107	112	140	137	087	071	057	065	146	127	085	140
39. Saint-Martin-de-Hinx..	098	142	163	149	137	117	118	142	162	154	126	107
40. Toulouse.....	119	137	073	079	131	110	094	078	097	082	040	060
41. Toronto.....	151	216	148	186	121	097	080	082	090	073	096	154
42. Bukarest.....	050	062	093	170	175	156	092	124	130	132	084	076
43. Pola.....	080	086	144	162	147	158	155	159	149	141	087	077
44. Moncalieri.....	161	184	230	209	207	159	164	180	210	176	139	153
45. Milan.....	100	137	158	153	123	115	116	118	133	147	132	103

TABLEAU VI (suite). — COMPOSANTE SECONDAIRE DE L'ONDE SEMI-DIURNE.

	<i>Amplitudes.</i>											
	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
46. Trieste.....	0,079	0,060	0,127	0,148	0,147	0,147	0,112	0,140	0,127	0,111	0,109	0,094
47. Lyon (Saint-Genis)....	098	108	130	105	136	137	106	131	138	107	099	085
48. Lyon (Pare).....	129	120	158	145	131	146	119	135	140	144	166	128
49. Puy-de-Dôme.....	019	055	082	097	109	095	095	109	115	087	079	051
50. Clermont-Ferrand.....	044	123	129	088	125	117	102	089	127	102	077	097
51. Grand Saint-Bernard...	022	015	052	099	079	075	062	082	078	073	047	064
52. Genève.....	106	150	147	123	116	113	108	134	166	179	140	106
53. Obir.....	063	094	118	158	184	133	126	186	154	126	075	067
54. Klagenfurt.....	103	111	151	070	086	090	170	088	082	057	039	078
55. Poitiers.....	080	075	095	112	100	101	078	098	116	115	067	049
56. Nantes.....	092	167	167	117	098	082	033	039	075	113	132	170
57. Berne.....	016	029	080	092	079	077	056	067	080	077	045	035
58. Sântis.....	030	033	053	062	055	108	065	071	077	074	056	048
59. Kremsmunster.....	109	076	131	124	128	122	127	106	121	129	131	126
60. Munich.....	064	062	108	129	129	125	111	103	120	103	054	061
61. Vienne.....	107	142	167	196	158	159	124	143	164	172	139	155
62. Paris (Saint-Maur)....	128	138	191	173	142	120	137	152	160	176	108	113
63. Sainte-Honorine-du-Fay.	073	066	124	085	094	170	034	061	099	096	054	069
64. Prague.....	053	071	091	115	097	083	089	057	108	124	133	059
65. Falmouth.....	111	127	147	107	119	093	100	108	126	127	119	142
66. Bruxelles.....	077	115	151	145	131	143	120	121	130	115	099	063
67. Nertchinsk.....	168	211	277	278	237	215	167	199	235	235	155	111
68. Leipzig.....	042	073	109	153	154	107	118	111	149	089	088	055
69. Kew.....	125	126	178	167	147	131	110	133	151	134	118	126
70. Greenwich.....	076	123	145	146	115	104	103	125	139	132	092	086
71. Oxford.....	058	160	159	158	133	125	104	151	144	124	115	102
72. Valencia.....	112	146	136	092	110	099	092	093	115	118	142	091
73. Utrecht.....	061	122	118	117	104	101	102	108	127	143	106	093
74. Amsterdam.....	083	103	159	140	117	132	093	114	096	123	102	098
75. Magdebourg.....	085	129	168	163	146	117	111	131	154	110	103	029
76. Groningue.....	076	129	120	110	125	126	084	110	130	127	124	078
77. Barnaoul.....	068	060	028	024	017	012	008	019	047	045	018	053
78. Liverpool (Bidston)....	098	093	139	144	100	094	085	105	127	120	094	084
79. Hambourg.....	071	075	134	150	128	096	090	108	121	120	101	067
80. Stonyhurst.....	129	127	159	161	127	120	109	133	149	143	113	102
81. Swinemunde.....	056	092	117	137	095	103	097	110	127	117	080	059
82. Armagh.....	102	135	148	152	124	106	112	125	144	161	118	107
83. Keitum.....	098	071	123	124	106	103	108	098	093	107	098	063
84. Moscou.....	019	038	039	080	113	075	052	065	069	043	019	040
85. Glasgow.....	122	129	148	166	130	110	097	127	157	149	118	097
86. Catherinbourg.....	051	042	054	028	061	055	041	040	030	021	038	052
87. Nouvelle-Arkhangelsk.	104	108	117	108	114	106	086	101	109	102	084	110
88. Aberdeen.....	112	116	117	140	113	099	105	116	120	110	091	062
89. Upsal.....	081	064	088	102	090	092	088	086	113	096	069	072
90. Saint-Pétersbourg.....	057	065	055	051	052	052	041	049	058	072	069	074
91. Helsingfors.....	060	076	098	099	064	071	081	073	096	071	074	081

TABLEAU VII. — COMPOSANTE SECONDAIRE DE L'ONDE SEMI-DIURNE.

Phases.

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1. Singapore	113,6 ⁰	99,9 ⁰	86,5 ⁰	55,4 ⁰	57,2 ⁰	68,2 ⁰	74,3 ⁰	94,0 ⁰	77,8 ⁰	81,9 ⁰	75,6 ⁰	76,6 ⁰
2. Atlant. (2°30'N.).	134,7	179,7	194,6	148,7	61,7	314,9	263,4	230,4	218,7	208,8	132,3	128,1
3. Golfe du Bengale	101,4	131,9	135,0	131,4	121,7	88,9	109,6	129,3	182,6	129,1	106,4	118,5
4. Batavia	94,8	108,6	107,8	91,5	83,2	87,0	92,4	105,8	108,7	97,3	91,1	88,1
5. Atlant. (7°30'N.).	126,2	177,5	186,8	75,3	49,5	68,7	281,8	318,7	309,0	333,8	59,9	47,5
6. Ascension	211,9	222,2	195,1	209,8	219,0	231,2	250,6	239,7	221,4	206,7	222,0	214,3
7. Madras	94,5	91,9	74,8	65,7	61,0	58,0	66,9	68,8	84,2	85,1	82,6	83,5
8. Sainte-Hélène	121,5	116,6	77,4	31,6	36,4	70,8	97,9	118,6	15,3	39,8	45,0	75,6
9. Bombay	87,7	84,6	75,9	59,9	54,8	45,6	37,9	60,3	66,4	85,4	82,9	79,3
10. Mexico	89,1	79,7	84,1	73,0	62,9	55,6	67,7	66,0	71,4	75,9	75,3	81,3
11. Maurice	141,1	142,7	141,5	138,0	110,6	110,1	113,7	129,8	131,7	123,5	122,2	126,1
12. Hong-Kong	73,1	74,9	54,8	36,0	19,0	8,6	17,4	11,6	39,5	63,7	74,4	79,4
13. Calcutta	72,1	63,3	56,1	45,9	45,6	43,7	44,5	42,2	49,0	64,0	72,4	71,4
14. La Havane	97,6	110,7	132,5	146,3	208,8	183,8	223,6	215,0	219,8	105,8	88,6	100,0
15. Hazaribagh	53,2	49,0	64,4	40,4	34,1	38,0	42,9	35,8	43,3	29,1	23,3	45,1
16. Allahabad	76,7	73,7	57,8	60,2	50,3	42,3	54,3	42,6	53,3	66,6	78,7	69,2
17. Patna	74,1	72,9	72,0	57,5	52,4	60,3	45,1	49,5	53,1	69,9	68,1	72,5
18. Goalpara	60,9	79,1	66,6	56,7	40,1	41,7	51,4	45,2	37,5	49,6	52,0	52,9
19. Simla	44,0	43,6	38,7	36,5	34,0	34,3	39,3	42,3	40,9	41,2	39,9	44,5
20. Zi-Ka-Wei	125,8	111,7	66,4	57,0	45,2	48,3	37,2	45,1	77,1	104,0	109,8	116,6
21. Cordoba	328,9	314,9	233,8	208,6	168,4	173,4	158,2	134,7	110,9	63,4	332,9	341,3
22. Le Cap	93,6	95,8	108,3	97,1	98,3	95,4	94,0	105,1	105,9	95,7	88,2	71,4
23. Tokio	123,0	122,2	107,2	83,5	78,5	86,2	92,2	100,7	105,4	113,5	116,1	122,0
24. San Fernando	83,2	76,7	34,7	— 2,9	— 7,1	— 1,0	6,2	0,4	4,5	29,8	51,0	72,9
25. Melbourne	91,9	100,1	103,6	+ 86,4	+ 103,3	94,1	103,0	99,5	97,1	90,4	92,3	85,5
26. Lisbonne	89,2	74,9	65,4	50,7	43,0	45,5	43,3	53,7	57,7	63,4	63,5	74,7
27. Washington	121,6	117,6	95,0	101,2	74,5	65,0	69,0	50,2	69,2	87,5	90,3	119,3
28. Philadelphie	111,0	95,8	113,8	95,9	90,0	80,1	18,6	69,7	75,1	96,2	104,1	141,6
29. Pékin	77,5	74,1	53,4	40,0	32,5	30,2	12,9	18,1	25,7	35,7	55,6	62,9
30. Coïmbre	79,0	73,6	71,9	62,3	70,8	66,7	70,9	74,7	75,2	66,8	61,7	63,8
31. Madrid	85,4	68,5	64,0	60,3	56,0	53,0	59,2	55,7	58,1	63,0	69,4	68,6
32. Naples	115,8	69,0	13,2	10,5	— 11,7	— 11,0	— 1,4	3,8	6,1	4,8	13,6	37,3
33. Tiflis	108,4	104,4	89,1	68,3	+ 62,2	+ 71,7	+ 59,5	61,4	60,4	67,5	87,3	100,7
34. Albany	106,7	116,3	109,3	64,2	74,7	69,3	61,8	56,7	71,0	75,1	106,3	116,6
35. Perpignan	96,0	87,6	67,2	58,5	46,7	36,1	26,0	38,4	64,1	65,8	81,2	82,7
36. Hobarton	107,1	111,6	98,2	96,2	89,5	97,7	96,8	107,0	100,1	108,5	109,3	115,7
37. Lésina	77,5	24,5	— 2,2	— 4,1	— 7,2	— 4,8	— 17,8	— 14,8	— 6,1	— 3,3	14,5	— 3,7
38. Marseille	340,9	327,7	+ 316,2	+ 298,8	+ 313,6	+ 314,4	+ 251,6	+ 269,1	+ 318,9	+ 296,2	305,0	+ 348,0
39. St-Martin-de-Hinx.	88,8	73,6	60,1	42,3	36,0	31,4	37,1	43,0	51,0	63,8	78,5	86,3
40. Toulouse	123,7	70,4	97,9	90,0	70,9	65,3	28,5	53,9	56,0	86,5	72,5	87,1
41. Toronto	145,8	116,3	108,1	102,4	80,5	92,4	67,9	64,1	101,5	109,2	129,5	126,8
42. Bukarest	55,7	40,4	40,2	8,5	29,8	21,8	13,9	24,3	10,2	— 2,2	11,0	44,0
43. Pola	4,3	— 5,3	11,6	— 5,6	— 9,8	— 15,0	— 18,8	— 17,5	— 18,0	— 0,8	— 5,9	— 7,5
44. Moncalieri	70,0	+ 59,3	52,4	+ 46,4	+ 44,0	+ 49,6	+ 38,1	+ 45,9	+ 41,1	46,2	+ 60,3	+ 57,2
45. Milan	65,7	78,6	58,4	44,2	32,4	34,4	39,0	31,8	17,9	10,2	15,4	39,9

TABLEAU VII (suite). — COMPOSANTE SECONDAIRE DE L'ONDE SEMI-DIURNE.

	Phases.											
	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
46. Trieste.....	39,4	14,5	18,3	9,3	— 3,9	3,9	— 2,1	— 16,6	9,1	0,5	4,7	14,2
47. Lyon (Saint-Genis) ..	60,8	53,7	48,4	52,4	+ 43,2	48,0	+ 55,4	— 34,8	33,5	53,4	35,1	58,9
48. Lyon (Parc).....	66,8	81,9	53,5	55,1	43,4	42,8	43,0	41,1	45,0	35,1	46,2	61,0
49. Puy-de-Dôme.....	— 51,3	6,2	— 13,4	— 11,9	— 2,1	3,0	5,4	— 8,4	1,0	— 12,0	9,5	46,6
50. Clermont-Ferrand ..	+133,1	74,4	+67,6	+62,3	+ 51,8	44,7	51,8	— 50,0	46,6	+64,4	38,7	35,8
51. Grand Saint-Bernard.	43,2	11,3	— 13,2	— 20,1	— 21,4	— 23,5	— 15,0	— 36,0	— 18,7	— 11,9	— 41,6	0,9
52. Genève.....	96,0	81,2	+79,0	+63,0	+ 47,8	+ 38,9	+ 48,8	+ 62,5	+62,8	+65,6	+88,4	60,5
53. Obir.....	3,6	— 3,0	6,8	— 18,1	— 11,6	— 1,3	— 7,3	— 14,4	— 17,0	— 5,0	4,6	2,6
54. Klagenfurt.....	138,9	+101,9	73,8	+58,3	+ 52,6	+ 72,0	+ 57,7	+ 62,8	+48,9	+32,0	106,1	97,4
55. Poitiers.....	101,6	61,4	63,2	68,5	49,5	29,6	27,6	31,3	45,0	67,5	73,5	5,1
56. Nantes.....	56,1	80,7	65,0	67,8	63,4	60,0	61,1	82,7	51,0	70,3	67,7	81,5
57. Berne.....	50,2	20,3	44,5	39,2	43,0	42,4	30,2	17,3	36,9	40,3	15,6	30,2
58. Sântis.....	55,8	56,6	10,9	— 20,8	— 7,2	4,7	10,6	— 11,3	14,2	17,2	— 15,5	68,2
59. Kremsmunster.....	69,1	69,9	45,3	+57,2	+ 37,1	27,8	13,2	+ 43,5	9,0	49,4	+44,7	70,0
60. Munich.....	73,6	48,3	59,4	51,0	43,7	36,9	37,3	37,1	39,9	49,3	61,1	73,9
61. Vienne.....	55,3	46,4	53,3	36,7	26,2	27,4	30,1	30,7	30,0	36,5	36,2	48,9
62. Paris (Saint-Maur) ..	81,0	77,0	71,7	61,7	54,7	60,4	46,2	48,5	61,7	64,5	76,6	67,1
63. St ^e -Honorine-du-Fay.	79,0	53,7	50,3	28,7	8,0	63,4	24,3	19,9	27,6	32,2	18,4	10,0
64. Prague.....	69,2	59,4	48,6	49,9	59,0	16,9	12,3	20,7	41,3	38,5	39,8	46,4
65. Falmouth.....	66,7	57,2	52,2	45,0	35,4	34,5	38,5	37,8	43,1	49,2	52,8	70,7
66. Bruxelles.....	90,7	67,0	51,5	52,0	46,6	54,4	51,8	44,7	41,9	65,9	56,2	45,7
67. Nertchinsk.....	104,4	93,8	74,9	67,8	71,3	70,7	77,9	77,5	74,0	71,6	72,7	99,9
68. Leipzig.....	25,4	26,9	39,1	27,3	21,5	21,3	12,7	28,0	21,8	28,0	21,3	7,2
69. Kew.....	63,4	49,5	60,7	55,3	47,8	44,7	45,2	50,2	56,1	64,8	59,5	56,9
70. Greenwich.....	74,0	54,6	44,2	38,1	32,2	45,1	29,6	35,9	43,5	48,1	42,4	47,4
71. Oxford.....	69,7	97,9	74,3	65,4	59,2	69,8	63,2	64,5	64,2	66,3	79,5	76,4
72. Valencia.....	61,1	71,7	59,5	51,1	40,2	41,7	45,9	44,6	59,6	69,7	62,7	67,4
73. Utrecht.....	52,9	57,7	44,7	39,8	28,8	12,5	28,1	22,8	32,8	35,9	45,8	43,7
74. Amsterdam.....	35,2	34,8	30,3	26,2	18,9	— 0,9	— 0,6	22,1	8,4	42,4	14,2	22,9
75. Magdebourg.....	75,6	62,8	56,9	49,0	35,0	+ 35,6	+ 37,0	33,8	41,3	50,1	38,3	46,4
76. Groningue.....	34,3	66,6	61,1	47,6	29,9	52,4	40,2	40,2	37,5	36,7	42,7	45,0
77. Barnaoul.....	206,9	201,5	173,9	204,5	40,2	— 31,0	— 45,0	81,0	62,7	46,8	176,8	205,6
78. Liverpool (Bidston) ..	64,7	59,6	56,4	47,5	36,1	+ 34,2	+ 19,3	27,8	38,9	52,5	50,6	51,6
79. Hambourg.....	36,4	53,1	47,1	49,3	41,5	25,2	32,8	33,7	42,0	44,7	36,6	23,9
80. Stonyhurst.....	66,6	73,1	57,6	60,3	51,7	49,4	42,6	43,2	61,5	40,8	62,1	67,5
81. Swinemunde.....	24,3	29,4	27,4	31,6	13,4	6,7	12,5	10,0	31,8	22,6	22,0	12,6
82. Armagh.....	73,0	60,8	66,0	57,9	52,2	55,2	51,5	57,5	66,3	66,9	49,8	68,9
83. Keitum.....	39,2	3,2	16,5	10,2	— 2,7	— 17,5	— 20,1	— 20,8	1,3	11,3	23,4	13,8
84. Moscou.....	325,5	285,1	336,1	325,1	+333,7	+324,8	+315,0	+313,8	307,4	302,6	164,5	200,2
85. Glasgow.....	58,4	60,3	63,1	67,3	54,7	55,7	50,9	56,6	62,6	50,7	41,5	48,8
86. Catherinbourg.....	207,1	144,8	36,0	55,2	25,3	— 3,1	7,0	40,9	50,5	84,6	209,9	199,1
87. Nouv.-Arkhangelsk ..	— 41,5	— 42,0	— 42,6	— 39,0	— 62,3	— 65,2	— 79,3	— 66,7	— 54,7	— 43,4	— 18,0	— 35,7
88. Aberdeen.....	+ 51,9	+ 49,6	+56,8	+58,1	+ 42,9	+ 45,2	+ 50,4	+ 51,0	+59,0	+42,8	+45,2	+41,1
89. Upsal.....	0,5	12,4	42,7	42,6	34,6	29,4	23,4	42,6	39,6	27,9	12,7	— 7,1
90. Saint-Petersbourg ..	— 47,1	— 39,4	— 14,8	— 5,6	— 10,0	— 28,5	— 22,8	— 25,0	— 16,0	— 23,0	— 38,5	— 53,3
91. Helsingfors.....	— 11,5	0,0	+ 2,3	+ 3,8	— 21,0	— 5,7	— 22,4	— 3,1	+ 4,2	— 6,4	— 17,2	— 11,5

Comme nous l'avions déjà prévu, les valeurs de l'amplitude a_2'' et de la phase ψ_2'' de la composante secondaire de l'onde semi-diurne présentent généralement une variation annuelle bien nette et passent dans le courant de l'année par un seul maximum et un seul minimum. Nous les avons donc représentées, en fonction de la longitude l du Soleil, par une expression telle que

$$(a_2'' \text{ ou } \psi_2'') = m + p \sin l + q \cos l.$$

Nous donnons dans le Tableau suivant (Tableau VIII) les valeurs de m , p et q pour chaque station, après avoir ramené les valeurs de a_2'' à la pression de 760^{mm}, comme nous l'avons déjà fait pour a_1 (*voir plus haut*, page B. 297).

TABLEAU VIII. — VARIATION ANNUELLE DE L'ONDE SEMI-DIURNE SECONDAIRE

$$(a_2'' \text{ ou } \psi_2'') = m + p \sin l + q \cos l.$$

	a_2'' .			ψ_2'' .		
	Valeurs ramenées à la pression 760 ^{mm} .					
	m .	p .	q .	m .	p .	q .
	^{mm}	^{mm}	^{mm}	^o	^o	^o
1. Singapore.....	0,145	-0,0502	+0,0154	80,3	-13,63	-2,39
2. Atlantique (2°30'N.).....	0,105	-0,0381	-0,0021	184,3	+30,05	-24,37
3. Golfe du Bengale.....	0,159	-0,0543	+0,0259	123,8	+3,84	-9,19
4. Batavia.....	0,164	-0,0118	-0,0144	96,4	-2,67	-0,92
5. Atlantique (7°30'N.).....	0,124	-0,0775	+0,0083	169,6	+7,36	-88,57
6. Ascension.....	0,130	-0,0492	-0,0094	220,2	+11,29	-10,49
7. Madras.....	0,364	-0,0251	+0,0210	76,6	-14,33	-0,88
8. Sainte-Hélène.....	0,077	-0,0429	+0,0244	70,7	12,10	+10,18
9. Bombay.....	0,306	-0,1417	+0,0556	68,7	-21,92	-3,22
10. Mexico.....	0,350	-0,0695	+0,0442	73,7	-11,20	-2,78
11. Maurice.....	0,141	+0,0015	+0,0042	127,7	-7,49	-4,80
12. Hong-Kong.....	0,214	-0,0472	+0,0275	46,7	37,47	-4,03
13. Calcutta.....	0,390	-0,0363	+0,0407	56,1	16,78	-0,63
14. La Havane.....	0,097	-0,0764	+0,0346	151,8	-70,24	-21,45
15. Hazaribagh.....	0,367	-0,0319	+0,0472	41,6	-2,48	-8,23
16. Allahabad.....	0,346	-0,0262	-0,0004	60,7	-15,38	-2,12
17. Patna.....	0,406	-0,0137	+0,0369	62,5	13,59	-6,36
18. Goalpara.....	0,515	-0,0698	+0,0472	52,9	-10,08	-9,10
19. Simla.....	0,953	-0,0156	+0,0320	40,0	3,52	-1,63
20. Zi-Ka-Wei.....	0,142	-0,0392	+0,0370	79,3	-42,23	-2,50
21. Cordoba.....	0,123	+0,0406	-0,0156	215,1	78,23	-50,76
22. Le Cap.....	0,134	+0,0071	-0,0278	95,7	-6,08	-2,67
23. Tokio.....	0,237	-0,1091	+0,0475	104,5	21,46	-2,83
24. San Fernando.....	0,096	+0,0196	+0,0009	29,6	-44,09	+9,91
25. Melbourne.....	0,252	-0,0417	+0,0021	95,6	-2,76	-1,05
26. Lisbonne.....	0,126	-0,0265	+0,0076	60,7	-17,26	-4,54
27. Washington.....	0,172	-0,0661	+0,0365	88,7	-23,89	-15,75
28. Philadelphie.....	0,191	-0,0216	+0,0047	89,0	-23,98	+18,24
29. Pékin.....	0,262	-0,0319	+0,0885	43,5	23,42	-16,64
30. Coïmbre.....	0,157	-0,0018	+0,0127	69,8	+0,73	-1,34
31. Madrid.....	0,188	-0,0084	+0,0169	63,5	-9,50	-3,33
32. Naples.....	0,079	+0,0224	-0,0115	21,2	-30,25	+21,04
33. Tiflis.....	0,136	+0,0232	-0,0067	78,7	-20,76	-12,32
34. Albany.....	0,135	-0,0147	+0,0456	86,1	-28,57	+11,77
35. Perpignan.....	0,120	-0,0312	+0,0097	63,0	-26,19	-8,87
36. Hobarton.....	0,306	-0,0159	-0,0168	103,3	-8,87	-3,36
37. Lesina.....	0,117	+0,0471	0,0222	4,6	-18,21	-18,13
38. Marseille.....	0,108	-0,0183	-0,0076	-51,4	-18,74	+19,25
39. Saint-Martin-de-Hinx.....	0,135	+0,0044	-0,0011	58,0	-27,48	-1,04
40. Toulouse.....	0,094	+0,0146	+0,0239	75,5	-19,26	+20,77
41. Toronto.....	0,126	-0,0160	+0,0482	104,1	-27,98	+10,82
42. Bukarest.....	0,112	+0,0465	+0,0011	24,9	-8,23	+13,86
43. Pola.....	0,121	+0,0406	+0,0007	7,1	-9,56	-7,66
44. Moncalieri.....	0,186	+0,0142	+0,0106	+51,0	9,55	-5,92
45. Milan.....	0,130	-0,0016	+0,0066	39,0	-5,28	-21,78

TABLEAU VIII (suite). — VARIATION ANNUELLE DE L'ONDE SEMI-DIURNE SECONDAIRE

$$(\alpha''_2 \text{ ou } \psi''_2) = m + p \sin l + q \cos l.$$

	α''_2 .			ψ''_2 .		
	Valeurs ramenées à la pression 760 ^{mm} .					
	<i>m.</i>	<i>p.</i>	<i>q.</i>	<i>m.</i>	<i>p.</i>	<i>q.</i>
	^{mm}	^{mm}	^{mm}	⁰	⁰	⁰
46. Trieste.....	0,116	+0,0311	-0,0033	7,7	-10,18	+11,11
47. Lyon (Saint-Genis).....	0,119	+0,0178	+0,0035	48,2	-4,72	+5,43
48. Lyon (Pare).....	0,141	-0,0039	+0,0003	51,3	-7,90	+10,78
49. Puy-de-Dôme.....	0,098	+0,0356	-0,0183	-2,2	-2,25	-14,24
50. Clermont-Ferrand.....	0,106	+0,0109	+0,0025	+60,2	-10,45	+20,97
51. Grand Saint-Bernard.....	0,084	+0,0329	-0,0169	-12,0	-13,62	+15,22
52. Genève.....	0,138	-0,0109	-0,0089	+66,5	-18,40	+5,38
53. Obir.....	0,157	+0,0655	-0,0084	-4,9	-9,80	+3,35
54. Klagenfurt.....	0,099	+0,0085	+0,0119	+75,5	-23,04	+17,33
55. Poitiers.....	0,091	+0,0169	+0,0024	52,1	-12,74	+18,37
56. Nantes.....	0,108	-0,0472	+0,0291	67,4	-4,98	-1,95
57. Berne.....	0,065	+0,0234	-0,0021	34,1	+2,52	+8,63
58. Säntis.....	0,082	+0,0233	-0,0128	15,6	-25,58	+6,50
59. Kremsmunster.....	0,049	+0,0023	-0,0072	44,9	-18,86	+13,22
60. Munich.....	0,103	+0,0375	+0,0028	51,2	-14,99	+4,41
61. Vienne.....	0,155	+0,0088	+0,0027	38,3	-11,49	+6,25
62. Paris (Saint-Maur).....	0,145	+0,0048	+0,0052	64,4	-12,47	+7,60
63. Sainte-Honorine-du-Fay...	0,086	+0,0122	+0,0243	34,7	-5,88	+20,73
64. Prague.....	0,092	+0,0010	-0,0082	42,0	-10,74	+15,44
65. Falmouth.....	0,120	-0,0158	+0,0003	48,8	-14,66	+2,33
66. Bruxelles.....	0,118	+0,0243	+0,0109	55,8	-9,72	+8,98
67. Nertchinsk.....	0,223	+0,0306	+0,0349	79,9	-9,78	+2,87
68. Leipzig.....	0,104	+0,0441	-0,0037	23,4	-1,03	+5,74
69. Kew.....	0,137	+0,0063	+0,0123	54,6	-7,34	-0,24
70. Greenwich.....	0,116	+0,0108	+0,0024	44,7	-10,13	+7,12
71. Oxford.....	0,129	+0,0137	+0,0046	71,0	-9,46	+4,51
72. Valencia.....	0,112	-0,0174	+0,0087	56,5	-14,47	-0,78
73. Utrecht.....	0,109	+0,0008	-0,0075	37,3	-14,22	+5,98
74. Amsterdam.....	0,113	+0,0054	+0,0132	21,3	-12,74	+6,75
75. Magdebourg.....	0,121	+0,0291	-0,0175	47,0	-12,43	+10,78
76. Groningue.....	0,112	+0,0047	+0,0035	44,6	-3,85	+7,15
77. Barnaoul.....	0,034	-0,0185	+0,0057	111,2	-83,71	+49,53
78. Liverpool (Bidston).....	0,107	+0,0046	+0,0062	45,1	-15,56	+10,20
79. Hambourg.....	0,105	+0,0170	+0,0033	38,9	-1,36	+5,33
80. Stonyhurst.....	0,132	+0,0041	+0,0104	58,2	-9,64	-4,38
81. Swinemunde.....	0,099	+0,0192	-0,0019	20,4	-3,66	+3,41
82. Armagh.....	0,129	-0,0010	+0,0002	60,7	-5,59	+7,57
83. Keitum.....	0,099	+0,0105	+0,0058	5,1	-19,19	+8,48
84. Moscou.....	0,055	+0,0349	+0,0042	-66,2	+35,00	+46,21
85. Glasgow.....	0,130	+0,0044	+0,0072	+55,8	+4,25	+5,62
86. Catherinbourg.....	0,044	+0,0011	-0,0090	89,4	-92,95	-0,89
87. Nouvelle-Arkhangelsk....	0,105	+0,0013	+0,0083	-48,9	-18,39	-3,77
88. Aberdeen.....	0,109	+0,0130	+0,0101	+49,5	+2,78	+1,50
89. Upsal.....	0,087	+0,0129	-0,0031	24,9	+16,24	-0,28
90. Saint-Petersbourg.....	0,058	-0,0120	-0,0018	-27,2	+14,77	+3,16
91. Helsingfors.....	0,079	+0,0029	-0,0015	-7,4	+0,54	-3,09

L'expression qui représente la variation annuelle de l'onde semi-diurne secondaire

$$(\alpha''_2 \text{ ou } \psi''_2) = m + p \sin l + q \cos l$$

peut être mise sous la forme

$$(\alpha''_2 \text{ ou } \psi''_2) = m + r(\cos l + \xi).$$

Pour calculer les lois auxquelles satisfont r et ξ , nous avons, comme nous l'avons déjà fait pour l'onde diurne (p. B.301), groupé les stations en réunissant celles qui sont à peu près à la même latitude et dans les mêmes conditions géographiques. Nous avons ainsi, pour étudier la marche annuelle des amplitudes α''_2 , formé les groupes suivants, dans lesquels les stations sont, pour abrégé, désignées par leur numéro d'ordre :

Stations continentales.

- I. 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18.
- II. 20, 23, 27, 28, 29.
- III. 31, 33, 34, 35, 40, 41.
- IV. 42, 44, 45, 47, 48.
- V. 50, 52, 54, 57, 59.
- VI. 60, 61, 62, 64, 66.
- VII. 67, 68, 75, 77, 84, 86.

Stations de montagne.

- VIII. 49, 51, 53, 58.

Stations maritimes ou littorales.

- IX. 1, 2, 3, 4, 5.
- X. 6, 8, 11, 12, 14.
- XI. 22, 24, 25, 26, 30.
- XII. 32, 37, 38, 43, 46.
- XIII. 36, 39, 55, 56, 63.
- XIV. 65, 69, 70, 71, 72.
- XV. 73, 74, 76, 79, 81.
- XVI. 78, 80, 82, 83, 85.
- XVII. 87, 88, 89, 90, 91.

Pour étudier la marche annuelle des amplitudes ψ''_2 , les groupes que nous avons formés sont généralement les mêmes ; toutefois, le groupe VII ne comprend plus que les stations 67, 68 et 75, et le groupe XVII que les stations 88, 89, 90 et 91.

Au moyen des nombres donnés dans le Tableau VIII, on a calculé, pour chacun de ces groupes, les valeurs moyennes de m , p et q , et enfin celles de r

et ξ ; on a, bien entendu, changé les signes de p et q pour les stations de l'hémisphère Sud, avant de les faire entrer dans le calcul des moyennes. On a ainsi obtenu les valeurs suivantes :

VARIATION ANNUELLE DES AMPLITUDES a_2'' .

Groupes.	Latitude moyenne.	m .	p .	q .	r .	ξ .
<i>Stations continentales.</i>						
I.....	22,3	mm 0,385	mm —0,0492	mm +0,0355	mm 0,061	+ 54°
II.....	37,1	0,201	—0,0536	+0,0428	0,069	+ 51
III.....	42,5	0,160	—0,0065	+0,0275	0,028	+ 13
IV.....	45,3	0,138	+0,0146	+0,0044	0,015	+ 73
V.....	46,7	0,091	+0,0068	—0,0007	0,007	— 96
VI.....	49,2	0,123	+0,0153	+0,0027	0,016	— 80
VII.....	53,4	0,097	+0,0202	+0,0113	0,023	— 61
<i>Stations de montagne.</i>						
VIII.....	46,4	0,105	+0,0393	—0,0141	0,042	—110
<i>Stations maritimes ou littorales.</i>						
IX.....	4,5	0,139	—0,0417	+0,0124	0,044	+ 73
X.....	17,9	0,132	—0,0066	+0,0086	0,011	+ 37
XI.....	37,6	0,153	+0,0052	+0,0094	0,011	— 29
XII.....	43,6	0,108	+0,0246	—0,0057	0,026	+103
XIII.....	45,9	0,145	—0,0079	+0,0076	0,011	+ 46
XIV.....	51,4	0,123	—0,0005	+0,0057	0,006	+ 5
XV.....	53,0	0,108	+0,0094	+0,0021	0,010	— 77
XVI.....	54,5	0,119	+0,0045	+0,0050	0,008	— 37
XVII.....	58,8	0,088	+0,0036	+0,0024	0,004	— 56

VARIATION ANNUELLE DES PHASES ψ_2'' .

Groupes.	Latitude moyenne.	m .	p .	q .	r .	ξ .
<i>Stations continentales.</i>						
I.....	22,3	+ 59,9°	—13,51°	+ 4,11°	14,1°	+ 73°
II.....	37,1	81,0	—27,00	+10,06	28,8	+ 70
III.....	42,5	78,5	—22,04	+11,31	24,8	+ 63
IV.....	45,3	42,9	— 7,14	+11,55	13,6	+ 32
V.....	46,7	56,2	—13,65	+13,11	18,9	+ 46
VI.....	49,2	50,3	—11,98	+ 8,54	14,7	+ 54
VII.....	51,6	50,3	— 7,75	+ 6,46	10,1	+ 50
<i>Stations de montagne.</i>						
VIII.....	46,4	— 0,9	—12,81	+ 2,71	13,1	+ 78

Stations maritimes ou littorales.

IX.....	4,5	+130,9	+ 6,06	-23,76	24,5	+194(?)
X.....	17,9	+123,4	+ 8,21	- 4,38	9,3	+242(?)
XI.....	37,6	+ 70,3	-13,89	+ 2,41	14,1	+ 80
XII.....	43,6	- 5,0	-17,39	+15,44	23,3	+ 48
XIII.....	45,9	+ 63,1	- 8,44	+ 8,31	11,8	+ 46
XIV.....	51,4	+ 55,1	-11,21	+ 2,59	11,5	+ 77
XV.....	53,0	+ 32,5	- 7,17	+ 5,72	9,2	+ 51
XVI.....	54,5	+ 45,0	- 9,15	+ 7,25	11,7	+ 52
XVII.....	59,3	+ 10,0	+ 8,58	+ 2,01	8,8	- 77

La considération de ces nombres conduit aux lois suivantes :

La valeur moyenne m des amplitudes a''_2 est plus grande pour les stations continentales que pour les stations maritimes et elle décroît quand la latitude augmente, en restant à peu près proportionnelle au carré du cosinus de la latitude λ ; on aurait donc

$$m = k \cos^2 \lambda.$$

Si l'on fait abstraction du groupe I qui comprend toutes les stations de l'Inde, dans lesquelles l'existence des moussons amène des conditions particulières, on trouve que les valeurs de m pour les six autres groupes des stations continentales sont représentées très exactement par la formule

$$m = 0^{\text{mm}}, 277 \cos^2 \lambda;$$

pour les stations purement maritimes, elles seraient représentées par

$$m = 0^{\text{mm}}, 143 \cos^2 \lambda;$$

enfin, pour les stations littorales, le coefficient a une valeur intermédiaire entre les deux précédentes.

L'amplitude de la variation annuelle de a''_2 est toujours faible; elle est plus petite pour les stations maritimes que pour les stations continentales et paraît décroître quand la latitude augmente; mais la loi de cette décroissance ne peut être encore déterminée bien exactement.

Enfin, la phase ξ de cette variation annuelle est comprise entre $+90^\circ$ et -90° ; elle semble positive jusque vers la latitude 45° et négative au delà, c'est-à-dire qu'entre l'équateur et la latitude 45° le maximum de l'amplitude a''_2 paraît se produire avant l'équinoxe de printemps, tandis qu'au delà de 45° il se présente après cette époque.

Quant à la phase ψ''_2 de l'onde secondaire semi-diurne, sa valeur moyenne m paraît voisine de 60° pour les stations continentales aussi bien que pour les stations maritimes, et elle semble décroître légèrement depuis l'équateur jusqu'aux latitudes élevées. Les maxima de l'onde semi-diurne secondaire se produiraient

donc vers 10^h du matin et du soir, un peu plus tôt près de l'équateur, et plus tard dans les hautes latitudes; la variation annuelle de cette phase dans chaque station, caractérisée par la valeur de r , est toujours faible et n'atteint pas une demi-heure en plus ou en moins de la valeur moyenne. Dans l'hémisphère Nord le maximum de cette phase se produit vers le milieu de janvier ($\xi = 60^\circ$ environ); c'est donc à ce moment que le maximum de l'onde semi-diurne secondaire se présente le plus tôt; il se présente, au contraire, le plus tard vers le milieu de juillet, et inversement pour l'hémisphère Sud.

3° *Onde tiers-diurne.*

Pour l'étude de l'onde tiers-diurne, $a_3 \cos(3m + \psi_3)$, nous avons utilisé les données de quatre-vingt-quatre stations. On trouvera dans les Tableaux suivants (Tableaux IX et X) les valeurs des amplitudes a_3 et des phases ψ_3 rapportées au temps vrai pour toutes ces stations et chacun des douze mois.

TABLEAU IX. — ONDE TIERS-DIURNE $a_3 \cos(3m + \psi_3)$.Valeurs de a_3 .

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	mm 0,	mm 0,	mm 0,	mm 0,	mm 0,	mm 0,	mm 0,	mm 0,	mm 0,	mm 0,	mm 0,	mm 0,
1. Singapore.....	+059	+049	+038	+055	+055	+043	+066	+042	+045	+051	+056	+052
2. Batavia.....	—009	020	050	077	061	070	063	062	048	040	024	006
3. Madras.....	+099	069	053	—067	—084	—037	—074	—065	—039	016	079	103
4. Sainte-Hélène.....	—108	—076	024	+039	+080	+109	+127	+084	+040	—055	—086	—122
5. Bombay.....	+168	+127	061	—020	—043	—094	—071	—033	018	+081	+124	+155
6. Mexico.....	096	067	017	—057	—089	—094	—068	—053	078	062	078	105
7. Maurice.....	—097	—051	029	+089	+138	+148	+140	+131	074	—035	—057	—086
8. Calcutta.....	+195	+136	052	—052	—101	—094	—092	—081	028	+075	+133	+180
9. La Havane.....	141	135	098	+033	—008	—023	—028	—014	044	067	112	142
10. Hazaribagh.....	222	139	072	—035	—111	—085	—097	—056	088	079	153	156
11. Allahabad.....	198	110	082	—031	—171	—087	—127	—111	037	085	192	207
12. Patna.....	179	131	017	—061	—128	—132	—104	—057	035	101	100	174
13. Goalpara.....	267	158	092	—042	—121	—138	—076	—036	035	118	199	264
14. Simla.....	183	130	074	+025	—030	—033	—036	+028	102	099	152	160
15. Zi-Ka-Wei.....	245	176	087	026	—051	—091	—073	—042	041	108	168	217
16. Cordoba.....	—097	—044	024	072	+108	+118	+140	+139	091	044	—049	—083
17. Le Cap.....	—114	—069	027	113	168	155	150	129	029	—025	—065	—112
18. Tokio.....	+226	+142	059	—036	—092	—118	—095	—064	022	+112	+178	+213
19. San Fernando.....	164	119	050	—025	—068	—099	—098	—063	018	067	114	162
20. Melbourne.....	—124	—064	—023	+071	+137	+147	+135	+132	081	—005	—076	—099
21. Lisbonne.....	+180	+151	+044	—025	—045	—069	—063	—045	077	+088	+138	+173
22. Washington.....	240	151	078	+060	—071	—074	—080	—018	014	097	223	215
23. Pékin.....	226	201	089	—008	—079	—067	—069	—028	016	097	190	247
24. Coïmbre.....	184	129	077	—003	—026	—043	—035	—009	076	101	135	168
25. Madrid.....	152	127	062	—028	—064	—091	—098	—052	013	075	123	157
26. Naples.....	127	109	050	+007	—046	—063	—057	—037	010	091	094	128
27. Tiflis.....	179	119	064	—014	—049	—064	—084	—063	045	084	132	173
28. Albany.....	162	105	075	—040	—061	—051	—064	—047	012	062	115	148
29. Perpignan.....	171	111	048	—023	—057	—076	—082	—039	016	056	133	165
30. Hobarton.....	—092	—057	033	+094	+114	+129	+133	+116	082	—025	—061	—100
31. Lesina.....	+136	+081	038	—018	—054	—067	—074	—039	051	+072	+089	+126
32. Marseille.....	119	069	054	—058	—050	—056	—060	—074	021	035	091	130
33. Saint-Martin-de-Hinx.....	131	097	032	—043	—067	—071	—067	—038	025	083	129	140
34. Toulouse.....	137	083	067	—016	—050	—063	—077	—042	024	078	114	142
35. Toronto.....	238	144	070	—011	—067	—089	—076	—039	013	076	142	190
36. Bukarest.....	120	063	043	+017	—037	—043	—025	—033	037	066	091	111
37. Pola.....	127	094	062	—022	—040	—059	—070	—035	033	060	103	119
38. Moncalieri.....	122	096	041	—033	—059	—069	—082	—054	—016	033	072	112
39. Milan.....	125	106	056	—018	—035	—042	—038	—020	+037	073	103	121
40. Trieste.....	058	039	016	—027	—022	—026	—027	—038	040	032	058	071
41. Lyon (Saint-Genis).....	151	105	063	—003	—048	—061	—070	—038	031	062	114	151
42. Lyon (Parc).....	150	108	057	+010	—050	—062	—071	—053	032	090	132	154

TABLEAU IX (suite). — ONDE TIERS-DIURNE.

Valeurs de a_3 .

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
43. Puy-de-Dôme.....	+086	+062	+053	+030	—025	—030	—042	—028	+039	+050	+092	+097
44. Clermont-Ferrand.....	150	085	063	+013	—059	—065	—082	—031	043	077	119	126
45. Grand Saint-Bernard.....	089	061	035	+013	—020	—017	—036	+016	026	057	079	082
46. Genève.....	132	095	061	+027	043	—063	—070	—045	012	063	097	133
47. Obir.....	097	057	022	—018	—039	043	—044	—028	009	058	084	094
48. Klagenfurt.....	055	045	033	—008	—054	—048	—052	—041	018	030	051	059
49. Poitiers.....	105	075	043	—028	—062	—078	—059	—054	032	058	069	102
50. Nantes.....	133	057	061	—035	—074	—061	—050	032	037	047	097	110
51. Berne.....	130	084	049	—003	—042	—053	—060	—029	006	064	100	126
52. Sântis.....	077	051	032	—010	—040	—044	—040	—024	010	046	075	087
53. Kremsmunster.....	108	072	052	020	—034	—038	—054	—011	029	047	054	094
54. Munich.....	109	077	035	—009	—046	—040	—041	—016	010	047	084	070
55. Vienne.....	110	089	038	—017	—054	—063	—062	—046	011	070	088	089
56. Paris (Saint-Maur).....	131	112	053	—015	—082	—066	—090	—062	008	066	114	145
57. Sainte-Honorine-du-Fay..	101	065	041	—029	—051	—045	—059	—035	019	061	064	114
58. Prague.....	114	082	059	—008	—042	—051	—054	—024	019	073	072	101
59. Falmouth.....	131	100	047	—014	—062	—069	—066	—051	011	060	095	122
60. Bruxelles.....	100	073	047	+004	—027	—047	—051	—028	030	063	083	119
61. Nertchinsk.....	142	125	054	—020	—057	—048	—056	—041	033	105	131	144
62. Leipzig.....	096	070	054	—002	—037	—048	—058	—026	025	074	071	076
63. Kew.....	121	088	055	—020	—067	—070	—069	—047	014	060	087	101
64. Greenwich.....	111	091	037	—068	—051	—021	—065	—040	016	068	095	117
65. Valencia.....	111	075	033	—022	—048	—052	—050	—033	008	045	091	111
66. Utrecht.....	076	039	040	—024	—032	—039	—057	—039	022	045	073	083
67. Amsterdam.....	101	065	044	—010	—052	—049	—042	—031	014	065	076	086
68. Magdebourg.....	103	075	043	—015	—053	—065	—052	—023	017	033	079	094
69. Groningue.....	105	059	045	—022	—047	—063	—036	—030	020	051	074	091
70. Barnaoul.....	060	028	021	+005	—013	—003	—067	+011	025	040	055	046
71. Liverpool (Bidston).....	100	075	037	—021	—036	—043	—048	—028	021	062	074	089
72. Hambourg.....	088	074	045	—007	—041	—055	—044	—026	017	056	075	076
73. Stonyhurst.....	116	077	033	—021	—054	—053	—058	—048	015	060	078	096
74. Swinemunde.....	084	074	037	—010	—040	—030	—031	—013	023	052	074	095
75. Armagh.....	104	075	046	—019	—055	—050	—054	—043	—002	055	092	108
76. Keitum.....	086	059	032	—023	—042	—047	—045	—035	+017	030	057	070
77. Moscou.....	066	044	102	+029	—029	—015	—031	+005	028	020	054	035
78. Glasgow.....	102	072	038	—018	—050	—063	—048	—036	009	059	070	103
79. Catherinbourg.....	054	040	025	—026	—039	—042	—040	030	017	036	039	050
80. Nouvelle-Arkhangelsk....	036	036	027	—037	—024	—023	—032	—019	021	016	013	051
81. Aberdeen.....	094	080	044	—016	—043	—050	—052	—028	020	022	065	081
82. Upsal.....	066	060	041	—018	—027	033	—033	—013	019	045	060	066
83. Saint-Petersbourg.....	039	033	017	+012	—014	—013	—005	+009	012	028	029	034
84. Helsingfors.....	053	050	028	+024	—010	—010	006	—020	009	039	038	061

TABLEAU X. — ONDE TIERS-DIURNE $a_3 \cos(3m + \psi_3)$.Valeurs de ψ_3 (temps vrai).

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1. Singapore.....	313,6	293,9	313,9	348,8	371,9	355,7	377,0	379,8	366,0	331,9	300,8	310,1
2. Batavia.....	309,6	220,0	261,8	272,7	273,7	290,4	296,6	308,2	301,0	275,5	259,9	195,4
3. Madras.....	287,9	292,7	331,2	231,7	260,2	252,3	295,4	268,7	323,2	294,8	269,9	267,9
4. Sainte-Hélène.....	247,4	241,5	357,1	296,5	273,3	284,7	285,3	282,6	316,7	195,6	239,0	251,8
5. Bombay.....	274,7	280,2	294,9	188,1	254,7	256,5	257,5	266,8	233,6	257,1	269,7	271,5
6. Mexico.....	269,3	247,0	159,6	260,0	275,8	271,9	271,9	313,5	169,7	218,7	248,2	262,9
7. Maurice.....	268,2	268,6	316,1	294,6	288,6	286,8	292,6	290,9	291,9	200,7	261,3	266,2
8. Calcutta.....	274,4	275,0	289,8	307,6	285,4	275,3	278,3	287,4	181,4	277,4	264,5	271,1
9. La Havane.....	294,1	289,6	294,1	271,2	235,3	196,6	227,3	205,9	286,5	285,0	271,0	273,2
10. Hazaribagh.....	273,3	262,5	260,3	301,1	290,3	280,3	288,9	213,0	217,5	261,7	247,8	251,8
11. Allahabad.....	275,8	265,9	313,5	279,6	274,0	263,8	297,1	310,7	204,9	265,0	271,2	271,0
12. Patna.....	298,7	295,0	269,6	264,3	271,2	272,7	350,1	296,7	209,2	306,9	282,0	280,7
13. Goalpara.....	274,6	287,1	292,7	180,5	247,9	276,1	305,4	290,6	235,2	269,4	266,8	263,6
14. Simla.....	267,6	263,2	258,7	237,0	280,7	244,0	213,0	150,8	212,8	251,1	260,1	253,6
15. Zi-Ka-Wei.....	279,2	277,2	279,7	337,2	240,6	258,7	265,2	240,0	298,6	282,8	274,0	277,5
16. Cordoba.....	251,7	235,4	275,7	319,3	300,7	301,3	303,0	308,2	327,8	302,8	241,7	261,2
17. Le Cap.....	270,2	250,6	326,3	291,2	269,3	273,3	271,1	272,7	321,4	217,9	256,7	262,4
18. Tokio.....	285,0	288,1	309,1	264,2	276,7	275,8	279,1	262,6	247,0	268,6	277,1	282,1
19. San Fernando.....	260,7	258,6	257,2	242,2	260,2	263,9	266,2	276,0	182,4	257,8	255,7	263,6
20. Melbourne.....	275,1	301,0	192,5	253,6	270,0	266,0	275,7	276,4	305,7	305,3	255,1	280,2
21. Lisbonne.....	272,4	275,6	291,4	211,6	239,9	240,1	240,0	228,9	303,4	276,2	267,8	271,3
22. Washington.....	271,0	276,0	261,2	273,6	247,5	283,8	287,9	202,3	189,6	259,1	263,2	273,7
23. Pékin.....	262,3	261,7	275,8	227,8	214,9	264,8	238,0	271,1	251,4	249,0	236,3	255,8
24. Coïmbre.....	267,0	258,3	252,5	180,1	241,9	263,8	262,1	303,1	251,3	249,3	260,6	261,7
25. Madrid.....	264,1	261,9	253,4	264,2	274,7	269,6	267,9	268,5	262,5	255,1	259,4	266,0
26. Naples.....	263,7	257,3	242,9	275,6	265,6	251,0	232,7	225,5	240,5	249,2	259,6	263,7
27. Tiflis.....	270,1	265,9	248,6	325,9	283,5	285,2	289,5	300,6	184,7	245,9	256,5	266,7
28. Albany.....	260,8	262,0	258,1	270,8	237,2	239,8	233,6	244,4	290,3	243,5	260,1	251,4
29. Perpignan.....	262,5	271,1	264,9	259,3	252,6	260,1	262,5	266,5	312,1	262,5	274,4	269,1
30. Hobarton.....	260,8	236,0	321,1	285,5	288,3	283,0	285,6	293,1	320,8	226,6	235,2	260,8
31. Lesina.....	272,9	260,5	231,2	293,0	252,3	248,8	238,4	235,4	251,7	246,5	255,8	255,0
32. Marseille.....	279,4	284,4	333,6	215,9	276,6	260,6	283,8	249,1	356,2	321,4	281,3	286,0
33. Saint-Martin-de-Hinx..	289,3	277,6	265,4	270,9	264,2	260,4	254,3	248,3	298,8	275,8	274,3	281,5
34. Toulouse.....	274,2	283,6	238,7	294,2	273,3	267,7	249,5	257,5	279,6	264,4	264,2	273,1
35. Toronto.....	276,3	270,2	287,4	239,7	237,7	241,2	254,5	259,1	123,8	277,2	263,3	275,9
36. Bukarest.....	266,0	261,1	246,1	265,1	218,0	217,6	233,3	243,5	227,7	231,8	244,1	257,7
37. Pola.....	255,0	251,0	213,4	301,8	245,9	234,8	247,0	259,6	197,6	246,3	254,0	250,4
38. Moncalieri.....	270,6	247,2	228,7	295,6	262,8	243,8	255,6	258,5	255,0	247,4	257,3	268,9
39. Milan.....	271,7	273,4	273,4	157,7	214,3	226,2	229,0	188,5	280,2	259,5	255,8	262,4
40. Trieste.....	224,6	217,5	202,1	111,4	165,0	184,8	170,0	141,9	294,7	242,5	224,7	230,1
41. Lyon (Saint-Genis)....	257,5	264,6	246,0	251,4	245,7	240,7	244,7	244,7	239,6	257,7	247,2	255,8
42. Lyon (Pare).....	260,9	256,8	250,4	286,5	235,8	245,3	238,2	227,0	270,4	270,8	252,7	260,9

TABLEAU X (suite). — ONDE TIERS-DIURNE $\alpha_3 \cos(3m + \psi_3)$.*Valeurs de ψ_3 (temps vrai).*

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
43. Puy-de-Dôme.....	276,8	266,6	236,7	170,7	216,4	259,3	239,2	199,0	289,4	255,8	271,6	259,4
44. Clermont-Ferrand.....	266,4	267,8	251,1	207,3	264,1	258,3	245,4	219,6	309,6	279,6	259,6	281,4
45. Grand Saint-Bernard...	281,8	270,4	258,9	276,3	230,7	239,4	207,8	322,8	291,1	267,6	259,3	254,9
46. Genève.....	262,3	264,8	220,5	181,4	237,7	234,9	249,3	272,2	153,7	262,9	266,0	268,9
47. Obir.....	244,2	237,9	231,8	286,4	217,1	221,9	234,8	253,4	198,7	234,8	239,9	238,3
48. Klagenfurt.....	282,5	257,1	257,3	262,7	253,7	270,3	292,8	254,3	195,3	184,0	228,0	249,5
49. Poitiers.....	270,9	258,1	251,1	290,8	229,0	237,5	244,9	247,4	283,1	251,4	239,2	260,5
50. Nantes.....	272,7	224,2	234,3	275,3	262,8	246,3	255,0	254,9	281,0	243,2	255,3	279,7
51. Berne.....	260,4	260,7	262,4	356,1	241,0	230,7	223,5	243,2	213,8	241,9	254,0	258,0
52. Säntis.....	262,1	255,8	252,0	305,4	234,7	237,4	246,2	252,4	277,5	247,7	254,2	262,5
53. Kremsmunster.....	286,1	255,7	253,1	241,2	236,3	208,8	223,9	303,0	253,8	227,8	289,0	265,4
54. Munich.....	267,3	260,4	236,6	261,6	239,1	269,1	245,6	268,8	221,2	264,1	252,4	257,1
55. Vienne.....	263,9	265,4	270,2	215,5	222,9	232,8	211,8	241,9	282,5	258,3	264,9	269,8
56. Paris (Saint-Maur).....	264,9	254,3	236,5	281,4	251,9	252,3	257,2	249,0	239,1	254,0	254,5	268,2
57. Sainte-Honorine-du-Fay.	250,6	245,5	248,9	294,4	272,3	273,5	238,1	246,8	244,3	238,0	253,9	246,0
58. Prague.....	262,5	255,9	239,0	292,6	221,9	221,4	217,3	241,2	268,0	252,0	248,0	259,6
59. Falmouth.....	263,2	252,5	241,0	262,5	252,3	242,5	245,4	243,0	299,1	263,6	261,2	257,9
60. Bruxelles.....	255,5	269,5	248,3	206,7	234,3	234,8	235,3	226,3	264,3	243,9	259,1	251,6
61. Nertchinsk.....	254,7	250,2	237,3	335,9	264,1	274,9	269,8	268,8	201,7	248,2	243,5	255,7
62. Leipzig.....	248,3	244,7	237,0	324,9	233,5	238,3	230,0	242,5	127,3	234,3	251,5	259,6
63. Kew.....	259,9	253,7	246,7	280,8	243,6	242,7	244,4	243,6	265,3	256,9	254,6	256,3
64. Greenwich.....	264,6	256,7	244,8	91,6	235,4	167,1	236,2	225,8	290,5	259,8	248,3	261,0
65. Valencia.....	268,7	264,7	242,4	292,5	260,6	256,2	259,9	258,8	339,5	248,4	258,1	267,1
66. Utrecht.....	270,0	258,7	276,5	179,5	204,8	213,3	214,1	195,5	325,8	271,9	261,3	271,5
67. Amsterdam.....	258,6	257,6	275,1	119,7	242,1	218,9	227,9	222,3	296,9	273,0	242,9	252,0
68. Magdebourg.....	271,2	246,4	232,7	320,8	237,1	240,4	238,3	240,2	250,5	216,2	260,3	255,8
69. Groningue.....	264,3	251,9	210,6	318,5	213,3	242,3	238,7	234,0	192,5	247,1	247,4	247,9
70. Barnaoul.....	265,9	272,0	263,2	237,5	263,2	206,8	269,7	282,5	251,2	216,5	250,6	264,3
71. Liverpool (Bidston)....	265,2	266,8	253,1	208,0	224,8	216,2	226,7	210,0	281,1	269,8	257,9	265,0
72. Hambourg.....	264,8	258,1	240,6	265,4	236,8	230,8	217,8	236,2	260,4	237,9	250,4	256,5
73. Stonyhurst.....	263,1	264,8	239,9	268,2	250,3	258,2	259,3	252,0	191,5	263,0	261,8	252,3
74. Swinemunde.....	252,9	250,3	237,7	254,4	219,0	228,3	232,1	198,4	233,1	244,8	257,5	263,2
75. Armagh.....	272,0	261,3	255,5	241,9	246,5	247,8	240,1	254,0	188,5	260,0	267,0	270,3
76. Keitum.....	240,6	240,9	188,5	223,0	213,4	222,7	205,1	224,5	299,7	242,0	240,5	240,7
77. Moscou.....	273,3	224,9	251,4	136,3	273,6	247,7	219,3	130,6	141,9	161,1	252,7	256,0
78. Glasgow.....	259,1	255,0	270,5	241,8	248,8	250,1	245,3	253,2	210,5	252,0	246,2	250,2
79. Catherinbourg.....	258,3	234,3	190,0	288,5	244,8	235,1	253,7	266,9	140,2	214,5	261,9	258,9
80. Nouvelle-Arkhangelsk..	230,1	208,0	170,5	238,4	208,9	238,2	237,7	249,0	102,1	116,2	214,1	242,9
81. Aberdeen.....	261,8	260,7	245,7	296,7	259,1	245,4	254,0	262,1	239,1	247,4	254,6	260,4
82. Upsal.....	267,0	259,3	238,8	335,5	249,7	247,1	254,1	288,4	227,4	245,4	254,6	258,8
83. Saint-Pétersbourg.....	260,5	248,1	213,3	137,8	244,9	231,4	283,7	128,9	193,3	225,2	242,8	248,2
84. Helsingfors.....	264,4	266,0	234,0	161,1	227,7	254,8	152,1	304,5	238,9	214,4	234,2	260,2

Les valeurs de a_3 et de ψ_3 , comme celles de a_1 et ψ_1 et de a_2'' et ψ_2'' , présentent une variation annuelle bien nette; nous les avons donc représentées, en fonction de la longitude l du Soleil, par la formule

$$(a_3 \text{ ou } \psi_3) = m + p \sin l + q \cos l.$$

Nous donnons ci-après (Tableau XI) les valeurs de m , p et q pour chaque station. Comme pour les ondes diurne et semi-diurne, les valeurs qui correspondent à a_3 ont toutes été ramenées à la pression 760^{mm}, en les multipliant par le rapport $\frac{760}{h}$. De plus, pour le calcul des valeurs de m , p et q qui représentent la variation annuelle de ψ_3 , on n'a utilisé que les huit mois de janvier, février, mai, juin, juillet, août, novembre et décembre. En effet, les valeurs de b_3 et de c_3 , qui, par leur rapport, donnent $\tan \psi_3$, passent par zéro vers les équinoxes et sont extrêmement petites (quelques millièmes de millimètre) pour les quatre mois de mars, avril, septembre et octobre; les valeurs correspondantes de ψ_3 sont donc à peu près indéterminées pour ces quatre mois, ce qui explique les grandes variations qu'elles présentent (*voir* le Tableau X). Elles sont au contraire très régulières pour les autres mois; cette régularité est d'autant plus remarquable que les valeurs de b_3 et c_3 sont toujours très petites et que, dans cette onde tiers-diurne, une variation de 1° dans la valeur de ψ_3 ne correspond, en temps, qu'à une incertitude de 1^m20^s sur l'heure des maxima ou des minima de l'onde.

TABLEAU XI. — VARIATION ANNUELLE DE L'ONDE TIERS-DIURNE

$$(a_3 \text{ ou } \psi_3) = m + p \sin l + q \cos l.$$

	a_3 Valeurs ramenées à la pression 760 ^{mm} .			ψ_3		
	m .	p .	q .	m .	p .	q .
	mm	mm	mm	°	°	°
1. Singapore.....	0,051	-0,0002	-0,0017	337,6	+37,81	-15,01
2. Batavia.....	0,042	+0,0326	-0,0021	268,9	+28,61	+ 3,88
3. Madras.....	0,006	-0,1003	+0,0187	274,4	- 6,55	- 0,92
4. Sainte-Hélène.....	0,003	+0,1240	-0,0099	263,0	+21,05	- 6,70
5. Bombay.....	0,041	-0,1247	+0,0112	266,5	- 8,91	+ 1,69
6. Mexico.....	0,017	-0,1246	+0,0234	270,0	+14,17	-10,93
7. Maurice.....	0,034	+0,1313	-0,0105	277,8	+14,01	- 2,09
8. Calcutta.....	0,034	-0,1518	+0,0116	276,4	+ 6,49	+ 1,19
9. La Havane.....	0,060	-0,0870	+0,0217	249,4	-37,10	+16,35
10. Hazaribagh.....	0,050	-0,1566	+0,0094	263,3	+10,05	+25,71
11. Allahabad.....	0,036	-0,1810	+0,0064	278,7	+ 6,03	-19,47
12. Patna.....	0,023	-0,1536	-0,0062	293,4	+ 1,92	-19,13
13. Goalpara.....	0,064	-0,1982	-0,0049	276,5	+ 2,34	-11,04
14. Simla.....	0,094	-0,1265	-0,0034	241,6	-16,25	+49,16
15. Zi-Ka-Wei.....	0,070	-0,1522	+0,0222	264,2	-15,29	+ 2,37
16. Cordoba.....	0,039	+0,1149	-0,0333	275,1	+31,83	-12,00
17. Le Cap.....	0,030	+0,1440	-0,0017	265,7	+ 6,88	- 1,05
18. Tokio.....	0,048	-0,1716	+0,0048	278,3	- 4,54	+ 7,24
19. San Fernando.....	0,030	-0,1302	+0,0143	263,1	+ 3,30	- 5,30
20. Melbourne.....	0,024	+0,1394	-0,0267	274,9	- 2,36	+ 6,86
21. Lisbonne.....	0,052	-0,1244	+0,0036	254,5	-19,51	+ 8,58
22. Washington.....	0,072	-0,1512	+0,0168	263,2	- 6,97	+14,58
23. Pékin.....	0,070	-0,1664	+0,0163	253,2	+ 7,74	- 3,25
24. Coïmbre.....	0,065	-0,1105	+0,0030	264,9	+ 0,97	-14,94
25. Madrid.....	0,035	-0,1440	+0,0154	266,5	+ 4,69	+ 1,42
26. Naples.....	0,037	-0,1029	+0,0114	252,6	- 8,01	+16,57
27. Tiflis.....	0,047	-0,1326	+0,0153	277,1	+14,32	- 4,70
28. Albany.....	0,036	-0,1186	+0,0154	248,7	-11,25	+ 4,62
29. Perpignan.....	0,037	-0,1224	+0,0109	264,9	- 6,36	- 5,76
30. Hobarton.....	0,032	+0,1262	-0,0114	267,7	+22,90	- 5,65
31. Lesina.....	0,030	-0,0974	+0,0022	252,4	- 8,05	+14,43
32. Marseille.....	0,020	-0,1012	+0,0086	275,2	- 8,96	+ 1,75
33. Saint-Martin-de-Hinx.....	0,031	-0,1158	-0,0057	268,8	-12,64	+10,82
34. Toulouse.....	0,035	-0,1119	+0,0081	267,9	- 4,57	+15,04
35. Toronto.....	0,052	-0,1462	+0,0219	259,9	-14,92	- 4,60
36. Bukarest.....	0,035	-0,0763	+0,0018	242,8	-17,88	- 1,09
37. Pola.....	0,032	-0,0981	+0,0103	249,8	- 4,47	- 5,59
38. Moncalieri.....	0,016	-0,1028	+0,0218	258,1	- 4,13	- 3,45
39. Milan.....	0,041	-0,0927	+0,0045	240,3	-28,11	+17,87
40. Trieste.....	0,015	-0,0499	-0,0044	195,1	-33,59	+12,35
41. Lyon (Saint-Genis).....	0,041	-0,1111	+0,0130	250,2	- 6,57	+ 5,34
42. Lyon (Parc).....	0,044	-0,1166	+0,0103	247,3	-11,67	+ 7,23

TABLEAU XI (suite). — VARIATION ANNUELLE DE L'ONDE TIERS-DIURNE
 $(a_3 \text{ ou } \psi_3) = m + p \sin l + q \cos l.$

	a_3 Valeurs ramenées à la pression 760 ^{mm} .			ψ_3		
	m .	p .	q .	m .	p .	q .
	mm	mm	mm	°	°	°
43. Puy-de-Dôme.....	0,039	-0,0763	+0,0079	248,7	-21,50	+16,74
44. Clermont-Ferrand.....	0,040	-0,1084	+0,0094	257,9	-10,75	+15,07
45. Grand Saint-Bernard.....	0,044	-0,0744	+0,0015	258,5	-10,67	-4,05
46. Genève.....	0,037	-0,1016	+0,0198	257,2	-12,49	-12,68
47. Obir.....	0,028	-0,0967	+0,0001	236,1	-6,86	-10,67
48. Klagenfurt.....	0,008	-0,0625	+0,0047	260,9	+9,67	+8,54
49. Poitiers.....	0,018	-0,0926	+0,0033	248,5	-10,16	+2,66
50. Nantes.....	0,025	-0,0948	-0,0007	256,4	-3,60	-9,56
51. Berne.....	0,034	0,1010	-0,0112	246,5	-13,35	-5,98
52. Sântis.....	0,026	-0,0927	-0,0001	250,8	-10,59	-4,88
53. Kremsmunster.....	0,030	-0,0692	+0,0144	258,8	-22,44	-20,84
54. Munich.....	0,025	-0,0772	+0,0091	257,5	-1,69	+3,35
55. Vienne.....	0,022	-0,0966	-0,0034	246,9	-22,95	+3,05
56. Paris (Saint-Maur).....	0,028	-0,1201	+0,0139	256,6	-4,89	-0,60
57. Sainte-Honorine-du-Fay..	0,022	-0,0851	+0,0035	253,2	+7,61	+13,73
58. Prague.....	0,031	-0,0870	+0,0103	241,1	-18,51	+2,02
59. Falmouth.....	0,027	-0,1044	+0,0127	252,7	-8,05	+1,38
60. Bruxelles.....	0,032	-0,0790	+0,0047	245,9	-14,54	+8,19
61. Nertchinsk.....	0,047	-0,1255	+0,0042	260,1	-11,11	-0,31
62. Leipzig.....	0,026	-0,0766	+0,0009	243,7	-9,64	-3,26
63. Kew.....	0,022	-0,0994	+0,0117	249,9	-7,36	+1,52
64. Greenwich.....	0,026	-0,0981	+0,0045	237,2	-26,57	-7,86
65. Valencia.....	0,024	-0,0865	+0,0048	261,8	-3,14	+2,14
66. Utrecht.....	0,017	-0,0686	+0,0028	236,4	-34,29	+7,03
67. Amsterdam.....	0,023	-0,0791	+0,0043	240,4	-13,34	+10,68
68. Magdebourg.....	0,021	-0,0807	+0,0057	248,8	-11,44	+2,09
69. Groningue.....	0,023	-0,0807	-0,0001	242,6	-12,11	+3,07
70. Barnaul.....	0,023	-0,0316	-0,0042	259,5	-7,10	-14,26
71. Liverpool (Bidston).....	0,025	-0,0769	+0,0054	241,8	-25,55	+7,89
72. Hambourg.....	0,023	-0,0740	+0,0039	244,0	-14,67	+10,26
73. Stonyhurst.....	0,021	-0,0890	-0,0090	257,8	-2,80	+3,36
74. Swinemunde.....	0,027	-0,0679	+0,0004	237,9	-21,58	+3,52
75. Armagh.....	0,023	-0,0918	+0,0083	257,5	-12,29	+1,12
76. Keitum.....	0,014	-0,0658	+0,0073	228,7	-14,01	+4,18
77. Moscou.....	0,026	-0,0415	+0,0185	236,1	-33,65	+47,84
78. Glasgow.....	0,022	-0,0863	+0,0038	251,0	-1,14	+4,93
79. Catherinbourg.....	0,008	-0,0546	+0,0011	251,9	-4,91	-17,18
80. Nouvelle-Arkhangelsk....	0,006	0,0384	+0,0019	228,7	-3,16	-15,84
81. Aberdeen.....	0,019	-0,0713	+0,0132	257,3	-2,67	-0,61
82. Upsal.....	0,020	-0,0580	+0,0026	259,9	1,49	-8,32
83. Saint-Petersbourg.....	0,015	-0,0236	-0,0003	236,2	-12,78	+23,45
84. Helsingfors.....	0,018	-0,0492	+0,0028	255,5	-9,94	+17,90

L'expression qui représente la variation annuelle des deux éléments de l'onde tiers-diurne

$$(a_3 \text{ ou } \psi_3) = m + p \sin l + q \cos l$$

sera mise ensuite sous la forme, plus commode pour la discussion,

$$(a_3 \text{ ou } \psi_3) = m + r \cos(l + \xi).$$

Mais, pour calculer r et ξ , il est bon de grouper d'abord les stations en réunissant celles qui sont à peu près à la même latitude et dans les mêmes conditions géographiques. Nous avons ainsi formé les groupes suivants :

Stations continentales.

- I. Madras, Bombay, Calcutta, Hazaribagh, Allahabad, Patna, Goalpara.
- II. Zi-Ka-Wei, Tokio, Washington, Pékin, Albany.
- III. Madrid, Tiflis, Toulouse, Perpignan, Toronto.
- IV. Bukarest, Moncalieri, Milan, Lyon (Saint-Genis), Lyon (Parc).
- V. Clermont-Ferrand, Genève, Klagenfurt, Berne, Kremsmunster.
- VI. Munich, Vienne, Paris, Prague, Bruxelles.
- VII. Leipzig, Magdebourg, Barnaoul, Moscou, Catherinbourg.

Stations de montagne.

- VIII. Puy-de-Dôme, Grand Saint-Bernard, Obir, Säntis.

Stations maritimes ou littorales.

- IX. Singapore, Batavia, Sainte-Hélène, Maurice, La Havane.
- X. Le Cap, San Fernando, Melbourne, Lisbonne, Coïmbre.
- XI. Naples, Lesina, Marseille, Pola, Trieste.
- XII. Hobarton, Saint-Martin-de-Hinx, Poitiers, Nantes, Sainte-Honorine-du-Fay.
- XIII. Falmouth, Kew, Greenwich, Valencia, Liverpool.
- XIV. Utrecht, Amsterdam, Groningue, Hambourg.
- XV. Stonyhurst, Swinemünde, Armagh, Keitum, Glasgow.
- XVI. Nouvelle-Arkhangelsk, Aberdeen, Upsal, Saint-Pétersbourg, Helsingfors.

Au moyen des nombres donnés dans le Tableau XI, nous avons calculé pour chacun de ces groupes les valeurs moyennes de m , p et q , et enfin celles de r et ξ ; pour les stations de l'hémisphère Sud on a, bien entendu, changé les signes de p et de q avant de les faire entrer dans les moyennes. Nous avons ainsi obtenu les valeurs suivantes :

Groupes.	Latitude moyenne.	Amplitudes (a_3).					Phases (ψ_3).				
		<i>m.</i>	<i>p.</i>	<i>q.</i>	<i>r.</i>	ξ .	<i>m.</i>	<i>p.</i>	<i>q.</i>	<i>r.</i>	ξ .
<i>Stations continentales.</i>											
I.....	22,3	^{mm} 0,036	^{mm} —0,1777	^{mm} +0,0077	^{mm} 0,178	87,5	275,6 ⁰	+ 1,62 ⁰	—3,14 ⁰	3,5 ⁰	207 ⁰
II.....	37,7	0,059	—0,1520	+0,0151	0,153	84,3	261,5	— 9,16	+5,11	10,5	61
III.....	42,5	0,042	—0,1232	+0,0135	0,124	83,7	267,3	— 1,37	—0,07	1,4	93
IV.....	45,3	0,035	—0,0999	+0,0103	0,100	84,1	247,7	—13,67	—5,18	14,6	111
V.....	46,7	0,030	—0,0885	+0,0119	0,089	82,3	256,3	— 9,87	—0,80	9,9	95
VI.....	49,2	0,028	—0,0920	+0,0069	0,092	85,7	249,6	—12,52	+3,20	12,9	76
VII.....	53,9	0,021	—0,0570	+0,0044	0,057	85,4	248,0	—13,35	+3,05	13,7	77
<i>Stations de montagne.</i>											
VIII.....	46,4	0,034	—0,0850	+0,0024	0,085	88,4	248,5	—12,40	—0,72	12,4	93
<i>Stations maritimes et littorales.</i>											
IX.....	13,3	0,038	—0,0750	+0,0081	0,075	83,8	279,3	—12,59	+1,25	12,7	84
X.....	37,6	0,040	—0,1297	+0,0099	0,130	85,6	264,6	— 3,95	—3,49	5,3	132
XI.....	43,6	0,027	—0,0899	+0,0056	0,090	86,4	245,0	—12,62	+7,90	14,9	58
XII.....	45,9	0,026	—0,1029	+0,0024	0,103	88,7	258,9	— 8,34	+4,66	9,6	61
XIII.....	51,7	0,025	—0,0931	+0,0078	0,093	85,2	248,7	—14,13	+1,01	14,2	86
XIV.....	52,8	0,022	—0,0756	+0,0033	0,076	87,5	240,9	—18,60	+7,76	20,2	67
XV.....	54,6	0,021	—0,0802	+0,0058	0,080	85,9	246,6	—10,36	+3,42	10,9	72
XVI.....	58,8	0,016	—0,0481	+0,0040	0,048	85,2	247,5	— 4,74	+3,32	5,8	55

La considération de ces nombres conduit aux lois suivantes :

La valeur moyenne (m) de l'amplitude a_3 est, pour la même latitude, plus petite dans les stations maritimes que dans les stations continentales ; il en est de même de l'amplitude r de la variation annuelle de a_3 . Ces deux quantités, m et r , décroissent régulièrement de l'équateur vers les latitudes élevées, et paraissent très exactement proportionnelles au carré du cosinus de la latitude. On a ainsi :

	Stations continentales.	Stations maritimes.
m	$0^{\text{mm}},068 \cos^2 \lambda$	$0^{\text{mm}},040 \cos^2 \lambda$
r	$0^{\text{mm}},211 \cos^2 \lambda$	$0^{\text{mm}},080 \cos^2 \lambda$

Les coefficients 0,068 et 0,211, relatifs aux stations continentales, sont déterminés très exactement et donnent pour m et r des valeurs calculées dont l'écart aux valeurs déduites de l'observation ne dépasse pas quelques millièmes de millimètre, sauf pour le groupe I ; mais nous savons déjà que ce groupe, qui comprend toutes les stations des Indes, se trouve dans des conditions toutes particulières par suite du régime des moussons. Quant aux coefficients 0,040 et 0,080, relatifs aux stations maritimes, ils sont beaucoup moins bien déterminés, parce que le nombre des stations réellement maritimes est très petit ; il n'y a

guère dans ce cas que les stations du groupe IX; toutes les autres sont des stations situées sur le littoral et qui donnent pour m et r des valeurs intermédiaires entre celles qui conviennent aux stations continentales et aux stations maritimes proprement dites.

Quant à la phase ξ de la variation annuelle de l'amplitude a_3 , elle paraît constante pour toutes les latitudes et toutes les conditions climatologiques; sa valeur est de 85° , c'est-à-dire que, dans toutes les stations de l'hémisphère Nord, le maximum de l'amplitude a_3 se produit quand la longitude du Soleil est de $360^\circ - 85^\circ = 275^\circ$, et le minimum quand la longitude du Soleil est de 95° , et inversement pour l'hémisphère Sud. Ces nombres correspondent respectivement au 26 décembre et au 26 juin.

La valeur moyenne m de l'amplitude ψ_3 paraît décroître à mesure que la latitude augmente, aussi bien pour les stations maritimes que pour les stations continentales, même si l'on fait abstraction du nombre fourni par le groupe I qui présente, comme nous l'avons déjà dit, des conditions particulières.

La fonction qui représente le plus exactement la variation de m en latitude est, pour les stations continentales,

$$m = 203^\circ,4 + 74^\circ,6 \cos \lambda.$$

Les stations à climat franchement maritime ne sont pas assez nombreuses pour qu'on puisse déterminer pour elles une fonction analogue. Mais la comparaison des résultats que donne la formule précédente avec les valeurs de ψ_3 qui correspondent aux stations littorales montre qu'il est probable que cette formule convient aussi pour les stations maritimes et donne des résultats exacts, à quelques degrés près, ce qui suffit, puisque, pour produire une erreur de 10^m sur l'heure du maximum de l'onde tiers-diurne, il faudrait que la valeur de ψ_3 fût inexacte de plus de 7° .

Les valeurs de r sont assez irrégulières; toutefois, elles paraissent augmenter avec la latitude et ne présentent pas de grandes différences entre les stations maritimes et continentales. On peut représenter, pour toutes les stations, au moins d'une manière provisoire, la variation de r en latitude par l'expression

$$r = 15^\circ,6 \sin \lambda.$$

Enfin, les valeurs de ξ diminuent à mesure que la latitude augmente; elles sont à peu près représentées par la formule

$$\xi = 46^\circ,0 + 60^\circ \cos \lambda \quad \text{pour les stations continentales}$$

et

$$\xi = 33^\circ,0 + 60^\circ \cos \lambda \quad \text{pour les stations maritimes.}$$

Nous ne donnons, bien entendu, ces expressions que comme de premières ap-

proximations; il faudrait des séries beaucoup plus longues et plus nombreuses que celles que nous possédons pour pouvoir déterminer avec plus de précision les lois de la variation annuelle de l'amplitude et surtout de la phase de l'onde tiers-diurne.

4° *Onde quart-diurne.*

L'onde quart-diurne $a_4 \cos(4m + \psi_4)$ est extrêmement petite et nécessairement très incertaine; nous nous sommes borné à la calculer pour vingt-deux stations seulement, choisies parmi celles qui ont fourni les séries d'observations horaires les plus longues. On trouvera dans les Tableaux suivants (Tableaux XII et XIII) les valeurs des amplitudes a_4 et des phases ψ_4 rapportées au temps vrai pour toutes ces stations et chacun des douze mois. Dans ces Tableaux, nous avons désigné sous le nom de *Inde* la moyenne des nombres qui correspondent aux quatre stations de Hazaribagh, Allâhabad, Patna et Goalpara, qui, individuellement, n'offraient que des séries trop courtes pour donner des résultats un peu certains. Nous avons de même réuni les deux stations de Lyon (Saint-Genis et Parc).

TABLEAU XII. — ONDE QUART-DIURNE $a_4 \cos(4m + \psi_4)$.

Valeurs de a_4 .

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1. Singapore.....	0,018	0,024	0,061	0,054	0,014	0,007	0,024	0,031	0,049	0,020	0,025	0,020
2. Batavia.....	042	014	021	018	008	005	017	015	020	009	030	033
3. Sainte-Hélène.....	004	019	021	026	030	036	040	033	035	019	015	020
4. Bombay.....	086	058	033	010	010	015	015	018	020	043	056	076
5. Calcutta.....	083	049	033	031	045	033	017	025	029	041	068	076
6. Inde.....	078	031	032	024	034	031	032	028	034	043	049	093
7. Zi-Ka-Wei.....	087	026	010	009	003	006	013	018	020	035	060	080
8. San Fernando.....	084	036	016	027	019	019	028	031	033	042	053	080
9. Lisbonne.....	096	047	008	008	015	018	014	026	024	035	055	100
10. Tiflis.....	070	019	032	034	018	018	024	037	033	030	036	065
11. Lyon.....	062	022	020	017	017	017	017	030	025	014	032	044
12. Berne.....	060	038	008	015	007	009	015	023	018	015	046	066
13. Vienne.....	067	010	027	019	016	012	016	024	030	030	041	097
14. Paris (Saint-Maur)....	060	013	019	036	013	012	016	028	027	016	027	054
15. Bruxelles.....	054	015	034	036	039	007	004	022	025	030	016	059
16. Nertchinsk.....	064	023	040	044	027	013	014	016	024	016	024	065
17. Greenwich.....	054	013	021	017	008	009	014	022	030	004	019	061
18. Valencia.....	045	033	021	022	008	002	002	017	030	010	025	054
19. Hambourg.....	045	004	022	027	023	008	008	026	024	010	018	047
20. Catherinbourg.....	018	013	011	021	025	008	011	023	025	004	013	024
21. Upsal.....	046	022	017	023	020	013	015	023	017	005	022	042
22. Saint-Pétersbourg.....	032	018	009	011	004	009	029	006	010	006	017	033

TABLEAU XIII. — ONDE QUART-DIURNE.

Valeurs de ψ_4 (temps vrai).

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
1. Singapore.....	327 ⁰	113 ⁰	80 ⁰	73 ⁰	168 ⁰	25 ⁰	138 ⁰	100 ⁰	106 ⁰	133 ⁰	208 ⁰	300 ⁰
2. Batavia.....	331	11	70	34	104	104	234	182	141	16	22	319
3. Sainte-Hélène.....	70	91	104	71	94	103	106	110	66	55	100	33
4. Bombay.....	170	137	129	206	322	307	258	94	137	145	142	153
5. Calcutta.....	153	135	155	226	236	237	225	211	172	118	134	136
6. Inde.....	176	146	149	197	131	231	261	149	242	148	125	134
7. Zi-Ka-Wei.....	140	85	274	156	173	207	205	177	147	132	125	131
8. San Fernando.....	121	122	162	160	136	143	140	166	170	129	111	111
9. Lisbonne.....	130	77	42	105	160	111	180	161	150	123	111	117
10. Tiflis.....	138	156	237	232	167	183	201	196	210	173	123	124
11. Lyon.....	106	58	281	247	209	189	166	189	227	176	94	151
12. Berne.....	106	131	116	218	200	116	199	200	206	57	75	99
13. Vienne.....	141	155	227	180	160	173	140	145	151	156	122	123
14. Paris (Saint-Maur)....	119	33	309	248	193	152	178	208	218	161	99	114
15. Bruxelles.....	134	96	268	233	248	223	264	195	233	165	116	117
16. Nertchinsk.....	130	154	226	222	227	199	206	192	223	144	157	112
17. Greenwich.....	116	33	301	233	182	189	176	199	218	249	78	107
18. Valencia.....	125	22	346	295	239	222	306	273	279	331	82	110
19. Hambourg.....	113	354	278	231	218	159	169	184	233	182	99	119
20. Catherinbourg.....	98	26	196	168	154	170	170	171	190	256	25	75
21. Upsal.....	112	39	286	122	131	130	146	112	120	90	96	103
22. Saint-Petersbourg.....	83	36	279	208	158	79	86	102	260	39	53	82

Les valeurs de α_4 et de ψ_4 présentent, pour une même station, des variations très brusques d'un mois à l'autre; mais ces variations ne peuvent être considérées comme dues uniquement aux irrégularités des observations, car elles se reproduisent à peu près de même dans toutes les stations. Il est probable que l'onde quart-diurne est, comme l'onde semi-diurne, la résultante de deux ondes d'origines différentes : l'une à période annuelle, comme les ondes diurne et tiers-diurne, produite par la variation diurne de la température; l'autre à période semi-annuelle, analogue à la composante principale de l'onde semi-diurne. Cela expliquerait probablement les variations brusques de phases qu'on remarque dans le Tableau XIII; car la phase résultante de deux ondes dont les amplitudes et les phases sont différentes peut prendre toutes les valeurs, selon que l'une ou l'autre des deux ondes composantes devient prépondérante.

Les valeurs de α_4 sont trop petites et trop peu supérieures à leur incertitude probable pour qu'il y ait lieu, pour le moment, de chercher à séparer les deux ondes composantes, comme nous l'avons tenté pour l'onde semi-diurne. Nous arrêtons donc là cette étude.

IV. — Résumé. Conclusions.

Après avoir donné (p. B.249 à B.287) les Tableaux de la variation diurne du baromètre pour soixante-seize stations, nous avons calculé les amplitudes et les phases des quatre premières oscillations harmoniques simples dans lesquelles on peut décomposer l'oscillation complexe que nous offre la marche diurne du baromètre. La comparaison de ces nombres nous a permis, sans aucune hypothèse, de formuler les conclusions suivantes :

La marche diurne du baromètre doit être considérée comme résultant de la superposition de deux ondes, d'origine et de caractères différents. L'une de ces ondes est indépendante des conditions géographiques particulières de chaque station; elle ne dépend que de la position du Soleil sur son orbite et de la latitude. En appelant $f(\lambda)$ une certaine fonction de la latitude, cette première onde peut être représentée pour toute la Terre par la formule

$$f(\lambda) \frac{\cos^2 \delta}{r^2} \cos(2m + \psi'_2).$$

Nous avons trouvé, au moins d'une manière provisoire, que la phase ψ'_2 peut être considérée comme constante pour toute la Terre et égale à 64° , et que la fonction $f(\lambda)$ est bien représentée par

$$f(\lambda) = 0^{\text{mm}},926 \cos^4 \lambda.$$

Enfin, il est probable que cette première onde, en plus du terme en $\cos(2m + \psi'_2)$, contient un autre terme en $\cos(4m + \psi'_4)$; mais le coefficient de ce terme n'atteint certainement pas $0^{\text{mm}},02$ ou $0^{\text{mm}},03$ et, par suite, ne peut encore être déterminé d'une manière exacte.

Nous ne voulons pas insister pour le moment sur la cause qui produit cette première onde. Bien que tout à fait analogue, par son expression analytique, à l'onde semi-diurne que l'attraction du Soleil produit sur les océans, il est probable qu'elle ne doit pas être attribuée, au moins en totalité, à la gravitation et que, suivant une opinion formulée par Sir William Thomson, elle provient en grande partie de l'action calorifique du Soleil sur les couches élevées de l'atmosphère.

La deuxième onde peut être représentée par une série telle que

$$a_1 \cos(m + \psi_1) + a'_2 \cos(2m + \psi'_2) + a_3 \cos(3m + \psi_3) + \dots$$

Cette onde est produite, au moins en plus grande partie, par la variation diurne de la température dans les couches inférieures de l'atmosphère et, par

conséquent, tous les coefficients dépendent non seulement de la latitude et de la saison, mais encore de la situation particulière de chaque station; ils changent de valeur avec toutes les conditions et toutes les influences locales qui modifient la variation diurne de la température; nous pouvons donc désigner cette deuxième onde sous le nom d'*onde thermique*. En nous basant exclusivement sur les résultats fournis par les observations, nous avons formulé les lois suivantes pour les différents termes de l'onde thermique.

1° *Amplitudes*. — Les amplitudes a_n des différents termes de l'onde thermique peuvent être représentées, en fonction de la longitude l du Soleil, par l'expression

$$a_n = m_n + r_n \cos(l + \xi_n).$$

Pour les stations tout à fait voisines de l'équateur, il faudrait ajouter un terme en $\cos 2l$; mais ce terme devient tout à fait négligeable dès que la latitude dépasse 10° .

Les coefficients m_n , qui représentent la valeur moyenne de l'amplitude a_n , sont, pour des stations de même régime, sensiblement proportionnels au carré du cosinus de la latitude. On a donc

$$a_n = k_n \cos^2 \lambda.$$

Les valeurs de k_n que nous avons déterminées, au moins d'une manière provisoire, pour les stations continentales ou maritimes et pour les différents termes de l'onde thermique, sont les suivantes,

		Stations continentales.	Stations maritimes.
		^{mm}	^{mm}
Terme diurne.....	k_1	1,047	0,267
Terme semi-diurne.....	k_2	0,277	0,143
Terme tiers-diurne.....	k_3	0,068	0,040

Les valeurs de r_n suivent une marche un peu plus compliquée. Pour le terme diurne, r_1 , nul à l'équateur, croît jusque vers la latitude de 35° , puis décroît ensuite jusqu'au pôle. La loi de variation en latitude du terme semi-diurne r_2 n'a pu être encore bien déterminée. Enfin, pour le terme tiers-diurne, on a sensiblement, pour les stations continentales,

$$r_3 = 0^{\text{mm}}, 211 \cos^2 \lambda;$$

et pour les stations maritimes,

$$r_3 = 0,080 \cos^2 \lambda.$$

Les phases ξ_1 et ξ_3 sont indépendantes de la latitude; ξ_1 est égal à 265° pour les stations continentales et à 235° pour les stations maritimes; ξ_3 est égal à 85° pour toutes les stations, si l'on considère r_3 comme positif; si l'on donnait à r_3 le signe —, sa valeur deviendrait 265° , c'est-à-dire exactement la même que celle

de ξ_1 , pour les stations continentales. Quant à la valeur de ξ_2 , elle ne peut encore être déterminée bien exactement.

2° *Phases.* — Les phases ψ_n des différents termes de l'onde thermique peuvent être représentées également par une formule telle que

$$\psi_n = m_n + r_n \cos(l + \xi_n).$$

Dans le terme diurne, la valeur de m_1 paraît indépendante de la latitude; elle est égale à 280° pour les stations continentales, à 79° pour les stations de montagne, et à 275° pour les stations maritimes, sauf dans les latitudes élevées où se produit dans l'onde diurne une inversion que nous avons signalée et expliquée (voir page B.305).

Dans les termes semi-diurne et tiers-diurne, les valeurs de m_2 et de m_3 paraissent avoir la forme $m_0 + k \cos \lambda$. Pour les stations continentales, la valeur de m_0 est de 60° dans le terme semi-diurne et de 203° dans le terme tiers-diurne; quant à la valeur de k , elle est de 75° dans le terme tiers-diurne, et ne peut être déterminée exactement dans le terme semi-diurne.

Pour les stations maritimes, les valeurs de m_2 et de m_3 ne peuvent pas encore, avec les observations dont on dispose, être déterminées bien exactement; mais elles ne s'écartent pas beaucoup de celles qui conviennent aux stations continentales.

Les valeurs de r n'ont été déterminées que pour les stations continentales et les premier et troisième termes. On a trouvé ainsi :

$$\begin{aligned} r_1 &= 12^\circ, 6 \tan \lambda, \\ r_3 &= 15^\circ, 6 \sin \lambda. \end{aligned}$$

Enfin les valeurs de ξ n'ont été bien déterminées que pour les stations continentales, pour lesquelles on a

$$\begin{aligned} \xi_1 &= 73^\circ, \\ \xi_2 &= 82^\circ \cos \lambda, \\ \xi_3 &= 46^\circ + 60^\circ \cos \lambda. \end{aligned}$$

Au lieu d'étudier séparément les différents termes de l'onde thermique, il est intéressant de calculer directement la valeur de cette onde totale pour chaque heure. Il suffit pour cela de prendre les nombres qui représentent, pour chaque station et chaque mois, la variation diurne réelle du baromètre (Tableaux des pages B.249 à B.287) et d'en retrancher l'onde semi-diurne principale dont l'expression en temps moyen est, en désignant par ε l'équation du temps (voir page B. 290) :

$$0^{\text{mm}}, 926 \frac{h \cos^2 \delta}{760 r^2} \cos^4 \lambda \cos(2m + 64^\circ - 2\varepsilon).$$

On calculera aisément pour chaque mois et chaque heure de temps moyen la valeur de cette onde semi-diurne, au moyen des valeurs de $\frac{\cos^2 \delta}{r^2}$ et de ε données page B. 291, et, en la retranchant des nombres qui représentent la variation diurne réelle du baromètre, on aura directement l'onde thermique totale, que nous avons représentée par la série

$$a_1 \cos(m + \psi_1) + a_2'' \cos(2m + \psi_2'') + a_3 \cos(3m + \psi_3) + \dots$$

et dont nous avons jusqu'ici étudié séparément les différents termes.

Nous avons fait ce calcul pour quelques stations et nous en donnons les résultats dans le Tableau suivant (Tableau XIV) :

TABLEAU XIV. — VARIATION DIURNE DU BAROMÈTRE. ONDE THERMIQUE.

Heures (temps moyen).	Batavia.		Calcutta.		Lisbonne.	Madrid.		Saint-Bernard.	Saint-Maur.	Catherinbourg.	Upsal.	Saint-Pétersbourg.
	Juin.	Déc.	Mars.	Juill.	Juill.	Janv.	Juill.	Juill.	Juill.	Juill.	Juill.	Juill.
0 (minuit).	+32	+23	-18	+17	+3	-11	-6	+18	+12	+6	+12	+1
1.....	+37	+22	-14	+14	+2	-9	-2	+12	+7	+8	+11	+2
2.....	+38	+25	-10	+17	-3	+4	+6	+2	+7	+10	+10	+3
3.....	+36	+26	-8	+10	-5	+12	+18	-8	+10	+12	+7	+2
4.....	+37	+30	-6	+14	-1	+6	+35	-16	+16	+14	+9	+2
5.....	+37	+38	+21	+20	+7	+1	+55	-22	+23	+15	+10	+2
6.....	+39	+47	+44	+36	+12	+3	+68	-23	+33	+15	+11	+2
7.....	+41	+52	+67	+45	+20	+10	+74	-22	+39	+17	+12	+2
8.....	+45	+48	+107	+49	+21	+23	+72	-22	+37	+14	+12	+1
9.....	+37	+36	+126	+47	+19	+43	+64	-21	+30	+10	+12	+3
10.....	+15	+18	+126	+43	+16	+56	+53	-18	+23	+5	+10	+5
11.....	-7	-2	+107	+33	+15	+43	+38	-14	+16	+2	+8	+7
12 (midi)....	-33	-20	+68	+20	+8	+8	+21	-7	+6	0	+2	+8
13.....	-54	-37	+24	+2	+3	-22	+1	+1	-3	-3	-4	+6
14.....	-73	-58	-23	-22	0	-36	-20	+8	-12	-5	-8	+4
15.....	-78	-76	-58	-48	-8	-33	-43	+12	-24	-10	-14	0
16.....	-70	-75	-80	-76	-12	-24	-63	+14	-39	-17	-20	-3
17.....	-53	-59	-96	-86	-24	-17	-80	+13	-54	-23	-27	-6
18.....	-40	-40	-102	-80	-28	-13	-86	+12	-55	-26	-29	-9
19.....	-27	-26	-93	-60	-29	-9	-81	+12	-47	-24	-25	-10
20.....	-10	-12	-71	-36	-21	-8	-62	+13	-32	-19	-15	-10
21.....	+6	+3	-48	-7	0	-8	-34	+18	-7	-7	0	-7
22.....	+17	+14	-32	+20	+1	-9	-18	+19	+4	+1	+6	-4
23.....	+28	+23	-29	+26	+5	-10	-11	+20	+10	+5	+10	-1

L'étude de l'onde thermique seule conduit à des conclusions très intéressantes.

Dans les latitudes basses en toute saison, et dans toutes les latitudes en été, l'onde thermique présente un seul maximum et un seul minimum. Le maximum se présente entre 7^h et 11^h du matin, suivant les pays ou les saisons, et le minimum vers 4^h du soir en moyenne, plus tôt en hiver, plus tard en été. L'onde

thermique produit donc en moyenne un maximum de pression vers 9^h ou 10^h du matin, puis la pression baisse rapidement jusque vers 4^h du soir; elle remonte ensuite d'abord assez vite, puis plus lentement pendant la nuit, et plus rapidement de nouveau à partir du lever du Soleil. On remarquera que ces variations sont en grande partie conformes à la première théorie de la variation diurne du baromètre, celle qui a été proposée par Ramond et perfectionnée ensuite par Kreil et Renou et qui était insuffisante quand on l'appliquait à la variation diurne totale de la pression. L'onde thermique peut ainsi s'expliquer de la manière suivante :

Pendant la nuit, à mesure que le refroidissement se produit dans les couches inférieures de l'atmosphère, celles-ci se contractent et l'air afflue par le haut; il se produit alors une accumulation d'air au-dessus de la station et même un courant descendant, et la pression augmente peu à peu. A partir du lever du Soleil, les couches inférieures s'échauffent rapidement et tendent à s'élever; mais ce mouvement ne se produira que plus tard, quand l'échauffement aura été assez grand pour se communiquer aux régions supérieures de l'atmosphère; dans les premières heures qui suivent le lever du Soleil, les couches inférieures sont donc maintenues en place, s'échauffent et se dilatent, d'où augmentation de la force élastique et hausse plus rapide du baromètre. De 8^h à 10^h du matin, selon les saisons et les stations, l'échauffement des couches inférieures devient assez grand pour déterminer enfin le mouvement ascendant général de l'air, qui va se répandre sur les méridiens plus éloignés du Soleil. La pression diminue donc rapidement jusqu'au moment où, vers la fin du jour, à mesure que la température baisse, le courant ascendant diminue, cesse et finit par être remplacé la nuit par un mouvement descendant; le baromètre remonte alors.

Sur le sommet des montagnes isolées, la marche diurne de l'onde thermique, au moins en été, est inverse, comme nous l'avons déjà indiqué (p. B. 305). Par suite de la dilatation de l'air pendant le jour et de sa contraction pendant la nuit, la quantité d'air qui se trouve au-dessus de la montagne, et par conséquent la pression, est plus grande le jour et plus petite la nuit.

Enfin, dans les latitudes élevées en hiver, et même en été dans les stations maritimes, l'onde thermique semble plus compliquée; mais cette complication s'explique aisément. L'onde thermique normale doit, comme toujours présenter un maximum le matin et un minimum le soir. Seulement ce maximum et ce minimum sont peu accusés, la variation diurne de la température étant faible. Sur cette variation normale se superpose alors, comme nous l'avons déjà expliqué (p. B. 305), une variation inverse produite par un échange d'air entre les latitudes basses et les latitudes élevées, et qui tend à renverser les heures du maximum et du minimum de l'onde thermique. L'onde thermique est de plus influencée, dans les stations littorales, par la différence

descendant pour
courant

ascendant pour
courant

des variations diurnes de la température entre la terre et la mer, différence qui produit le phénomène bien connu des brises de terre et de mer, et qui amène des variations correspondantes dans la forme de l'onde thermique. En étudiant dans chaque cas particulier la forme de cette onde, on arriverait aisément à en expliquer toutes les particularités; peut-être y retrouverait-on, dans une certaine mesure, l'influence d'autres phénomènes, comme l'humidité. Ce sont des recherches de détail qui pourront être faites ultérieurement.

En résumé, des deux ondes distinctes dans lesquelles nous avons décomposé la variation diurne du baromètre, l'une, l'onde thermique, de forme plus ou moins compliquée en apparence, s'explique aisément et est produite, au moins en plus grande partie, par la variation diurne de la température et les différences que cette variation présente entre stations voisines. L'autre, l'onde semi-diurne principale, dont nous avons donné la loi numérique, présente une forme beaucoup plus simple et n'est affectée en rien par les conditions locales. Il est possible qu'elle soit produite par l'action calorifique du Soleil sur les couches supérieures de l'atmosphère; mais ce n'est encore là qu'une hypothèse, et la théorie de cette partie du phénomène reste à établir.

Table par ordre alphabétique des stations pour lesquelles on a publié, dans ce Mémoire, les Tableaux de la variation diurne du baromètre.

	Pages.		Pages.
Aberdeen	B. 282	Melbourne	B. 255
Albany	B. 259	Mexico	B. 285
Allahabad	B. 253	Moncalieri	B. 262
Amsterdam	B. 275	Moscou	B. 280
Armagh	B. 279	Munich	B. 269
Barnaoul	B. 276	Nantes	B. 267
Batavia	B. 249	Naples	B. 258
Berne	B. 268	Nertchinsk	B. 272
Bidston (près Liverpool)	B. 277	Nouvelle-Arkhangelsk	B. 281
Bombay	B. 251	Obir	B. 266
Bruxelles	B. 272	Parc Saint-Maur (Paris)	B. 270
Calcutta	B. 252	Pékin	B. 256
Le Cap de Bonne-Espérance	B. 285	Perpignan	B. 259
Catherinbourg	B. 281	Poitiers	B. 267
Clermont-Ferrand	B. 264	Pola	B. 287
Coïmbre	B. 257	Prague	B. 271
Cordoba	B. 254	Puy-de-Dôme	B. 264
Falmouth	B. 271	Saint-Bernard (Grand)	B. 265
Genève	B. 265	Saint-Martin-de-Hinx	B. 261
Glasgow	B. 280	Saint-Pétersbourg	B. 283
Greenwich	B. 274	Sainte-Hélène	B. 250
Groningue	B. 276	Sainte-Honorine-du-Fay	B. 270
Hambourg	B. 277	San Fernando	B. 254
La Havane	B. 252	Sântis	B. 268
Helsingfors	B. 283	Singapore	B. 249
Hobarton	B. 260	Stonyhurst	B. 278
Keitum	B. 279	Swinemunde	B. 278
Kew	B. 273	Tiflis	B. 258
Klagenfurt	B. 266	Tokio	B. 286
Leipzig	B. 273	Toronto	B. 262
Lesina	B. 286	Toulouse	B. 261
Lisbonne	B. 255	Trieste	B. 287
Lyon (Parc)	B. 263	Upsal	B. 282
Lyon (Saint-Genis)	B. 263	Utrecht	B. 275
Madras	B. 250	Valencia	B. 274
Madrid	B. 257	Vienne	B. 269
Marseille	B. 260	Washington	B. 256
Maurice	B. 251	Zi-Ka-Wei	B. 253

ERRATA.

Dans les observations de Sainte-Hélène (n° 4, p. B. 250) et de Toronto (n° 27, p. B. 262), on a employé en réalité non pas le temps moyen du lieu, mais le temps moyen de Goettingue; pour Sainte-Hélène, les observations ont été faites ainsi 2^m28^s avant l'heure du lieu, et pour Toronto, 2^m48^s après cette heure. Au lieu des heures marquées sur les Tableaux : 0^h, 1^h, ..., il faut donc lire : 23^h58^m, 0^h58^m, ... pour Sainte-Hélène et 0^h3^m, 1^h3^m, ... pour Toronto. On a tenu compte de ces différences dans le calcul des phases ψ des différentes ondes.

Page B. 306, 21^e ligne, au lieu de 0°, 267, lire 0^{mm}, 267.

✓ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE
DE LA
RÉPARTITION DES PRESSIONS
A LA SURFACE DU GLOBE.✓

PAR M. LÉON TEISSERENC DE BORT.

La répartition de la pression barométrique sur le globe dépend de plusieurs causes complexes qui réagissent les unes sur les autres, en sorte qu'il est très difficile de fixer exactement la part de chacune d'elles. Les tentatives faites jusqu'à ces dernières années pour expliquer les traits généraux des isobares n'avaient pas encore permis d'aborder la synthèse de la distribution des pressions et d'essayer de reconstituer par le calcul les isobares moyennes, telles qu'elles résultent des nombreuses observations faites sur les continents et sur les océans.

C'est ce problème que j'ai cherché à résoudre, sinon d'une façon rigoureuse, du moins avec assez d'approximation pour que les isobares calculées offrent les mêmes inflexions générales que les isobares observées et diffèrent seulement de quelques millimètres dans les valeurs absolues.

Si l'on réunit les observations faites pendant une longue période en un grand nombre de points sur le globe, de façon à obtenir la valeur moyenne de la pression en chacun de ces points, soit pour l'année, soit pour les divers mois en particulier, on voit, ainsi que l'a montré Maury, que la pression barométrique varie avec la latitude d'une manière analogue, dans les deux hémisphères, de façon que le phénomène dans son ensemble est caractérisé par les traits suivants. Il existe :

- 1° Une zone de faible pression près de l'équateur;
- 2° Deux zones de fortes pressions vers 35° Nord et Sud;
- 3° Deux zones de faibles pressions vers 55° Nord et Sud;
- 4° La pression remonte légèrement de ces zones vers les pôles.

C.2 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

En étudiant la répartition de la pression dans les différents mois, on reconnaît que ces zones ne restent pas fixes, mais qu'elles se déplacent suivant la déclinaison du Soleil.

Le Tableau suivant, basé sur les Cartes d'isobares moyennes, indique les principales phases de ces déplacements :

Pression barométrique moyenne à diverses latitudes, corrigée de la variation de la pesanteur.

Latitudes.	Janvier.	Mars.	Juillet.	Octobre.
	mm	mm	mm	mm
60° N.....	759,9	760,3	758,3	758,3
55.....	761,8	759,2	758,6	758,9
50.....	762,4	760,9	759,2	760,8
45.....	763,4	761,9	760,0	762,5
40.....	764,5	762,9	760,4	763,7
35.....	765,6	763,3	760,1	763,9
30.....	765,3	762,7	759,6	762,6
25.....	763,8	761,9	758,6	760,9
20.....	761,5	760,6	757,9	759,7
15.....	759,5	759,3	757,2	758,6
10.....	758,4	758,6	757,3	757,8
5 N.....	757,9	758,0	757,9	758,0
0.....	757,7	757,2	758,6	758,4
5 S.....	757,6	757,6	759,6	759,0
10.....	758,3	757,8	760,8	760,1
15.....	758,4	758,2	762,2	761,4
20.....	759,0	759,6	763,3	762,0
25.....	759,7	760,6	764,8	763,6
30.....	760,0	762,0	764,8	764,0
35.....	761,2	762,6	763,6	763,1
40.....	761,9	760,7	761,1	760,8
45.....	757,1	758,5	757,9	758,0
50.....	751,0	755,3	753,1	753,9

Nous donnons ci-après, pour l'hémisphère Nord, les pressions moyennes des régions polaires par zone d'après les récentes Cartes des isobares de janvier et juillet publiées par M. J. Hann (*Atlas physique de Berghaus*) :

	Latitude Nord.						
	55°.	60°.	65°.	70°.	75°.	80°.	85°.
Janvier.....	761,5	760,9	762,0	760,0	758,3	757,7	758,5
Juillet.....	758,4	757,5	757,5	757,5	758,0	758,8	759,3

D'autre part, si nous considérons la variation de pression à la même latitude, en suivant les parallèles, nous verrons que le baromètre n'y est pas uniforme, mais qu'il présente des maxima et minima.

L'étude des Cartes d'isobares nous conduit à reconnaître qu'il y a une tendance générale de la pression à se répartir par zone, tendance qui est accusée

par les moyennes des parallèles; mais que cette tendance est combattue par des causes qui font varier la pression d'une même zone suivant les méridiens. Cette variation est même plus accusée dans l'hémisphère Nord que la variation suivant la latitude, et l'on trouve sur un même parallèle des pressions qui diffèrent de 5^{cm}, pendant que la différence suivant la latitude sur un même méridien ne dépasse pas 25^{mm}.

Il résulte de la superposition des variations en latitude et en longitude la formation d'aires de hautes et de basses pressions. Ces aires, qui ont un caractère de permanence dans une saison donnée, constituent ce que j'ai appelé les *grands centres d'action de l'atmosphère*. Leur existence est liée à la position des grands centres d'action du globe, régions qui, soit par leurs propriétés physiques, soit par leur relief géographique, amènent la production initiale des grands centres d'action de l'atmosphère. Ces derniers justifient le nom de *centres d'action*, parce qu'ils commandent la circulation des vents tout autour d'eux, et que leurs déplacements à la surface du globe et leurs changements d'intensité sont la cause immédiate de la plupart des caractères différents de la circulation atmosphérique dans les diverses saisons.

Pour pouvoir aborder l'explication de la circulation générale, il est nécessaire d'analyser séparément les variations de pression suivant la latitude et celles qui se produisent le long des parallèles. Le trait général de la variation en latitude, trait commun aux deux hémisphères, c'est que la pression monte depuis les régions équatoriales jusque vers 35°, puis décroît jusqu'aux régions polaires. Il faut remarquer que la zone où la pression est la plus basse près de l'équateur varie un peu de latitude suivant la saison, ainsi que celle où le baromètre est le plus haut de part et d'autre.

D'autre part, la pression remonte légèrement vers les pôles, de façon qu'un minimum de pression relatif se trouve dans les deux hémisphères vers 55° de latitude.

Si nous envisageons la variation de pression suivant les parallèles, nous verrons que la température influe directement sur les isobares, et qu'aux régions plus chaudes correspondent des pressions basses, et inversement. C'est ce que j'ai démontré il y a dix ans en rapprochant les isanomales moyennes thermiques des isobares des mêmes mois (voir *Annales du Bureau central météorologique*, t. IV; 1878).

Une fois ces points établis, on arrive à cette première conclusion que, si l'on connaissait la loi générale qui fait varier la pression avec la latitude, en tenant compte de la température en divers points des parallèles, on pourrait reconstituer les isobares dans leurs traits généraux.

Nous allons examiner successivement les causes de la variation des pressions en latitude et le long des parallèles.

C.4 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

PREMIER CAS. — *Isothermes parallèles à l'équateur; la Terre est supposée immobile.*

D'une façon générale, supposons la surface du globe couverte d'une substance homogène, de façon que l'insolation détermine des isothermes parallèles à l'équateur. En admettant qu'à l'origine la température est uniforme et la masse de l'air également répartie, nous aurons partout une pression d'environ 760.

Dans ces conditions, si la température devient inférieure vers les pôles à ce qu'elle est à l'équateur, les surfaces d'égale pression, au lieu d'être des surfaces de niveau, seront inclinées sur ces dernières. Il se forme ainsi des *gradients moteurs* qui mettent l'air en mouvement.

L'effet de cette variation de densité se traduit tout d'abord sur la répartition des pressions dans les régions supérieures où, à égale hauteur au-dessus du niveau de la mer, la pression ne sera plus uniforme.

Il en résulte un mouvement de l'air de l'équateur vers le pôle dans les régions élevées qui ne tardera pas à déterminer vers les hautes latitudes un maximum barométrique près du sol (puisque l'air tend à s'accumuler vers les pôles jusqu'à ce que les surfaces d'égales pressions soient devenues dans les hautes régions des surfaces de niveau).

Près du sol, l'air s'échappe en divergeant des régions polaires pour se rendre dans la zone équatoriale où la pression en bas est inférieure.

A l'équateur, la différence de densité détermine un mouvement ascendant de l'air.

SECOND CAS. — *Isothermes avec des inflexions; l'air a un mouvement relatif par rapport à la Terre qui tourne sur son axe.*

Dans ce cas, comme l'a montré M. W. Ferrel, à cause des mouvements relatifs de l'air par rapport à la surface du globe, il se produit des gradients dirigés de l'équateur au pôle. Leur rôle est de faire équilibre à la composante horizontale suivant le méridien des effets centrifuges, qui tend à s'opposer au mouvement de l'air vers les pôles. Ces gradients, qui ont une origine différente de ceux qui résultent de la pente des surfaces d'égale pression causée par les variations de température, doivent être considérés comme des *gradients de mouvement* ou *gradients résistants*.

L'accumulation de l'air vers le pôle est donc limitée ainsi, et la différence de densité de l'atmosphère dans ces régions, qui tend à y amener la formation du maximum de pression principal, ne suffit pas à l'entretenir, dès que le mouvement relatif de l'air a pris une certaine valeur.

D'autre part, dans les régions tropicales, l'air, dans son mouvement vers

l'équateur, ne prend pas tout à fait la vitesse vers l'est de la Terre, en sorte qu'il arrive avec une direction Nord-Est qui se convertit au point de convergence en vent d'Est. Les alizés qui s'élèvent à l'équateur en vertu de la différence de densité de l'air sont ainsi en retard sur le mouvement diurne de la Terre, et lorsqu'ils se répandent de part et d'autre, leur trajectoire par rapport au globe, au lieu d'être dirigée suivant la ligne de plus grande pente de l'atmosphère qui coïncide à peu près partout avec les méridiens, est infléchie vers l'Ouest jusqu'à la latitude pour laquelle la vitesse de rotation de la Terre est justement la même que celle dont l'air est animé.

Ce mouvement relatif vers l'Ouest tend à diminuer l'aplatissement des surfaces de niveau dynamique vers le pôle et, par conséquent, à intervertir le sens de la pente des surfaces d'égale pression entre l'équateur et la latitude à laquelle le vent a la vitesse de rotation de la Terre.

Aussi, la courbure des surfaces d'égale pression, qui est déjà assez faible dans les régions tropicales à cause de la faible variation de température avec la latitude, est-elle encore diminuée par l'effet du retard de l'alizé supérieur. Et la pression moyenne de l'équateur au 25° degré, dans les conditions moyennes, diminue à 4000^m d'altitude seulement de 1^{mm},5.

La décroissance de pression dans les hautes régions de l'atmosphère entre l'équateur et le pôle est d'abord assez lente; puis elle augmente rapidement en même temps que la densité de l'air croît et que le mouvement relatif de l'air par rapport à la Terre prend une valeur plus grande.

1. *Maxima annulaires du 35°.* — La distance qui sépare une surface d'égale pression de la Terre diminue donc de l'équateur au pôle. La répartition des pressions au niveau du sol dépend directement de cette distance et de la densité de l'air, puisque, en négligeant les effets du mouvement qui font varier un peu la valeur de la pesanteur, la pression en bas est égale à la pression en haut, plus le poids de la colonne d'air comprise dans l'intervalle. Or, les deux facteurs qui déterminent ce poids varient en sens inverse; il y a donc sur chaque méridien une latitude où leur produit est maximum et où la pression entre l'équateur et le pôle est la plus grande. Cette latitude n'est pas la même sur tous les méridiens, à cause de la répartition différente de la température. Elle est plus éloignée de l'équateur dans les régions très froides, comme la Sibérie, l'Amérique centrale et, en général, le centre des continents en hiver; au contraire, elle s'en rapproche au-dessus des mers chaudes ou des continents à température élevée. Dans certains cas, le maximum barométrique est pour ainsi dire supprimé, comme cela arrive au-dessus de l'Asie en été, la diminution de densité étant telle que le maximum n'arrive que dans les hautes latitudes.

Telle est, pour moi, la cause primordiale et originelle des maxima baromé-

C.6 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

triques annulaires qui se trouvent de chaque côté de l'équateur; cause assez différente de celles auxquelles M. Ferrel rattache ces phénomènes.

Sans contester que les effets déviatoires dus aux mouvements relatifs de l'air marchant vers l'Est ou vers l'Ouest ne favorisent l'existence et le maintien des maxima barométriques annulaires, je pense que la cause que j'indique est tout à fait indiscutable. En effet, elle ne repose sur aucune hypothèse et découle comme une conséquence nécessaire de ce fait que la température diminue de l'équateur au pôle et que les hauteurs comprises entre les surfaces d'égale pression à plusieurs milliers de mètres de la Terre diminuent de l'équateur au pôle par suite du mouvement relatif de l'air.

Elle permet de comprendre pourquoi les maxima annulaires varient en latitude avec la position du Soleil et l'échauffement de la Terre, changent de latitude suivant les points du globe considérés et sont supprimés au-dessus de quelques régions très chaudes.

En résumé, on conçoit bien que la distribution générale des pressions soit caractérisée par un minimum relatif à l'équateur, dû à la température élevée; par deux zones de fortes pressions, causées par l'accroissement rapide de la densité de l'air et la lente diminution de la hauteur des surfaces isobares au-dessus du sol; enfin, par un abaissement général des pressions vers les hautes latitudes, à cause des effets du mouvement relatif de l'air par rapport à la Terre⁽¹⁾.

Mais il reste à comprendre comment, dans la majeure partie des cas, la pression est plus basse vers 55° de latitude que plus haut, et c'est là un point qui n'a reçu aucune explication satisfaisante jusqu'ici. M. le Dr Sprung, dans son *Lehrbuch der Meteorologie* (1885), a fait remarquer avec raison que le froid très vif des régions polaires tendait à provoquer l'augmentation de la pression vers les pôles; mais l'effet même de l'accroissement de densité tendant à augmenter la pente des surfaces d'égale pression et à accélérer les mouvements dans les couches supérieures de l'air, ce qui augmente les gradients résistants, la pression ne peut être accrue sensiblement par l'action des températures dans les limites où se maintient le refroidissement.

La raison de la distribution des pressions dans les régions polaires provient, d'après nous, des conséquences du mouvement que nous allons exposer brièvement.

2. *Minima barométriques du 55° de latitude.* — Nous poserons d'abord ce principe que : *en un point donné, les mouvements relatifs de l'air vers l'Est ou l'Ouest, qui déterminent les gradients résistants dirigés suivant les méridiens, sont d'autant plus rapides que l'air change plus vite de latitude.*

(1) Voir FERREL, *The motions of fluids and solids on the Earth's surface*. Washington, 1882.

On sait *a priori* que, en vertu de l'inertie, la vitesse relative suivant les parallèles d'une masse d'air transportée de A à B dépend seulement de la différence de vitesse de la Terre entre ces points, dans l'unité de temps, et non du temps que l'air a mis pour aller de A à B. Mais ceci est seulement vrai dans l'hypothèse que le frottement est nul, sans quoi l'air sera entraîné plus ou moins par les couches inférieures en contact avec le sol, et cet entraînement fera disparaître dans l'unité de temps une certaine fraction de la vitesse relative de l'air.

Ainsi, le frottement tendant à mettre l'air en équilibre avec les mouvements de la Terre, la vitesse relative sera d'autant plus grande et se rapprochera d'autant plus de la vitesse théorique (donnée par la variation de longueur des parallèles) que le changement de latitude qui la produit se fera en un temps plus court.

Ceci posé, examinons ce qui se passe dans le courant supérieur à mesure qu'il marche vers les pôles. La longueur des parallèles diminuant comme le cosinus de la latitude, il faut forcément que la vitesse du courant augmente ou que sa hauteur croisse pour que le mouvement soit continu. A partir de 45° de latitude, on peut considérer que les vents ayant une composante dirigée vers le pôle sont très prédominants près du sol, surtout dans l'hémisphère Sud, où la circulation se rapproche beaucoup des conditions théoriques ; on peut donc admettre que l'air marche vers les pôles à la fois près du sol et dans une partie des régions supérieures. Connaissant la pente des surfaces d'égale pression due à la variation des températures et en supposant le frottement très petit, on peut déterminer l'accroissement de vitesse de l'air vers le pôle. En comparant ensuite cet accroissement de vitesse à la vitesse nécessaire pour assurer l'écoulement de l'air, on voit que, sur la plupart des méridiens, la vitesse de l'air ne croît pas assez pour que l'épaisseur du courant reste uniforme et que cette épaisseur augmente à partir des hautes latitudes aux environs de 55° .

Cette augmentation de hauteur produit un relèvement des surfaces d'égale pression qui entraîne la diminution de la vitesse suivant le méridien et aussi, en vertu du principe n° 2, un ralentissement dans la vitesse relative de l'air par rapport à la Terre. En conséquence, les surfaces de niveau dynamique changent de courbure, les gradients suivant le méridien diminuent, et ainsi la pression remonte dans les régions supérieures. On voit donc que, près du sol, la pression barométrique doit augmenter légèrement de 55° vers les pôles. La seule exception à ce fait se produit lorsque les maxima barométriques se forment seulement assez haut en latitude, comme cela a lieu sur l'Asie et sur l'Amérique en hiver, parce que, dans ce cas, le courant général vers le pôle n'atteint le sol qu'à une latitude assez élevée et qu'ainsi la section horizontale du courant varie dans des limites moindres que celle des courants venant des plus basses latitudes. Il en résulte que la continuité du courant est assurée, avec de faibles augmentations

C.8 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

de hauteur, par les accroissements de vitesse qui résultent des différences de température. C'est ce qu'on observe au nord de l'Asie et de l'Amérique, où la pression décroît peu à peu jusque vers les pôles, pendant qu'elle augmente dans les autres parties du globe à la même latitude.

3. *Mouvement ascendant de l'air.* — Un autre trait caractéristique de la circulation atmosphérique dans les hautes latitudes, c'est le mouvement ascendant de l'air vers 55° , qui serait tout à fait général sans la présence des continents; ce mouvement se traduit par la convergence des vents dans les dépressions si fréquentes à ces latitudes.

Les conditions de continuité des courants aériens nous donnent la raison de cette tendance générale à un mouvement ascensionnel. Comme nous l'avons vu précédemment, les courants généraux doivent augmenter d'épaisseur en se rapprochant des pôles; cet effet est surtout sensible dans les couches inférieures où le frottement retarde les mouvements de l'air, et où les gradients sont plus faibles qu'en haut. Les Cartes de la circulation atmosphérique nous montrent, en effet, que les vents sont déjà forts vers 45° et ne croissent pas sensiblement en vitesse plus au Nord.

Les courants inférieurs augmentent donc rapidement d'épaisseur en s'approchant du pôle, et la trajectoire du vent ne suit pas une surface de niveau, ce qui revient à dire que le vent a une composante ascendante.

La continuité des courants généraux explique donc très bien comment, dans les conditions de température qui existent sur le globe, il y a une zone de basses pressions moyennes vers 55° et une tendance des vents équatoriaux inférieurs à devenir ascendants vers ces latitudes.

L'existence du minimum de pression a pour conséquence de déterminer près du sol des vents marchant du pôle vers les basses pressions, vents qui, en vertu de l'inertie, sont en retard sur le mouvement terrestre et amènent ainsi des gradients résistants dont la pente tend à renforcer le maximum relatif du pôle.

4. *Courants supérieurs de retour vers l'équateur.* — Le point le plus obscur de la circulation générale, c'est la cause et le mode de formation des courants de retour qui ramènent à l'équateur l'air des régions moyennes où les vents sont dirigés à la fois près du sol et à une certaine hauteur vers les pôles.

Il serait un peu téméraire de raisonner sur ces courants dans l'état actuel de nos connaissances, parce qu'ils nous sont seulement indiqués par la nécessité d'expliquer comment l'air revient à son point d'origine, condition indispensable pour assurer la continuité des courants.

Les observations prolongées sur les cirrus fourniront peut-être quelques éclaircissements à cette question si délicate.

Il est bon, cependant, de faire remarquer dès à présent que les tourbillons aériens, qui forment les dépressions barométriques et dont le mécanisme paraît se rapprocher beaucoup de celui des tourbillons liquides, des remous qui se produisent sur les routes et des trombes de M. Weyher, jouissent de certaines propriétés mécaniques qui doivent être prises en considération dans l'explication des courants supérieurs de retour.

Le premier effet de ces tourbillons est de refouler l'air tout autour d'eux dans la partie supérieure où il s'échappe (comme nous l'ont montré les belles recherches de M. Hildebrandsson), en tournant autour du centre de dépression et s'en éloignant de plus en plus.

L'air qui sort de ce maximum de pression relatif peut regagner en partie les régions équatoriales sans être arrêté par les gradients généraux dirigés vers les pôles, parce que cet air a une vitesse relative Est considérable et qu'il tourne autour d'un centre avec un rayon bien inférieur à celui de la Terre.

L'effet centrifuge est très grand et, dans la plupart des cas, les surfaces d'équilibre dynamique pour ces masses d'air sont plus infléchies vers les pôles que celles du courant général. Ces dernières se présentent ainsi, pour l'air qui s'échappe de la partie de la dépression dirigée vers l'équateur, comme des surfaces en pente vers l'équateur.

Nous allons examiner maintenant comment on peut appliquer ces principes généraux à retrouver par le calcul les traits caractéristiques de la distribution des pressions sur le globe.

5. *Forme des surfaces d'égale pression dans l'atmosphère.* — Sur une terre où la température serait la même partout et dans laquelle, par conséquent, l'atmosphère serait en repos, les surfaces d'égale pression seraient des surfaces de niveau, et elles seraient sensiblement concentriques à la surface du globe.

L'accroissement d'intensité de l'effet centrifuge dû à la rotation de l'atmosphère, avec des rayons plus grands que celui de la Terre, augmente très légèrement l'aplatissement de l'atmosphère par rapport à celui de la Terre, et cet effet est à peine sensible à l'observation.

Mais, lorsque la température n'est pas uniforme, la densité différente de l'air fait varier la forme des surfaces d'égale pression, qui ne sont plus des surfaces de niveau. Il en résulte des déplacements de l'air par rapport à la Terre, et ces déplacements donnent lieu aux effets suivants.

Ainsi que le veut le théorème de Coriolis et comme M. Ferrel l'a, le premier, démontré pour l'atmosphère, *une masse d'air qui est animée d'un mouvement relatif par rapport à la surface du globe tend à être déviée de sa trajectoire vers la droite dans l'hémisphère Nord, et vers la gauche dans l'hémisphère Sud.*

Cet effet déviatoire s'oppose au mouvement suivant la pente des isobares et,

C.10 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

pour lui faire équilibre, il faut qu'il se produise une différence de pression opposée, différence qui entre dans la valeur du gradient.

Lorsqu'il s'agit d'une masse d'air qui marche, par exemple, de l'équateur vers le pôle, ou *vice versa*, on conçoit à première vue que, en vertu de l'inertie, elle est en avance ou en retard sur le mouvement de la Terre, à cause de la différence de longueur des parallèles ; mais quand on considère une masse qui a un mouvement vers l'Est ou l'Ouest, la tendance déviatrice est moins évidente (1).

Nous allons nous occuper plus particulièrement de ce dernier cas, qui a la plus grande influence sur la circulation générale.

Considérons avec M. Ferrel un corps qui tourne autour du globe à la latitude λ avec une vitesse linéaire V_1 ; l'action centrifuge dans le plan de rotation, pour un corps, de masse égale à l'unité, qui tourne avec la vitesse V de la Terre, est

$$(1) \quad \frac{V^2}{R \cos \lambda}.$$

Pour le corps animé de la vitesse relative V_1 prise négativement quand elle est de sens contraire du mouvement de la Terre, elle est

$$(2) \quad \frac{(V + V_1)^2}{R \cos \lambda}.$$

En négligeant la variation de longueur du rayon due à ce que la masse d'air n'est pas au niveau de la mer, appelant ω la vitesse angulaire de la Terre $\frac{2\pi}{86164}$, R étant le rayon équatorial, nous pouvons remplacer V par sa valeur $\omega R \cos \lambda$; alors l'expression de l'effet centrifuge devient $\omega^2 R \cos \lambda$. Développant (2), il vient

$$\frac{V^2 + V_1^2 + 2VV_1}{R \cos \lambda} = F.$$

Remplaçant V par sa valeur, on obtient

$$(3) \quad \left(\omega^2 R \cos \lambda + \frac{V_1^2}{R \cos \lambda} + 2\omega V_1 \right) = F,$$

qui exprime l'effet centrifuge F dans le plan de rotation pour un corps qui se déplace sur la Terre avec une vitesse relative suivant les parallèles V_1 .

Pour avoir la composante suivant l'horizon, il suffit de multiplier l'expression précédente par le sinus de la latitude.

(1) Jusqu'à ces dernières années, la plupart des météorologistes n'en ont pas tenu compte, ce qui a donné lieu à ces figures erronées que l'on trouve encore dans des Ouvrages récents à propos de la marche des vents dans les dépressions, et dans lesquelles on représente les vents d'Est et d'Ouest comme n'étant pas déviés.

Nous rappellerons que M. Ferrel avait, dès 1856, appelé l'attention sur ce point en particulier dans ses remarquables travaux.

On remarquera que, dans cette expression, le terme $\omega^2 R \cos \lambda$, qui varie de l'équateur au pôle, est justement celui qui correspond à l'effet centrifuge pour les corps fixés à la surface de la Terre, et il a pour effet de produire l'aplatissement. Nous n'avons donc pas à le prendre en considération, puisque nous cherchons la différence de courbure des surfaces isobares et de la surface du globe. Les termes suivants, dus à l'effet centrifuge F' qui se fait sentir seulement sur les couches d'air animées d'un mouvement relatif V_1 , donnent lieu à un excès d'aplatissement par rapport à la surface du globe. Cet excès peut être positif ou négatif, suivant que l'air va plus vite ou plus lentement que le globe.

Pour exprimer numériquement la valeur de F' , on procède de la façon suivante :

Multipliant l'accélération de l'effet centrifuge F' par le sinus de la latitude, on obtient la valeur de l'accélération centrifuge dans le plan de l'horizon; en divisant ce nombre par g , valeur de la gravité à la latitude considérée, on obtient le rapport des deux accélérations, ou la tangente de l'angle α dont les surfaces de niveau de l'atmosphère seront inclinées sur l'horizon du lieu par l'effet centrifuge

$$\frac{F'}{g} \sin \lambda = \tan \alpha.$$

Pour exprimer cette tangente en millimètres de mercure, on cherche la hauteur occupée au repos par l'atmosphère exerçant une pression de 760^{mm}, si la densité était uniforme et la température égale à 0°. Cette hauteur est donnée par W. Ferrel comme égale à 7991^m,7.

Ce nombre divisé par l'unité de longueur choisie, qui est le degré du méridien terrestre pris comme ayant 111111^m,111, donne la tangente de l'angle que font avec l'horizon les surfaces d'égale pression de l'atmosphère, pour que, sur une longueur de 1°, leur dénivellation corresponde à une différence de pression de 760^{mm}.

Le rapport des deux tangentes, multiplié par 760, donne, en millimètres de mercure, la valeur numérique de la tangente correspondant à l'angle dont les surfaces isobares sont déviées par l'effet du mouvement relatif,

$$\frac{F'}{g} : \frac{7991,7}{111111^m,111} \times 760 = F' \times 1077,4 = \frac{G}{\sin \lambda}.$$

Dans le cas où la température t n'est pas égale à 0° et la pression P à 760^{mm}, il faut multiplier l'expression par $\frac{P}{760(1+0,004t)}$.

Remplaçant F' par sa valeur, il vient

$$(1) \quad G = \frac{1077,4 \left(2\omega V_1 + \frac{V_1^2}{R \cos \lambda} \right) \sin \lambda P}{760(1+0,004t)},$$

C.12 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

expression qui donne, en millimètres de mercure, le gradient G produit par l'excès de courbure des surfaces d'égale pression de l'atmosphère par rapport à la courbure de la surface du globe, excès dû au mouvement relatif V , de l'atmosphère normalement au méridien.

Si l'on voulait tenir compte du frottement de l'air, il serait nécessaire d'augmenter légèrement ce gradient dans une proportion qui n'est pas encore définie.

Construction des Cartes d'isobares calculées.

D'après ce que nous avons dit précédemment on peut indiquer la raison des principaux caractères de la distribution des isobares sur le globe; nous avons voulu aller plus loin et essayer la reconstitution des Cartes d'isobares moyennes par le calcul. Ce travail de synthèse a dû être forcément précédé d'une analyse minutieuse des causes qui font varier la pression sur la Terre, analyse qui nous a conduit à construire les Cartes d'isobares à diverses hauteurs, 1467^m, 2859^m ⁽¹⁾ et 4000^m, d'après les isobares observées. (*Voir ces mêmes Annales*, t. I; 1885.) Ces Cartes montrent comme faits principaux :

1° *Que les maxima barométriques annulaires du 35° degré de part et d'autre de l'équateur disparaissent à une certaine hauteur, en sorte que les surfaces d'égale pression à partir de 4000^m environ sont déprimées sans point de rebroussement à partir de l'équateur thermique vers les pôles;*

2° *Que les minima et maxima qui résultent du renforcement des zones de basses et de hautes pressions, minima de l'Atlantique et du Pacifique, minima des continents pendant la saison chaude, maxima de l'Asie, de l'Amérique et des continents de l'hémisphère Sud, s'effacent à une certaine hauteur et sont remplacés par des phénomènes inverses.*

Ce résultat fait bien comprendre comment se produisent les mouvements de l'air des régions supérieures et concorde pleinement avec les recherches de M. H. Hildebrandsson sur la marche des cirrus.

Nous croyons devoir reproduire ici les deux Cartes les plus importantes (*fig. 1 et 2*); ce sont les premières Cartes générales de ce genre qui aient été données, elles ont paru dans les *Annales du Bureau météorologique*, en mai 1887 ⁽²⁾.

Ces Cartes montrent clairement que l'on pourrait reproduire les isobares près du sol, de 0° à 60°, en partant de surfaces d'égale pression prises à une hauteur convenable et plus ou moins infléchies vers les hautes latitudes.

⁽¹⁾ Ces hauteurs sont celles de l'observatoire du Puy de Dôme et de celui du Pic du Midi.

⁽²⁾ Depuis cette époque, M. Köppen a publié dans le *Meteorologische Zeitschrift* de décembre 1888 une étude où il analyse les variations de la pression dans la verticale sous l'influence des différences de température, et donne un exemple, la journée du 19 décembre 1884 sur l'Amérique du Nord et une portion de l'Atlantique.

Il nous a paru intéressant de rechercher alors quelle était la part qui appartenait à l'inflexion propre de ces surfaces le long de chaque méridien, de façon

Fig. 1.



Isobares moyennes de janvier à 4000^m.

Fig. 2.

Isobares moyennes de juillet à 4000^m.

à séparer ce qui est dû à la seule influence de la densité de l'air, qui change d'un point à l'autre à la même latitude. Pour cela, nous avons calculé à la hauteur des contre-alizés, c'est-à-dire à 4000^m, la distribution de la pression moyenne

C.14 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

le long du méridien, d'après l'ensemble des deux hémisphères, et nous avons en chaque point (les points sont éloignés de 15° en longitude et de 5° en latitude) ajouté à la pression à 4000^m le poids de la colonne d'air, de cette hauteur, ayant pour température moyenne la température déduite des nombres observés au niveau du sol, en prenant pour décroissance 1° pour 180^m .

Nous avons donc ainsi le long des parallèles des variations de pressions dues seulement à la différence de densité de l'air et non à l'aplatissement plus ou moins grand des surfaces d'égale pression. C'est ainsi qu'ont été construites les Cartes (*fig. 1* et *2*) qui représentent les isobares de janvier et celles de juillet. On voit sur ces Cartes que l'effet des différences de température suffit et au delà à produire les principaux traits caractéristiques de la distribution des pressions le long d'un même parallèle. Les maxima et minima qui coïncident avec les anomalies thermiques sont bien marqués avec des différences de pression très exagérées, mais les maxima annulaires des 35° Nord et Sud sont peu distincts.

L'exagération très manifeste des gradients tient à ce fait que les surfaces d'égale pression des régions élevées sont supposées avoir la même courbure au-dessus des régions chaudes et des régions froides, ce qui n'est pas conforme à la réalité.

Il est évident, en effet, que la courbure des surfaces isobares provient, à l'origine du mouvement, de la contraction plus ou moins grande de l'air vers les pôles, sous l'influence de l'écart de température entre l'équateur et les hautes latitudes. Cette courbure, d'où dépend la rapidité du mouvement d'échange d'air entre des régions à températures différentes, doit se conserver en s'accroissant plus ou moins lorsque la circulation générale est établie.

Au-dessus des régions à anomalies thermiques positives, la courbure des surfaces doit donc être moins prononcée que sur les régions froides, puisque la contraction est moindre.

Une fois sur la trace de ce fait qui était démontré avec évidence par ce premier essai de reconstitution des isobares figuré sur les Cartes (*fig. 1* et *2*), nous avons cherché à aller plus loin et à calculer la forme que doivent avoir, d'une façon générale, les surfaces d'égale pression dans les régions élevées et comment cette forme est modifiée pour chaque méridien en particulier.

La hauteur à laquelle les surfaces d'égale pression sont courbées de l'équateur thermique aux hautes latitudes sans point de rebroussement, et qui correspond ainsi aux contre-alizés réguliers, est, d'après nos Cartes, de 4000^m environ; nous avons donc cherché la valeur des gradients (ce qui est plus simple que la courbure des surfaces et revient au même) à cette hauteur.

La courbure des surfaces isobares dépend, à l'origine, de la différence de densité de l'air, mais elle ne tarde pas à être modifiée par les effets du mouvement relatif.

Or, nous avons vu précédemment que la formule de Ferrel (4) fournit un moyen de calculer la valeur du gradient dû à l'effet du mouvement relatif normal au méridien, quand on connaît la vitesse de ce déplacement. Nous avons donc calculé par ce moyen les gradients des régions supérieures, et cela de la façon suivante.

6. *Application de la formule de Ferret.* — Cette formule suppose connues les vitesses relatives de l'air par rapport à la surface du globe; les observations des courants supérieurs sont encore trop incomplètes pour que l'on puisse en déduire quelque chose sur la vitesse moyenne de l'air: il a donc fallu recourir à une hypothèse sur ces vitesses. Voici à quoi nous nous sommes arrêté.

La vitesse relative vers l'Est ou l'Ouest due à l'inertie d'une masse d'air qui se déplace sur le globe serait égale à la différence de vitesse entre le point de départ de l'air et chacun des parallèles parcourus si le frottement était nul; mais, par suite du contact de la surface de la Terre et des masses d'air voisines, la vitesse relative est considérablement diminuée.

Nous avons admis que la vitesse était ainsi réduite à des valeurs voisines de la racine carrée de la vitesse qui existerait sans le frottement. Cette hypothèse conduit à trouver un gradient général assez peu différent de celui que l'on observe sur l'ensemble du globe.

Nous avons donc pris pour vitesse de l'air la racine carrée de la vitesse relative théorique.

Comme ces vitesses donnaient pour l'hiver des gradients un peu faibles, nous les avons augmentés d'une quantité α égale à $\frac{1}{6}$ de leur valeur sur les terres, à $\frac{1}{5}$ sur les océans de l'hémisphère Nord et à $\frac{1}{4}$ sur ceux de l'hémisphère Sud.

Nous avons en effet jugé, ainsi que l'étude des Cartes journalières le fait voir, que les mouvements de l'atmosphère sont en moyenne bien moins violents sur les terres que sur les mers, ce qui coïncide avec des gradients moindres; de même en juillet, les différences de température étant moins accentuées, et cela même dans l'hémisphère Sud, les mouvements de l'air sont moins rapides et les gradients plus faibles; nous n'avons donc pas augmenté les vitesses comme pour le mois de janvier.

Les vents alizés sont en retard sur la vitesse de rotation du globe, et ce retard, à 5° ou 6° de latitude Nord et Sud, atteint près du niveau de la mer 6^m à 7^m par seconde. A mesure que l'on s'élève, les vitesses sont plus grandes et le retard aussi plus sensible puisque le frottement ne tend plus à entraîner l'air.

Nous basant sur la vitesse de propagation des cendres du Krakatoa, qui indique pour les courants supérieurs un retard d'environ 31^m par seconde, retard qui doit être considéré comme un maximum à cause de la grande élévation du courant, nous avons admis que la latitude à laquelle le contre-alizé supérieur

C.16 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

partant des régions équatoriales avait la même vitesse de rotation que la Terre était en moyenne 20° . Sur ce parallèle, en effet, la vitesse de rotation est de 28^m en nombres ronds, inférieure à celle de l'équateur.

° Du reste, à ces latitudes, les gradients dirigés vers l'équateur dans les hautes régions sont très faibles et sont encore diminués par ce fait que la température élevée de l'équateur tend à détruire la courbure des surfaces d'égale pression vers l'équateur et la diminue en tout cas d'une quantité suffisante pour assurer l'écoulement de l'air. Les surfaces infléchies vers l'équateur, comme l'indique le gradient calculé, sont en effet des surfaces de niveau pour une masse d'air animée d'une vitesse relative donnée par rapport à la Terre. L'écoulement ne peut être entretenu que lorsque les surfaces isobares sont moins infléchies que les surfaces de niveau; l'écart maximum entre ces surfaces représente en millimètres de mercure la différence de pression nécessaire pour donner à l'air sa composante suivant le méridien et vaincre le frottement. Nous avons pris cette valeur égale à $1^{mm},5$, ce qui correspond pour 15° du méridien à une pente de $0,000019$, pente très faible.

Les valeurs générales des vitesses étant ainsi calculées, nous avons cherché, nous basant sur le principe du n° 2, dans quelle mesure la décroissance de température le long du méridien qui détermine les mouvements de l'air influe sur la vitesse relative des courants vers l'Est ou l'Ouest.

Nous nous sommes arrêté aux valeurs suivantes, qui entrent dans le coefficient ($1 \pm \theta$) par lequel il faut multiplier les gradients, θ étant affecté du signe — ou du signe + suivant que l'excès thermique du point considéré est positif ou négatif. La température moyenne de chaque latitude prise pour base est la moyenne des températures des deux hémisphères.

Excès de température.	Valeur de θ	
	en janvier.	en juillet.
0	0	0
4	0,10	0,2
8	0,15	0,3
12	0,20	0,4
16	0,25	0,5
20	0,30	0,6
24	0,35	0,7

Entre l'équateur et le 30° degré, la pression à 4000^m ne paraît pas croître vers le centre de l'Asie, d'après les Cartes (*fig.* 1 et 2), comme cela aurait lieu s'il existait une contre-mousson supérieure. Il est probable, ou bien que la contre-mousson se produit à une altitude plus grande, ou que le contre-alizé emporte vers le Nord l'air de la mousson inférieure qui ne fait pas directement retour à l'équateur.

Dans l'une comme dans l'autre hypothèse, on peut considérer qu'à 4000^m le

vent a une composante dirigée vers le pôle et, en vertu des mouvements relatifs, il se forme un gradient dans le sens de celui de la mousson. C'est en admettant ce fait que notre Carte a été calculée. Les vitesses vers l'Est, dans cette région, sont prises comme égales à la racine carrée des vitesses théoriques. Les gradients près de l'Asie sont plus grands que ceux des régions voisines parce que l'air vient de l'hémisphère sud et présente peu de retard sur le mouvement diurne à l'équateur, comme le montre la mousson dirigée presque suivant le méridien.

La pression en un point est donc calculée sur nos Cartes de la façon suivante.

Entre l'équateur et 20°, excepté sur l'Asie, les gradients, calculés en prenant la vitesse relative telle qu'elle résulte de la différence de longueur des parallèles, sont ramenés pour les raisons exposées plus haut à 1^{mm}.

Au-dessus de 20° les vitesses sont données par l'expression

$$V_1 = \frac{(1 \pm \theta) \sqrt{R(\cos \lambda - \cos \lambda_1)}}{86164},$$

expression multipliée pour le mois de janvier par $(1 + \alpha)$ et dans laquelle

R égale le rayon de la Terre;

λ , la latitude à laquelle le vent n'a pas de composante parallèle à l'équateur;

λ_1 , la latitude du point de la Terre considéré.

Cette vitesse est introduite dans la formule (4) dont on connaît alors tous les éléments, puisque la pression P est donnée à l'origine par la pression du point de départ et ensuite par celle du dernier point calculé et que la température est connue par l'observation au niveau du sol, ce qui permet de la déterminer à peu près à 4000^m.

En juillet, sur la portion centrale de l'Asie, la latitude λ du point où la vitesse relative du vent suivant les parallèles est nulle a été prise comme égale à 45°, parce que le maximum thermique remonte jusque vers 30°.

En hiver, où le mouvement général de l'air vers les pôles est bien marqué, il faudrait pouvoir tenir compte, dans les hautes latitudes, de l'augmentation de hauteur des courants et de la diminution des gradients, ainsi qu'il est dit nos 2 et 3. Ne pouvant pas calculer exactement ces quantités, nous avons déterminé quels seraient les gradients pour le cas où, l'air ayant un mouvement général ascendant vers 55° à 60°, le point d'origine du courant supérieur se trouverait à cette latitude. C'est à peu près le cas sur les océans Atlantique et Pacifique.

Ces gradients, qui sont plus faibles que ceux d'un courant venant directement des régions équatoriales, ont été employés pour la Carte de janvier à partir de 60°.

Ils déterminent la formation de maxima barométriques polaires assez analogues à ceux de la nature et, bien que leur calcul soit empirique, le fait de la

C.18 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

diminution des gradients à ces latitudes dans les régions supérieures paraît certain à cause de l'accroissement de hauteur des courants.

Nous avons représenté, sur la Carte de janvier, par des lignes ponctuées les isobares qui résultent des gradients calculés d'après la règle générale employée entre 20° et 60°; il est manifeste qu'ils sont trop grands et entraîneraient un abaissement de pression vers les pôles, contraire aux faits observés et aux principes des n^{os} 2 et 3.

Ces gradients supposent un mouvement rapide de l'air vers les pôles qui nécessiterait en bas des contre-courants ramenant l'air vers les latitudes moyennes. Or ces courants ne peuvent se former dans les couches inférieures et n'ont pas, dans l'état de nos connaissances, de raison de s'établir dans les hautes régions.

On doit donc admettre des gradients voisins de ceux que nous avons employés.

Les gradients donnés par la formule sont considérés comme positifs quand ils sont dirigés vers l'équateur et comme négatifs lorsqu'ils sont tournés vers les pôles. Après les avoir corrigés comme il a été dit plus haut, on les ajoute successivement à la pression de l'équateur à 4000^m, prise pour point de départ, pour avoir la pression au-dessus de chaque point. Cette pression initiale est le seul nombre dépendant de l'observation du baromètre qui soit nécessaire à la reconstitution des isobares par le calcul.

On arrive ainsi à avoir la pression le long des divers méridiens (nous avons calculé la valeur de ces pressions de 5° en 5° de latitude et de 15° en 15° en longitude).

Il ne reste plus qu'à ramener cette pression à sa valeur au niveau de la mer, en partant de la densité de l'air variable suivant les régions.

Pour cette opération, nous avons fait usage de la Table de décroissance suivante, afin de tenir compte autant que possible de la manière différente dont ce phénomène se produit dans la saison chaude et dans la saison froide :

Décroissance de la température pour 4000^m d'altitude.

Température près du sol.....	—15	—10,0	—7,5	—5,0	—2,5	0	2,5	10	15
Variation pour 4000 ^m	18,0	18,0	19,0	20,0	21,2	22,4	23,6	25,0	25,0

De plus, comme à 4000^m on ne peut pas considérer qu'avec les courants généraux la température dépend seulement de celle qui est observée près du sol, mais qu'elle est influencée par celle des points voisins, nous avons pris comme température T à 4000^m

$$T_{4000} = \frac{2(t_1 - \delta) + t_2}{3},$$

où

t_1 , égale la température du point considéré;

δ , la variation de température pour 2000^m;

t_2 , la température moyenne générale pour 4000^m à la latitude considérée.

7. *Changements du point d'origine des alizés.* — La position sur le globe de l'équateur thermique, qui dépend de la déclinaison du Soleil et de la nature des surfaces insolées, varie de quelques degrés sur les océans; mais sur les terres, qui s'échauffent rapidement et dont la température n'est pas régularisée par les courants, la zone des plus hautes températures se déplace de plus de 30° dans le cours de l'année.

L'alizé ou les moussons, qui en réalité ne diffèrent pas comme cause première des alizés, ont donc, sur les terres, un point de convergence variable de l'été à l'hiver. Entre l'équateur et le 15° ou 20° degré, il y a donc en été intervention des gradients par le fait de la diminution de densité de l'air vers les tropiques et de l'effet du mouvement relatif de l'air appelé vers le point de densité minimum.

Cette intervention du sens ordinaire des gradients est peu accentuée dans l'hémisphère Sud, mais elle est très visible dans l'hémisphère Nord, particulièrement sur l'Asie. L'étendue et la forme compacte de ce continent permettent à l'insolation de produire, en échauffant le sol, un effet considérable et de transporter ainsi le point de convergence de l'alizé jusqu'au 25° degré Nord.

Ce changement dans la latitude du courant ascendant influe sur les gradients, puisque les points où la vitesse du vent est sensiblement égale à celle de la Terre ne sont plus les mêmes.

En appliquant la formule de Ferrel à ce qui se passe dans ces régions, on n'a plus, comme dans le cas ordinaire, une zone de 20° environ où les vents supérieurs, en retard sur le mouvement diurne, tendent à produire un gradient dirigé vers l'équateur jusqu'à la latitude où leur vitesse devient supérieure à celle de la Terre, mais les gradients supérieurs au nord du point de convergence sont continuellement tournés vers les pôles. On en a tenu compte dans le calcul des gradients, en prenant pour $V_1 = 0$ la latitude du point de convergence du vent.

Sur l'Amérique et les continents de l'hémisphère Sud, en été, les minima barométriques sont bien plus limités et les perturbations amenées par la différence de latitude du point de convergence des vents ne sont pas assez intenses pour que nous ayons cru devoir en tenir compte. Les gradients ordinaires ont donc été employés partout, excepté sur l'Asie entre les méridiens de 45° et de 105° E.

On pourra remarquer malgré cela que les isobares calculées pour les régions tropicales s'écartent peu des isobares observées, parce que l'effet des différences de température suffit pour donner aux lignes d'égale pression leurs formes caractéristiques. Les gradients, dans ces régions, paraissent donc être bien plutôt des gradients moteurs que des gradients résistants, c'est-à-dire qu'ils sont dus surtout à la variation de densité de l'air et peu aux effets des mouvements relatifs de l'air. C'est, du reste, ce qui doit avoir lieu le plus ordinaire-

C.20 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

ment près de l'équateur, où le mouvement relatif autour de l'axe de la Terre tend surtout à changer la valeur de la gravité.

8. *Intervention des gradients vers les pôles.* — Comme nous l'avons dit, n° 3, les conditions de continuité ne se trouvant pas satisfaites partout autour du globe à mesure que les courants s'approchent des pôles, il en résulte une augmentation de hauteur de ces courants à certaines latitudes et, par conséquent, un minimum de pression relatif où se produit un mouvement ascendant de l'air. Pour tenir compte de ce fait, nous avons calculé les variations d'épaisseur d'un courant à 4000^m de hauteur, en admettant que ce courant a pour vitesse la vitesse imprimée par le seul abaissement des surfaces d'égale pression sous l'influence de la température des hautes latitudes. En admettant que la pression au niveau du sol est uniforme et voisine de 760^{mm}, ce qui est le cas initial où la circulation atmosphérique commence à se produire par suite des différences de température entre l'équateur et les pôles, et prenant les vitesses du vent suivant les méridiens à 45° (d'après la formule $V_p = \sqrt{2gh}$, h exprimant en mètres l'abaissement des surfaces isobares entre les points considérés), on trouve que la latitude où le courant supérieur commence à se ralentir sensiblement et où, par conséquent, l'air tend à prendre un mouvement ascensionnel, est située vers 55°.

Si l'on prend en considération ce qui se passe près du sol, on peut évaluer, comme dans le Tableau suivant, le produit de la vitesse du vent par le cosinus de la latitude qui varie comme la section horizontale des courants; ce produit correspond au débit. Nous admettons que ces vents ont une vitesse nulle selon le méridien dans l'aire centrale des maxima (ce qui se vérifie par l'observation, les vents étant très faibles et variables près du centre des aires de fortes pressions) et que leur accélération leur est imprimée par un gradient égal à celui des couches supérieures, qui est plus fort que celui du voisinage du sol :

Latitude.	180 E.	105 E.	90 E.	30 E.	0.	30 W.	90 W.	105 W.
0								
40	0	»	»	»	»	0.	0	»
45	29,8	»	»	»	0	26,3	29,2	0
50	42,4	0	»	0	18,7	37,4	37,7	38,7
55	43,8	13,9	0	20,3	25,7	40,9	42,1	52,1
60	42,4	33,1	26,1	24,7	28,9	43,8	51,0	49,9
65	45,0	37,3	33,8	32,6	44,2	42,1	»	»
70	»	32,0	30,3	»	»	37,3	»	»

Sans s'attacher à la valeur absolue des vitesses considérées, on remarquera que sur les méridiens de 180°E et 30°W, qui correspondent à la partie centrale des océans, le produit de la vitesse par la section reste à peu près constant; ceci prouve qu'avec les vitesses réelles, bien inférieures à celles de notre calcul où, à 50° Nord, elles atteignent 60^m par seconde, la continuité du courant n'est assurée qu'avec une augmentation de hauteur et une hausse de pression.

Sur les méridiens des continents, au contraire, dans les conditions de l'hémisphère Nord, les débits augmentent avec la latitude, ce qui montre qu'à débit constant la hauteur du courant diminue; la pression peut donc décroître vers le pôle, comme les observations le montrent.

9. *Système d'isobares fermées.* — Dans tout ce que nous avons dit précédemment, nous n'avons pris en considération que la composante des mouvements relatifs de l'air normale aux méridiens. L'air tourne ainsi autour de la Terre avec un rayon peu différent de celui du parallèle considéré; mais, lorsqu'il se produit en un point un minimum de pression, les vents qui convergent prennent, en vertu de l'inertie, un mouvement tourbillonnaire et l'air se meut suivant des courbes dont le rayon est plus petit que celui des parallèles, en sorte que l'effet centrifuge est beaucoup augmenté. C'est à cette cause et à la superposition continuelle de dépressions barométriques tourbillonnaires que l'on doit d'avoir des minima moyens aussi accentués sur les océans Atlantique et Pacifique.

Dans l'état actuel de nos connaissances sur la vitesse des vents, et en particulier des courants supérieurs, il nous a paru prématuré de tenir compte par le calcul de ces causes de diminution de la pression; mais il n'est pas inutile de les indiquer. Il nous suffit, pour le moment, de montrer qu'en vertu des phénomènes indiqués nos 2 et 8 les pressions doivent remonter sur les océans Atlantique et Pacifique à partir de 55° et 60° Nord, en sorte qu'il se produit une zone de basses pressions relatives à ces latitudes, zone que le voisinage des terres froides transforme en un minimum fermé plus ou moins allongé, dont la forme est ensuite régularisée et arrondie par les mouvements tourbillonnaires violents qui s'y produisent. Nous pouvons d'ailleurs considérer ces tourbillons comme dus en partie à la différence de température et en partie à l'action mécanique des grands courants supérieurs de l'atmosphère.

10. *Composante verticale des vents.* — Il est à propos de faire remarquer ici que, dans un minimum barométrique, où la température inférieure agit jusqu'à une certaine hauteur, la composante verticale du vent est influencée par les conditions de continuité des courants de la manière suivante.

A cause de la direction des vents autour du minimum, les températures sont plus élevées à l'est du centre qu'à l'ouest; il s'ensuit qu'à une certaine hauteur les surfaces d'égale pression, sous l'influence des différences de densité, sont déprimées à l'arrière. Il en résulte à l'arrière une augmentation de vitesse des courants ou une déviation plus rapide de l'air vers le centre qui ont pour effet de faire arriver au point considéré une plus grande quantité d'air en un temps donné et d'y déterminer ainsi un maximum de pression relatif. Cette surpression se traduit par la composante descendante qui est accusée par les vents de la région

C.22 ÉTUDE SUR LA SYNTHÈSE DE LA RÉPARTITION DES PRESSIONS

postérieure des dépressions et qui donne aux vents de Nord-Ouest de notre hémisphère ce caractère *plongeant* que les marins connaissent bien.

Dans la partie antérieure, au contraire, les surfaces d'égale pression sont surélevées et les vents à une hauteur moyenne tendent à être moins convergents, ce qui oblige le courant ascendant à s'alimenter par les couches basses. Cet effet ne se poursuit pas jusqu'à une très grande hauteur, à cause du mode de décroissance de la température qui est plus rapide à l'avant qu'à l'arrière des dépressions, comme M. Hildebrandsson l'a démontré; mais il suffit déjà pour donner aux vents des couches inférieures, où nous observons, des composantes verticales différentes.

Ces mêmes caractères se retrouvent dans les grands minima moyens qui résultent de la superposition des minima barométriques journaliers. Ils sont très accentués par ce fait que, sur les océans, la rive droite est de beaucoup plus chaude que la rive opposée, à cause des courants généraux marins et atmosphériques.

11. *Résumé.* — Nous voyons, par cet essai de synthèse de la distribution des pressions, que les traits principaux des isobares s'expliquent et peuvent être reproduits par les considérations suivantes :

1° A l'origine, la température est supposée constante et la pression uniforme; la masse de l'atmosphère est telle que cette pression est voisine de 760^{mm}.

2° Quand la température du globe dépend non plus de la chaleur centrale, mais de l'insolation, la différence de température entre le pôle et l'équateur se produit, s'accroît et donne naissance à des courants aériens supérieurs dirigés des tropiques vers les hautes latitudes.

3° En vertu du mouvement relatif de l'air dû à l'inertie (comme M. Ferrel l'a le premier démontré), les vents qui marchent vers les pôles tendent à s'infléchir vers l'Est, et cette tendance amène la formation d'un gradient dirigé vers le pôle.

Les surfaces d'égale pression se rapprochent ainsi de la Terre à mesure que la latitude augmente, et cela dans une proportion plus considérable que ne le produit la seule variation de densité de l'air. Cet effet empêche le maximum barométrique principal de se produire au pôle.

Il se forme ainsi, à certaines latitudes, des maxima barométriques aux points où le produit de la hauteur (comprise entre les surfaces d'égale pression des régions élevées et la Terre) par la densité de l'air est maximum. Ces maxima se produisent avant les régions polaires, parce que là les surfaces d'égale pression sont trop abaissées.

On trouve donc entre l'équateur et les hautes latitudes une sorte de bourrelet d'air, qui est encore augmenté par le retard du contre-alizé supérieur et les effets du mouvement relatif de l'air inférieur qui forme les alizés et les vents d'Ouest des latitudes moyennes.

4° Dans les hautes latitudes, la convergence des méridiens, en diminuant la section des courants, les oblige à augmenter de hauteur lorsque leur vitesse ne croît pas assez rapidement, et c'est le cas général; il en résulte que la pression passe par un minimum entre les latitudes moyennes et les régions polaires. Ce minimum a une latitude variable suivant l'intensité des gradients qui modifie l'accroissement de vitesse des vents.

5° Les différences de température qui se produisent sur le globe entre les régions voisines et en particulier, à la même latitude, entre les continents et les mers, en changeant la densité des couches inférieures de l'atmosphère, détruisent la régularité des isobares et amènent la formation d'aires fermées de hautes ou de basses pressions qui sectionnent les zones.

C'est ainsi que se produisent les grands centres d'action de l'atmosphère qui impriment à la circulation générale son véritable caractère.




PLANCHES.

CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A.1.

5 Janvier 1886 (s.)



6 Janvier 1886.



8 Janvier 1886 (s.)



12-13 Janvier 1886.




14 Janvier 1886 (m.)




14 Janvier 1886 (s.)




17 Janvier 1886 (m.)




18 Janvier 1886 (m.)



18 Janvier 1886 (s.)



19 Janvier 1886 (m.)



19 Janvier 1886 (s.)




20 Janvier 1886 (m.)



20 Janvier 1886 (s.)




21 Janvier 1886 (m.)



21 Janvier 1886 (s.)




21-22 Janvier 1886.




23 Janvier 1886 (s.)



24 Janvier 1886 (m.)



24 Janvier 1886 (s.)



25 Janvier 1886 (s.)




CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.


Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A. 2.


26 Janvier 1886 (m.)




26 Janvier 1886 (s.)




27 Janvier 1886 (m.)



27 Janvier 1886 (s.)



27-28 Janvier 1886.



30 Janvier 1886 (s.)



1^{er} Février 1886 (m.)




1^{er} Février 1886 (s.)



2 Février 1886 (s.)



3 Février 1886 (m.)




3 Février 1886 (s.)



4 Février 1886 (m. et s.)



5 Février 1886 (m.)



6 Février 1886 (m. et s.)



12 Février 1886 (m. et s.)




17 Février 1886 (s.)



25 Février 1886 (s.)



26 Février 1886 (s.)



2 Mars 1886 (s.)



3 Mars 1886 (m. et s.)



Var.

CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A. 3.




CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.

Bureau central Météorologique de France

Annales de 1887. T.I. Pl. A. 4.


6 Avril 1886 (s.)



7 Avril 1886 (s.)



8 Avril 1886 (s.)



9 Avril 1886 (m.)



9 Avril 1886 (s.)




10 Avril 1886 (m.)




10 Avril 1886 (s.)



11 Avril 1886 (m. et s.)



12 Avril 1886 (m. et s.)



14 Avril 1886 (s.)



15 Avril 1886 (m.)



15 Avril 1886 (s.)



16 Avril 1886 (m.)



16 Avril 1886 (s.)




17 Avril 1886 (s.)



18 Avril 1886 (m. et s.)




19 Avril 1886 (m.)




19 Avril 1886 (s.)



20 Avril 1886 (m.)



20 Avril 1886 (s.)



Var.

Var.

CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A. 5.

21 Avril 1886 (s).

22 Avril 1886 (s).

23 Avril 1886 (s).

24 Avril 1886 (m).







24 Avril 1886 (s).

25 Avril 1886 (s).

26 Avril 1886 (m).

26 Avril 1886 (s).





27 Avril 1886 (m).

27 Avril 1886 (s).

28 Avril 1886 (m).

28 Avril 1886 (s).



29 Avril 1886 (m).

29 Avril 1886 (s).

30 Avril 1886 (m.as).

1^{er} Mai 1886 (m).



1^{er} Mai 1886 (s).

2 Mai 1886 (s).

7 Mai 1886 (s).

8 Mai 1886 (s).



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886


Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I_P1.A.6.


9 Mai 1886 (m).



9 Mai 1836 (s).



10 Mai 1886 (m).



10 Mai 1886 (s).



11 Mai 1886 (m).



11 Mai 1886 (s).



12 Mai 1886 (m).



12 Mai 1886 (s).



13 Mai 1886 (m).




13 Mai 1886 (s).



14 Mai 1886 (m).



14 Mai 1886 (s).



15 Mai 1886 (s).



16 Mai 1886 (m).



17 Mai 1886 (s).



18 Mai 1886 (m).




18 Mai 1886 (3).



19 Mai 1886 (m).



19 Mai 1886 (s).



20 Mai 1886 (s).




CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A. 7

21 Mai 1886 (m).



21 Mai 1886 (s).



22 Mai 1886 (m).




22 Mai 1886 (s).



23 Mai 1886 (m).



23 Mai 1886 (s).



24 Mai 1886 (m).



24 Mai 1886 (s).



25 Mai 1886 (m).



25 Mai 1886 (s).



26 Mai 1886 (m).



26 Mai 1886 (s).



27 Mai 1886 (m).




27 Mai 1886 (s).



28 Mai 1886 (m).



28 Mai 1886 (s).



29 Mai 1886 (m).



29 Mai 1886 (s).



30 Mai 1886 (s).



31 Mai 1886 (m).




CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A. 8.

31 Mai 1886 (s)



1^{er} Juin 1886 (m).



1^{er} Juin 1886 (s).



1^{er} Juin 1886 (s).



2 Juin 1886 (m).




2 Juin 1886 (s).



3 Juin 1886 (m).



3 Juin 1886 (s).



4 Juin 1886 (m).



4 Juin 1886 (s).



5 Juin 1886 (m).




5 Juin 1886 (s).



6 Juin 1886 (m).



6 Juin 1886 (s).



7 Juin 1886 (m).



7 Juin 1886 (s).



8 Juin 1886 (m).




8 Juin 1886 (s).



9 Juin 1886 (m).




9 Juin 1886 (s).



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A. 9.



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. PL.A.10

23 Juin 1886 (s).



24 Juin 1886 (s).




25 Juin 1886 (m).



25 Juin 1886 (s).



26 Juin 1886 (m).




26 Juin 1886 (s).



27 Juin 1886 (m).



27 Juin 1886 (s).



28 Juin 1886 (m).



28 Juin 1886 (s).



29 Juin 1886 (m).



29 Juin 1886 (s).



30 Juin 1886 (m).




30 Juin 1886 (s).



1^{er} Juillet 1886 (m).




1^{er} Juillet 1886 (s).



2 Juillet 1886 (m).



2 Juillet 1886 (s).



3 Juillet 1886 (m).



3 Juillet 1886 (s).



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A. II.

4 Juillet 1886 (s).



5 Juillet 1886 (s).




6 Juillet 1886 (s).



7 Juillet 1886 (m.).



7 Juillet 1886 (s).



8 Juillet 1886 (m.).



8 Juillet 1886 (s).



9 Juillet 1886 (m.).



9 Juillet 1886 (s).



10 Juillet 1886 (m.).



10 Juillet 1886 (s).



11 Juillet 1886 (s).



12 Juillet 1886 (s).



13 Juillet 1886 (s).



14 Juillet 1886 (s).



15 Juillet 1886 (s).




16 Juillet 1886.



17 Juillet 1886 (s).



18 Juillet 1886 (s).



19 Juillet 1886 (m.).




CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886


Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1886. T.I. Pl. A.13


30 Juillet 1886 (s.)



31 Juillet 1886 (m.)



31 Juillet 1886 (s.)




31 Juillet 1886 (s.)




2 Août 1886 (s.)



3 Août 1886 (m.)



3 Août 1886 (s.)



4 Août 1886 (m.)



4 Août 1886 (s.)



5 Août 1886 (m.)



5 Août 1886 (s.)



6 Août 1886 (m.)



7 Août 1886 (m.)



8 Août 1886 (s.)




9 Août 1886 (m.)



9 Août 1886 (s.)



10 Août 1886 (m.)



10 Août 1886 (s.)



11 Août 1886 (m.)



11 Août 1886 (s.)



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1886. T.I. Pl.A.14

12 Août 1886 (s.)



13 Août 1886 (m.)



13 Août 1886 (s.)




14 Août 1886 (m.)



14 Août 1886 (s.)



15 Août 1886 (m.)



15 Août 1886 (s.)



16 Août 1886 (s.)



17 Août 1886 (m.)



17 Août 1886 (s.)



18 Août 1886 (m.)



18 Août 1886 (s.)



19 Août 1886 (m.)



19 Août 1886 (s.)



20 Août 1886 (m.)



20 Août 1886 (s.)




21 Août 1886 (m.)




21 Août 1886 (s.)



22 Août 1886 (m.)



22 Août 1886 (s.)



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1886. T.I. Pl.A.15


23 Août 1886 (m.)




23 Août 1886 (s.)



24 Août 1886 (m.)



24 Août 1886 (s.)



25 Août 1886 (s.)



26 Août 1886 (s.)



27 Août 1886 (s.)



28 Août 1886 (s.)



29 Août 1886 (s.)



30 Août 1886 (m.)



30 Août 1886 (s.)



31 Août 1886 (m.)



31 Août 1886 (s.)



1^{er} Septembre 1886 (s.)



2 Septembre 1886 (m.)



2 Septembre 1886 (s.)



3 Septembre 1886 (m.)




3 Septembre 1886 (s.)



4 Septembre 1886 (m.)



4 Septembre 1886 (s.)



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1886. T.I. Pl.A.16

15 Septembre 1886 (m.)



5 Septembre 1886 (s.)



6 Septembre 1886 (m.)




6 Septembre 1886 (s.)



7 Septembre 1886 (m.)




7 Septembre 1886 (s.)




8 Septembre 1886 (m.)




8 Septembre 1886 (s.)




9 Septembre 1886 (s.)



10 Septembre 1886 (s.)




11 Septembre 1886 (m.)



11 Septembre 1886 (s.)



12 Septembre 1886 (s.)



13 Septembre 1886 (s.)



14 Septembre 1886 (m.)



14 Septembre 1886 (s.)



15 Septembre 1886 (m.)



15 Septembre 1886 (s.)



16 Septembre 1886 (m.)



16 Septembre 1886 (s.)



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.


Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A. 17.


17 Septembre 1886 (m.).



17 Septembre 1886 (s.).



18 Septembre 1886 (s.).



19 Septembre 1886 (s.).



20 Septembre 1886 (m.).



20 Septembre 1886 (s.).



21 Septembre 1886 (m.).



21 Septembre 1886 (s.).



22 Septembre 1886 (m.).



22 Septembre 1886 (s.).



23 Septembre 1886 (m.).



23 Septembre 1886 (s.).



24 Septembre 1886 (s.).



26 Septembre 1886 (s.).



29 Septembre 1886 (s.).



30 Septembre 1886 (s.).



1^{er} Octobre 1886 (m.).



1^{er} Octobre 1886 (s.).



2 Octobre 1886 (m.).



2 Octobre 1886 (s.).



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.

Bureau central Météorologique de France.


Annales de 1887. T.I. Pl.A.18.

3 Octobre 1886 (m.)

3 Octobre 1886 (s.)

4 Octobre 1886 (m.)

4 Octobre 1886 (s.)



5 Octobre 1886 (m.)

5 Octobre 1886 (s.)

6 Octobre 1886 (s.)

7 Octobre 1886 (m.)



7 Octobre 1886 (s.)

8 Octobre 1886 (s.)

9 Octobre 1886 (s.)

10 Octobre 1886 (m.)




10 Octobre 1886 (s.)

11 Octobre 1886 (m.)

11 Octobre 1886 (s.)

12 Octobre 1886 (m.)




12 Octobre 1886 (s.)

13 Octobre 1886 (m.)

13 Octobre 1886 (s.)

14 Octobre 1886 (m.)



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.

Bureau central Météorologique de France.


Annales de 1887. T.I. Pl. A.19.

14 Octobre 1886 (s.)

15 Octobre 1886 (s.).

16 Octobre 1886 (m.).

16 Octobre 1886 (s.).





17 Octobre 1886 (m.)

17 Octobre 1886 (s.).

18 Octobre 1886 (m.).

18 Octobre 1886 (s.).




19 Octobre 1886 (m.).

19 Octobre 1886 (s.).

20 Octobre 1886 (m.).

20 Octobre 1886 (s.).






21 Octobre 1886 (m.).

21 Octobre 1886 (s.).

22 Octobre 1886 (s.).

23 Octobre 1886 (m.).




23 Octobre 1886 (s.).

24 Octobre 1886 (m.).

24 Octobre 1886 (s.).

25 Octobre 1886 (m.).



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A. 20.

25 Octobre 1886 (s.).

25 Octobre 1886 (m.).

26 Octobre 1886 (s.).

27 Octobre 1886 (m.).



27 Octobre 1886 (s.).

28 Octobre 1886 (m.).

28 Octobre 1886 (s.).

29 Octobre 1886 (s.).



2 Novembre 1886 (s.).

3 Novembre 1886 (s.).

4 Novembre 1886 (s.).

5 Novembre 1886 (m.).



5 Novembre 1886 (s.).

6 Novembre 1886 (m.).

6 Novembre 1886 (s.).

7 Novembre 1886 (m.).



7 Novembre 1886 (s.).

8 Novembre 1886 (m.).

8 Novembre 1886 (s.).

9 Novembre 1886 (m.).



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl. A. 21.



CARTES JOURNALIÈRES DES ORAGES DE 1886.

Bureau central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl.A.22.

10 Décembre 1886 (m.)



10 Décembre 1886 (s.)



11 Décembre 1886 (m et s.)



12 Décembre 1886 (m.)



12 Décembre 1886 (s.)



13 Décembre 1886 (m.)



13 Décembre 1886 (s.)



14 Décembre 1886 (s.)



15 Décembre 1886 (m.)



15 Décembre 1886 (s.)



16 Décembre 1886 (m.)



16 Décembre 1886 (s.)



17 Décembre 1886 (s.)



20 Décembre 1886 (s.)



21 Décembre 1886 (m.)



27 Décembre 1886 (m.)



27 Décembre 1886 (s.)



28 Décembre 1886 (s.)



28 Décembre 1886 (s.)



29 Décembre 1886 (m.)




PRINCIPALES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES

enregistrées à l'Observatoire du Parc Saint-Maur en 1887.


Bureau Central Météorologique de France.

Annales de 1887 — T.I. Pl.B.1.


Du 14 au 15 Janvier 1887.



Du 17 au 18 Janvier 1887.



Le 16 Janvier 1887.




PRINCIPALES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES

enregistrées à l'Observatoire du Parc Saint-Maur en 1887.


Bureau Central Météorologique de France.

Annales de 1887 — T.I. Pl. B. II.


Du 23 au 24 Janvier 1887.




Le 1^{er} Février 1887.




Du 3 au 4 Février 1887.



Du 12 au 13 Février 1887.



Du 13 au 14 Février 1887.




PRINCIPALES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES

enregistrées à l'Observatoire du Parc Saint-Maur en 1887.


Bureau Central Météorologique de France.

Annales de 1887. T.I. Pl.B.III


Du 23 au 24 Février 1887.




Le 5 Avril 1887.



Du 14 au 15 Février 1887.



Du 15 au 16 Mars 1887.




PRINCIPALES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES

enregistrées à l'Observatoire du Parc Saint-Maur en 1887.


Bureau Central Météorologique de France.

Annales de 1887 — T.I. Pl.B. IV


Du 6 au 7 Avril 1887.



Le 15 Avril 1887.



Du 28 au 29 Avril 1887.




PRINCIPALES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES

enregistrées à l'Observatoire du Parc Saint-Maur en 1887.


Bureau Central Météorologique de France.

Annales de 1887 — T.I. Pl.B. V


Le 5 Juin 1887.




Le 12 Mai 1887.




Le 2 Mai 1887.



Du 1^{er} au 2 Août 1887.



Le 7 Juillet 1887.




PRINCIPALES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES

enregistrées à l'Observatoire du Parc Saint-Maur en 1887.


Bureau Central Météorologique de France.

Annales de 1887 — T.I. Pl. B.VI


Du 29 au 30 Août 1887.



Du 2 au 3 Août 1887.



Du 25 au 26 Septembre 1887.




PRINCIPALES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES

enregistrées à l'Observatoire du Parc Saint-Maur en 1887.


Bureau Central Météorologique de France.

Annales de 1887 — T.I. Pl. B.VII

Du 27 au 28 Septembre 1887.



Du 22 au 23 Octobre 1887.




PRINCIPALES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES

enregistrées à l'Observatoire du Parc Saint-Maur en 1887.


Bureau Central Météorologique de France.

Annales de 1887 — T. I. Pl. B. VIII


Du 21 au 22 Novembre 1887.




Du 21 au 22 Décembre 1887.



Le 26 Octobre 1887.




Le 18 Décembre 1887.



VARIATION DIURNE DES PERTURBATIONS DE LA DÉCLINAISON ET DE LA COMPOSANTE HORIZONTALE à l'Observatoire du Parc Saint Maur, d'après cinq années d'observations (1883-1887).

Bureau central météorologique de France.


Annales de 1887. T. I. Pl. B. IX.



LIGNES D'ÉGALE DÉCLINAISON au 1^{er} Janvier 1888, par M^r Th. Moureaux.

Annales de 1887. — T. I. Pl. B. X.

Bureau central météorologique de France.




• Observations faites par l'Auteur.
 ○ ————— ———— par divers observateurs.

LIGNES D'EGALE COMPOSANTE HORIZONTALE

au 1^{er} Janvier 1888,
par M^r Th. Moureaux.

Bureau central météorologique de France.

Annales de 1887. — T. I. Pl. B. XI.




LIGNES D'EGALE INCLINAISON

au 1^{er} Janvier 1888,
par M^r Th. Moureaux.

Bureau central météorologique de France.

Annales de 1887. — T. I. Pl. B. XII.




• Observations faites par l'auteur.
— " — " — " par divers observateurs.

JANVIER. — ISOBARES MOYENNES CALCULÉES,
Par M. L. TEISSERENG DE BORT.

Bureau central Météorologique de France.

1^{re} approximation.

Annales de 1887. T.I. Pl C 1



JUILLET — ISOBARES MOYENNES CALCULÉES.
Par M. L. TEISSERENC DE BORT.

Bureau central Météorologique de France.

1^{ère} approximation.

Annales de 1887. T I Pl. C 2




JANVIER. — ISOBARES MOYENNES CALCULÉES,
Par M. L. TEISSERENC DE BORT.

Bureau central Météorologique de France.

2^{ème} approximation.

Annales de 1887. T.I. Pl. C. 3.



JUILLET — ISOBARES MOYENNES CALCULÉES,

Par M. L. TEISSERENC DE BORT.

Bureau central Météorologique de France.

2^{ème} approximation.

Annales de 1887. T.I. Pl. C. 4.




TABLE DES MATIÈRES.

TEXTE.

	Pages
INTRODUCTION	v
RAPPORT lu le 4 avril 1888 à la séance générale du Conseil du Bureau central par M. le Vice-Président du Conseil.....	vii
MÉMOIRES.	
Résumé des orages en France et de l'état de l'atmosphère pendant l'année 1886, par M. FRON.....	A. 1
Observations magnétiques faites à l'observatoire du Parc Saint-Maur, pendant l'année 1887, par M. MOUREAUX.....	B. 1
Observations magnétiques faites à l'observatoire de Perpignan, pendant l'année 1887, par M. P. COEURDEVACHE, sous la direction de M. le D ^r FINES.....	B.25
Sur la périodicité des perturbations de l'aiguille aimantée horizontale à l'observatoire du Parc Saint-Maur, d'après cinq années d'observations (1883-1887), par M. MOUREAUX....	B.35
Détermination des éléments magnétiques dans le bassin occidental de la Méditerranée, par M. MOUREAUX.....	B.45
Observations magnétiques faites dans le Levant en 1884-1885, par M. LEPHAY.....	B.191
Études sur le climat de Paris. 3 ^e Partie. Température, par M. RENOU.....	B.193
Sur le calcul de la variation annuelle des éléments météorologiques, par M. Alfred ANGOT.	B.227
Étude sur la marche diurne du baromètre, par M. Alfred ANGOT.....	B.237
Étude sur la synthèse de la répartition des pressions à la surface du globe, par M. L. TEISSERENC DE BORT.....	C. 1

PLANCHES.

	Planches
Cartes journalières des orages de l'année 1886 (Mémoire de M. Fron).....	A. 1 à A.22
Principales perturbations magnétiques enregistrées à l'observatoire du Parc Saint-Maur en 1887 (Mémoire de M. Moureaux)	B. 1 à B. 8
Périodicité des perturbations de l'aiguille aimantée horizontale (Mémoire de M. Moureaux).....	B. 9
Cartes des éléments magnétiques dans le bassin occidental de la Méditerranée (Mémoire de M. Moureaux).....	B.10 à B.12
Isobares moyennes de janvier et de juillet (Mémoire de M. L. Teisserenc de Bort)....	C. 1 à C. 4

FIN.

3 8398 1005 5717 6



NOAA CENTRAL LIBRARY